

内科护理学

题号	预测题干	预测答案	星级
1	Graves 的主要原因是	自身免疫性疾病	☆☆☆
2	高血压最常见的致死原因是	脑出血	☆☆☆
3	SLE 最常见死亡原因	肾脏损害	☆☆☆
4	尿路感染最常见的感染途径是	上行感染	☆☆☆
5	原发性肾病综合征治疗首选药物是	糖皮质激素	☆☆☆
6	心绞痛发作期首选	硝酸酯类药物, 如硝酸甘油舌下含化	☆☆☆
7	肝胆系统(胆囊炎) 首选检查是	B 型超声	☆☆☆
8	通过疼痛发作时间可鉴别胃溃疡和十二指肠溃疡	胃溃疡是进食后疼痛; 十二指肠溃疡为饥饿痛, 进食后缓解	☆☆☆
9	心绞痛和心肌梗死的临床表现	心肌梗死疼痛性质与心绞痛相似, 只不过是疼痛更加剧烈; 心肌梗死疼痛持续时间比心绞痛长; 心肌梗死含服硝酸甘油无效, 而心绞痛含服硝酸甘油几分钟内缓解; 心肌梗死一般无诱因, 而心绞痛常因诱因而发作	☆☆☆
10	如何根据病例中提供的信息判断病人心功能的级别?	心功能 I (不受限制)、心功能 IV 级 (完全受限制) 是两个极端, 不需记忆, 考生只需区别心功能 II 级、III 级。II 级是日常活动会引起气急、心悸, III 级是低于平时一般活动量会引起气急、心悸	☆☆☆
11	心源性水肿与肾性水肿比较	心源性水肿通常出现在身体低垂及组织疏松的部位, 而肾性水肿通常出现在面部及眼睑	☆☆☆
12	急性肺水肿典型症状? 处理	急性肺水肿最典型症状是咯粉红色泡沫痰, 吸氧时可给予 30%~50% 酒精湿化的氧气, 以减轻肺泡内泡沫的表面张力	☆☆☆
13	如何根据动脉血氧分压和二氧化碳分压的结果判断呼吸衰竭的类型?	动脉血氧分压 < 60mmHg 属于 I 型呼吸衰竭; 动脉血氧分压 < 60mmHg 和二氧化碳分压 > 50mmHg 属于 II 型呼吸衰竭	☆☆☆
14	如何区分脑出血和脑血栓形成	脑出血病人通常患有高血压, 在白天情绪激动、过度活动后发病, 主要表现为剧烈头痛、恶心、呕吐; 脑血栓病人通常患有动脉硬化、高脂血症、在睡眠或安静休息后发病, 主要表现为肢体瘫痪	☆☆☆

内科 护理学	15	禁忌使用吗啡疾病	呼吸困难或咯血、胰腺、胆道疾病、颅脑损伤、急腹症	☆☆☆
	16	慢阻肺典型体征	桶状胸；叩诊过清音	☆☆☆
	17	支气管哮喘典型表现	呼气性呼吸困难，常被迫坐起	☆☆☆
	18	癫痫抽搐发作首要的处理措施是什么？	癫痫大发作时病人意识丧失，应松解衣领及裤带，病人头位放低，偏向一侧，以防窒息	☆☆☆
	19	铁锈色痰	大叶性肺炎（肺炎链球菌肺炎）	☆☆☆
	20	艾滋病最为关键的治疗	抗病毒治疗	☆☆☆
	21	慢性再生障碍性贫血首选药	雄激素	☆☆☆
	22	上呼吸道感染常见致病菌(病原菌)	病毒	☆☆☆
	23	导致心功能不全的最常见的诱因	上呼吸道感染	☆☆☆
	24	右心衰竭特征性的体征	颈静脉怒张、肝颈静脉回流征阳性	☆☆☆
	25	左心衰竭最早出现的症状	劳力性呼吸困难	☆☆☆
	26	颅内压增高表现	头痛、呕吐、视乳头水肿	☆☆☆
	27	上消化道出血最常见的原因	消化性溃疡	☆☆☆
	28	消化性溃疡(胃癌)首选确诊检查	胃镜	☆☆☆
	内科 护理学	29	呕吐隔夜宿食，说明发生了	幽门梗阻
30		膈下游离气体，可能发生了	穿孔	☆☆☆
31		引起肝硬化最常见的病因	病毒性肝炎（乙型多见）	☆☆☆
32		肝硬化最严重的并发症	肝性脑病	☆☆☆
33		胰腺癌常好发于	胰头	☆☆☆
34		确诊肺结核最特异、最简便的方法	痰结核菌检查	☆☆☆
35		诊断慢性阻塞性肺疾病（COPD）最有价值的检查是	肺功能检查（FEV1/FVC）	☆☆☆
36		控制支气管哮喘症状的首选药物	受体激动剂（沙丁胺醇）	☆☆☆
37		肾盂肾炎最常见致病菌	大肠杆菌	☆☆☆
38		诊断白血病依据	骨髓检查	☆☆☆
39		诊断癫痫主要依据	病史和脑电图	☆☆☆
40		癫痫持续状态首选用药	安定（地西洋）	☆☆☆