

- 1.属于牙内陷的是
 - A.牙中牙
 - B.畸形舌侧窝
 - C.畸形根面沟
 - D.畸形舌侧尖
 - E.以上说法均正确
- 2.下列有关四环素牙的叙述中，不正确的是
 - A.妊娠和喂母乳的妇女不宜使用四环素类药物
 - B.12岁以下的小儿不宜使用四环素类药物
 - C.可使用可见光复合树脂修复治疗
 - D.可使用塑料贴面修复治疗
 - E.可使用高浓度过氧化氢液脱色治疗
- 3.畸形中央尖高度约为
 - A.1~3 mm
 - B.2~4 mm
 - C.3~4 mm
 - D.4 mm
 - E.4 mm 以上
- 4.活髓切断术不适用于
 - A.前牙深龋
 - B.后牙深龋
 - C.部分冠髓牙髓炎
 - D.牙髓坏死
 - E.前牙外伤性冠折露髓
- 5.关于融合牙的处理不正确的是
 - A.融合牙对牙列无任何影响，可不作处理
 - B.切缘处有局限性分离，用光固化树脂修复
 - C.融合处成沟状，应早做窝沟封闭
 - D.定期观察
 - E.融合牙会影响恒牙萌出，应尽早拔除
- 6.颌面部间隙感染的病原菌
 - A.以金黄色葡萄球菌为主
 - B.以溶血性链球菌为主
 - C.混合性细菌感染为主
 - D.厌氧菌感染为主
 - E.特异菌感染为主
- 7.治疗年轻恒牙的操作中不妥当的是
 - A.考虑年轻恒牙的形态、组织结构和生理特点
 - B.宜用金刚砂车针高速切削，减少牙质发生裂纹
 - C.用龋蚀显示液
 - D.挖匙去除深部软化牙本质，避免不必要的露髓
 - E.选用对牙髓无刺激的材料垫底
- 8.引起牙髓活力电测验假阴性的原因不包括
 - A.测试前使用过麻醉剂

- B.根尖尚未形成的牙齿
C.刚受过外伤的牙齿
D.干髓治疗的牙齿
E.根管内过度钙化的牙齿
- 9.下列哪一项不是恒磨牙早萌的特点
A.先行的乳磨牙根尖周病变
B.先行的乳磨牙过早脱落
C.乳磨牙根尖周病变造成恒磨牙牙胚周围牙槽骨破坏
D.恒牙发育过快
E.松动
- 10.眶下间隙脓肿首选的治疗方法是
A.从口外切开引流
B.拔除病源牙
C.局部理疗
D.病源牙行根管开放引流
E.从口内切开引流
- 11.关于逆行性牙髓炎的治疗措施叙述错误的是
A.患牙如能保留，先去髓，再根管治疗
B.牙髓治疗的同时进行牙周系统治疗
C.必要时考虑将患根截除，保留患牙
D.如治疗预后差，则可直接拔除患牙止疼
E.不必考虑牙周手术，如分根术、截根术等
- 12.慢性根尖周囊肿的诊断主要依靠
A.牙髓电活力检查
B.温度试验
C.咬诊和叩诊
D.探诊和扪诊
E.X线检查
- 13.慢性根尖周炎主要的病变类型为
A.致密性骨炎
B.根尖周肉芽肿
C.根尖脓肿
D.根尖囊肿
E.有瘘型根尖脓肿
- 14.X线片根尖周透射区包括多个未治疗牙时确诊病源牙的主要依据是患牙
A.有无龋洞
B.是否有牙周疾病
C.牙髓有无活力
D.有无窦道
E.有无叩痛
- 15.感染根管内的主要细菌是
A.链球菌类
B.兼性厌氧菌
C.专性厌氧菌

D.真细菌类

E.放线菌类

16.细胞性牙骨质的沉积以补偿牙冠的磨耗发生于

A.牙颈部

B.牙冠 1/3

C.牙根中 1/3

D.牙根尖 1/3

E.牙髓腔

17.根管治疗过程可发生的并发症

A.器械折断

B.急性根尖周炎

C.皮下气肿

D.侧壁穿孔

E.以上都是

18.局限性侵袭性牙周炎的临床表现之一是

A.多发生于青少年男生

B.早期口腔不清洁

C.好发于第一磨牙和上下切牙

D.牙槽骨水平吸收

E.以父系遗传较多

19.以下哪一项不属于酸蚀的作用

A.增加釉质表面的粘结面积

B.增大釉质表面可湿性有利于粘接剂的渗入

C.保护牙髓活力

D.暴露出釉质新鲜层

E.增加釉质表面的粗糙度

20.关于牙震荡治疗的顺序说法不正确的是

A.受伤后 1、3、6、12 个月应进行定期复查

B.牙冠不变色，牙髓活力测试正常需行根管治疗

C.牙髓坏死的情况时，可以进行根管治疗术

D.年轻恒牙牙髓活力可在受伤后 1 年内才丧失

E.患牙在必要时应该降低咬合减轻负担

21.侵袭性牙周炎与慢性牙周炎不同的是，早期可出现

A.龈出血肿胀

B.脓肿

C.菌斑堆积

D.牙松动移位

E.龋增长

22.在疾病三级预防中，做好早期发现、早期诊断、早期治疗的“三早”预防工作在

A.第一级预防

B.第二级预防

C.第三级预防

D.第一级预防和第二级预防

E.第二级预防和第三级预防

23.为了解某地区铅污染的情况,抽样收集了130人的尿铅值,经分析发现数据为偏态分布。若要对数据进行描述,应选择集中趋势和离散程度的指标为

- A.中位数和标准差
- B.中位数和极差
- C.中位数和四分位间距
- D.算术均数和标准差
- E.算术均数和四分位间距

24.关于随机抽样研究中,下列描述哪项是错误的

- A.采集样本应遵循随机化原则
- B.实行抽样时,要使总体中每个个体都有同等机会被抽到
- C.调查者可在总体中随意抽取任意部分作为样本
- D.抽取的样本对总体要有代表性
- E.严格控制的随机抽样有助于减少样本的偏性

25.牙周病的最基本治疗应包括

- A.松牙固定术
- B.牙龈切除术
- C.牙周翻瓣术
- D.调磨接触面
- E.清除菌斑和牙石

26.牙周创伤的表现不包括

- A.与受力方向有关的牙移位
- B.牙周间隙加宽
- C.牙根一侧常形成窄而深的骨下袋
- D.牙松动
- E.牙槽骨常出现水平吸收

27.牙周翻瓣术的适应证不包括

- A.3 mm 以内的骨上袋
- B.牙周袋深度超过 5 mm 以上
- C.袋底超过膜龈联合线
- D.牙周病变范围大
- E.牙龈窦道距牙龈缘较远

28.牙周基础治疗后进行第一次复查的时间一般在治疗后

- A.1~2 周
- B.3 周
- C.2~3 个月
- D.5 个月
- E.1~2 年

29.牙周脓肿的特点是

- A.脓肿弥散
- B.牙髓无活力
- C.牙齿不敢咬合
- D.X 线片上根尖区有阴影
- E.脓肿局限于牙周袋壁区

30.在根管治疗疗效评估观察的时间指定为术后

- A.1 年
- B.2 年
- C.3 年
- D.4 年
- E.5 年

31.人工解剖式牙牙尖斜度为

- A.0° 或 3°
- B.10° 或 13°
- C.20° 或 23°
- D.30° 或 33°
- E.40° 或 43°

32.前腭杆的前缘应

- A.位于上前牙舌隆突上
- B.离开上前牙舌侧龈缘 6 mm
- C.离开上前牙舌侧龈缘 3 mm
- D.位于上前牙舌侧龈缘附近
- E.离开上前牙舌侧龈缘 10 mm 以上

33.上颌基托的哪个部分适宜做薄, 以减少发音影响

- A.前腭 2/3 部分
- B.前腭 1/2 部分
- C.前腭 1/3 部分
- D.后腭 2/3 部分
- E.后腭 1/3 部分

34.上颌义齿远中游离端基托的颊侧应

- A.覆盖整个上颌结节
- B.覆盖上颌结节的 2/3
- C.覆盖上颌结节的 1/2
- D.覆盖上颌结节的 1/3
- E.让开上颌结节

35.下面关于黏膜支持式义齿的描述, 正确的是

- A.力通过卡环传导到基牙上
- B.力通过基托传导到黏膜和牙槽骨上
- C.力通过支托传导到黏膜和牙槽骨上
- D.力通过基托传导到基牙上
- E.力通过支托传导到基牙上

36.可摘局部义齿基托组织面不作缓冲的部位是

- A.上颌结节颊侧
- B.上颌硬区
- C.下颌隆突
- D.磨牙后垫
- E.内斜嵴

37.制锁角是指

- A.义齿部件与余留牙之间的夹角
- B.义齿就位道与基牙长轴之间的夹角

- C.义齿就位道与脱位道的方向之间所形成的夹角
D.义齿就位道与基牙邻面间的夹角
E.义齿脱位道与基牙长轴之间的夹角
- 38.多数上前牙缺失用活动义齿修复，在排牙时不正确的提法是
A.人工牙的颜色应与相邻天然牙协调
B.中线应与下颌前牙中线一致
C.人工牙的颈缘线与相邻天然牙的颈缘在同一水平
D.人工牙的大小应与患者面形协调
E.人工牙的排列应与颌弓形状相适应
- 39.牙槽嵴修整术适用于
A.口腔内瘢痕组织
B.牙槽嵴表面的松动软组织
C.唇舌系带附着过高
D.拔牙后造成的骨尖或者骨突起
E.以上均适合
- 40.一般拔牙后多长时间可考虑固定义齿修复
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.4个月
E.6个月
- 41.固定桥若有中间基牙，此基牙的固位体不应选择
A.烤瓷熔附金属全冠修复
B.嵌体
C.铸造全冠
D.开面冠
E.3/4冠
- 42.在以下关于全冠咬合面的描述中不准确的是
A.必须恢复原有的面大小与形态
B.应与邻牙面形态相协调
C.应与对颌牙面形态相协调
D.力方向接近牙齿长轴
E.无早接触
- 43.固定桥基牙临床冠根比的最低限度为
A.1:1
B.1:2
C.1:3
D.2:3
E.3:2
- 44.关于固定桥特点的描述，错误的是
A.基牙的数量由缺牙间隙大小决定
B.力主要由基牙承担
C.基牙牙根必须有足够的支持力
D.基牙牙冠固位形必须有良好的固位力

- E.可以正确恢复缺失牙面的解剖形态
- 45.对于选作固定义齿基牙的死髓牙必须进行的处理是
- A.完善的根管治疗
 - B.采用桩核冠固位体
 - C.增加基牙，分散力
 - D.减小牙体预备量以增加基牙抗力
 - E.采用可动连接体以缓冲力
- 46.下列措施中不能减小固定桥桥体所受力的是
- A.减小桥体颊舌径
 - B.增加桥体牙尖斜度
 - C.加深桥体面窝沟
 - D.扩大桥体与固位体间的外展隙
 - E.消除桥体早接触及干扰
- 47.支托具有以下作用，除了
- A.支持作用
 - B.做间接固位体
 - C.防止食物嵌塞
 - D.防止向脱位的作用
 - E.恢复咬合接触
- 48.下列哪些患者不适合进行可摘局部义齿修复
- A.恶性肿瘤患者
 - B.癫痫患者
 - C.颞下颌关节紊乱病患者
 - D.牙周病患者
 - E.冠心病患者
- 49.关于可摘局部义齿基托伸展的范围，下列哪项是错误的
- A.应与天然牙轴面的非倒凹区轻轻接触
 - B.上颌远中游离者应伸至翼颌切迹，远中颊角应覆盖上颌结节
 - C.下颌远中游离者应覆盖磨牙后垫 $1/3 \sim 1/2$
 - D.基托应尽量伸展以获得良好的封闭和固位效果
 - E.尽量减小基托范围，使患者感到轻巧、舒适、美观
- 50.下列对可摘局部义齿间接固位体的作用的描述中不正确的是
- A.辅助固位作用，间接防止义齿向脱位
 - B.对抗侧向力，防止义齿摆动
 - C.平衡作用，防止义齿旋转
 - D.支持作用，防止义齿下沉
 - E.稳定作用，防止义齿翘起
- 51.对整复手术缝合的边距和针距的要求范围是
- A.边距 $2 \sim 3$ mm，针距 $3 \sim 5$ mm
 - B.边距 $2 \sim 3$ mm，针距 $4 \sim 6$ mm
 - C.边距 $4 \sim 5$ mm，针距 $4 \sim 6$ mm
 - D.边距 $4 \sim 5$ mm，针距 $6 \sim 7$ mm
 - E.边距 $5 \sim 6$ mm，针距 $6 \sim 7$ mm
- 52.环甲膜切开术后插管时间最长不宜超过

- A.8 小时
- B.10 小时
- C.12 小时
- D.24 小时
- E.48 小时

53.儿童行舌系带矫正术时，最好的年龄是

- A.4~6 个月
- B.7~12 个月
- C.1~2 岁
- D.3~4 岁
- E.4~5 岁

54.骨髓腔或骨孔内的出血可用

- A.温热盐水纱布压迫止血
- B.荷包缝扎止血
- C.骨蜡填充止血
- D.碘仿纱条填塞压迫止血
- E.手指压迫知名动脉的近心端

55.牙槽窝颊侧骨板折断易出现在拔除

- A.上颌中切牙
- B.下颌中切牙
- C.上下颌尖牙
- D.上颌前磨牙
- E.下颌前磨牙

56.列对进入上颌窦内的牙根描述错误的是

- A.常见于上颌第一磨牙的腭侧根
- B.亦常见于上颌第二磨牙的近中颊根
- C.因受入路限制，翻瓣去骨法仅适用于进入的颊根
- D.冲洗法适于进入的颊根或腭根
- E.牙挺放置不当或用力没有控制所致

57.预防干槽症，下列哪项是错误的

- A.减少手术创伤
- B.尽量延长局部压迫止血的时间
- C.注意无菌操作
- D.注意口腔卫生
- E.保护拔牙创内凝血块

58.临床创口分类中包括

- A.无菌创口、污染创口和化脓创口
- B.无菌创口、感染创口和化脓创口
- C.无菌创口、污染创口和感染创口
- D.污染创口、感染创口和化脓创口
- E.无菌创口、可疑创口和感染创口

59.舌损伤的处理原则是

- A.尽量保持舌的长度
- B.用细针细线缝合

- C.缝合时距创缘尽量近
D.尽量浅缝
E.尽量剪除碎裂组织
- 60.脓肿或死腔的引流物的去除应根据
A.放置 24~48 小时后
B.引流物放置的深浅
C.24 小时内引流量未超过 20~30 ml
D.脓液及渗出液完全消除
E.引流物为异物，应尽早拔除
- 61.创伤性溃疡的治疗应首选
A.肾上腺皮质激素及免疫抑制剂
B.去除刺激因素
C.局部消炎止痛
D.免疫增强剂
E.全身应用抗生素
- 62.口腔扁平苔藓的基本病损是
A.斑
B.丘疹
C.丘斑
D.糜烂
E.溃疡
- 63.皱纸状白斑好发于
A.颊黏膜
B.下唇
C.上唇
D.口角区
E.口底及舌腹
- 64.下列不属于地图舌临床表现的是
A.丝状乳头片状剥脱
B.舌背形成红色光滑区
C.红色区可糜烂
D.萎缩区微凹陷
E.菌状乳头清晰可见
- 65.以萎缩性损害为主的舌炎是
A.叶状乳头炎
B.菌状乳头炎
C.轮廓乳头炎
D.丝状乳头炎
E.毛舌
- 66.《医疗事故处理条例》规定患者在发生医疗纠纷的时候可以封存和复印病历，下列资料中哪项属于可以封存但不能复印的病历资料
A.会诊记录
B.门诊病历
C.手术及麻醉记录单

D.病理报告单

E.化验报告单

67.《医疗事故处理条例》规定，造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的属于

A.一级医疗事故

B.二级医疗事故

C.三级医疗事故

D.四级医疗事故

E.严重医疗差错

68.《药品管理法》对医疗机构配制的制剂有一系列规定，下列哪项不符合上述规定

A.应当是本单位临床需要而市场上没有供应的品种

B.可以部分在市场销售

C.必须按照规定进行质量检验

D.凭医师处方在本医疗机构使用

E.不得在市场销售

69.以下哪项不是龋齿的发病过程

A.牙菌斑形成

B.致龋菌代谢糖类产酸

C.多聚糖形成

D.硬组织脱矿溶解

E.唾液减少分泌

70.平滑面龋中最易发生龋坏的部位是

A.颈部

B.邻面

C.根部

D.牙颈部

E.窝沟

71.牙周病患者中因牙龈萎缩而在牙颈部以下的部位产生的龋多为

A.颈部龋

B.冠部龋

C.邻面龋

D.根龋

E.窝沟龋

72.除面外，龋损最易好发部位是

A.腭面

B.唇面

C.颊面

D.舌面

E.邻面

73.在诊断深龋和可复性牙髓炎时，用了冷水做温度试验，应避免

A.隔离唾液

B.干燥牙面

C.先测下牙后测上牙

D.冷水进入窝洞内

E.先测对照牙

74.以下哪个面是点隙窝沟龋的好发部位

- A.上颌中切牙的唇面
- B.上颌侧切牙的邻面
- C.上颌侧切牙的舌窝
- D.下颌中切牙的舌面
- E.下颌侧切牙的唇面

75.窝沟龋首先病变的部位是

- A.窝沟侧壁
- B.窝沟基底部
- C.平滑面釉质
- D.釉牙本质界
- E.釉质牙骨质界

76.根据牙面解剖形态可以分为两种类型，I型为窝沟龋，则II型为

- A.点隙龋
- B.隐匿性龋
- C.根面龋
- D.线性釉质龋
- E.平滑面龋

77.发生于牙齿颊面或舌面，靠近釉牙骨质界处的龋损为

- A.釉质龋
- B.冠部龋
- C.根部龋
- D.牙颈部龋
- E.窝沟龋

78.银汞合金雕刻形态是在充填完成多长时间后开始

- A.1~2 分钟
- B.2~3 分钟
- C.3~5 分钟
- D.6~8 分钟
- E.8~10 分钟

79.以下关于牙本质粘接的难点，叙述正确的是

- A.酸蚀脱矿后牙本质内大量胶原纤维塌陷
- B.酸蚀处理后釉质表面活化能提高
- C.使用磷酸进行蚀刻
- D.除去玷污层又不损伤牙髓牙本质复合体
- E.牙本质的矿化程度较釉质低，有机物和水含量较釉质低

80.下列有关釉质发育不全的防治的说法中，不正确的是

- A.轻症患者不必治疗
- B.患者补充维生素 D 和矿物质
- C.由于患者发育矿化较差，容易磨耗
- D.注意妇幼保健，可预防本病发生
- E.重症患者用复合树脂或用口腔修复学的方法覆盖牙面

81.拔牙后全口义齿修复的最佳时间是

- A.1 个月
- B.2 个月
- C.3 个月
- D.4 个月
- E.6 个月

82.制取无牙颌印模时，为提高全口义齿的固位和稳定，下列正确的是

- A.尽可能扩大印模面积
- B.取功能性印模
- C.不用使组织均匀受压
- D.使用弹性小的印模材料
- E.保持托盘一侧不动

83.下列确定颌位关系的方法中，哪项是可以客观观察下颌后退程度的方法

- A.哥特式弓
- B.卷舌后舔法
- C.吞咽咬合法
- D.后牙咬合法
- E.面部外形观察法

84.颌位关系的记录指的是

- A.正确恢复颌间距离
- B.正确恢复面下 1/3 距离
- C.正确恢复面下 1/3 距离和髁突的生理后位
- D.正确恢复面部的形状
- E.纠正侧向咬合和下颌前伸习惯

85.下列哪项不是临床上常用的确定垂直距离的方法

- A.拔牙前记录
- B.面部形态观察法
- C.息止颌间隙法
- D.X 线投影测量
- E.参照旧义齿法

86.全口义齿人工前牙排列成浅覆、浅覆盖的原因是

- A.有助于发音
- B.有助于美观
- C.便于排列人工牙
- D.模拟天然牙
- E.便于取得前伸平衡

87.下列哪项不属于解剖式牙的特点

- A.咀嚼效能高
- B.美观效果好
- C.适用于牙槽嵴高而宽者
- D.侧向力小，有利于义齿稳定
- E.牙尖斜度为 30° ~ 33°

88.上颌 Kennedy 第一类牙列缺损者可以采取单侧分别设计的病例是

- A.8778 缺失
- B.87645678 缺失

C.876423678 缺失

D.873678 缺失

E.876578 缺失

89.属于特殊结构的固定桥是

A.半固定桥

B.双端固定桥

C.种植固定桥

D.单端固定桥

E.复合固定桥

90.疱疹性龈口炎多见于

A.6个月~2岁婴幼儿

B.学龄前儿童

C.青少年

D.中年人

E.老年人

91.患者,女,65岁,下颌义齿基托边缘锐利,下后牙前庭沟处可见一处深在溃疡,边缘隆起,疼痛不明显,最可能的诊断是

A.自伤性溃疡

B.结核性溃疡

C.褥疮性溃疡

D.癌性溃疡

E.义齿性口炎

92.患者,女,60岁。上、下颌牙列缺失。对该患者颌面部的检查不包括

A.上唇的长度

B.面部的比例

C.张口习惯

D.侧面面型

E.颌间距离

93.患者,女,72岁。戴全口义齿数周,由于疼痛前来求治。检查发现全口义齿固位良好,而患者无准确定位疼痛点,口腔黏膜也未见明显压痛点。分析最有可能的原因是

A.垂直距离过大

B.垂直距离过小

C.正中时接触不良

D.没有达到前伸平衡

E.牙槽嵴上有骨尖

94.一无牙颌患者,牙槽嵴低平,戴义齿后主诉咬合痛,检查时未发现黏膜有明显改变。合适的处理方法是

A.基托组织面缓冲

B.基托边缘磨短

C.加大后牙牙尖斜度

D.选磨调

E.检查戴用,逐渐适应

95.患者,女,83岁。牙列缺失,牙槽嵴狭窄,全口义齿修复后咀嚼效率低,其原因不可能是

- A.牙槽嵴狭窄，固位较差
- B.垂直距离过低
- C.咬合接触少
- D.年龄过大
- E.人工牙过小

96.患者，男，24岁，早餐进食过快，发现右侧软腭突然发现一处血疱；疼痛不适，大小约1.0 cm×0.5 cm，自述以前从未有过类似病损，体检口腔内其余黏膜及皮肤未见有异常，最可能的诊断是

- A.寻常型天疱疮
- B.大疱性类天疱疮
- C.血小板减少性紫癜。
- D.黏膜血疱
- E.以上都不是

97.患者，女，52岁，上唇反复干燥、皲裂，表面覆有黄白色脱皮，并有轻度肿胀伴有发痒，秋冬季加重，最可能的诊断是

- A.肉芽肿性唇炎
- B.慢性脱屑性唇炎
- C.慢性糜烂性唇炎
- D.腺性唇炎
- E.过敏性唇炎

98.患者，女性，18岁。检查时发现左下第一磨牙穿髓孔，用尖锐探诊探查时剧痛，伴有少量暗色血液渗出，牙面堆积大量牙石。最可能的诊断为

- A.慢性闭锁性牙髓炎
- B.急性牙髓炎
- C.慢性溃疡性牙髓炎
- D.慢性增生性牙髓炎
- E.残髓炎

99.患者，男，36岁半年来右上后牙牙龈反复出现小脓包，曾两次肿痛，流出少许咸味液体。检查时最可能见到

- A.右上后牙龋齿和龈瘘
- B.多个牙齿松动
- C.多个龋坏牙齿
- D.牙龈处多处口腔溃疡
- E.变色牙和口腔溃疡

100.患者，男，16岁。左下67缺失，左下8未萌，以下设计合理的是

- A.左下45单端桥修复左下67
- B.左下345单端桥修左下67
- C.左下2345单端桥修复左下67
- D.左下12345单端桥修左下67
- E.活动义齿修复

101.患者，男。左上25缺失，固定义齿修复最佳设计方案为

- A.左上1单端桥修复左上2，左上6单端修复左上5
- B.左上1左上3双端固定桥修复左上2，左上46双端固定桥修复左上5
- C.左上346为基牙的复合固定桥

D.左上 1346 为基牙的复合固定桥

E.以上设计均不合理

102.患者女,44 岁。因右上后牙遇冷热敏感 1 周就诊。检查发现深龋,洞底较深、近髓。去腐质过程中患者疼痛明显,首选的治疗方法应是

A.局麻下开髓作牙髓治疗

B.可进行安抚治疗或间接盖髓

C.氢氧化钙制剂直接盖髓

D.聚羧酸锌粘固粉垫底永久充填

E.氧化锌丁香油粘固粉垫底永久充填

103.患者男,22 岁。左上后牙近来常嵌塞食物疼痛,遇冷热甜酸刺激时敏感,但无自发痛。检查发现左上 5 深龋,探洞底敏感,无叩痛。治疗前应当判明的主要问题是

A.龋洞的大小

B.龋洞的位置

C.龋坏组织的多少

D.腐质颜色的深浅

E.牙髓-牙本质复合体反应

104.患儿,女,7 岁,下颌第一恒磨牙做过窝沟封闭,但半年后做口腔检查时发现封闭剂脱落,少有的可能原因是

A.儿童唾液丰富,隔湿困难

B.牙面有牙石

C.局部清洁不彻底

D.光固化时间不足

E.恒磨牙半萌出而致窝沟难以干燥

105.患者,男,12 岁,左下第一恒磨牙曾做根尖诱导成形术,今来复查。X 线检查下列哪一项不是根尖诱导进步的评价标准

A.根尖周病变消失

B.牙根延长

C.根端闭合

D.根尖未完全形成

E.根尖形成极不规则

106.患儿,女,8 岁,因右下后牙食物嵌塞引起疼痛而就诊,检查:探(+),松(-)。叩诊检查不正确的是

A.垂直叩

B.侧面叩

C.先叩患牙,再叩正常邻牙

D.叩时用力要轻

E.患儿对疼痛诉说不清时,观察患儿眼神及表情

107.女,25 岁,因右下第二前磨牙中央尖折断,被诊断力慢性根尖周炎。患牙不松动,X 线片见根尖部呈燕尾状吸收,根尖周 X 线透射区 5 mm×5 mm,边界较清楚。患牙的治疗为

A.拔除

B.干髓治疗

C.塑化治疗

D.根管治疗

E.根尖诱导成形术

108.患者，男性，54岁，左下后牙咀嚼痛，冷水敏感，偶有自发痛。查：左下第一磨牙未见龋坏及隐裂，近中可探及深牙周袋。X线片可见近中根管影像全长增宽边缘整齐。最可能的诊断为

- A.根折
- B.内吸收
- C.外吸收
- D.牙根纵折
- E.牙周炎

109.男。20岁。昨夜右侧后牙痛未眠。痛为阵发性，服止痛片无效。查：右上5牙冠未见龋，叩痛(-)，不松动，冷刺激引起剧痛。引起该患牙牙髓疾病的最可能原因是

- A.隐匿龋
- B.牙隐裂
- C.发育异常
- D.楔状缺损
- E.咬合创伤

110.患者，男，73岁，进食时自觉右下后牙酸痛，无自发痛史。临床检查：右下第一、二磨牙磨耗严重，探诊敏感，冷(-)，叩(-)，无松动，牙结石Ⅰ度。其可能的诊断为

- A.浅龋
- B.中龋
- C.深龋
- D.釉质发育不全
- E.牙本质过敏症

111.患者，女，6岁，自诉左下磨牙不能咀嚼食物，并诉该牙3个月前曾行根管治疗，经医生检查，诊断为牙折。以下哪些原因易引起牙折

- A.根管充填时侧向或垂直向压力过大
- B.治疗过程中过度切削牙本质
- C.髓腔预备时过多去除牙本质
- D.牙冠有隐裂
- E.包括以上各项

(112~114题共用题干)

患者，男，27岁。牙龈疼痛、自动出血3天。检查：腐败性口臭，多个牙的牙龈乳头尖端消失变平，下切牙的龈缘虫蚀状坏死，有灰白膜覆盖。

112.该病最可能的诊断是

- A.边缘性龈炎
- B.增生性龈炎
- C.急性坏死性龈炎
- D.慢性牙周炎
- E.侵袭性牙周炎

113.对诊断最有帮助的辅助检查是

- A.涂片革兰染色
- B.查白细胞
- C.拍曲面断层片
- D.咬合检查
- E.肌电图检查

114.分析导致该病的主要病原微生物为

- A.伴放线放线杆菌
- B.牙龈卟啉单胞菌
- C.葡萄球菌
- D.梭形杆菌和螺旋体
- E.放线菌

(115~118 题共用题干)

患者，男。3年前行全口修复，使用1年后，一颗人工牙完整脱落，同时发现吃食物费力，咬恶心，出现疼痛，要求诊治。

115.人工牙完整脱落的原因不包括

- A.人工牙盖嵴部粘蜡未去净
- B.人工牙盖嵴部未磨粗糙
- C.人工牙盖嵴部未用单体膨胀
- D.人工牙盖嵴部有分离剂
- E.人工牙大小不合适

116.出现疼痛的原因是

- A.牙槽嵴骨尖
- B.咬合力过大
- C.黏膜有炎症
- D.咬合不平衡
- E.牙槽嵴吸收致基托边缘过长

117.咀嚼费力的原因是

- A.患者年龄增加
- B.咬合面磨损
- C.咬合不平衡
- D.咬合疼痛
- E.选用的为塑料牙

118.出现恶心感的原因是

- A.基托边缘过长
- B.患者年龄过大
- C.基托过厚
- D.垂直距离降低
- E.后牙磨损，前牙早接触致基托后缘与黏膜间出现间隙

(119~123 题共用题干)

患者，男，88岁。戴用全口义齿2周后复诊，自述义齿易松动。

119.询问病史时，最重要的是应了解患者

- A.每天戴义齿多长时间
- B.什么情况下义齿松动
- C.过去是否曾戴过义齿
- D.是否能够吃饭和喝汤
- E.是否有偏侧咀嚼习惯

120.首先应做的检查是

- A.正中关系是否正确
- B.垂直距离是否正常

- C.义齿的固位力如何
- D.让患者进食，看有无疼痛
- E.重新制作义齿

121.若患者说明在大张口或打哈欠时义齿易松动，可能的原因是

- A.义齿边缘过度伸展
- B.义齿排列不整齐
- C.义齿咬合不平衡
- D.正中关系不正确
- E.患者未适应义齿

122.进食时义齿容易松动，可能的原因是

- A.义齿边缘过度伸展
- B.系带处缓冲不足
- C.垂直距离恢复过低
- D.义齿磨光面抛光不足
- E.咬合不平衡

123.修改后，患者仍然坚持要求重衬，以下哪种情况需重衬处理

- A.正中关系不正确
- B.垂直距离过低
- C.义齿咬合不平衡
- D.义齿边缘封闭差，不密合
- E.患者要求

(124~128 题共用题干)

男性，42岁。3天来右上后磨牙痛重，冷热加剧，夜间痛而来就诊。近1年多来，右上磨牙进食时咬到某特定位置时出现撕裂样痛，冷热敏感，平时咬物不适。检查：16咬合面似有近远中方向越过边缘嵴的细裂纹，颊尖高陡，无龋洞，不松动，叩痛(+)。

124.为明确诊断做的重要检查是

- A.染色检查
- B.温度试验
- C.咬合关系检查
- D.电活力测试
- E.X线片检查

125.最可能的诊断是

- A.可复性牙髓炎
- B.急性牙髓炎
- C.慢性牙髓炎急性发作
- D.急性根尖周炎
- E.慢性根尖周炎

126.该患牙疾病的病因是

- A.细菌因素
- B.物理因素
- C.化学因素
- D.发育异常
- E.遗传因素

127.治疗方案为

- A. 充填术+调
- B. 盖髓术+调+全冠修复
- C. 塑化治疗+全冠修复
- D. 根管治疗+调
- E. 根管治疗+调+全冠修复

128. 为明确致病因素所作的检查不包括

- A. 咬诊
- B. 染色检查
- C. 咬合关系检查
- D. 温度试验
- E. 电活力测验

(129~130 题共用题干)

患者男，18岁。右上后牙刷牙时冷水刺激疼痛，刺激去除后症状即缓解，检查见咬面龋，探诊(±)，冷水入洞敏感，叩诊(-)，牙周检查(-)。

129. 最可能的诊断为

- A. 牙本质过敏症
- B. 可复性牙髓炎
- C. 深龋
- D. 急性牙髓炎
- E. 慢性溃疡性牙髓炎

130. 最佳的治疗方法是

- A. 牙髓失活
- B. 间接盖髓
- C. 牙脱敏治疗
- D. 安抚治疗
- E. 开髓引流

(131~132 题共用题干)

患者男，30岁。左下前磨牙冷热不适数月。检查：左下5颈部缺损，已露髓，探痛，叩痛(+)，无松动，热测引起痛。

131. 应诊断为

- A. 楔状缺损
- B. 深龋
- C. 酸蚀症
- D. 慢性牙髓炎
- E. 慢性根尖周炎

132. 选用的治疗方法是

- A. 盖髓术
- B. 活髓切断
- C. 干髓术
- D. 根管治疗
- E. 塑化治疗

(133~135 题共用备选答案)

- A. 1/4
- B. 1/3

C.2/3

D.1/5

E.1/2

133.冠桩的长度一般为根长的

134.固定桥的基牙牙槽骨吸收不能超过根长的

135.可保留的牙齿其牙槽骨吸收不能超过根长的

(136~138 题共用备选答案)

A.0.1 mm

B.0.2 mm

C.0.3 mm

D.0.5 mm

E.1.0 mm

136.金瓷冠的基底冠厚度至少为

137.钉洞固位形的直径一般为

138.铸造金属全冠凹形边缘的宽度为

(139~141 题共用备选答案)

A.唇肿胀、糜烂、干燥、脱屑、结痂，疣状或颗粒状增生，可出现白色条纹

B.有日光照射史，唇红部以糜烂为主要特征

C.唇肿胀，触之有散在、粟粒状小结节，有透明黏液溢出于唇表面，呈水珠状

D.唇弥漫性肿胀，柔软而有弹性

E.唇突然肿胀，触之韧而有弹性，肿胀消退较快

139.血管神经性水肿的临床表现是

140.光化性唇炎的临床表现是

141.腺性唇炎的临床表现是

(142~144 题共用备选答案)

A.木榴油

B.樟脑酚合剂

C.70%~75%乙醇

D.甲醛甲酚

E.麝香草酚乙醇溶液

与以下所描述性质相符的药物是

142.有较好的镇痛作用和弱的消毒作用

143.有较强的消毒作用，对根尖周组织的刺激性小

144.有较强的消毒作用并有明显刺激性

(145~147 题共用备选答案)

A.氧化锌丁香油粘固粉

B.聚羧酸锌粘固粉

C.玻璃离子粘固粉

D.磷酸锌粘固粉

E.复合树脂

145.对牙髓有刺激的粘固粉是

146.粉剂由二氧化硅、三氧化二铝和氟化钙组成的粘固粉是

147.粉剂由煅烧过的氧化锌和氧化镁混合物组成的粘固粉是

(148~150 题共用备选答案)

- A.心痛定
 - B.替硝唑
 - C.米诺环素
 - D.青霉素
 - E.罗红霉素
- 148.能引起牙龈增生的药物
- 149.对 Aa 有较强抑制作用的药物
- 150.对螺旋体作用最强的药物



金英州医学
JINYINGJIE.COM