

内科学

1. 引起肺心病最常见的病因是
 - A. 重症肺结核
 - B. 先天性肺囊肿
 - C. 支气管扩张
 - D. 慢支并发阻塞性肺气肿
 - E. 支气管哮喘
 2. 慢性阻塞性肺疾病急性发作的常见诱因是
 - A. 细菌感染
 - B. 环境污染
 - C. 寒冷干燥气候
 - D. 吸烟
 - E. 营养不良
 3. 患者，男，57岁。慢性支气管炎病史20年。近半年活动后心悸，气短。查体：有肺气肿体征，两肺散在干、湿啰音，剑突下可见心尖搏动，肺动脉瓣区第二心音亢进。应首先考虑的是
 - A. 冠心病
 - B. 肺心病
 - C. 风心病
 - D. 高血压性心脏病
 - E. 心肌炎
 4. 慢性支气管炎喘息型听诊典型表现是
 - A. 中、小水泡音
 - B. 哮鸣音及呼气延长
 - C. 痰鸣音
 - D. 捻发音
 - E. 大水泡音
 5. 患者，男，慢支病史多年，因感冒慢支急性发作，其首要的治疗是
 - A. 镇咳
 - B. 解痉
 - C. 气雾疗法
 - D. 祛痰
 - E. 控制感染
 6. 患者，男。肺心病病史5年，因受凉，咳、痰、喘加重，下肢浮肿，其关键性的治疗是
 - A. 控制呼吸道感染
 - B. 解痉
 - C. 吸氧
 - D. 利尿
 - E. 使用洋地黄
- (7~8题共用备选答案)
- A. 主要根据病史和症状
 - B. 肺部啰音
 - C. 血液检查

- D. 胸部 X 线检查
- E. 痰液检查
- 7. 诊断慢支主要靠
- 8. 早期诊断肺结核最有价值的
- 9. 诊断右心室扩大最有意义的是
- A. 心电图
- B. 超声心动图检查
- C. 肺功能检查
- D. 剑突下心尖搏动
- E. 房室瓣听诊区杂音

(10~11 题共用备选答案)

- A. 支气管哮喘
- B. 慢支并阻塞性肺气肿
- C. 支气管扩张
- D. 原发性肺泡通气不足
- E. 慢性高原病

- 10. 肺心病绝大多数病因是
- 11. 大咯血最可能的病因是

12. 支气管哮喘的主要特征为

- A. 吸气性呼吸困难
- B. 哮喘持续状态
- C. 反复发作性的呼气性呼吸困难
- D. 混合性呼吸困难
- E. 非发作性的呼气性呼吸困难

13. 危重哮喘患者，肺部哮鸣音减弱或消失提示

- A. 支气管痉挛缓解
- B. 支气管高度狭窄或痰栓堵塞
- C. 合并肺部严重感染
- D. 支气管内大量痰液被清除
- E. 支气管被大量血液堵塞

14. 患者，男，20 岁，接触花粉后，突然鼻痒、打喷嚏，继之出现带哮鸣的呼气性呼吸困难，喉中发出哮鸣音，诊断应考虑是

- A. 喘息型慢性支气管炎
- B. 心源性哮喘
- C. 肺癌
- D. 支气管哮喘
- E. 支气管扩张

15. 肺心病患者的氧疗原则应为

- A. 低浓度持续给氧
- B. 高浓度吸氧
- C. 通常呼吸道
- D. 应用呼吸兴奋剂
- E. 高压氧治疗

16. 患者，男，支气管哮喘病史 3 年，今晨突然发作，为控制发作应首选

金英大医学网
JYINGDAIYIXUE.COM



- A. 沙丁胺醇
- B. 阿托品
- C. 泼尼松
- D. 色甘酸二钠
- E. 维拉帕米

17. 肺炎球菌肺炎常见于

- A. 青少年
- B. 儿童
- C. 青壮年
- D. 老年
- E. 幼儿

18. 患者青年男性，大雨淋后突发寒战高热、胸痛、咳嗽、咳铁锈色痰及出现肺实变体征。有利于肺炎球菌肺炎诊断的检查是

- A. 白细胞计数
- B. 痰病原学检查
- C. X线透视
- D. 支气管镜
- E. 血沉

19. 患者高热、胸痛、咳嗽、咳痰，经检查诊断为肺炎球菌肺炎，其治疗应首选

- A. 青霉素
- B. 红霉素
- C. 磺胺药
- D. 氟喹诺酮类药
- E. 头孢唑啉钠

20. 下列各项中，肺癌与肺脓肿的主要鉴别是

- A. 咳嗽咳脓痰
- B. 性别
- C. 血白细胞偏高
- D. 年龄小
- E. X线或痰液检查

21. 支气管哮喘发作与心源性哮喘发作的鉴别有困难时，可用哪种药物治疗

- A. 地高辛
- B. 氨茶碱
- C. 吗啡
- D. 异丙托溴铵
- E. 异丙肾上腺素

22. 患者，38岁。高热、寒战4天，伴咳嗽，胸痛，痰中带血。为确诊，应首选的检查方法是

- A. 血常规检查
- B. 肺部听诊
- C. X线检查
- D. 痰结核菌检查
- E. 血培养

23. 中年患者，结核病史5年，因咳嗽、咳痰、痰中带血、发热、消瘦加重1个月来医院检



查，为排除肺癌，其鉴别主要根据

- A. 年龄
- B. 全身中毒症状
- C. 咳嗽、咳痰、咯血
- D. 血沉
- E. X线或痰液检查

(24~25 题共用备选答案)

- A. 急性起病、高热、铁锈色痰
- B. 持续低热、盗汗
- C. 急性起病、高热、大量脓痰
- D. 咳嗽性质改变呈高调金属音
- E. 夜间憋醒，被迫坐起

24. 肺癌的临床表现为

25. 肺脓肿的临床表现为

26. 下列各项，周围型肺癌是

- A. 以鳞状上皮细胞癌多见
- B. 生长在段以上的支气管
- C. 位于肺门附近
- D. 生长在段以下的支气管
- E. 约占肺癌的 4/5

27. 治疗心衰使用的保钾利尿剂是

- A. 呋塞米
- B. 依他尼酸
- C. 布美他尼
- D. 螺内酯
- E. 氢氯噻嗪

28. 下列各项，急性左心衰的典型表现是

- A. 胸痛
- B. 发热
- C. 急性肺水肿
- D. 咳嗽
- E. 咯血

29. 右心衰竭的特征是

- A. 肺循环淤血
- B. 体循环淤血
- C. 可出现全心衰竭
- D. 可见于高血压
- E. 可见于主动脉瓣病变

30. 左心衰竭时，最早出现和最重要的症状是

- A. 咳嗽
- B. 端坐呼吸
- C. 咯血
- D. 乏力
- E. 劳力性呼吸困难



31. 治疗急性肺水肿的主要措施是

- A. 休息
- B. 静脉补液
- C. 快速利尿
- D. 控制感染
- E. 限制钠盐摄入

32. 诱发心衰的感染多是

- A. 呼吸道感染
- B. 泌尿道感染
- C. 肠道感染
- D. 皮肤感染
- E. 病毒性肝炎

33. 患者，50岁，高血压性心脏病史3年，近半个月出现呼吸困难、咳嗽、咳痰、咯血、心悸、交替脉等表现，应考虑高血压心脏病伴有

- A. 左心衰竭
- B. 右心衰竭
- C. 全心衰竭
- D. 急性肺水肿
- E. 支气管炎

34. 患者肺心病6年，近1个月来腹胀、恶心、呕吐、肝区痛、肝肿大、水肿、颈静脉怒张，应考虑肺心病伴有

- A. 左心衰竭
- B. 右心衰竭
- C. 全心衰竭
- D. 急性肺水肿
- E. 慢性肾炎

35. 老年患者，高血压性心脏病史3年，夜间睡眠时突然憋醒，呼吸困难，呈哮喘状态，应诊断为

- A. 心源性哮喘
- B. 支气管哮喘
- C. 慢支喘息型
- D. 肺炎
- E. 右心衰竭

36. 患者，男，26岁。心悸，气促1年。查体：两颊暗红，颈静脉明显怒张，下肢浮肿。心浊音界向左扩大，心尖区可闻及舒张期隆隆样杂音，肝右肋下4cm，质软，有压痛，肝颈静脉回流征阳性。应首先考虑的是

- A. 二尖瓣狭窄并发右心衰竭
- B. 二尖瓣关闭不全后期所致右心衰竭
- C. 主动脉瓣狭窄并发左心衰竭
- D. 主动脉瓣关闭不全并发左心衰竭
- E. 肺源性心脏病致右心衰竭

(37~38题共用备选答案)

- A. 劳力性呼吸困难
- B. 咳嗽、咳痰



- C. 咯血
D. 下垂性凹陷性水肿
E. 紫绀
37. 右心衰时典型体征是
38. 左心衰时最早出现和最重要的症状是
39. 下列各项，心动过缓出现的室早治疗首选的是
- A. 利多卡因
B. 苯妥英钠
C. 阿托品
D. 洋地黄类
E. 胺碘酮
40. 急性心肌梗死出现的室早治疗应首选的是
- A. 静注利多卡因
B. 西地兰
C. 胺碘酮
D. 苯妥英钠
E. 普罗帕酮
41. 患者女性，20岁，感冒后出现心悸、气短，心电图检查显示P-R间期0.21秒，每个P波后均有QRS波，其心电图应诊断的是
- A. 正常心电图
B. 一度房室传导阻滞
C. 二度I型房室传导阻滞
D. 二度II型房室传导阻滞
E. 三度房室传导阻滞
42. 风湿性心脏病最常见的瓣膜损害部位是
- A. 二尖瓣
B. 三尖瓣
C. 主动脉瓣
D. 肺动脉瓣
E. 联合瓣膜病变
43. 二尖瓣狭窄伴有何种心律失常最易并发脑栓塞
- A. 室性早搏
B. 窦性心动过缓
C. 房颤
D. 阵发性心动过速
E. 房室传导阻滞
44. 患者女性，25岁，风湿热史2年，现呼吸困难、咳嗽、咳痰、咯血，查体心尖部闻及舒张中晚期杂音，心电图检查左房增大，据此可诊断为风湿病
- A. 二尖瓣狭窄
B. 二尖瓣关闭不全
C. 主动脉瓣狭窄
D. 主动脉瓣关闭不全
E. 联合瓣膜病变
45. 患者风湿热病史3年，听诊心尖区闻及响亮、粗糙、音调高的全收缩期杂音，X线检查



全球医学网
JINYINGJIE.COM

左房、左室增大，据此可诊断为风心病

- A. 三尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 肺动脉瓣关闭不全
- E. 联合瓣膜病变

46. 患者男性，风湿热病史 5 年，查体有周围血管体征，听诊主动脉瓣第二听诊区有舒张期吹风样杂音，X 线检查左室增大，据此可诊断为风心病

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 联合瓣膜病变

47. 1999 年世界卫生组织高血压诊断标准是

- A. 收缩压 $> 120\text{mmHg}$ 和/或舒张压 $> 80\text{mmHg}$
- B. 收缩压 $> 130\text{mmHg}$ 和/或舒张压 $> 85\text{mmHg}$
- C. 收缩压 $> 140\text{mmHg}$ 和/或舒张压 $> 90\text{mmHg}$
- D. 收缩压 $> 160\text{mmHg}$
- E. 舒张压 $\geq 95\text{mmHg}$

48. 患者男性，30 岁，高血压病史 3 年，今日下午突然剧烈头痛、烦躁、恶心、呕吐，测血压 $220/120\text{mmHg}$ ，为迅速降压宜选用

- A. 硝普钠静滴
- B. 普萘洛尔静滴
- C. 地西洋肌注
- D. 呋塞米静注
- E. 苯巴比妥肌注

49. 突然发作的心绞痛，其胸痛部位常位于

- A. 胸骨体中段、上段的后方
- B. 左肩背部
- C. 上腹部
- D. 右胸部
- E. 心尖部

50. 对冠心病最有确诊意义的检查是

- A. 普通心电图
- B. 选择性冠状动脉造影
- C. 24 小时动态心电图
- D. 超声心动图
- E. 心功能检查

51. 心绞痛发作时最好的治疗药物是

- A. 洋地黄
- B. 哌替啶
- C. 硝酸甘油
- D. 阿托品
- E. 去痛片



52. 心绞痛发作时心电图 ST 段抬高的是

- A. 劳累性心绞痛
- B. 稳定型心绞痛
- C. 恶化型心绞痛
- D. 变异型心绞痛
- E. 卧位型心绞痛

53. 心绞痛合并有高血压及心率增快者宜首选

- A. 美托洛尔
- B. 硝苯地平
- C. 维拉帕米
- D. 洋地黄
- E. 巯甲丙脯酸

54. 心肌坏死的特征性心电图表现是

- A. ST 段弓背向上
- B. ST-T 鱼钩样改变
- C. 病理性 Q 波
- D. T 波倒置
- E. ST 段下斜型降低

55. 患者，男，40 岁。因剧烈胸痛、低血压、频发室早急诊，心电图检查 $V_1 \sim V_3$ 导联出现急性心肌梗死特征性改变。可诊断为

- A. 急性下壁心肌梗死
- B. 急性前间壁心肌梗死
- C. 急性前侧壁心肌梗死
- D. 急性广泛前壁心肌梗死
- E. 急性高侧壁心肌梗死

56. 患者，男，55 岁。急性广泛前壁心肌梗死，发病 6 小时。首选哪项治疗措施

- A. 口服美托洛尔
- B. 链激酶溶栓治疗
- C. 静脉注射毛花苷 C
- D. 口服卡托普利
- E. 静脉滴注低分子右旋糖酐

57. 患者，女，61 岁。急性下壁和后壁心肌梗死，当晚突然意识丧失，抽搐。心电图发现有窦性停搏和三度房室传导阻滞。此时应首先考虑哪项措施

- A. 扩血管药物
- B. 异丙基肾上腺素
- C. 阿托品
- D. 抗凝治疗
- E. 安装临时起搏器

58. 诊断慢性胃炎最好的方法是

- A. X 线钡餐检查
- B. 胃液分析
- C. 胃镜加活检
- D. 血清胃泌素测定
- E. 大便隐血试验

59. 十二指肠溃疡发病的最主要因素是

- A. 胃酸分泌增高
- B. 胃黏膜屏障减弱
- C. 遗传因素
- D. 免疫因素
- E. 饮食不节

60. 消化性溃疡最主要的症状是

- A. 上腹疼痛
- B. 嗝气、反酸
- C. 恶心、呕吐
- D. 食欲减退
- E. 呕血、黑便

61. 消化性溃疡的疼痛特征是

- A. 进食后饱胀
- B. 无规律性
- C. 慢性、周期性、节律性
- D. 转移性
- E. 持续性疼痛伴阵发性加剧

62. 消化性溃疡最常见的并发症是

- A. 上消化道出血
- B. 胃肠穿孔
- C. 幽门梗阻
- D. 癌变
- E. 休克

63. 下列各项，空腹痛常见的是

- A. 胃溃疡
- B. 十二指肠溃疡
- C. 胆囊炎
- D. 急性胰腺炎
- E. 胃癌

64. 治疗早期胃癌最好的方法是

- A. 手术治疗
- B. 姑息手术
- C. 单一化疗
- D. 联合化疗
- E. 注射免疫增强剂

65. 在我国肝硬化的主要原因是

- A. 病毒性肝炎
- B. 营养缺乏
- C. 慢性乙醇中毒
- D. 循环障碍
- E. 慢性肠道感染

66. 胃癌淋巴转移最常见的部位是

- A. 左腋窝下淋巴结



金英杰医学网
JINYINGJIE.COM

- B. 左锁骨上淋巴结
- C. 脐周淋巴结
- D. 胃周淋巴结
- E. 直肠淋巴结

67. 肝硬化最常见的并发症是

- A. 上消化道出血
- B. 肝昏迷
- C. 肝肾综合征
- D. 感染
- E. 肝癌

68. 引起肝硬化上消化道出血的最主要原因是

- A. 食道胃底静脉曲张破裂
- B. 胃黏膜糜烂
- C. 合并溃疡
- D. 凝血因子减少
- E. 反流性食管炎

69. 原发性肝癌最早、最常见的转移方式是

- A. 淋巴转移
- B. 肝内血行转移
- C. 肝外血行转移
- D. 种植转移
- E. 直接蔓延

70. 诊断原发性肝癌最敏感的实验是

- A. γ -GT
- B. AFP
- C. LPH
- D. ALT
- E. AST

71. 患者慢性肝炎病史5年，近1个月来病情明显加重，经检查诊断为早期肝癌，最有效的治疗方法是

- A. 手术治疗
- B. 化疗
- C. 放射治疗
- D. 介入性治疗
- E. 生物导向治疗

72. 患者，男，42岁。2年来经常腹胀，下肢浮肿，前胸有蜘蛛痣，腹水，肝未触及，脾大。应首先考虑的疾病是

- A. 普通型病毒性肝炎
- B. 门脉性肝硬化
- C. 酒精性肝炎
- D. 肝细胞肝癌
- E. 慢性肝淤血

73. 溃疡性结肠炎活动期的重要表现是

- A. 黏液脓血便



- B. 持续性剧烈腹痛
- C. 腹膜刺激征
- D. 口腔复发性溃疡
- E. 高热

74. 患者因水肿、高血压、尿改变，经检查拟诊断为慢性肾炎，需与慢性肾盂肾炎鉴别，最主要的鉴别点是

- A. 尿细菌培养
- B. 尿蛋白
- C. 尿红细胞
- D. 尿管型
- E. 肾功能减退

75. 尿路感染的主要途径是

- A. 上行性感染
- B. 血源性感染
- C. 淋巴源性感染
- D. 多途径感染
- E. 邻近感染的直接蔓延

76. 尿路感染的病原体，最常见的是

- A. 结核杆菌
- B. 淋球菌
- C. 大肠杆菌
- D. 变形杆菌
- E. 葡萄球菌

77. 患者，女，27岁。婚后1周，尿痛、尿频、尿急2天，伴发热、腰痛。尿检查有红、白细胞及白细胞管型，其诊断可能是

- A. 急性肾炎
- B. 慢性肾炎急性发作
- C. 急性肾盂肾炎
- D. 慢性肾盂肾炎
- E. 膀胱炎

78. 慢性肾功能衰竭的最常见病因是

- A. 急进性肾炎
- B. 慢性肾炎
- C. 急性肾盂肾炎
- D. 慢性肾盂肾炎
- E. 肾小动脉硬化

79. 成人缺铁性贫血的主要原因是

- A. 需铁量增加
- B. 铁摄入量不足
- C. 慢性失血
- D. 铁吸收不良
- E. 骨髓造血障碍

80. 下列各项，可促进铁吸收的是

- A. 维生素 A



- B. 维生素 B
- C. 维生素 C
- D. 维生素 D
- E. 维生素 E

(81~82 题共用备选答案)

- A. 大细胞性贫血
- B. 靶形红细胞性贫血
- C. 小细胞低色素性贫血
- D. 正常细胞性贫血
- E. 高色素性贫血

81. 缺铁性贫血是

82. 再生障碍性贫血是

83. 患者因贫血、感染、发热、出血 2 个月就诊，经检查诊断为再障，做周围血检查，其典型表现是

- A. 白细胞减少
- B. 红细胞减少
- C. 网织红细胞增多
- D. 血小板减少
- E. 全血细胞减少

84. 血小板减少可出现的临床表现是

- A. 进行性贫血
- B. 皮肤、鼻腔等处发生坏死性溃疡
- C. 皮肤、黏膜出血
- D. 频繁性呕吐
- E. 胸骨压痛

85. 诊断甲亢最有意义的实验室检查是

- A. 基础代谢率
- B. FT₃、FT₄ 及 TSH 测定
- C. 甲状腺摄 ¹³¹I 率
- D. TRH 兴奋试验
- E. T₃ 抑制试验

86. 甲亢患者所致甲状腺肿大的特征是

- A. 弥漫性、对称性肿大
- B. 质软，表面不光滑
- C. 质硬，表面有结节
- D. 固定，不活动
- E. 触及震颤和听到血管杂音

87. 甲状腺功能亢进症危象的主要临床表现是

- A. 心率加快、血压高、头晕、头痛
- B. 心率>140 次/分、体温>39 ℃、腹泻
- C. 心悸、气促、呕吐、腹泻
- D. 发绀、鼻翼扇动、心悸、出汗
- E. 面色苍白、四肢厥冷、呼吸困难

88. 甲状腺危象的治疗，首先选用的药物是



- A. 甲硫氧嘧啶
- B. 甲巯咪唑
- C. 卡比马唑
- D. 普萘洛尔
- E. 丙硫氧嘧啶

89. 糖尿病最常见、最严重的急性并发症是

- A. 心血管病变
- B. 酮症酸中毒昏迷
- C. 感染
- D. 肺结核
- E. 神经系统病变

(90~91 题共用备选答案)

- A. 空腹血糖
- B. 糖化血红蛋白
- C. 尿糖
- D. 胰岛素释放试验
- E. 葡萄糖耐量试验

90. 诊断糖尿病最好的指标是

91. 判断糖尿病控制程度的指标是

92. 糖尿病引起失明的主要原因是

- A. 白内障
- B. 青光眼
- C. 视网膜微血管病变
- D. 角膜炎
- E. 结膜炎

93. 糖尿病最基础的治疗措施是

- A. 一般治疗
- B. 饮食治疗
- C. 口服降糖药物
- D. 胰岛素治疗
- E. 支持治疗

94. 糖尿病患者注射普通胰岛素的时间是

- A. 餐前 5 分钟
- B. 餐前 15 分钟
- C. 餐前 30 分钟
- D. 餐前 1 小时
- E. 餐后 15 分钟

95. 患者因多饮、多食、多尿、体重减轻就诊，做哪项检查可诊断糖尿病

- A. 尿糖
- B. 空腹血糖
- C. 葡萄糖耐量试验
- D. 血浆胰岛素
- E. 血酮测定

96. 患者因三多一少表现拟诊断为糖尿病，做空腹血糖测定，诊断为糖尿病的空腹血糖标准



是

- A. >3.9mmol/L
- B. >5.6mmol/L
- C. >7.0mmol/L
- D. <7.0mmol/L
- E. >11.1mmol/L

97. 患者，男，14岁。患I型糖尿病2年，近日在家中用胰岛素治疗，突然发生昏迷。其昏迷原因最可能是

- A. 糖尿病高渗性昏迷
- B. 乳酸性酸中毒
- C. 呼吸性酸中毒
- D. 尿毒症酸中毒
- E. 低血糖昏迷

98. I型糖尿病患者应选用的是

- A. 单纯饮食控制
- B. 服降血糖药
- C. 饮食治疗+胰岛素
- D. 小剂量胰岛素及大量输液
- E. 大剂量胰岛素及大量输液

99. 患者，女，50岁，掌指和腕关节反复肿痛2年余，近1个月病情加重，晨起时出现关节僵硬，活动后可缓解。首先考虑的诊断是

- A. 风湿性关节炎
- B. 类风湿性关节炎
- C. 强直性脊柱炎
- D. 骨关节炎
- E. 痛风

100. 类风湿性关节炎的主要表现是

- A. 全身关节肿痛伴发热、皮疹
- B. 游走性大关节肿痛
- C. 对称性小关节肿痛伴晨僵
- D. 腰骶痛伴晨僵
- E. 多关节肿痛伴四肢末梢感觉障碍

101. 系统性红斑狼疮患者的典型皮肤损害为

- A. 环形红斑
- B. 结节性红斑
- C. 面部蝶形红斑
- D. 多形性红斑
- E. 网状青斑

102. 引起上消化道出血最常见的原因是

- A. 食管胃底静脉曲张破裂出血
- B. 胃、十二指肠溃疡
- C. 胃癌
- D. 胃炎
- E. 血液病

金康医学网
JINYINGJIA.COM

103. 急性中毒者皮肤潮红，皮肤黏膜呈樱桃红色，见于
- A. 一氧化碳中毒
 - B. 毒蕈中毒
 - C. 阿托品中毒
 - D. 吗啡中毒
 - E. 甲醇中毒
104. 急性中毒者，瞳孔扩大，可见于
- A. 阿托品中毒
 - B. 有机磷农药中毒
 - C. 安眠药中毒
 - D. 吗啡中毒
 - E. 甲醇中毒
105. 急性中毒患者，瞳孔缩小，可见于
- A. 阿托品中毒
 - B. 乙醇中毒
 - C. 氰化物中毒
 - D. 有机磷杀虫药中毒
 - E. 麻黄素中毒
106. 患者男性，30岁，酗酒后昏睡，送人医院急诊，催醒药首选
- A. 纳洛酮
 - B. 依地酸钙钠
 - C. 维生素C
 - D. 细胞色素C
 - E. 二巯丙醇
107. 有机磷杀虫药中毒时患者呼气的特异气味是
- A. 烂苹果味
 - B. 氨味
 - C. 肝臭味
 - D. 大蒜臭味
 - E. 汗臭味
108. 内囊区出血的表现是
- A. 高热
 - B. 抽搐
 - C. 三偏征
 - D. 脑膜刺激征明显
 - E. 脑脊液大多正常
109. 头颅CT可见脑内高密度灶，多伴有偏瘫和意识障碍。属于
- A. 脑栓塞
 - B. 脑出血
 - C. 蛛网膜下腔出血
 - D. 动脉血栓性脑梗死
 - E. 脑膜炎



91急救医学网
JIUYINGJIE.COM

参考答案

1. 【答案】D
2. 【答案】C
3. 【答案】B
4. 【答案】B
5. 【答案】E
6. 【答案】A
7. 【答案】A
8. 【答案】E
9. 【答案】B
10. 【答案】B
11. 【答案】C
12. 【答案】C
13. 【答案】B
14. 【答案】D
15. 【答案】A
16. 【答案】A
17. 【答案】C
18. 【答案】B
19. 【答案】A
20. 【答案】E
21. 【答案】B
22. 【答案】C
23. 【答案】E
24. 【答案】D
25. 【答案】C
26. 【答案】D
27. 【答案】D
28. 【答案】C
29. 【答案】B
30. 【答案】E
31. 【答案】C
32. 【答案】A
33. 【答案】A
34. 【答案】B
35. 【答案】A
36. 【答案】A
37. 【答案】D
38. 【答案】A
39. 【答案】C
40. 【答案】A
41. 【答案】B
42. 【答案】A
43. 【答案】C



44. 【答案】 A
45. 【答案】 B
46. 【答案】 D
47. 【答案】 C
48. 【答案】 A
49. 【答案】 A
50. 【答案】 B
51. 【答案】 C
52. 【答案】 D
53. 【答案】 A
54. 【答案】 C
55. 【答案】 B
56. 【答案】 B
57. 【答案】 E
58. 【答案】 C
59. 【答案】 A
60. 【答案】 A
61. 【答案】 C
62. 【答案】 A
63. 【答案】 B
64. 【答案】 A
65. 【答案】 A
66. 【答案】 B
67. 【答案】 A
68. 【答案】 A
69. 【答案】 B
70. 【答案】 B
71. 【答案】 A
72. 【答案】 B
73. 【答案】 A
74. 【答案】 A
75. 【答案】 A
76. 【答案】 C
77. 【答案】 C
78. 【答案】 B
79. 【答案】 C
80. 【答案】 C
81. 【答案】 C
82. 【答案】 D
83. 【答案】 E
84. 【答案】 C
85. 【答案】 B
86. 【答案】 E
87. 【答案】 B



87. 【答案】 E
89. 【答案】 B
90. 【答案】 A
91. 【答案】 B
92. 【答案】 C
93. 【答案】 B
94. 【答案】 C
95. 【答案】 B
96. 【答案】 C
97. 【答案】 E
98. 【答案】 C
99. 【答案】 B
100. 【答案】 C
101. 【答案】 C
102. 【答案】 B
103. 【答案】 A
104. 【答案】 A
105. 【答案】 D
106. 【答案】 A
107. 【答案】 D
108. 【答案】 C
109. 【答案】 B

