

## 2021 中西医助理医师考试



扫码关注获取更多免费  
资料及医考资讯

# 2021 年 中西医医师资 格考试专用

## 第一单元

### 一、A1 型选择题 (1~100 题)

答题说明: 每一道考题下面有 A、B、C、D、

E 五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案。

1-下列表述中不属于症的是

- A. 胸闷
- B. 恶寒
- C. 口苦
- D. 发热
- E. 消渴

2. 人体是一个有机整体, 其中心是

- A. 心
- B. 脑
- C. 经络
- D. 脏腑
- E. 五脏

3. 两汉时期“元气一元论”认为, 构成宇宙万物最基本、最原始的物质是

- A. 元气
- B. 精气
- C. 谷气
- D. 云气

E. 精

4. 关于阴和阳的概念描述中, 最确切的是

- A. 阴和阳是中国古代的两点论
- B. 阴和阳即是矛盾
- C. 阴和阳代表对立的事物
- D. 阴和阳代表对立又相互关联的事物 属性
- E. 阴和阳说明相互关联着的事件

5. “阴在内, 阳之守也; 阳在外, 阴之使也”, 主要说明阴阳之间存在何种关系

- A. 对立制约
- B. 互根互用
- C. 互为消长
- D. 平衡协调

E,互相转化

6. 下列哪种治法体现了五行相克规律

- A. 金水相生
- B. 益火补土
- C. 抑木扶土
- D. 滋水涵木
- E. 培土生金

7. 属于“相侮”的脏病传变是

- A. 肝病及脾  
B. 肝病及肾  
C. 肝病及肺  
D. 肝病及心  
E. 脾病及心
8. 具有“主肃降”生理特性的脏是
- A. 肝  
B. 心  
C. 脾  
D. 肺  
E. 肾
9. “浊气归心，淫精于脉”中的“浊气”主要靠哪一个脏腑的运化
- A. 心  
B. 肺  
C. 脾  
D. 肾  
E. 大肠
10. 促进机体滋润、宁静、成形和制约阳热功能的物质是
- A. 肾精  
B. 肾气  
C. 肾阴  
D. 肾阳  
E. 肾血
11. 与维持正常呼吸关系最密切的两脏是
- A. 心与脾  
B. 脾与肾  
C. 肾与肝  
D. 肝与肺  
E. 肺与肾
12. “中精之诤指
- A. 胆  
B. 胃  
C. 大肠  
D. 小肠  
E. 三焦
13. 戴阳证患者的表现为
- A. 面黄隐隐  
B. 面色红赤  
C. 面色淡白  
D. 面色淡青  
E. 面色苍白，颧颊部嫩红如妆
14. 痈疮的病因是
- A. 外感火热毒邪  
B. 感受疫毒火毒  
C. 阴寒之邪凝聚  
D. 湿热火毒蕴结  
E. 气血亏虚
15. 患部顶白形小如粟，根硬较深，麻木痒痛者为
- A. 痈  
B. 疔  
C. 疽  
D. 疖  
E. 麻疹
16. 下列不属于假神临床表现的是
- A. 突然昏倒，口吐白沫  
B. 目无光彩，突然目光转亮  
C. 懒言少语，突然言语不休  
D. 本无食欲，突然欲进饮食  
E. 面色无华，突然两颧泛红如妆
17. 下列哪项不是正虚失神的表现
- A. 目无光彩  
B. 反应迟钝  
C. 呼吸微弱  
D. 精神萎靡  
E. 壮热神昏
18. 咯痰白滑量多易出者属
- A. 寒痰  
B. 燥痰  
C. 热痰  
D. 湿痰

- E. 肺病之痰
19. 手足蠕动的病机是
- A. 热极生风
  - B. 血虚生风
  - C. 阴虚动风
  - D. 肝阳化风
  - E. 寒凝筋脉
20. 病人肢体软弱无力, 行动不便属于
- A. 瘫痪
  - B. 痹病
  - C. 痿病
  - D. 痫病
  - E. 中风后遗症
21. 下列哪项是形盛气虚的表现
- A. 体胖能食, 肌肉坚实
  - B. 体胖食少, 神疲乏力
  - C. 形瘦能食, 舌红苔黄
  - D. 形瘦额红, 皮肤干焦
  - E. 卧床不起, 骨瘦如柴
22. 观察舌苔以辨别病邪深浅, 主要依据是
- A. 舌苔的有无
  - B. 舌苔的厚薄
  - C. 舌苔的颜色
  - D. 舌苔的真假
  - E. 舌苔的润燥
23. 下列除哪项外均为苦味药的作用
- A. 清热泻火
  - B. 泄降逆气
  - C. 收敛固涩
  - D. 通泻大便
  - E. 燥湿坚阴
24. 鱼腥草的功效是
- A. 清热解毒, 凉血止痢

- B. 清热解毒, 止痢截疟  
C. 清热解毒, 息风止痉, 清肝明目  
D. 清热解毒, 消痈排脓, 利尿通淋  
E. 清热解毒, 消痈排脓, 祛瘀止痛
25. 既能清热解毒, 又能疏散风热的药对是  
A. 桑叶、菊花  
B. 薄荷、牛蒡子  
C. 牛黄、水牛角  
D. 金银花、连翘  
E. 蒲公英、紫花地丁
26. 防己的功效是  
A. 祛风湿, 舒经络, 解表  
B. 祛风湿, 消骨氨 解暑  
C. 祛风湿, 止痛, 化湿和胃  
D. 祛风湿, 止痛, 安胎  
E. 祛风湿, 止痛, 利水消肿
27. 可用于养血安胎的药物是  
A. 狗脊  
B. 砂仁  
C. 乌梢蛇  
D. 五加皮  
E. 桑寄生
28. 既能化湿, 又能解暑的药物是  
A. 藿香、佩兰  
B. 苍术、厚朴  
C. 砂仁、豆蔻  
D. 陈皮、青皮  
E. 茯苓、玉竹
29. 既能温中止痛, 又能杀虫, 可用于蛔虫腹痛、  
呕吐或吐蛔的药物是  
A. 干姜  
B. 吴茱萸  
C. 砂仁  
D. 小茴香  
E. 花椒
30. 既能消食健胃, 又能涩精止遗, 还可治疗小  
儿脾虚疳积的药物是  
A. 银柴胡  
B. 麦芽  
C. 乌梅  
D. 莱服子  
E. 鸡内金
31. 既能凉血止血, 又能清热利尿, 清肺胃热的  
药物是  
A. 大蓟  
B. 小蓟  
C. 白茅根  
D. 地榆  
E. 槐花
32. 桑白皮与草苗子既能泻肺平喘, 又能  
A. 利水渗湿  
B. 利水通淋  
C. 利水消肿  
D. 利水止泻  
E. 利水退黄
33. 具有镇静安神, 平肝潜阳, 收敛固涩功效的  
药物是  
A. 菊花  
B. 夏枯草  
C. 龙骨  
D. 朱砂  
E. 石决明
34. 败毒散中配伍人参的主要用意是  
A. 大补肺脾, 以复正气  
B. 补脾益肺, 培土生金  
C. 扶助正气, 鼓邪外出  
D. 益气生津, 以资汗源  
E. 益气和中, 温阳止痛
35. 九味羌活汤的功用是  
A. 散寒解表, 祛风除湿  
B. 发汗解表, 疏风止痛  
C. 发汗祛湿, 兼清里热  
D. 宣肺散寒, 除湿止痛  
E. 散寒除湿, 通痹止痛
36. 麻子仁丸的组成药物中不含  
A. 大黄

- B. 枳实  
C. 当归  
D. 杏仁  
E. 芍药
37. 半夏泻心汤与小柴胡汤两方组成中均含有的药物是  
A. 人参、生姜、半夏、甘草、大枣  
B. 半夏、黄连、黄芩、甘草、大枣  
C. 人参、黄芩、半夏、干姜、甘草  
D. 柴胡、人参、黄芩、生姜、甘草  
E. 半夏、黄芩、人参、炙甘草、大枣
38. 香薷散的功用是  
A. 祛湿化浊，理气宽中  
B. 散寒解表，化湿和中  
C. 解表散寒，理气和中  
D. 祛暑解表，化湿和中  
E. 祛暑解表，清热化湿
39. 四逆汤与当归四逆汤二方组成中均含有的药物是  
A. 当归  
B. 附子  
C. 桂枝  
D. 干姜  
E. 甘草
40. 炙甘草汤的组成药物中含有  
A. 麦冬、麻仁、枣仁  
B. 生地、元参、麦冬  
C. 阿胶、当归、芍药  
D. 生姜、大枣、黄芩  
E. 生地、阿胶、麦冬
41. 温经汤的组成药物中不包括  
A. 干姜、肉桂  
B. 丹皮、麦冬  
C. 半夏、甘草  
D. 当归、芍药  
E. 人参、阿胶
42. 川尊茶调散的组成药物中含有  
A. 牛蒡  
B. 羌活  
C. 苍术  
D. 当归  
E. 蝉蜕
43. 以清宣温燥，润肺止咳为主要功用的方剂是  
A. 杏苏散  
B. 增液汤  
C. 桑杏汤  
D. 养阴清肺汤  
E. 清燥救肺汤
44. 苏合香的功效是  
A. 开窍醒神，活血通经，消肿止痛  
B. 开窍醒神，清热止痛  
C. 开窍醒神，清心化痰  
D. 开窍醒神，化湿和胃，宁神益智  
E. 开窍醒神，辟秽止痛
45. 抽搐病因中，属于感染性颅脑疾病的是  
A. 癫痫  
B. 脑外伤  
C. 脑肿瘤  
D. 脑寄生虫病  
E. 脑血管性疾病
46. 属感染性发热的疾病是  
A. 风湿热  
B. 广泛性皮炎  
C. 肝癌  
D. 斑疹伤寒  
E. 白血病
47. 引起发热的病因中，属非感染性发热的是  
A. 立克次体  
B. 抗原-抗体反应  
C. 肺炎支原体  
D. 螺旋体  
E. 病毒
48. 关于热型的说法错误的是  
A. 伤寒常为稽留热  
B. 弛张热是指体温在 39.2 以上，一天内波

动不超过 2 龙

- C. 间歇热是发热期和无热期交替出现
  - D. 肺结核常为不规则热
  - E. 发热不一定是感染引起的
49. 甲状腺功能亢进引起发热的主要原因是
- A. 坏死物质吸收

- B.内分泌与代谢障碍  
C.产热过多  
D.散热过少  
E.抗原-抗体反应
- 50.右上腹痛伴发热、黄疸3天，最可能的诊断是  
A.急性胆囊炎  
B.急性胃炎  
C.消化性溃疡  
D.急性阑尾炎  
E.急性胰腺炎
- 51.吸气性呼吸困难表现为  
A.明显的哮鸣音  
B.深大呼吸  
C.桶状胸  
D.三凹征  
E.胸部一侧呼吸减弱
- 52.气胸出现的呼吸困难为  
A.呼气性呼吸困难  
B.吸气性呼吸困难  
C.混合性呼吸困难  
D.神经精神性呼吸困难  
E.以上都不是
- 53.黄绿色痰可提示  
A.铜绿假单胞菌肺炎  
B.支气管哮喘  
C.支气管扩张  
D.慢性支气管炎  
E.肺结核
- 54.下列疾病可弓 I 起咯血，但除外  
A.肺结核  
B.肺炎  
C.支气管内膜结核  
D.风湿性心脏病  
E.支气管哮喘
- 55.下列不属于个人史的是  
A.社会经历  
B.习惯与嗜好  
D.职业和生活条件  
E.生育史
- 56.下列不符合心包摩擦音特点的是  
A.收缩期及舒张期均可听到  
B.通常在胸骨左缘3、4肋间易听到  
C.将听诊器胸件向胸部加压时，可使摩擦音增强  
D.屏住呼吸时摩擦音消失  
E.病人采取坐位稍前倾时，易于听到
- 57.足三阳经的循行规律是  
A.从胸走手  
B.从足走头  
C.从头走足  
D.从足走胸  
E.从胸走足
- 58.中极穴是以下哪个脏腑之募穴  
A.大肠  
B.小肠  
C.膀胱  
D.肾  
E.肝
- 59.横指同身寸法中，以患者何指何处横纹为标准，将四指的宽度作为3寸  
A.中指中节  
B.食指中节  
C.无名指中节  
D.小指中节  
E.小指末节
- 60.善于治疗无脉症的腧穴是  
A.孔最  
B.尺泽  
C.列缺  
D.太渊  
E.少商
- 61.华佗夹脊穴位于后正中线旁开0.5寸  
A.第1颈椎至第12胸椎棘突下两侧  
B.第7颈椎至第5腰椎棘突下两侧  
C.第1胸椎至第5腰椎棘突下两侧



C.冶游史

D.第] 胸椎至第 12 胸椎棘突下两侧

E.第] 胸椎至骶管裂孔棘突下两侧

62. 下列腧穴中, 治疗急性吐泻有速效的是
- 委阳
  - 委中
  - 承山
  - 飞扬
  - 昆仑
63. 针刺环跳穴的最佳体位是
- 坐位
  - 站位
  - 仰卧位
  - 俯卧位
  - 侧卧位
64. 对捻转补泻中补法的叙述, 下列哪项是错误的
- 捻转角度小
  - 用力重
  - 频率慢
  - 操作时间短
  - 拇指向前, 食指向后 (左转用力为主)
65. 治疗厥阴头痛, 应配用
- 印堂、攒竹、合谷
  - 率谷、外关、足临泣
  - 天柱、后溪、申脉
  - 太冲、内关、四神聪
  - 血海、膈俞、内关
66. 针灸治疗实证痛经应取哪些经脉
- 任脉、足少阴经
  - 任脉、足厥阴经
  - 任脉、足太阴经
  - 冲脉、足厥阴经
  - 督脉、足厥阴经
67. 手足三阴经在四肢肘膝关节以上的分布规律是
- 太阴在前, 厥阴在中, 少阴在后
  - 太阴在前, 少阴在中, 厥阴在后
  - 厥阴在前, 太阴在中, 少阴在后
  - 少阴在前, 厥阴在中, 太阴在后
  - 厥阴在前, 少阴在中, 太阴在后
68. 下列不属于药物不良反应的是
- 副作用
  - 变态反应
  - 毒性反应
  - 后遗效应
  - 拮抗作用
69. 大多数弱酸性药和弱碱性药物一样, 口服后大部分在小肠吸收, 这主要是因为
- 都呈最大解离
  - 吸收面积最大
  - 小肠血流较其他部位丰富
  - 都呈最小解离
  - 存在转运大多数药物的载体
70. 不同给药途径吸收快慢次序是
- 舌下) 静脉注射) 肌内注射) 皮下注射) 口服) 直肠) 皮肤
  - 吸入) 舌下) 肌内注射) 皮下注射) 口服) 直肠) 皮肤
  - 静脉滴注) 肌内注射) 皮下注射) 舌下) 口服) 直肠) 皮肤
  - 皮肤) 直肠) 口服) 皮下注射) 肌内注射) 舌下) 吸入
  - 吸入) 舌下) 静脉滴注) 皮下注射) 口服) 直肠) 皮肤
71. 对药物作用的选择性, 认识不正确的是
- 选择性低的药物, 使用针对性低
  - 选择性高的药物, 使用针对性高
  - 较小剂量时选择性高, 剂量增大, 选择性降低
  - 选择性高的药物药理活性较强, 与剂量大

小无关

- E. 选择性低的药物, 不良反应较多, 但作用范围广
72. 外周血管痉挛性疾病宜选用下列哪种药物
- 普萘洛尔
  - 肾上腺素
  - 多巴胺
  - 酚妥拉明
  - 美托洛尔
73. 毛果芸香碱不具有的药理作用是
- 胃肠道平滑肌收缩
  - 腺体分泌增加
  - 心率减慢
  - 骨骼肌收缩
  - 眼内压减低
74. 氯解磷定的作用, 不正确的是
- 使肌束颤动消失或明显减轻
  - 对中枢中毒症状疗效最明显
  - 不直接对抗体内积聚的 ACh, 需与阿托品合用
  - 对中毒过久“老化”的磷酰化胆碱酯酶解毒效果差
  - 能与体内游离的有机磷酸酯类直接结合
75. 眼科检查、验光常选用
- 东食若碱
  - 新斯的明
  - 双复磷
  - 后马托品
  - 毛果芸香碱
76. 苯巴比妥治疗癫痫大发作, 疗效不佳, 后改用苯妥英钠, 结果反而病情加重, 可能的原因是
- 苯妥英钠剂量太小
  - 苯妥英钠对大发作无效
  - 苯妥英钠剂量过大而中毒
  - 苯妥英钠诱导了肝药酶, 加速自身代谢
  - 苯妥英钠的血药浓度尚未达到有效血药浓度
77. 氟喹诺酮类药物引起的不良反应是
- 胃肠道反应
  - 光敏反应
  - 心脏毒性
  - 软骨损害
  - 以上均是
78. 左旋多巴抗帕金森病的作用部位是
- 延脑
  - 黑质-纹状体
  - 延脑第四脑室底部
  - 大脑皮层
  - 丘脑下部
79. 654-2 临床可用于
- 支气管哮喘
  - 内脏平滑肌绞痛
  - 心肌梗死
  - 晕动病和呕吐
  - 胃肠道出血
80. 某种传染病在某一地区的近几年发病率的一 迹平称为
- 散发
  - 暴发
  - 流行
  - 流行性
  - 大流行
81. 下述哪项不是艾滋病的传播途径
- 性接触
  - 注射及输血和血制品
  - 母婴传播
  - 器官移植
  - 消化道
82. 慢性乙型肝炎的治疗关键是
- 休息
  - 保肝
  - 降酶
  - 抗病毒

- E. 调节免疫
83. 流行性出血热的“三痛”是
- A. 头痛、全身痛和腰痛
  - B. 头痛、关节痛和腰痛
  - C. 头痛、腓肠肌痛和腰痛
  - D. 头痛、眼眶痛和腰痛
  - E. 头痛、腹痛和腰痛
84. 狂犬病的传播途径不包括
- A. 眼结膜
  - B. 肛门粘膜
  - C. 胃肠粘膜
  - D. 角膜移植
  - E. 呼吸道
85. 霍乱的典型临床表现是
- A. 先泻后吐
  - B. 先吐后泻
  - C. 只泻不吐
  - D. 腹泻伴腹痛
  - E. 吐泻同时发生
86. 普通型流脑败血症期重要的体征是
- A. 高热
  - B. 剧烈头痛
  - C. 全身中毒症状
  - D. 皮肤黏膜瘀斑
  - E. 脑膜刺激征
87. 伤寒第一次菌血症相当于临床上的哪一期
- A. 潜伏期
  - B. 初期
  - C. 极期
  - D. 缓解期
  - E. 恢复期
88. 下列哪项不是急性菌痢的典型表现
- A. 里急后重
  - B. 发热
  - C. 呕吐
  - D. 腹痛
  - E. 黏液便
89. 下列哪项不符合中毒型菌痢脑型的诊断
- A. 急性高热，惊厥，昏迷
  - B. 迅速出现呼吸衰竭
  - C. 肠道症状不明显
  - D. 大便常规正常
  - E. 脑脊液检查正常
90. 有关隔离的描述，错误的是
- A. 是控制传染病流行的重要措施
  - B. 便于管理传染源
  - C. 可防止病原体向外扩散给他人
  - D. 根据传染病的平均传染期来确定隔离期限
  - E. 某些传染病患者解除隔离后尚应进行追踪观察
91. 有关医院感染的概念，错误的是
- A. 是指在医院内获得的感染
  - B. 出院之后的感染有可能是医院感染
  - C. 与上次住院有关的感染是医院感染
  - D. 入院时处于潜伏期的感染不一定是医院感染
  - E. 婴幼儿经胎盘获得的感染属医院感染
92. 下列各项中，在整个卫生法律体系中享有最高法律效力的规范性文件是
- A. 《中华人民共和国刑法》
  - B. 《中华人民共和国宪法》
  - C. 《中华人民共和国民法通则》
  - D. 《中华人民共和国食品安全法》
  - E. 以上均不是
93. 卫生法所涉及的民事责任主要形式是
- A. 赔偿损失
  - B. 行政处罚
  - C. 刑事处罚
  - D. 财产责任
  - E. 损害责任
94. 受吊销医师执业证书行政处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满多长时间的不给予注册
- A. 6个月

- B. 12个月  
C. 18个月  
D. 24个月  
E. 36个月
95. 下列关于假药的情形叙述正确的是
- A. 变质的药品  
B. 被污染的药品  
C. 国务院药品监督管理部门规定禁止使用的药品  
D. 所标明的适应证或者功能主治超出规定范围的药品  
E. 以上均是
96. 对医学道德的认识不正确的是
- A. 医务人员容易理解、接受  
B. 人道主义精神的集中体现  
C. 只存在于从事医生职业活动的人们中间  
D. 在内容上具有稳定性、连续性  
E. 在形式上比较具体、生动
97. 医务人员对患者诚信、宽厚, 潜心医学事业, 对医学科学忠诚, 体现了
- A. 仁爱  
B. 刚  
C. 诚挚  
D. 公正  
E. 奉献
98. 医学人道主义的含义包括
- A. 认为人的生命是宝贵的  
B. 人的生命和尊严具有最高的价值  
C. 医学人道主义要求医务人员同情、关心、尊重和爱护患者  
D. 是人道主义思想在医学领域中的具体体现  
E. 以上皆是
99. 患者的基本权利不包括
- A. 基本医疗权  
B. 疾病认知权

- C. 知情同意权  
D. 自主决定权  
E. 社会免责权

100. 人体实验类型中, 无需承担道德代价的是

- A. 天然实验  
B. 自愿实验  
C. 欺骗实验  
D. 强迫实验  
E. 自我实验

## 二、A2型选择题 (101-102题)

答题说明: 每一道考题是以一个小案例出现的, 其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案。

101. 患者女性, 慢性乙型肝炎 12 年, 血化验: **HBSAg (+)、HBeAg (+)、抗-HBcIgG (+)**。育有一女, 13 岁, 体检时查: 血清抗-HBs (+), 追问病史, 无任何临床症状, 未注射乙肝疫苗。其女儿属于下列哪种感染 A. 潜伏性感染
- B. 显性感染  
C. 病毒携带状态  
D. 隐性感染  
E. 垂直感染
102. 男性, 20 岁, 无任何不良反应, 体检时, 发现血清 **HBsAg** 阳性, 转氨酶等其他肝功能检查均正常, 属于下列哪种感染
- A. 既往感染过  
B. 显性感染  
C. 潜在性感染  
D. 病原体携带  
E. 重复感染
- ## 三、B1型选择题 (103-150题)
- 答题说明: 以下提供若干组考题, 每组考题共用在前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个与问题最密切的答案, 某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(103-104 题共用备选答案)

- A. 眩晕欲仆
  - B. 目睛上吊
  - C. 手足蠕动
  - D. 手足拘挛不伸
  - E. 咳嗽咽痒
103. 热极生风可见
104. 血虚生风可见

(105-106 题共用备选答案)

- A. 塞因塞用
  - B. 寒者热之
  - C. 热因热用
  - D. 寒因寒用
  - E. 通因通用
105. 适用于脾虚腹胀的治则治法是
106. 适用于真热假寒证的治则治法是

(107-108 题共用备选答案)

- A. 燥苔
- B. 类剥苔
- C. 花剥苔

D.糙苔

E.地图舌

107.舌苔不规则脱落,边缘突起,界限清楚的是

108.舌苔干燥粗糙津液全无的是

(109~110 题共用宛答案)

A.血虚动风

B.热极生风

C.阴虚动风

D.疫毒攻心

E.肝阳化风

109.舌紫而吐舌可见于

110.新病舌绛而颤动并伴高热惊厥可见于

(111~112 题共用备选答案)

A.舌强硬红绛少津

B.舌强硬语言睿涩

C.舌强硬舌苔厚腻

D.舌痿软淡白无华

E.舌痿软红绛少苔

111.气血两虚多见

112.邪热炽盛多见

(113~114 题共用备选答案)

A.滋补肝肾, 养胃生津

B.补脾益气, 养胃生津

C.滋阴除烦, 养胃生津

D.养阴润燥, 清肺生津

E.清肺养阴, 益胃生津

113.北沙参的功效是

114.天冬的功效是

(115~116 题共用备选答案)

A.风湿痹痛

B.湿热黄疸

C.血虚失眠

D.肾虚腰痛

E.肠燥便秘

115.川芎可用于治疗的病证是

116.郁金可用于治疗的病证是

(117~118 题共用备选答案)

A.芍药、大腹子

C.生姜、草豆蔻

D.肉桂、炮干姜

E.桂枝、茯苓皮

117.真武汤的组成药物中含有

118.实脾散的组成药物中含有

(119~120 题共用翻答案)

A.宣畅气机, 清利湿热

B.清热化湿, 理气和中

C.清热泻火, 利水通淋

D.利湿化浊, 清热解毒

E.利水渗湿, 温阳化气

119.八正散的功用

120.三仁汤的功用

(121~122 题共用备选答案)

A.结核病

B.急性喉炎

C.疟疾

D.败血症

E.伤寒

121.稽留热可见于

122.弛张热可见于

(123~124 题共用备选答案)

A.白血病

B.传染性单核细胞增多症

C.急性胆囊炎

D.钩端螺旋体病

E.流行性感胃

123.发热伴结膜充血常见于

124.发热伴寒战常见于

(125~126 题共用备选答案)

A.输尿管结石

B.十二指肠溃疡

C.急性胆囊炎

D.心绞痛

E.颅内压增高

125.心前区疼痛呈压榨样并有窒息感常见于

126.右上腹疼痛放射至右肩胛下区常见于

(127~128 题共用备选答案)

**B.**白术、炮附子

**A.**妊娠



- B. 糖尿病  
C. 消瘦体型  
D. 胸膜增厚  
E. 下叶肺实变
127. 肺下界可下移 1 肋见于
128. 肺下界可上移 1 肋见于  
(129-130 题共用备选答案)
- A. 任脉  
B. 冲脉  
C. 带脉  
D. 阴脉  
E. 阴维脉
129. 具有维系六阴经作用的是
130. 具有调节全身阴经经气作用的是  
(131-132 题共用备选答案)
- A. 太冲、太溪  
B. 丰隆、合谷  
C. 曲池、内庭、丰隆  
D. 足三里、气海  
E. 太溪、风池
131. 治疗中风中经络之痰热腑实证，除主穴外，还应配合
132. 治疗中风中经络之阴虚风动证，除主穴外，还应配合  
(133-134 题共用备选答案)
- A. 足三里  
B. 上巨虚  
C. 下巨虚  
D. 条口  
E. 丰隆
133. 强壮保健要穴是
134. 治疗痰饮病证的要穴是  
(135-136 题共用备选答案)
- A. 毛果芸香碱  
B. 新斯的明  
C. 阿托品  
D. 杜冷丁  
E. 吗啡
135. 可用于治疗青光眼的是
136. 可用于阵发性室上性心动过速的是  
(137-138 题共用备选答案)
- A. 异烟肼  
B. 利福平  
C. 氯霉素  
D. 磺胺嘧啶  
E. 庆大霉素
137. 雷米封即
138. 甲哌利福霉素即  
(139-141 题共用备选答案)
- A. 作用于髓祥升支粗段的髓质和皮质部，抑制  $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$  共同转运系统  
B. 作用于髓祥升支粗段皮质部，抑制  $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$  共同转运系统  
C. 作用于远曲小管和集合管，竞争醛固酮受体，对抗醛固酮的作用  
D. 作用于远曲小管近端，阻滞  $\text{Na}^+$  通道，减少  $\text{Na}^+$  的重吸收  
E. 作用于近曲小管，抑制碳酸酐酶，减少  $\text{H}^+-\text{Na}^+$  交换
139. 呋塞米的利尿作用机制是
140. 螺内酯的利尿作用机制是  
(141-142 题共用备选答案)
- A. 氮芥类  
B. 喜树碱类  
C. 亚硝胍类  
D. 普卡霉素类  
E. 二氢叶酸还原酶抑制剂
141. 属于抗代谢药中常用药物的是
142. 属于抗肿瘤抗生素常用药物的是  
(143-144 题共用备选答案)
- A. 体液传播  
B. 土壤传播  
C. 飞沫传播  
D. 水、食物、苍蝇传播  
E. 蚊虫传播

143. 流感传播途径主要是

144. 流脑传播途径主要是

(145-146 题共用备选答案)

- A. 病程超过 2 周
- B. 病程超过 1 月
- C. 病程超过 2 月
- D. 病程超过半年
- E. 病程超过 1 年

145. 慢性肝炎

146. 慢性菌痢

(147-148 题共用备选答案)

- A. 发热, 腹痛, 腹泻, 洗肉水样大便

147. 急性菌痢典型表现为 148. 霍乱典型表现为

B. 发热, 腹痛, 腹泻, 脓血便, 里急后重

C. 腹泻, 呕吐, 水样大便, 无发热, 无腹痛

D. 发热, 腹痛, 腹泻, 水样大便

E. 低热, 腹痛, 腹泻, 果酱样大便

(149~150 题共用备选答案)

A. 超声波

B. 洗手

C. 碘类消毒

D. 电离辐射

E. 紫外线

149. 属高效消毒法的是

150. 属灭菌法的是

## 第二单元

## 一、A1 型选择题 (1~83 题)

答题说明: 每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案。

1. 非小细胞肺癌中, 最常见的是
  - A. 小细胞肺癌
  - B. 鳞状上皮细胞癌
  - C. 腺癌
  - D. 大细胞癌
  - E. 鳞腺癌
2. 不属于肺炎链球菌肺炎病理改变分期的是
  - A. 充血期
  - B. 红色肝变期
  - C. 灰色肝变期
  - D. 消散期
  - E. 吸收期
3. 治疗原发性支气管肺癌中医证型之阴虚毒热证选用的方药是
  - A. 导痰汤
  - B. 保真汤
  - C. 血府逐瘀汤
  - D. 沙参麦冬汤合五味消毒饮
  - E. 百合固金汤合秦艽鳖甲散
4. 慢性肺源性心脏病最常见的病因是
  - A. 慢性阻塞性肺疾病
  - B. 严重的胸廓畸形
  - C. 神经-肌肉病变
  - D. 晚期支气管哮喘
  - E. 重症肺结核
5. 液脚留的可靠指标是
  - A. 短时间内体重增加
  - B. 颈静脉充盈程度
  - C. 肝-颈静脉反流征
  - D. 肺和肝充血的程度
  - E. 下肢和髓部水肿
6. 急性心肌梗死最常见的心律失常是
  - A. 窦性停搏
  - B. 阵发性室上性心动过速
  - C. 室性期前收缩
  - D. 交界性心律
  - E. 心房扑动
7. 栓塞最常见于下列哪种病人
  - A. 二尖瓣关闭不全
  - B. 主动脉瓣关闭不全
  - C. 二尖瓣狭窄伴房颤
  - D. 主动脉瓣狭窄
  - E. 三尖瓣狭窄
8. 胸外心脏按压的频率是
  - A. 每分钟至少 60 次
  - B. 每分钟至少 80 次
  - C. 每分钟至少 100 次
  - D. 每分钟至少 120 次
  - E. 每分钟至少 140 次
9. 高血压急症的首选降压药是
  - A. 硝普钠
  - B. 硝酸甘油
  - C. 呋塞米
  - D. 硝苯地平
  - E. 贝那普利
10. 急性胃炎在中医中密切相关的脏腑是
  - A. 肝脾
  - B. 肺脾
  - C. 肺肾
  - D. 脾肾
  - E. 心肝
11. 治疗溃疡性结肠炎脾肾阳虚证首选
  - A. 四神丸
  - B. 实脾散
  - C. 痛泻要方
  - D. 参苓白术散
  - E. 膈下逐瘀汤

12. 关于上消化道出血的叙述, 错误的是
- A. 出血量超过 50ml, 即可出现柏油样黑粪
  - B. 出血早期血压、血红蛋白可正常
  - C. 出血 24~48 小时内可急诊胃镜检查
  - D. 咖啡渣样液是血液经过胃酸作用后形成的
  - E. 大量出血者就是食管静脉曲张静脉破裂出血
13. 消化性溃疡的命名是由于
- A. 溃疡位于消化道
  - B. 溃疡影响消化功能
  - C. 溃疡局限于胃和十二指肠
  - D. 溃疡由消化道功能紊乱引起
  - E. 溃疡的形成有胃酸和胃蛋白酶的消化作用参与
14. 原发性肝癌淋巴结转移, 以何部位最多见
- A. 肝门淋巴结
  - B. 锁骨上淋巴结
  - C. 胰腺
  - D. 腋窝淋巴结
  - E. 脾脏
15. 慢性肾炎有多少由急性肾炎转变而来
- A. 全部
  - B. 少数
  - C. 半数
  - D. 大多数
  - E. 没有
16. 女性易患尿路感染的最主要原因是
- A. 妊娠
  - B. 月经期抵抗力下降
  - C. 更年期内分泌失调
  - D. 尿道口接近肛门且尿道直而宽
  - E. 饮食影响尿液 pH 值
17. 急性白血病的首发表现是
- A. 贫血
  - B. 发热
  - C. 出血
  - D. 脾大
  - E. 失明
18. 巨脾伴见白细胞数显著增高多见于
- A. 急性淋巴细胞性白血病
  - B. 慢性髓细胞性白血病
  - C. 血吸虫病晚期
  - D. 骨髓纤维化症
  - E. 肝硬化
19. 下列缺铁性贫血所属中医范畴错误的是
- A. 血劳
  - B. 浮肿
  - C. 虚劳
  - D. 萎黄
  - E. 黄胖
20. 下列哪项不是引起再障的主要原因
- A. 药物
  - B. 接触化学毒物
  - C. 病毒感染
  - D. 饮食不当
  - E. 电离辐射
21. 类风湿关节炎的基本病理改变是
- A. 皮炎
  - B. 滑膜炎
  - C. 心包炎
  - D. 血管炎
  - E. 心脏炎
22. 短暂性脑缺血发作持续时间为
- A. 数秒至数啊
  - B. 数分钟至 1 小时
  - C. 1~2 小时
  - D. 2~6 小时
  - E. 6~24 小时
23. 脑栓塞的多发人群是
- A. 儿童
  - B. 少年
  - C. 青壮年
  - D. 中年
  - E. 老年
24. 腔隙性梗死约占急性缺血性脑卒中的

A. 10%

B. 20%

C. 30%

D. 40%

E. 50%

25.蛛网膜下腔出血最可靠的诊断依据是

A.突然剧烈头痛, 呕吐

B.脑膜刺激征阳性

C.偏瘫

D. CT 脑检查呈低密度影

E.脑脊液检查呈均匀血性, 压力增高

26.血胆碱酯酶活力测定可疑时还可进行哪项检查

A.痰液检查

B.大便检查

C.尿液检查

D.脑脊液检查

E.活组织检查

27.实喘的治疗原则是

A.化痰平喘

B.祛邪利气

C.降气平喘

D.降气化痰

E.以上都不是

28.虚烦不寐, 触事易惊, 终日惕惕, 胆怯心悸, 伴气短自汗, 倦怠乏力, 宜选

A.黄连阿胶汤

B.半夏秫米汤

C.归脾汤合酸枣仁汤

D.安神定志丸合酸枣仁汤

E.六味地黄丸

29.便秘是指两次排便时间间隔

A. 6 天以上

B. 2 天以上

C. 3 天以上

D. 4 天以上

E. 5 天以上

30.胃痞痰湿中阻证治疗的主方是

A.二陈平胃汤加减

C.泻心汤和连朴饮加减

D.越鞠丸和枳术丸加减

E.枳实消痞丸加减

31.下列哪一项不是肝胆湿热胁痛的特点

A.胁肋灼热胀痛

B. 口苦口黏

C.小便黄赤

D.舌红少苔

E.脉弦滑数

32.肝胆湿热证的胁痛, 治疗主方为

A.小承气汤

B.大承气汤

C.甘露消毒丹

D.龙胆泻肝汤

E.三仁汤

33.治疗肠道湿热所致的便血, 宜选用

A.归脾汤

B.龙胆泻肝汤

C.黄土汤

D.地榆散合槐角丸

E.地榆散合小蓟饮子

34.郁证与五脏皆有关系, 但关系密切的脏是

A.心、肝、脾

B.心、肝、肺

C.心、肝、肾

D.心、肺、肾

E.脾、肺、肾

35.自汗、盗汗与战汗的区别错误的是

A.汗出有无突然恶寒战栗

B.心悸少寐

C.汗出是否是发生在急性热病进程中

D.汗出之后脉静身凉

E.全身汗出

36.致病特点为其肿宣浮, 患部皮色或红或不  
变, 痛无定处, 走注甚速的是

A.风

B.寒

C.暑

B.保和丸加減

D.湿

- E. 燥
37. 气管内插管的拔管指征包括
- A. 病人完全清醒，呼之有明确反应
  - B. 呼吸道通气量正常，肌张力完全恢复
  - C. 吞咽反射，咳嗽反射恢复
  - D. 循环功能良好，血氧饱和度正常
  - E. 以上都是
38. pH 值下降不明显，PCO<sub>2</sub>增高，常大于 6.0kPa。血浆 HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>有所增加，AB > SB，可诊断为
- A. 急性呼吸性酸中毒
  - B. 慢性呼吸性酸中毒
  - C. 轻度代谢性酸中毒
  - D. 重度代谢性酸中毒
  - E. 代谢性碱中毒
39. 下列血液制品属血浆成分的是
- A. 冷沉淀
  - B. 红细胞制剂
  - C. 血小板制剂
  - D. 免疫球蛋白
  - E. 浓缩凝血因子
40. 术后一般监测不包括
- A. 心电监测
  - B. 肾功能监测
  - C. 血容量监测
  - D. 呼吸功能监测
  - E. 体温监测
41. 术后镇痛的方法包括
- A. 口服给药
  - B. 肌肉注射
  - C. 静脉注射
  - D. 椎管内镇痛
  - E. 以上都是
42. 网状淋巴管炎又称
- A. 疖
  - B. 痈
  - C. 丹毒
  - D. 脓肿
  - E. 急性蜂窝织炎
43. 肺癌最常见的症状是
- A. 咳嗽
  - B. 血痰
  - C. 胸痛
  - D. 发热
  - E. 气短及胸闷
44. 多为单发的乳腺肿块，边缘清楚，无粘连，极易推动，且无疼痛，腋窝淋巴结不大，可诊断为
- A. 乳腺导管扩张症
  - B. 乳腺癌
  - C. 乳房纤维腺瘤
  - D. 积乳囊肿
  - E. 急性乳腺炎
45. 胃、十二指肠溃疡大出血最常见的症状是
- A. 腹痛
  - B. 黑便
  - C. 肠鸣音活跃
  - D. 胃脘部胀满
  - E. 体温轻度增高
46. 肝癌诊断中最常用而有效的方法是
- A. CT
  - B. MRI
  - C. X线检查
  - D. 超声检查
  - E. 肝血管造影
47. 慢性肾炎易被误诊为肝硬化的主要原因是
- A. 伴血尿
  - B. 伴高血压
  - C. 易发生腹水
  - D. 尿中有管型
  - E. 尿中有大量蛋白
48. 肠梗阻的典型症状不包括
- A. 腹痛
  - B. 腹胀



- C. 腹泻
  - D. 呕吐
  - E. 停止排气排便
49. 腹股沟直疝最有效的治疗手段是
- A. 使用疝带

- B.疝修补术
- C.疝成形术
- D.疝高位结扎
- E.手术加强腹股沟三角

50.内痔的主要临床表现为

- A.便血、贫血、坠胀
- B.下血、嵌顿、贫血
- C.便血、坠胀、肿块脱出
- D.水肿、糜烂、坏死
- E.嵌顿、坠胀、痔核脱出

51.前列腺增生症最重要的症状是

- A.尿潴留
- B.尿频
- C.进行性排尿困难
- D.血尿
- E.尿痛

52.古籍中有关子宫的名称错误的是

- A.胞宫
- B.女子胞
- C.子处
- D.子门
- E.血室

53.卵子从卵巢排出，在输卵管何处受精

- A.输卵管峡部
- B.输卵管峡部与壶腹部连接处
- C.输卵管伞部
- D.输卵管间质部
- E.子宫腔

54.关于人绒毛膜促性腺激素的叙述，下列哪项正确

- A.绒毛细胞滋养细胞产生
- B.受精后 10 日开始分泌
- C.有与黄体生成素相似的生物活性
- D.为糖蛋白激素，产后 1 周内消失
- E.至妊娠 14-16 天达高峰，持续 1~2 周后下降

55.做产前检查应常规每周 1 次的是

- A.孕 24 周后

C.孕 24~36 周

D.孕 30 周后

E.孕 16~20 周

56.临产的主要标志是

- A.见红，规律宫缩，胎头下降
- B.规律宫缩，破膜，胎头下降
- C.见红，破膜，宫口扩张
- D.规律宫缩，胎头下降，宫口扩张
- E.见红，破膜，规律宫缩

57.正常恶露总量约为

- A. 100~200ml
- B. 200~400ml
- C. 250~500ml
- D. 400~800ml
- E. 800~1000ml

58.子宫发育不良、不孕、流产等是由于

- A.过度忧虑
- B.营养过剩
- C.脂肪缺乏
- D.维生素 E 缺乏
- E.严重营养不良

59.脾胃素弱，胃失和降，冲气上逆引起的妊娠恶阻选用的代表方为

- A.理中丸
- B.举元煎
- C.完带汤
- D.四君子汤
- E.苏叶黄连汤

60.妊娠剧吐的主要发病机理是

- A.脾气虚弱，胃失和降
- B.痰浊上扰，胃失和降
- C.冲气上逆，胃失和降
- D.阴血下注，阳气偏亢
- E.肝胃不和，胃失和降

61.异位妊娠的基本病机是

- A.湿热下注
- B.肾气亏虚
- C.少腹血瘀实证

B.孕 36 周起

D.瘀血阻滞冲任胞宫

- E. 冲任不固，带脉失约
62. 产后出血的常见病因病机为
- A. 气滞和血瘀
  - B. 气虚和血瘀
  - C. 气脱和血瘀
  - D. 气滞和血虚
  - E. 气虚和血虚
63. 属于产后关节痛的中医范畴的是
- A. 产后出血
  - B. 产后发热
  - C. 产后血晕
  - D. 产后身痛
  - E. 产后眩晕
64. 下列关于女性生殖道的自然防御功能，错误的是
- A. 两侧大阴唇自然合拢，可防止外界微生物的污染
  - B. 阴道口闭合，阴道前后壁紧贴，可防止外界污染
  - C. 阴道分泌物可维持中性粒细胞活性，防止细菌侵入阴道黏膜
  - D. 输卵管黏膜上皮细胞的纤毛向宫腔方向摆动，有利于阻止病原体的侵入
  - E. 宫颈管分泌的黏液栓内含有乳铁蛋白、溶菌酶，可抑制细菌侵入子宫内膜
65. 月经病的治疗原则是
- A. 治本调经
  - B. 清热利湿
  - C. 化瘀止痛
  - D. 补肾调经
  - E. 清热解毒
66. 宫颈癌早期临床特点是
- A. 绝经后阴道大量出血
  - B. 接触性出血
  - C. 大量脓血性恶臭白带
  - D. 下肢肿痛
  - E. 输尿管上段扩张
67. 最容易被子宫内膜异位症侵犯的器官是
- A. 卵巢
  - B. 输卵管
  - C. 肠管
  - D. 输尿管
  - E. 膀胱
68. 小儿常用内治法中消食导滞法之消食化积常用方为
- A. 消乳丸
  - B. 保和丸
  - C. 健脾丸
  - D. 枳实导滞丸
  - E. 资生健脾丸
69. 小儿常用内治法中利水消肿法之阳水常用方剂是
- A. 实脾饮
  - B. 真武汤
  - C. 五苓散
  - D. 十灰散
  - E. 防己黄芪汤
70. 以下各期中死亡率最高的是
- A. 学龄期
  - B. 学龄前期
  - C. 幼儿期
  - D. 新生儿期
  - E. 婴儿期
71. 正常小儿前囟关闭的年龄是
- A. 6~8个月
  - B. 8~10个月
  - C. 10~12个月
  - D. 12~18个月
  - E. 16~24个月
72. 小儿的舒张压正常值应为收缩压的
- A. 1/3

- B. 1/4  
C. 1/5  
D. 2/3  
E. 1/6
73. 小儿时期最常见的两脏疾病是  
A. 肺脾  
B. 肝肾  
C. 心肾  
D. 肝脾  
E. 肝肺
74. 重度脱水时患儿失水量约为体重的  
A. 5%以下  
B. 8%左右  
C. 5%~10%  
D. 10%左右  
E. 10%以上
75. 母乳喂养早吸吮的最合理时间是  
A. 出生后 30 分钟内  
B. 出生后 1~2 小时  
C. 出生后 2~6 小时  
D. 出生后 6~24 小时  
E. 出生后 24~48 小时
76. 小儿腹部叩之音浊, 按之有波动感, 脐突, 应首先考虑的是  
A. 气滞  
B. 虫症  
C. 食积  
D. 疳证  
E. 腹水
77. 小儿应用脉诊的最早年龄是  
A. 1 周岁  
B. 2 周岁  
C. 3 周岁  
D. 4 周岁  
E. 7 周岁
78. 古医家认为诊断小儿疾病最重要的是  
A. 按诊  
B. 望诊  
C. 闻诊  
D. 问诊  
E. 切诊
79. 察目应首选观察的项目是  
A. 眼神  
B. 瞳孔  
C. 眼睑  
D. 巩膜  
E. 结膜
80. 下列哪项不属于小儿反复呼吸道感染的病因  
A. 喂养不当, 调护失宜  
B. 少见风日, 不耐风寒  
C. 湿蕴脾胃, 熏蒸肝胆  
D. 用药不当, 损伤正气  
E. 正虚邪伏, 遇感乃发
81. 小儿时邪感冒的治法宜选用  
A. 辛温解表  
B. 辛凉解表  
C. 清暑解表  
D. 清热解毒  
E. 辛凉解毒
82. 不属于新生儿黄疸之寒湿阻滞证的证候特征的是  
A. 颜色鲜明  
B. 目黄身黄  
C. 神疲倦怠  
D. 四肢欠温  
E. 舌淡苔白腻
83. 病毒性心肌炎的中医发病外因是  
A. 正气亏虚  
B. 风热邪毒  
C. 麻毒时邪  
D. 暑湿疫毒  
E. 温热邪毒

## 二、A2 型选择题 (84~ 們 3 題)

答题说明: 每一道考题是以一个小案例出现

的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案。

84. 张某,男,48岁。支气管肺癌术后3个月,配合中药治疗。现症见:咳嗽不畅,咯痰不爽,胸胁胀痛、刺痛,面青唇暗,大便秘

- D. 益气养阴,化痰散结  
E. 行气化滞,清热解毒

85. 韩某,男,68岁。肺心病多年,诊见:呼吸浅短难续,声低气怯,甚则张口抬肩,倚息不能平卧,咳嗽,痰白清稀如沫,胸闷,心慌形寒,汗出,舌淡,脉沉细微无力。治疗宜选

- A. 苏子降气汤  
B. 生脉散合血府逐瘀汤  
C. 补肺汤  
D. 涤痰汤  
E. 小青龙汤

86. 患者,女,40岁。提早出现的 P'波,形态与窦性 P 波不同; P' -R > 0.12 秒; QRS 形态正常;代偿间歇不完全。该患者的诊断为

- A. 室上性心动过速  
B. 房性早搏  
C. 室性早搏  
D. 房颤  
E. 室颤

87. 患者,男,28岁。经常出现规律性上腹痛3年,空腹发作,夜间更重,进食可缓解,服抗酸药可止痛。最可能的诊断为

- A. 胃溃疡  
B. 十二指肠球部溃疡  
C. 复合性溃疡  
D. 十二指肠壅积症  
E. 胃黏膜脱垂症

88. 患者,男,42岁。不规则低热3个月,厌食,体重下降5kg,右季肋下胀痛,巩膜轻度黄染,面部有三个蜘蛛痣,肝肋下3.5cm,质硬表面不平,脾肋下1cm,肝区可闻及血管杂音,白细胞  $5.8 \times 10^9/L$ ,中性 0.64,谷丙转氨酶 130U/L。碱性磷酸酶 30U/L。经中西医治疗

结,舌质暗紫,舌下有瘀斑,脉弦。治拟何法

- A. 活血散瘀,行气化滞  
B. 祛湿化痰,清热解毒  
C. 养阴清热,解毒散结

无效。应诊断为

- A. 慢性活动性肝炎  
B. 原发性肝癌  
C. 门脉性肝硬化  
D. 肝脓肿  
E. 肝血管瘤

89. 王某,男性,9岁。在房屋装修后立即入住,半年后出现头晕,乏力,心悸,就诊时骨髓活检示增生低下,患者表现为面色苍白,唇甲色淡,心悸乏力,颧红盗汗,手足心热,口渴思饮,腰膝酸软,皮肤出血,便结,舌质淡,舌苔薄,脉细数。最可能诊断为西医何病、中医何证

- A. 缺铁性贫血,肾阴虚证  
B. 再障,肾阳亏虚证  
C. 恶性贫血,肾阳亏虚证  
D. 再障,肾阴虚证  
E. 再障,肾阴阳两虚证

90. 患者,男,62岁,头晕目眩,卒然半身不遂,移时恢复如常,舌质暗,苔黄厚腻,脉滑数,选用的方药为

- A. 镇肝息风汤  
B. 补阳还五汤  
C. 星萎承气汤  
D. 天麻钩藤饮  
E. 黄连温胆汤合桃红四物汤

91. 患者,男,45岁,高血压十余年,左侧面部和上下肢无力,MRI可清晰显示脑干病灶,其余未见明显异常,可考虑患者为

- A. 脑出血  
B. 脑栓塞  
C. 脑血栓形成  
D. 腔隙性梗死  
E. 蛛网膜下腔出血

92. 某男, 35岁, 被人发现时躺在公园一角落, 呈半昏迷状态, 便急送医院。体检: 体温、血压正常, 神志不清, 两侧瞳孔针尖大小, 口角流涎, 口唇紫即, 呼吸急促, 两肺满布水泡音, 心率 60次/分钟, 肌肉有震颤。迅速洗胃, 洗出液有大蒜味。可能的诊断是
- 有机磷杀虫药中毒
  - 酒精中毒
  - CO中毒
  - 中暑
  - 安定中毒
93. 张某, 12岁, 因发热就诊, 肌注青霉素后出现肢冷, 汗出, 血压下降, 应采用下列哪种药物治疗
- 间羟胺
  - 氢化考的松
  - 去甲肾上腺素
  - 多巴胺
  - 肾上腺素
94. 患者, 女, 28岁。心烦不寐, 胸闷脘痞, 泛恶暖气, 伴口苦, 头重, 目眩, 舌偏红, 苔黄腻, 脉滑数, 选用的治法是
- 疏肝泻火, 镇心安神
  - 清化痰热, 和中安神
  - 补益心脾, 养血安神
  - 滋阴降火, 交通心肾
  - 益气镇惊, 安神定志
95. 左某, 男, 42岁。患慢性肝炎十余年。近一周来出现腹胀大, 按之不坚, 胁下胀满疼痛, 纳食减少, 食后作胀, 暖气不爽, 小便短少, 苔白腻, 脉弦。治宜选用
- 柴胡疏肝散
  - 五苓散
  - 实脾饮
  - 调营饮
  - 中满分消丸
96. 患者, 男, 52岁。近来胁肋隐痛, 悠悠不休, 遇劳加重, 口干咽燥, 心中烦热, 头晕目眩, 舌红少苔, 脉细弦而数。治法宜选用
- 疏肝理气
  - 蹴络
  - 清热利湿
  - 养阴柔肝
  - 以上都不是
97. 方某, 女, 45岁, 腰部冷痛重着, “如带五千钱”, 不能转侧, 活动不利, 静卧痛不减, 天阴下雨则疼痛尤甚, 舌质淡, 苔白腻, 脉沉而迟缓。其选择的中医治法是
- 清热利湿, 舒筋止痛
  - 活血理气, 舒筋止痛
  - 散寒行湿, 温经通络
  - 温补肾阳, 舒筋止痛
  - 滋补肾阴, 温经通络
98. 患者女性, 28岁, 手术后出现表情淡漠、嗜睡、烦躁、腹胀、心律加快, 心电图早期 T波低平、双相倒置, 继之 S-T段下降、Q-T间期延长和 U波出现, 属
- 轻度脱水
  - 中度脱水
  - 重度脱水
  - 低钾血症
  - 高钾血症
99. 患者, 男, 35岁, 出现局部隆起, 红肿热痛明显, 压之剧痛, 有波动感, 应首先考虑为
- 丹毒
  - 蜂窝织炎
  - 脓肿
  - 疥
  - 疔
100. 男性患者, 26岁, 西医诊断为肝破裂, 中医辨证为血脱证, 宜用方药
- 当归补血汤合参附汤
  - 复元活血汤

- C. 四物汤  
D. 八珍汤  
E. 补阳还五汤
101. 患者，男，5岁，右臂沿神经干走向出现多个肿块，质软，同时皮肤出现大小不等的咖啡色斑块。应首先考虑的是
- A. 皮脂腺囊肿  
B. 神经纤维瘤  
C. 皮样囊肿  
D. 脂肪瘤  
E. 淋巴管瘤
102. 患者，女，40岁，颈前弥漫性肿大，性情急躁易激动，双眼突出，双手颤动，身体消瘦但食欲亢进。应首先考虑的是
- A. 单纯性甲状腺肿  
B. 甲状腺腺瘤  
C. 甲状腺癌  
D. 甲状腺功能亢进症  
E. 甲状腺机能减退症
103. 患者，女，35岁，转移性右下腹疼痛3天，右下腹压痛、反跳痛、肌紧张，腰大肌试验阳性，血白细胞升高，应诊断为
- A. 急性阑尾炎  
B. 慢性阑尾炎  
C. 急性肠梗阻  
D. 肠系膜淋巴结炎  
E. 右侧附件炎
104. 患者，女，27岁，产后恶露量多，色淡红，质稀，无臭气，面色觥白，神疲懒言，四肢无力，小腹空坠；舌淡，苔薄白，脉细弱。选用的治法为
- A. 补脾益气，固冲摄血  
B. 养阴清热，安冲止血  
C. 活血化瘀，调冲止血  
D. 清热解毒，凉血化瘀  
E. 清营解毒，散瘀泄热
105. 女，28岁，月经干净后开始出现外阴奇痒，灼热疼痛，带下量多，色黄气秽，局部皮肤黏膜粗糙肥厚或破损溃疡，渗流黄水，胸闷烦躁，口苦口干，溲赤便秘；舌红，苔黄腻，脉弦数。主方选用
- A. 龙胆泻肝汤  
B. 五味消毒饮  
C. 易黄汤  
D. 革薛胜湿汤  
E. 二妙散
106. 经期或经后腹痛，喜温喜按，月经色淡质稀，神疲乏力，下腹积块，腹腔镜检查诊断为子宫内膜异位症，首选方剂为
- A. 少腹逐瘀汤  
B. 膈下逐瘀汤  
C. 血府逐瘀汤  
D. 桃红四物汤  
E. 理冲汤
107. 一农妇，诉阴道脱出一物3年，查体：宫颈已脱出至阴道口外，宫体在阴道内，双附件无异常，诊断为子宫脱垂。其程度应属于
- A. I度轻  
B. I度重  
C. II度轻  
D. II度重  
E. m度
108. 患者，女，结婚4年未孕，月经38-5。天一行，量少色淡，面色晦暗，腰酸腿软。舌淡红，苔薄白，脉沉细，检查子宫发育欠佳。治宜
- A. 滋阴养血，调冲益精  
B. 补肾益精，养血调经  
C. 疏肝解郁，养血理脾  
D. 燥湿化痰，理气调经



- E. 温肾养血益气, 调补冲任
109. 患者正常宫内妊娠 45 天, 曾多次人工流产, 瘢痕子宫, 要求终止妊娠, 对手术流产恐惧。应采取的措施是
- A. 负压吸引术  
B. 药物流产  
C. 钳刮术  
D. 手术流产  
E. 输卵管绝育术
110. 小儿, 男, 3 岁, 站位测身高 96cm, 体重 14kg。评价其生长发育状况最恰当的是
- A. 正常范围  
B. 身长体重低于正常  
C. 身长正常, 体重低于标准  
D. 体重正常, 身长低于标准  
E. 身长体重超过正常
111. 患儿, 女, 1 岁。高热咽痛, 咽部充血, 软腭上有 2~4mm 大小的疱疹, 疱疹周围有红晕。心肺听诊正常。应首先考虑的是
- A. 疱疹性咽峡炎  
B. 咽结合膜热  
C. 支气管炎  
D. 支气管肺炎  
E. 急性化脓性扁桃体炎
112. 患儿, 女, 1 岁。发热有汗, 鼻塞流涕, 咽部充血, 口渴, 苔薄黄, 兼见惊惕啼叫, 睡卧不宁, 舌质红, 脉浮弦。其诊断是
- A. 感冒夹食滞  
B. 感冒夹惊  
C. 感冒夹痰  
D. 风寒感冒  
E. 时行感冒
113. 患儿, 男, 6 岁。患病毒性心肌炎 6 个月, 面色晦暗, 胸闷憋气, 时觉心前区刺痛, 时欲呕恶, 舌质紫暗, 苔白腻, 脉滑。其中医证型是
- A. 风热犯心证  
B. 湿热侵心证  
C. 气阴亏虚证  
D. 痰瘀阻络证  
E. 心阳虚弱证
114. 患儿, 男, 9 岁。患病毒性心肌炎。寒热起伏, 胸闷憋气, 肌肉酸痛, 脏痞腹泻, 恶心欲吐, 舌质红, 苔黄腻, 脉濡数。其中医证型为
- A. 风热犯心证  
B. 湿热侵心证  
C. 热实结胸证  
D. 心脉痹阻证  
E. 痰火扰心证
115. 患儿, 女, 7 岁。2 周前曾有感冒, 现发热, 低热绵延, 鼻塞流涕, 咽红肿痛, 肌痛肢楚, 胸闷胸痛舌红苔薄, 脉数。诊断为病毒性心肌炎, 中医辨证为风热犯心证, 治疗应首选的方剂是
- A. 银翘散  
B. 失笑散  
C. 生脉散  
D. 葛根黄芩黄连汤  
E. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤
- 三、A3 型选择题 (116-130 题)
- 答题说明: 以下提供若干个案例, 每个案例下设多道考题。请根据题干所提供的信息, 在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。
- (116-118 题共用题干)
- 患者, 男, 30 岁。1 周前出现发热, 恶风, 鼻塞, 咳嗽, 自服感冒药、止咳化痰药物, 症状不减。昨日咳嗽, 咯痰加重。现症: 咳嗽频剧, 气促, 痰色白, 咯吐不爽, 口微渴, 发热重, 恶寒轻, 头痛, 鼻塞。查体: T39Y, 右下肺叩诊浊音, 听诊呼吸音减低, 可闻及湿啰音。舌边尖红, 苔薄白, 脉浮数。血常规: 白细胞  $12 \times 10^9/L$ , 中性粒细胞 80%。胸部 X 线片示: 右下肺片状浸润阴影。
116. 最可能的诊断是
- A. 胸膜炎  
B. 肺癌  
C. 肺脓肿

- D. 肺结核
- E. 肺炎链球菌肺炎

## 117. 西医治疗首选

- A. 氨基糖苷类抗生素
- B. 红霉素
- C. 四环素
- D. 青霉素 G
- E. 克林霉素

## 118. 中医治疗首选

- A. 生脉散合四逆汤
- B. 竹叶石膏汤
- C. 麻杏甘石汤
- D. 三拗汤
- E. 清营汤

(119~121 题共用题干)

患者，女，45岁。患糖尿病5年。3年前间歇出现头痛，测血压增高，最高达160/96mmHg。现症：头痛，痛有定处；固定不移。头晕阵作，心前区痛，偏身麻木。查体：BP165/95mmHg。口唇发绀，心率75次/分，律齐，各瓣膜区未闻及杂音，两肺呼吸音清，腹软。舌紫，脉弦细涩。心电图示：窦性心律，左室高电压。尿常规：未见异常。

## 119. 该患者的血压应降至

- A. 130/80mmHg 以下
- B. 140/90mmHg 以下
- C. 150/80mmHg 以下
- D. 150/90mmHg 以下
- E. 160/90mmHg 以下

## 120. 其中医辨证是

- A. 瘀血内停证
- B. 肝阳上亢证
- C. 肝肾阴虚证
- D. 痰湿内盛证
- E. 肾阳虚衰证

## 121. 治疗应首选

- A. 半夏白术天麻汤

- B. 天麻钩藤饮

- C. 血府逐瘀汤

- D. 杞菊地黄丸

- E. 济生肾气丸

(122~124 题共用题干)

患者，女，35岁，乳房胀痛半年，经前加重，经后痛减；伴情绪抑郁，心烦易怒，失眠多梦，胸胁胀满；舌质淡红苔薄白，脉细涩。

## 122. 其证型是

- A. 痰瘀凝结证
- B. 肝郁气滞证
- C. 气滞血瘀证
- D. 冲任失调证
- E. 毒热蕴结证

## 123. 其治法

- A. 疏肝理气，散结止痛
- B. 调摄冲任，理气散结
- C. 清热解毒，活血化瘀
- D. 调理肝脾，益气养血
- E. 疏肝活血，化痰散结

## 124. 选择的方药为

- A. 逍遥散
- B. 二仙汤
- C. 失笑散合开郁散
- D. 逍遥散合桃红四物汤
- E. 桃红四物汤合失笑散

(125327 题共用题干)

患者，女，28岁，产后小便不通，小腹胀急疼痛，腰膝酸软，面色晦暗；舌淡，脉沉细迟弱。

## 125. 判断此患者的证型为

- A. 肺脾气虚证
- B. 肾阳亏虚证
- C. 血瘀证
- D. 气滞证
- E. 肾气亏虚证

126. 选用的治法是
- 益气生津, 宣肺利水
  - 补肾温阳, 化气利尿
  - 养血活血, 祛瘀利尿
  - 理气行滞, 行水利尿
  - 温阳化气, 补肾固脬

127. 选用的方剂为

- 补气通脬饮
- 济生肾气丸
- 加味四物汤
- 木通散
- 肾气丸

(128~130 题共用题干)

患儿, 男, 8 岁, 西医诊断为病毒性心肌炎, 临床可见: 寒热起伏, 全身肌肉酸痛, 恶心呕吐, 腹痛泄泻, 心悸胸闷, 肢体乏力, 舌质红, 苔黄腻, 脉濡数或结代。

128. 中医辨证是

- 风热扰心
- 湿热侵心
- 气阴亏虚
- 心阳虚弱
- 痰瘀阻络

129. 中医治法是

- 清热解毒, 宁心复脉
- 清热化湿, 宁心复脉
- 益气养阴, 宁心复脉
- 温振心阳, 宁心复脉
- 豁痰化瘀, 活血通络

130. 中医选方是

- 银翘散
- 葛根黄芩黄连汤
- 炙甘草汤合生脉散
- 桂枝甘草龙骨牡蛎汤
- 瓜蒌薤白半夏汤合失笑散

四、B1 型选择题 (131~150 题)

答题说明: 以下提供若干组考题, 每组考 题

共用 5 个选项, 请从中选择一个与问题最密切的答案, 某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(131~132 题共用备选答案)

- II 度 I 型房室传导阻滞
- II 度 II 型房室传导阻滞
- m 度房室传导阻滞
- 干扰性房室分离
- II 度 I 型窦房传导阻滞

131. P-R 逐个延长, R-R 逐次缩短, 直至 QRS 波脱落, 周而复始

132. P-P 规则, P-R 固定, QRS 波间歇性或周期性脱落

(133~134 题共用备选答案)

- 脾肿大
- 腹水
- 腹壁静脉曲张
- 出血倾向及贫血
- 痔静脉曲张

133. 肝硬化代偿功能减退的最突出的体征是

134. 属于肝硬化肝功能减退的临床表现是

(135~136 题共用备选答案)

- AFP
- X 线
- B 超
- CT
- MRI

135. 目前肝癌筛查的首选检查方法是

136. 目前肝癌的主要诊断依据是

(137~138 题共用备选答案)

- 脑栓塞
- 脑血栓形成
- 脑出血
- 短暂性脑缺血发作
- 蛛网膜下腔出血

137. 某青年男性,原有风湿性心脏病,突然出现中风,首先应考虑的是

138. 患者,男,55岁,因在剧烈运动时,突然出现剧烈头痛,呕吐,口舌歪斜,首先应考虑的是

(139-140题共用备选答案)

- A. 仙方活命饮
- B. 竹叶黄芩汤
- C. 十全大补汤
- D. 托里消毒散
- E. 防风通圣散

139. 治疗痈之阴虚火盛证首选

140. 治疗痈之气血两虚证首选

(141~142题共用备选答案)

- A. 当归饮子
- B. 除湿胃苓汤
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 消风散合四物汤
- E. 麟渗湿汤合三妙丸

141. 湿疹湿热浸淫证选用的方剂为

142. 湿疹脾虚湿蕴证选用的方剂为

(143-144题共用备选答案)

- A. 呕吐、反酸、自汗
- B. 呕吐、盗汗、泄泻
- C. 呕吐、眩晕、盗汗
- D. 病痉、病郁冒、大便难
- E. 冲心、冲胃、冲肺

143. 产后三急是指

144. 产后三病是指

(妇 46 题共用答案)

- A. 膈下逐瘀汤
- B. 少腹逐瘀汤
- C. 清热调血汤
- D. 黄芷建中汤
- E. 调肝汤

145. 痛经寒湿凝滞证选用的方剂是

146. 痛经湿热瘀阻证选用的方剂是

(147~148 题共用备选答案)

- A. 涤痰通络
- B. 泻火涤痰
- C. 涤痰开窍
- D. 化瘀通窍
- E. 健脾化痰

147. 病毒性脑炎痰热壅盛证的治法宜选用

148. 病毒性脑炎痰蒙清窍证的治法宜选用

(149~150 题共用备选答案)

- A. 温补脾肾，益精养血
- B. 健运脾胃，益气养血
- C. 补脾养心，益气生血
- D. 滋养肝肾，益精生血
- E. 滋水涵木，益气生血

149. 营养性缺铁性贫血脾肾阳虚证治法宜选用

150. 营养性缺铁性贫血心脾两虚证治法宜选用