

2 0 2 1 中 医 助 理 医 师 考 试

模拟密押卷

2021 年
中医助理医师资格
考试专用
(答案)

第一单元

A1

1. 足太阴脾经与手少阴心经的交接位置是A.

胸中

B. 肺中 C.

心中 D.

目内眦

E. 足大趾

答案：C

解析：足手阴经在胸部交接：足太阴脾经与手少阴心经交接于心中；足少阴肾经与手厥阴心包经交接于胸中；足厥阴肝经与手太阴肺经交接于肺中。

2. 五脏藏五神，肾藏

A. 魄

B. 志

C. 魂

D. 神

E. 意

2. 答案：B

解析：五脏藏五神，心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，肾藏志。

3. 以下病机中是以阴阳失调来阐释实热或实寒的是

A. 阴阳偏盛

B. 阴阳格拒

C. 阴阳偏衰

D. 阴阳互损

E. 阴阳离决

3. 答案：A

解析：实热证，是指邪热亢盛、内外俱实的病证，在阴阳失调上，可看作阳偏盛。实寒是以寒邪盛为主，正气不虚的病证，可看作阴偏盛。阴阳偏盛，是指人体阴阳双方中的某一方的病理性亢盛状态，属邪气盛则实的实证。

4. 阴中求阳的治法适用于

A. 阳盛

B. 阴阳两虚

C. 阴虚

D. 阳虚

E. 阴盛

答案：D

解析：对于阴阳偏衰的虚热及虚寒证的治疗，补阳时适当佐以补阴药谓之阴中求阳，补阴时适当佐以补阳药谓之阳中求阴。阴中求阳，适用于阳虚，补阳为主，兼以补阴。

5. 木为火之

A. 所不胜

B. 相克 C.

母

D. 子

E. 所胜

答案：C

解析：木生火，故木为火之母。 6.

具有“五脏六腑之海”之称的是A.

督脉

B. 任脉

C. 冲脉

D. 带脉

E. 维脉

答案：C

解析：冲脉能调节十二经脉气血，故又称其为“十二经脉之海”或“五脏六腑之海”。 7. 以下属于奇经八脉生理功能的是

A. 加强了十二经脉中互为表里的两经之间的联系

B. 主束骨而利机关

C. 调节十二经脉的气血

D. 分主一身左右之阴阳

E. 加强了足三阴、足三阳经脉与心脏的联系

答案：C

解析：奇经八脉具有蓄溢和调节十二经脉气血。当十二经脉气血满溢时，就会流入奇经八脉，蓄以备用；当十二经脉气血不足时，奇经中所蓄的气血则溢出给予补充，以保持十二经脉气血的相对恒定状态，有利于维持机体生理功能的需要。

8. 以下病机哪项是以阴阳失调来阐释真寒假热或真热假寒的

- A. 阴阳互损
- B. 阴阳离决
- C. 阴阳偏盛
- D. 阴阳偏衰
- E. 阴阳格拒

答案：E

解析：阴阳格拒指在阴阳偏盛至极的基础上，阴阳双方相互排斥而出现寒热真假病变的一类病机。

9. 足手阴经的交接部位是

- A. 肩胛部
- B. 头面部
- C. 胸部
- D. 背部
- E. 四肢部

答案：C

解析：足手阴经在胸部交接，如足太阴脾经与手少阴心经交接于心中；足少阴肾经与手厥阴心包经交接于胸中；足厥阴肝经与手太阴肺经交接于肺中。

10. 冲脉的基本功能是

- A. 调节阳经气血
- B. 调节阴经气血
- C. 调节十二经气血
- D. 维系全身经脉
- E. 主司下肢运动

答案：C

解析：冲脉调节十二经气血：冲脉上行于头，下至于足，后行于背，前布于胸腹，贯穿全身，通受十二经之气血，为总领诸经气血之要冲。

11. 肾在志为

- A. 怒
- B. 喜
- C. 思
- D. 悲
- E. 恐

答案：E

解析：肝、心、脾、肺、肾对应的五志分别

为怒、喜、思、悲、恐。

12. “将军之官，谋虑出焉”指的脏腑是A. 心

- B. 肺
- C. 脾
- D. 肝
- E. 肾

答案：D

解析：《素问·灵兰秘典论》说：“肝者，将军之官，谋虑出焉。胆者，中正之官，决断出焉。”

13. 外感六淫中易伤阳气的是

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 暑邪
- D. 火邪
- E. 燥邪

答案：B

解析：寒为阴邪，易伤阳气：寒即阴气盛的表现，故称其为阴邪。感受寒邪，最易损伤人体阳气。

14. 五行指导脏腑用药，赤色、苦味入

- A. 心
- B. 脾
- C. 肺
- D. 肝
- E. 肾

答案：A

解析：青色、酸味入肝，赤色、苦味入心，黄色、甘味入脾，白色、辛味入肺，黑色、咸味入肾。

15. 元气生成的主要物质来源是

- A. 肾中精气
- B. 水谷精气
- C. 清气
- D. 脏腑精气
- E. 经气

答案：A

解析：元气由肾精化生，根于命门。

16. 下列不会导致实证短气的是

- A. 痰饮
- B. 胃肠积滞

C. 火盛

D. 气滞

E. 瘀阻

答案：C

解析：实证短气，常兼有呼吸声粗，或胸部室闷，或胸腹胀满等，多因痰饮、胃肠积滞或气滞或瘀阻所致。

17. 外感风寒或风热之邪，或痰湿壅肺，肺失宣肃，导致的音哑或失音，这种现象称为A. 少气

B. 短气

C. 子暗

D. 金实不鸣

E. 金破不鸣

17. 答案：D

解析：新病音哑或失音者，多属实证，多因外感风寒或风热袭肺，或痰湿壅肺，肺失清肃，邪闭清窍所致，即所谓“金实不鸣”。18. 患者恶寒发热，头身疼痛，喷嚏，鼻塞，流涕，咽喉痒痛，微有咳嗽，气喘，舌淡红，苔薄，脉浮。属

A. 表证

B. 里证

C. 寒证

D. 热证

E. 阴证

18. 答案：A

解析：表证常见临床表现有新起恶风寒，或恶寒发热，头身疼痛，喷嚏，鼻塞，流涕，咽喉痒痛，微有咳嗽、气喘，舌淡红，苔薄，脉浮。

19. 体弱气虚者其坐姿为

A. 坐而喜俯

B. 坐而喜仰 C.

坐卧不安 D.

但卧不得坐

E. 但坐不得卧

19. 答案：A

解析：坐而喜俯，少气懒言，多属体弱气虚。20. 相兼脉主病中沉涩脉主

A. 痰热

B. 血瘀

C. 痰火

D. 湿热

E. 阴虚火旺

20. 答案：B

解析：沉涩脉主血瘀，尤常见于阳虚而寒凝血瘀者。

21. 寒湿困脾证与湿热蕴脾证均有的表现是

A. 身热不扬

B. 脘腹痞闷

C. 面黄不泽

D. 口渴喜饮

E. 白带量多

21. 答案：B

解析：寒湿困脾证与湿热蕴脾证均因湿邪困脾，脾胃纳运失职所致，可见脘腹痞闷，纳呆呕恶，便溏，肢体困重，面目发黄，苔腻，脉濡等。

区别在于兼热、兼寒之不同。湿热蕴脾证病性属湿热，故有舌质红苔黄腻，身热不扬，

阳黄，脉濡数等湿热内蕴表现；寒湿困脾证病

性属寒湿，故见舌淡苔腻白滑，腹痛喜暖，口

淡不渴，带下量多清稀，阴黄，脉濡缓等寒湿内停表现。故此题最佳的选项是B。

22. 临床表现主要为胃脘嘈杂，饥不欲食，干呕呃逆，口燥咽干，舌红少苔，脉细数的证候为

A. 胃阴虚 B.

胃阳虚 C.

食滞胃脘D.

肝胃不和

E. 肝脾不调

22. 答案：A

解析：胃阴虚证临床表现：胃脘嘈杂，饥不欲食，或痞胀不舒，隐隐灼痛，干呕，呃逆，口燥咽干，大便干结，小便短少，舌红少苔

乏津，脉细数。

23. 面色淡黄，枯槁无华称为

- A. 萎黄
- B. 黄胖
- C. 阴黄
- D. 阳黄
- E. 黄疸

23. 答案：A

解析：面色淡黄，枯槁无华，称“萎黄”。常见于脾胃气虚，气血不足者。

24. 形瘦多食者，多属于

- A. 中气虚弱
- B. 中焦有火
- C. 阴虚不足
- D. 阳气不足
- E. 痰湿内盛

24. 答案：B

解析：形瘦食多，属中焦有火；形瘦食少，属中气虚弱。

25. 下列不属于气虚证临床表现的是

- A. 气短声低
- B. 精神疲惫
- C. 少气懒言
- D. 体倦乏力
- E. 脘腹坠胀感

25. 答案：E

解析：气虚证的临床表现：气短声低，少气懒言，精神疲惫，体倦乏力，脉虚，舌质淡嫩，或有头晕目眩，自汗，动则诸症加重。选项 E 是气陷证的临床表现。

26. 脾胃虚弱患者与正常人均可见的脉象表现是

- A. 沉脉
- B. 实脉
- C. 缓脉
- D. 长脉
- E. 滑脉

26. 答案：C

解析：缓脉多见于湿病。脾胃虚弱，亦可见

于正常人。

27. 暑邪伤人出现气短乏力的症状主要是由于

- A. 暑为阳邪，其性炎上
- B. 暑性升散，伤津耗气
- C. 暑多夹湿，阻遏气机
- D. 暑性升发，易扰心神
- E. 暑性干涩，易伤津液

27. 答案：B

解析：暑性升散，易扰心神，易伤津耗气；暑为阳邪，易升发上犯，故易上扰心神。头目，出现心胸烦闷不宁、头昏、目眩、面赤等。暑邪伤人，可致腠理开泄而多汗。且汗出过多，不仅伤津，而且气随津脱则易耗气，故临床除常见口渴喜饮、尿赤短少等津伤之症外，往往可见气短、乏力，耗伤太过，清窍失养而突然昏倒、不省人事等。

28. 既能泻下冷积，逐水退肿，又能祛痰利咽，治疗喉痹的药物是

- A. 大黄
- B. 芒硝
- C. 牛蒡子
- D. 巴豆
- E. 芫花

28. 答案：D

解析：巴豆功效：峻下冷积，逐水退肿，祛痰利咽，外用蚀疮。主治病证：寒积便秘；腹水鼓胀；喉痹痰阻；痈肿脓成未溃、疥癣恶疮。

29. 大蓟治疗血热出血证，多用于治疗

- A. 尿血、血淋
- B. 吐血、咯血
- C. 面部出血
- D. 胃肠出血
- E. 便血

29. 答案：B

解析：大蓟与小蓟二药均能凉血止血，散瘀解毒消痈，可用治血热出血证以及热毒痈肿，常相须为用。但大蓟解毒散瘀消肿、凉血止血作用较强，多用于治疗吐血、咯血及崩漏；

小蓟凉血止血、解毒散瘀消肿作用弱于大蓟，但兼能利尿，故治疗尿血、血淋为优。

30. 功效燥湿消痰，下气除满，治疗梅核气的药物是

- A. 苍术
- B. 枳实
- C. 厚朴
- D. 陈皮

E. 木香

30. 答案：C

解析：厚朴功效：燥湿消痰，下气除满。应用

(1) 湿阻中焦，脘腹胀满。本品苦燥辛散，能燥湿，又下气除胀满，为消除胀满的要药。

(2) 食积气滞，腹胀便秘。(3) 痰饮 喘咳。

(4) 梅核气。

31. 郁李仁的功效是

- A. 润肠通便，润肺止咳
- B. 疏散风热，清肺利咽
- C. 润肠通便，下气利水
- D. 润肠通便，祛痰利咽
- E. 润肠通便，消肿散结

31. 答案：C

解析：郁李仁功效：润肠通便，下气利水。32.

下列各项，不属栀子主治病证的是

- A. 血淋涩痛
- B. 骨蒸潮热
- C. 火毒疮疡
- D. 湿热黄疸
- E. 血热吐衄

32. 答案：B

解析：栀子主治热病心烦，湿热黄疸，热淋涩痛，血热吐衄，目赤肿痛，火毒疮疡等。

故骨蒸潮热不属于栀子的主治病证，故选 B。

33. 辛夷入汤剂宜

- A. 冲服
- B. 后下
- C. 包煎
- D. 先煎

E. 烊化

33. 答案：C

解析：包煎：辛夷、旋覆花等药材有毛，对咽喉有刺激性，入药时宜用纱布包裹入煎。

34. 下列药物中既能止咳平喘，又能润肠通便的为

- A. 薏苡仁
- B. 火麻仁
- C. 苦杏仁
- D. 郁李仁

E. 酸枣仁

34. 答案：C

解析：苦杏仁功效：降气止咳平喘，润肠通便。

35. 下列具有散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻功效的药物是

- A. 肉桂
- B. 干姜
- C. 吴茱萸
- D. 高良姜
- E. 附子

35. 答案：C

解析：吴茱萸功效：散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻。

36. 下列药物中具有润肺清心，养阴生津功效的是

- A. 石斛
- B. 生地
- C. 麦冬
- D. 黄精
- E. 天冬

36. 答案：C

解析：麦冬功效：养阴生津，润肺清心。

37. 具有补血活血，调经止痛，润肠通便功效的药物是

- A. 当归
- B. 白芍
- C. 三七
- D. 何首乌

E. 阿胶

37. 答案: A

解析: 当归功效: 补血活血, 调经止痛, 润肠通便。

38. 下列具有解表退热功效的是

A. 薄荷

B. 柴胡 C.

刺蒺藜D.

菟丝子

E. 钩藤

38. 答案: B

解析: 柴胡功效: 解表退热, 疏肝解郁, 升举阳气。

39. 下列药物中, 不具有行气, 止痛功效的药物是

A. 郁金

B. 白前

C. 三棱

D. 姜黄

E. 川芎

39. 答案: B

解析: 白前功效: 降气, 祛痰, 止咳。

40. 具有养阴生津功效的药物是

A. 牡丹皮

B. 赤芍 C.

紫草 D.

金银花

E. 生地黄40.

答案: E

解析: 生地黄功效: 清热凉血, 养阴生津。41. 补气养血药中加入适量肉桂, 其主要目的为

A. 补而不滞

B. 发汗解表

C. 引火归原

D. 鼓舞气血生长

E. 散寒止痛

41. 答案: D

解析: 肉桂应用: (1) 肾阳虚证。为治命门

火衰之要药。(2) 院腹冷痛, 寒疝腹痛。善去痼冷沉寒。(3) 腰痛, 胸痹, 阴疽, 闭经, 痛经。(4) 虚阳上浮。能使因下元虚衰所致上浮的虚阳回归故里。故曰引火归原。此外, 久病体虚气血不足者。在补益气血方中加入少量本品, 可鼓舞气血生长。

42. 蒲黄的功效是

A. 凉血, 止血, 利尿

B. 活血, 祛瘀, 止痛

C. 止血, 化瘀, 通淋

D. 止血, 化瘀, 利尿

E. 止血, 消肿, 生肌

42. 答案: C

解析: 蒲黄的功效: 止血, 化瘀, 通淋。

43. 属于桑菊饮功用的是

A. 消食导滞

B. 行气化滞

C. 宣肺止咳

D. 燥湿和胃

E. 消痞除癥

43. 答案: C

解析: 桑菊饮功用: 疏风清热, 宣肺止咳。

44. 酸枣仁汤中益心脾而宁心神的药物是A.

茯苓

B. 远志

C. 茯神木

D. 石菖蒲

E. 琥珀

44. 答案: A

解析: 酸枣仁汤中重用酸枣仁为君, 以其甘酸质润, 入心、肝之经, 养血补肝, 宁心安神。茯苓甘淡性平, 益心脾而宁心神; 知母苦寒质润, 滋阴润燥, 清热除烦, 共为臣药。与君药相伍, 养阴血, 清虚热, 安神除烦。佐以辛散之川芎, 调肝血而疏肝气, 与大量之酸枣仁相伍, 辛散与酸收并用, 补血与行血结合, 具有养血调肝之妙。甘草和中缓急, 调和诸药为使。

45. 不含川芎的方剂是

A. 温经汤

B. 四物汤

C. 越鞠丸

D.生化汤

E.归脾汤45.

答案：E

解析：归脾汤的组成为：白术.当归.茯苓.炒黄芪.远志.龙眼肉.炒酸枣仁.人参.木香.炙甘草.生姜.大枣。方歌：归脾汤用术参芪，归草茯苓远志随；酸枣木香龙眼肉，煎加姜枣益心脾。怔忡健忘俱可却，便血崩漏总能医。46.半身不遂，口眼歪斜，语言蹇涩，口角流涎，脉缓无力者。选方为

A.桃核承气汤

B.小活络丹 C.

温经汤

D.血府逐瘀汤

E.补阳还五汤

46.答案：E

解析：补阳还五汤主治：中风之气虚血瘀证。半身不遂，口眼歪斜，语言蹇涩，口角流涎，小便频数或遗尿失禁，舌暗淡，苔白，脉缓无力。

47.恶寒发热，无汗，头痛项强，肢体酸楚疼痛，口苦微渴，舌苔白或微黄，脉浮。治宜选用

A.越鞠丸

B.麻杏石甘汤

C.天麻钩藤饮

D.九味羌活汤

E.大青龙汤47.

答案：D

解析：九味羌活汤主治：外感风寒湿邪，内有蕴热证。恶寒发热，无汗，头痛项强，肢体酸楚疼痛，口苦微渴，舌苔白或微黄，脉浮。

48.下列不属于至宝丹功用的是

A.开窍

B.息风

C.化浊

D.解毒

E.清热

48.答案：B

解析：至宝丹功用：清热开窍，化浊解毒。主治痰热内闭心包证。神昏谵语，身热烦躁，痰盛气粗，舌红苔黄垢腻，脉滑数。亦治中风、中暑、惊厥属于痰热内闭者。

49.属于天台乌药散组成药物的是A.

陈皮

B.草豆蔻

C.肉桂

D.厚朴

E.川楝子

49.答案：E

解析：天台乌药散组成为天台乌药、木香、小茴香、青皮、高良姜、槟榔、川楝子、巴豆、酒。方歌：天台乌药木茴香，巴豆制楝青槟姜，行气疏肝止疼痛，寒疝腹痛是良方。50.玉屏风散的功用为

A.涩肠止遗

B.清热养血

C.固冲摄血

D.补肾纳气

E.益气固表止汗

50.答案：E

解析：玉屏风散功为益气固表止汗，主治表虚自汗。

51.朱砂安神丸中泻火除烦的药物是A.

黄连

B.石膏

C.竹叶

D.知母

E.栀子

51.答案：A

解析：朱砂安神丸中朱砂甘寒质重，专入心经，寒能清热，重可镇怯，既重镇安神，又清心经火，治标之中兼能治本，用为君药。黄连苦寒，入心经，清心泻火，以除烦热为臣药，两药相伍，重镇以安神，清心以除烦，共收泻火安神之功。

52.天王补心丹与朱砂安神丸组成中均含有的药物有

A.炙甘草

B.玄参

C.黄柏

D.生地黄

E.酸枣仁

52.答案：D

解析：天王补心丹：酸枣仁、柏子仁、当归、天冬、麦冬、生地黄、人参、丹参、玄参、茯苓、五味子、远志、桔梗、朱砂、竹叶。

朱砂安神丸：朱砂、黄连、生地黄、当归、炙甘草。两方共有的药物是朱砂、生地、当归。注意天王补心丹中不含炙甘草。

53. 骨髓增生异常综合征血象检查最明显的改变是

- A. 白细胞计数明显增多
- B. 白细胞持续降低
- C. 持续性全血细胞减少
- D. 骨髓巨核细胞减少
- E. 持续性全血细胞增多

53. 答案：C

解析：骨髓增生异常综合征血象和骨髓象检查：持续性全血细胞减少，一系减少少见，多为红细胞减少， $Hb < 100g/L$ ，中性粒细胞 $< 1.8 \times 10^9/L$ ，血小板 $< 100 \times 10^9/L$ 。

54. 富含嘌呤的食物是

- A. 牛奶
- B. 鸡蛋
- C. 动物内脏
- D. 黄瓜
- E. 米饭

54. 答案：C

解析：高尿酸血症及痛风患者应该低嘌呤饮食甚至暂时禁食富含嘌呤食物，嘌呤含量高的食物如虾、蟹、贝类、沙丁鱼、动物内脏、肉类、啤酒等。

55. 肠套叠可见腹痛，并伴有的症状是A.

- 急性发热
- B. 黄疸
- C. 呃逆
- D. 腹泻
- E. 血便

55. 答案：E

解析：腹痛伴血便，急性者见于急性细菌性痢疾、肠套叠、绞窄性肠梗阻、急性出血性坏死性结肠炎、过敏性紫癜等；慢性者可见于慢性菌痢、肠结核、结肠癌等；柏油样便提示上消化道出血；鲜血便提示下消化道出血。

56. 患者 X 线下见两肺上部有多发的厚壁空洞，周围有较广泛的纤维条索影。应首先考虑的疾病为

- A. 肺大泡
- B. 肺脓肿

- C. 浸润型肺结核空洞形成
- D. 慢性纤维空洞型肺结核
- E. 周围型肺癌空洞形成

答案：D

解析：慢性纤维空洞型肺结核 X 线主要表现为两肺上部多发厚壁的慢性纤维病变及空洞，周围有广泛的纤维条索影及散在的新老病灶，常伴有明显的胸膜肥厚，病变的肺因纤维化而萎缩，出现肺不张征象，上叶萎缩使肺门影向上移位，下肺野血管纹理牵引向上及下肺叶的代偿性肺气肿，使膈肌下降、平坦，肺纹理被拉长呈垂柳状。

57. 下列哪项是甲状腺功能减退病人可见的面容

- A. 黏液性水肿面容
- B. 苦笑面容
- C. 无欲貌
- D. 满月脸
- E. 肢端肥大症面容

57. 答案：A

解析：黏液性水肿面容表现为面色苍白，脸厚面宽，颜面浮肿，目光呆滞，反应迟钝，眉毛、头发稀疏，舌色淡、胖大。见于甲状腺功能减退症。

58. 风湿热引起发热的主要原因是

- A. 坏死物质吸收
- B. 内分泌与代谢障碍
- C. 产热过多
- D. 散热过少
- E. 抗原-抗体反应

58. 答案：E

解析：抗原-抗体反应如风湿热、血清病、药物热、系统性红斑狼疮、皮炎、类风湿关节炎等。

59. 可引起阻塞性黄疸的疾病是

- A. 蚕豆病
- B. 病毒性肝炎
- C. 胰头癌
- D. 系统性红斑狼疮
- E. 毒蕈中毒

59. 答案：C

解析：阻塞性黄疸：以 CB 增高为主，见于胆石症、胰头癌、肝癌等。

60. 胆囊触痛征（墨菲征）阳性，见于

- A.胰头癌
- B.肝癌
- C.急性胆囊炎
- D.肝硬化
- E.胆囊癌60.

答案：C

解析：墨菲征的检查方法：医生将左手掌平放在被检者的右肋，拇指放在胆囊点，用中等压力按压腹壁，然后嘱被检者缓慢深呼吸，如果深吸气时被检者因疼痛而突然屏气，则称胆囊触痛征，墨菲征阳性，见于急性胆囊炎。

61. 红细胞直径 $>15\mu\text{m}$ 见于

- A.溶血性贫血
- B.失血性贫血 C.
- 缺铁性贫血 D.
- 巨幼细胞贫血
- E.再生障碍性贫血

61.答案：D

解析：红细胞直径 $>15\mu\text{m}$ 。见于巨幼细胞贫血。

62. 导致内出血低热的原因可能是

- A.代谢障碍
- B.植物神经功能紊乱
- C.无菌性坏死物质吸收
- D.继发感染
- E.失血导致体温调节中枢功能障碍

62.答案：C

解析：导致内出血低热的原因是无菌性坏死物质吸收。

63. 患者，女，18岁。头痛昏蒙，兼胸闷脘胀，苔白腻，脉滑。治疗除主穴外，应配选 A.

- 血海、合谷
- B.中脘、丰隆
- C.上星、头维
- D.百会、通天
- E.率谷、太阳

63.答案：B

解析：头痛昏蒙，兼胸闷脘胀，苔白腻，脉滑者为痰浊头痛，痰浊头痛配中脘、丰隆。64.

患者，男性，26岁。因夜吹风扇，晨起出现右颈项痛，转动受限，并向同侧肩部放射。

针灸治疗除主穴外，宜选取

- A.风池、合谷

- B.曲池、合谷
- C.血海、膈俞
- D.合谷、大椎
- E.风池、内关

64.答案：A

解析：根据题干症状辨证为外邪内侵导致的漏肩风。漏肩风，外邪内侵配合谷、风池。65.患者，女性，23岁。月经不调，常提前7天以上，甚至10余日一行。治疗应首选

- A.气海、三阴交、归来
- B.关元、三阴交、肝俞 C.
- 足三里、脾俞、太冲 D.
- 命门、三阴交、足三里 E.
- 关元、三阴交、血海65.

答案：E

解析：本病属月经先期。针灸治疗主穴：关元、三阴交、血海。

66. 患者，男性，62岁。咳嗽一个月，劳累后加重，咳吐黏稠痰，胸脘痞闷，胃纳减少，舌苔白腻，脉濡滑。治疗除主穴外，还应取A.尺泽、列缺

- B.脾俞、阴陵泉
- C.风门、大椎
- D.丰隆、阴陵泉
- E.脾俞、胃俞66.

答案：D

解析：本患者属内伤咳嗽痰湿阻肺。痰湿阻肺配丰隆、阴陵泉。

67. 患者，男，23岁。目赤肿痛，眼涩难开，流泪，畏光，伴发热、恶风、头痛，舌苔薄黄，脉浮数。治疗除取主穴外，还应加

- A.四白、养老
- B.风池、侠溪
- C.印堂、内庭
- D.少商、外关
- E.关冲、支沟

67.答案：D

解析：目赤肿痛的针灸治疗。本证为外感风热型目赤肿痛，治疗除取主穴外，还应加少商、外关。

68. 患者，男，45岁，天冷外出突觉心前区刺痛，心痛彻背，心慌汗出，面色晦暗，唇甲青紫，舌质紫暗，脉涩，针灸治疗除主穴外，应配

- A.内关、阴郄
- B.心俞、脾俞
- C.膻中、心俞
- D.神阙、关元
- E.神阙、至阳

68.答案: E

解析: 遇寒诱发, 唇甲青紫, 心痛如刺, 心痛彻背, 舌质紫暗, 脉涩者为寒邪凝滞。根据患者主诉, 应考虑为心绞痛之寒邪凝滞证, 应配神阙、至阳。

69. 患者体质素弱, 近 2 个月来, 呕吐时作时止, 倦怠乏力, 脘腹痛而喜温喜按, 舌苔薄白, 脉弱。治疗除主穴外, 应选用

- A.期门、太冲
- B.脾俞、胃俞
- C.丰隆、公孙
- D.上脘、胃俞
- E.梁门、天枢

69.答案: B

解析: 根据题干诊断为脾胃虚寒之呕吐, 针灸宜配脾俞、胃俞。

70. 患者突然出现左半身活动不利, 舌强语蹇, 兼眩晕头痛, 烦躁, 舌红, 苔黄, 脉弦而有力。针灸治疗除主穴外, 应加用

- A.足三里、气海
- B.太溪、风池
- C.丰隆、合谷
- D.曲池、内庭
- E.太冲、太溪

70.答案: E

解析: 根据题干症状“烦躁, 脉弦”判断病位在肝, 应该为中风之肝阳暴亢证。肝阳暴亢针灸宜配太冲、太溪

71. 患者, 女性, 35 岁。2 个月前突发高热, 热退后出现周身乏力, 并见下肢痿软无力, 食少纳呆, 腹胀便溏, 神疲乏力。治疗本病应选用主要经脉是

- A.手足阳明经穴、夹脊穴
- B.手足太阳经穴、夹脊穴
- C.手足太阴经穴、夹脊穴
- D.手足厥阴经穴、夹脊穴
- E.手足少阳经穴、夹脊穴

71.答案: A

解析: 痿证的针灸治疗: 治法: 祛邪通络,

濡养筋脉。以手足阳明经穴和夹脊穴为主。

72. 患者, 女性, 48 岁。失眠 1 年, 多梦少寐, 入睡迟, 易惊醒, 多疑善惊, 气短头晕, 舌淡, 脉弦细。治疗除选取主穴外, 应加用的腧穴是

- A.肝俞、间使
- B.脾俞、胃俞
- C.心俞、胆俞
- D.心俞、肾俞
- E.心俞、脾俞

72.答案: C

解析: 不寐之心胆气虚证, 配心俞、胆俞

73. 患者, 男, 70 岁。右侧肢体活动不利 1 月, 神志清楚, 伴舌强语蹇, 右侧口角下垂。治疗应首选的经穴是

- A.督脉、手厥阴及足太阴经穴
- B.督脉、手厥阴及足少阴经穴
- C.督脉、手少阴及足太阴经穴
- D.督脉、手少阴及足厥阴经穴
- E.督脉、手少阴及足少阴经穴

73.答案: A

解析: 中风中经络主症: 意识清楚, 半身不遂, 口角喎斜, 语言不利。治法: 疏通经络, 醒脑调神。取督脉、手厥阴及足太阴经穴为主。74. 患者, 女, 66 岁。夜间难以入睡 2 月, 平素急躁易怒, 时有心烦, 舌红, 苔黄, 脉弦数。针刺选穴中具有调理阴阳、安神助眠作用的腧穴是

- A.后溪、太溪
- B.后溪、照海
- C.列缺、申脉
- D.太溪、申脉
- E.照海、申脉

74.答案: E

解析: 难以入睡, 急躁易怒, 舌红, 苔黄, 脉弦数者为不寐肝火扰神证。不寐主穴为百会、安眠、神门三阴交、照海、申脉。跷脉主寤寐, 司眼睑开阖, 照海通阴跷脉, 申脉通阳跷脉, 两穴同用可调节阴阳跷脉以安神助眠。

75. 患者, 男, 79 岁。哮喘反复发作, 声低气怯, 气息短促, 体质虚弱, 舌淡, 脉细无力。治疗除相应背俞少外, 还应选取的经穴是

- A.手太阴、手阳明经穴
- B.手阳明、足太阴经穴
- C.手太阴、足少阴经穴
- D.手少阴、足太阴经穴
- E.手少阴、足少阴经穴

75.答案: C

解析: 哮喘虚证: 病程长, 反复发作或当缓解期, 哮喘声低气怯, 气息短促, 深吸为快, 体质虚弱, 脉弱无力。虚证的治法: 补益肺肾, 止哮平喘。取相应背俞穴及手太阴、足少阴经穴为主。

76. 患者, 女, 26 岁。产后乳少, 乳房胀满疼痛, 胸肋胀闷, 舌红, 苔薄黄, 脉弦。除乳根、膻中、少泽外, 应加取

- A.太冲、内关
- B.外关、肝俞
- C.膈俞、期门
- D.中脘、天枢、期门
- E.足三里、脾俞、胃俞

76.答案: E

解析: 乳少汁稀, 兼面色少华、倦怠乏力者为缺乳气血虚弱证。气血虚弱配足三里、脾俞、胃俞。

77. 患者咽喉肿痛, 咽干, 口渴, 便秘, 舌红, 苔黄, 脉洪大。除少商、合谷、尺泽、关冲外, 应加取

- A.内庭、关冲
- B.厉兑、天突
- C.内庭、鱼际
- D.列缺、照海
- E.曲池、鱼际

77.答案: C

解析: 咽喉肿痛主症为咽喉部红肿疼痛。吞咽不适, 兼吞咽困难, 高热, 口渴喜饮, 大便秘结, 小便黄赤, 舌红, 苔黄, 脉数有力者为肺胃热盛。肺胃热盛配内庭、鱼际。

78. 医学伦理学的研究对象是

- A.医学道德难题
- B.医学道德关系
- C.医学基本理论
- D.医学基本规范
- E.医学基本原则

78.答案: B

解析: 医学伦理学的研究对象是医学活动中

的道德现象和道德关系。

79. 下列除哪项外均是医德品质的内容

- A.公正
- B.严谨
- C.奉献
- D.乐观
- E.仁爱

79.答案: D

解析: 医德品质的内容: (1) 仁爱; (2) 严谨 (3) 诚挚; (4) 公正; (5) 奉献。

80. 患者权利包括

- A.平等享有医疗的权利
- B.获得自己所患疾病真实情况
- C.拒绝治疗的权利
- D.监督医疗过程的权利
- E.以上都是

80.答案: E

解析: 患者权利包括: 平等享有医疗的权利, 获得自己所患疾病真实情况、共同参与诊断和医疗方案的制订和实施等知情同意的权利, 监督医疗过程的权利, 对个人隐私保密的权利, 拒绝治疗、拒绝参加临床试验的权利。

A2

81. 患者, 男, 38 岁, 现身热, 无恶寒, 汗出, 烦渴, 胸闷痛, 舌红苔黄, 脉数。其证属

- A.邪热壅肺证
- B.热扰胸膈证
- C.风热犯肺证
- D.燥热犯肺证
- E.热灼营阴证

81.答案: A

解析: 邪热壅肺证临床表现: 身热, 汗出, 烦渴, 咳喘, 或胸闷胸痛, 舌红苔黄, 脉数。辨证要点: 本证以身热而不恶寒, 咳喘, 舌红苔黄, 脉数为辨证要点。

82. 患者, 女, 35 岁, 现症见面色晦滞, 神疲乏力, 气短懒言, 食少纳呆, 肢体麻木, 舌淡紫或有瘀点瘀斑, 脉细涩。其证属

- A.气虚证
- B.气虚血瘀证
- C.气血两虚证

D.气不摄血证

E.气滞血瘀证

答案：B

解析：气虚血瘀证临床表现：面色淡白，神疲乏力，气短懒言，食少纳呆；面色晦滞，局部青紫、肿胀、刺痛不移而拒按，或肢体瘫痪、麻木，或可触及肿块，舌淡紫或有瘀点瘀斑，脉细涩。

83. 患者，男，69岁，近日脘腹痞胀，泛吐清水，伴有胸闷，心悸，息促不得卧，舌苔白滑，脉滑。其证属

A.痰证

B.水停证

C.饮证

D.气虚证

E.气逆证

答案：C

解析：饮证临床表现：脘腹痞胀，泛吐清水，脘腹部水声辘辘；肋间饱满，咳唾引痛；胸闷，心悸，息促不得卧；身体、肢节疼重；咳吐清稀痰涎，或喉间哮鸣有声；头目眩晕，舌苔白滑，脉弦或滑等。

84. 患者手足厥寒，腰腿疼痛，口不渴，舌淡苔白，脉沉细。治宜首选的是

A.桂枝汤倍桂枝

B.桂枝汤去芍药

C.桂枝汤倍芍药

D.桂枝汤倍芍药，加饴糖

E.桂枝汤去生姜，倍大枣，加当归、通草、细辛

84. 答案：E

解析：当归四逆汤主治：血虚寒厥证。手足厥寒，或腰、股、腿、足、肩臂疼痛，口不渴，舌淡苔白，脉沉细或细而欲绝。本方以桂枝汤去生姜，倍大枣，加当归、通草、细辛组成。

85. 患者牙痛牵引头疼，面颊发热，口气热臭，舌红苔黄，脉滑数。治宜首选的方剂是 A.黄连解毒汤

B.左金丸

C.导赤散

D.白虎汤

E.清胃散

答案：E

解析：清胃散主治：胃火牙痛。牙痛牵引头疼，面颊发热，其齿喜冷恶热，或牙宣出血，或牙龈红肿溃烂，或唇舌腮颊肿痛，口气热臭，口干舌燥，舌红苔黄，脉滑数。

86. 急性上消化道出血患者，查体心率 122 次/分，血压 70/50mmHg，估计患者出血量至少是

A.500mL

B.1000mL

C.1200mL

D.1500mL

E.2000mL

86. 答案：D

解析：患者急性上消化道出血，且心率为 122 次/分，血压 70/50mmHg，考虑发生失代偿性休克。估计出血量：数小时内出血量 > 1500ml（循环血容量的 30%），发生失代偿性休克。根据收缩压可估计失血量，血压降至 90~100mmHg 时，失血量约为循环血容量的 20%；血压降至 60~80mmHg 时，失血量约为循环血容量的 30%；血压降至 40~50mmHg 时，失血量 > 循环血容量的 40%。提示严重出血的征象是：收缩压 < 80mmHg 或较基础压降低 > 25%；心率 > 120 次/分，血红蛋白 < 70g/L。故此题选 D。

87. 女性，45岁，上腹痛 2 天，呕吐，腹胀，血淀粉酶 750U/L（Somogyi），血压 80/50mmHg，脉搏 120 次/分，最可能的诊断为

A.急性胃炎

B.急性胰腺炎

C.急性心肌梗死

D.急性肾功能衰竭

E.急性肝炎

87. 答案：B

解析：根据患者腹痛、呕吐、腹胀等症状及实验室检查，考虑为急性胰腺炎

88. 患者，男，42岁。哮喘反复发作 5 年，本次发作喘促不能平卧，咳痰清稀，无汗，头痛，脉浮紧。治疗应首选

A.中府、列缺、肺俞、尺泽

B.肺俞、风门、丰隆、太渊

C.膻中、太渊、太溪、肾俞

D.天突、定喘、尺泽、膻中

E. 膏肓、肾俞、太溪、丰隆

88. A

解析：根据题干症状诊断为哮喘实证。哮喘实证主穴：列缺、尺泽、肺俞、中府、定喘。手太阴经络穴列缺可宣通肺气，祛邪外出；合穴尺泽以肃肺化痰，降逆平喘；肺俞、中府，俞募相配，调理肺脏、宣肺祛痰、止哮平喘；定喘为治疗哮喘的经验效穴。

89. 患者，男，40岁。胃脘疼痛隐隐，喜按喜暖，空腹痛甚，纳后痛减，兼见泛吐清水，便溏，手足不温，舌淡苔薄，脉虚弱，在足三里、内关、中脘基础上，应加取

- A. 胃俞、梁门
- B. 下脘、梁门
- C. 太冲、肝俞
- D. 肾俞、太溪
- E. 关元、脾俞、胃俞

89. E

解析：根据题干症状辨证为胃痛之脾胃虚寒证。胃痛的配穴：寒邪客胃配胃俞；饮食伤胃配梁门、下脘；肝气犯胃配期门、太冲；瘀血停胃配膈俞、三阴交。脾胃虚寒配关元、脾俞、胃俞；胃阴不足配胃俞、三阴交、内庭。

90. 某女，17岁，痫病发作后来诊，发病前有眩晕，胸闷，现痰多，舌红，苔白腻，脉滑。针灸治疗除印堂、鸠尾、间使、太冲、丰隆外，应加用

- A. 曲池、神门、内庭
- B. 合谷、阴陵泉、风池
- C. 心俞、脾俞、足三里
- D. 肝俞、肾俞、太溪
- E. 丰隆、膈俞、内关

90. B

解析：痫病之风痰闭阻证，应配合谷、风池、阴陵泉。

B1

- A. 佐金平木法
- B. 抑木扶土法
- C. 滋水涵木法
- D. 培土生金法
- E. 泻南补北法

91. 肝火犯肺证的治法是

91. 答案：A

解析：佐金平木法是滋肺阴清肝火以治疗肝火犯肺病证的治法。

92. 肝脾不和的治法是

92. 答案：B

解析：佐金平木法是滋肺阴清肝火以治疗肝火犯肺病证的治法。抑木扶土法是疏肝健脾或平肝和胃以治疗肝脾不和（或）肝气犯胃病证的治法。滋水涵木法是滋肾阴以养肝阴的治法。培土生金法是健脾生气以补益肺气的治法。泻南补北法是泻心火补肾水以治疗心肾不交病证的治法。

- A. 因时制宜
- B. 因地制宜
- C. 治病求本
- D. 祛除邪气
- E. 因人制宜

93. 属于夏季用药慎用温热的理论依据的是

93. 答案：A

解析：因时制宜是根据时令气候特点，考虑用药的治则。如《素问·六元正纪大论》所说：“用寒远寒，用凉远凉，用温远温，用热远热，食宜同法。”

94. 属于阴盛之体慎用寒凉的理论依据是

94. 答案：E

解析：因人制宜是根据病人的年龄、性别、体质等不同特点，考虑用药的治则。

- A. 任脉
- B. 督脉
- C. 带脉
- D. 冲脉
- E. 阴维脉

95. 被称为十二经脉之海的是

95. 答案：D

解析：冲脉上行于头，下至于足，后行于背，前布于胸腹，贯穿全身，通受十二经之气血，为总领诸经气血之要冲。当脏腑经络气血有余时，冲脉能加以涵蓄和贮存，而在脏腑经络气血不足时，则冲脉给予补充灌注，以维持人体各组织器官正常生理活动的需要。由于冲脉能调节十二经脉气血，故又称其为

“十二经脉之海”或“五脏六腑之海”。

96. 与女子妊娠密切相关的经脉

96. 答案: A

解析: 任主胞胎, 故任脉与妊娠关系密切。

- A. 虚寒
- B. 真寒假热
- C. 实热
- D. 实寒
- E. 虚热

97. 阴偏衰所形成的病理变化是

97. 答案: E

解析: 阴偏衰, 即是阴虚, 是指机体阴气不足, 阴不制阳, 导致阳气相对偏盛, 功能虚性亢奋的病理状态。其病机特点多表现为阴气不足, 阳气相对偏盛的虚热证。

98. 阴偏胜所形成的病理变化是

98. 答案: D

解析: 阴偏胜, 即是阴盛, 是指机体在疾病过程中所出现的一种阴气病理性偏盛, 功能抑制, 热量耗伤过多, 病理性代谢产物积聚的病理状态。其病机特点多表现为阴盛而阳未虚的实寒证。

- A. 阴维脉、阳维脉
- B. 督脉
- C. 任脉
- D. 带脉
- E. 阴跷脉、阳跷脉

99. 具有维络腰腹, 提系胞胎, 固护胎儿作用的经脉是

99. 答案: D

解析: 带脉基本机能: ①约束纵行诸经: 十二正经与奇经中的其余七脉均为上下纵行, 唯有带脉环腰一周, 有总束诸脉的作用。②固护胞胎: 《傅青主女科》载: “带脉者, 所以约束胞胎之系也, 带脉无力, 则难以提系, 必然胞胎不固。”说明带脉还有维络腰腹, 提系胞胎, 固护胎儿的作用。③主司带下: 因带脉有病, 常见妇人带下, 故有“带脉主司带下”之说。

100. 维系联络全身阴经和阳经的经脉是

100. 答案: A

解析: 维脉的基本机能: 阴维有维系联络全

身阴经的作用; 阳维有维系联络全身阳经的作用。

(101~102 题共用备选答案)

- A. 当归芍药散
- B. 温经汤
- C. 胶艾汤
- D. 附子汤
- E. 白术散

101. 妊娠腹痛由于阳虚寒甚者, 选用

102. 妊娠腹痛由于冲任虚寒者, 选用

101. D

解析: 附子汤主妊娠腹痛由于阳虚寒甚者。

102. C

解析: 胶艾汤妊娠腹痛由于冲任虚寒者。

(103~104 题共用备选答案)

- A. 肝风内动
- B. 热入心包
- C. 阴虚火旺
- D. 心脾热盛
- E. 中风先兆

103. 歪斜舌多见于

104. 颤动舌多见于

103. E

解析: 歪斜舌的临床意义: 主中风, 或中风先兆。多因肝风内动, 夹痰或夹瘀, 痰瘀阻滞一侧经络, 舌肌弛缓, 收缩无力, 而健侧舌肌如常而致。

104. A

解析: 颤动舌主肝风内动。因气血两虚, 阴液亏虚, 舌失于濡养而无力平稳伸展舌体; 或因热极津亏而动风、肝阳化风等导致舌抖动难安。

(105~106 题共用备选答案)

- A. 中阳偏旺
- B. 胃家实
- C. 中焦气机壅滞
- D. 脾胃健运
- E. 中脘胀满

105. “中气实则病在阳明, 中气虚则病在太阴”, 其中“中气实”的最佳解释是

106. “若湿热之证, 不夹内伤, 中气实者, 其病必微”, 其中“中气实”的最佳解释是

105. A

解析：“中气实则病在阳明，中气虚则病在太阴”，其中“中气实”为中阳偏旺之意。

106. D

解析：“若湿热之证，不夹内伤，中气实者，其病必微”，其中“中气实”为脾胃健运之意。

（107~108 题共用备选答案）

- A. 舌尖
- B. 舌中
- C. 舌根
- D. 舌两侧
- E. 舌底

107. 肾在舌上分属部位是

108. 肝在舌上分属部位是

107. C

解析：舌面的脏腑分部：（1）舌质多候五脏病变，侧重血分。（2）舌苔多候六腑病变，侧重气分。（3）舌尖多反映上焦心肺的病变。（4）舌中部多反映中焦脾胃的病变。（5）舌根部多反映下焦肾的病变。（6）舌两侧多反映肝胆的病变。

108. D

解析：舌面的脏腑分部：（1）舌质多候五脏病变，侧重血分。（2）舌苔多候六腑病变，侧重气分。（3）舌尖多反映上焦心肺的病变。（4）舌中部多反映中焦脾胃的病变。（5）舌根部多反映下焦肾的病变。（6）舌两侧多反映肝胆的病变。

（109~110 题共用备选答案）

- A. 口腔不洁
- B. 食积胃肠
- C. 胃热
- D. 牙疳
- E. 内有溃腐脓疡

109. 口气臭秽者多见于

110. 口臭难闻，牙龈腐烂者多见于

109. C

解析：口气酸臭，并伴食欲不振，脘腹胀满者，多属食积胃肠。口气臭秽者，多属胃热。口气腐臭，或兼咳吐脓血者，多是内有溃腐脓疡。口气臭秽难闻，牙龈腐烂者，为牙疳。110. D

解析：口气酸臭，并伴食欲不振，脘腹胀满者，多属食积胃肠。口气臭秽者，多属胃热。

口气腐臭，或兼咳吐脓血者，多是内有溃腐脓疡。口气臭秽难闻，牙龈腐烂者，为牙疳。

- A. 既能治疗血虚证，又能治疗遗精盗汗证
- B. 既能治疗血虚证，又能治疗胁肋脘腹疼痛
- C. 既能治疗血虚证，又能治疗痈疽疮疡证
- D. 既能治疗血虚证，又能治疗虚劳喘咳证
- E. 既能治疗血虚证，又能治疗出血证

111. 阿胶的主治病证是

111. 答案：E

解析：阿胶功效：补血滋阴，润肺，止血。

主治：（1）血虚萎黄，眩晕，心悸，肌痿无力。

为补血要药。（2）劳嗽咯血，吐血尿血，便

血崩漏，妊娠胎漏。为止血要药。（3）肺燥咳嗽。

（4）热病伤阴，心烦失眠，阴虚风动，手足瘈疰等。

112. 白芍的主治病证是

112. 答案：B

解析：白芍功效：养血调经，敛阴止汗，柔

肝止痛，平抑肝阳。主治：（1）血虚萎黄，

月经不调，崩漏下血。（2）肝脾不和，胸肋

脘腹疼痛，四肢挛急疼痛。（3）肝阳上亢，

头痛眩晕。（4）自汗，盗汗。

- A. 蕲蛇
- B. 木瓜
- C. 威灵仙
- D. 秦艽
- E. 桑寄生

113. 具有祛风，通络，止痉功效的药物是

113. 答案：A

解析：蕲蛇功效：祛风，通络，止痉。

114. 具有舒筋活络，和胃化湿功效的药物是

114. 答案：B

解析：木瓜功效：舒筋活络，和胃化湿。

- A. 开窍醒神，清热止痛
- B. 开窍醒神，活血通经，消肿止痛
- C. 开窍醒神，辟秽止痛
- D. 化痰开窍，凉肝息风，清热解毒
- E. 开窍醒神，清心化痰

115. 麝香的功效是

115. 答案：B

解析：麝香功效：开窍醒神，活血通经，消肿止痛，催生下胎。

116. 牛黄的功效是

116. 答案: D

解析: 牛黄功效: 凉肝息风, 清心豁痰, 开窍醒神, 清热解毒。

- A. 滑石
- B. 茵陈
- C. 草薢
- D. 地肤子
- E. 泽泻

117. 具有利湿去浊, 祛风除痹功效的药物是

117. 答案: C

解析: 草薢功效: 利湿去浊, 祛风除痹。

118. 具有清利湿热, 利胆退黄功效的药物是

118. 答案: B

解析: 茵陈功效: 清利湿热, 利胆退黄。

- A. 干姜
- B. 附子
- C. 肉桂
- D. 丁香
- E. 吴茱萸

119. 治疗腹痛泄泻, 为温暖中焦之主药的是

119. 答案: A

解析: 干姜主治腹痛, 呕吐, 泄泻。本品辛热, 长于温中散寒, 健运脾胃, 为温暖中焦之主药。凡脾胃寒证, 无论是实证或虚寒证均可用之。治脾胃虚寒, 则多配人参、白术等, 如理中丸。

120. 治疗阳痿、宫冷, 虚阳上浮的药物是

120. 答案: C

解析: 肉桂主治: 肾阳虚证。本品辛甘大热, 能补火助阳, 益阳消阴, 作用温和持久, 为治命门火衰之要药。本品大热入肝肾, 能使因下元虚衰所致上浮之虚阳回归故里, 故曰引火归原。

- A. 收敛肺气
- B. 安蛔止痛
- C. 生津止渴
- D. 涩精止遗
- E. 固冲止血

121. 二陈汤中乌梅的配伍意义是

122. 乌梅丸中乌梅的配伍意义是

121. 答案: A

解析: 乌梅收敛肺气, 与半夏、橘红相伍, 散中兼收, 防其燥散伤正。

122. 答案: B

解析: 方中重用味酸之乌梅, 取其酸能安蛔, 使蛔静则痛止, 为君药。

- A. 猪苓汤
- B. 真武汤
- C. 实脾散
- D. 五苓散
- E. 苓桂术甘汤

123. 主治阳虚水泛证的首选方剂是

124. 主治脾肾阳虚, 水气内停之阴水的首选方剂是

123. 答案: B

解析: 真武汤主治: 阳虚水泛证。畏寒肢厥, 小便不利, 心下悸动不宁, 头目眩晕, 身体筋肉瞤动, 站立不稳, 四肢沉重疼痛, 浮肿, 腰以下为甚; 或腹痛, 泄泻; 或咳喘呕逆。舌质淡胖, 边有齿痕, 舌苔白滑, 脉沉细。124. 答案: C

解析: 实脾散主治: 脾肾阳虚, 水气内停之阴水。身半以下肿甚, 手足不温, 口中不渴, 胸腹胀满, 大便溏薄, 舌苔白腻, 脉沉弦而迟者。

- A. 透邪解郁, 疏肝理脾
- B. 寒热平调, 消痞散结
- C. 温阳健脾, 行气利水
- D. 清胆利湿, 和胃化痰
- E. 肝疏解郁, 养血健脾

125. 四逆散的功用是

126. 逍遥散的功用是

125. 答案: A

解析: 四逆散功用: 透邪解郁, 疏肝理脾。

126. 答案: E

解析: 逍遥散功用: 肝疏解郁, 养血健脾。

- A. 清营解毒, 透热养阴
- B. 清泻肺热, 止咳平喘
- C. 清热解毒, 凉血散瘀
- D. 清肺化痰, 逐瘀排脓
- E. 清泻肝火, 降逆止呕

127. 左金丸的功用是

128. 答案: E

解析：左金丸功用：清泻肝火，降逆止呕。

127. 苇茎汤的功用是

128. 答案：D

解析：苇茎汤功用：清肺化痰，逐瘀排脓

A. 口服碳酸钙

B. 必需氨基酸疗法

C. 补充(OH)

D. 促红细胞生成素

E. 血液透析治疗

129. 慢性肾功能不全出现肾性贫血最合适的治疗药物是

129. 答案：D

解析：肾性贫血患者 EPO 水平较低，在进行治疗过程中，往往通过注射 EPO 来提高体内 EPO 水平进行治疗，从而帮助病人增加红细胞数量，此时 EPO 水平有所上升。

130. 尿毒症患者伴高钾血症最有效降血钾疗法是

130. 答案：E

解析：急诊透析可用于：药物不能控制的高血钾（超过 6.5 毫摩尔/升）。

A. 慢性阻塞性肺气肿

B. 慢性支气管炎

C. 支气管扩张症

D. 肺炎

E. 急性肺水肿

131. 咳嗽痰量大有分层现象的疾病是

131. 答案：C

解析：支气管扩张症与肺脓肿患者痰量多时，痰可出现分层现象：上层为泡沫，中层为浆液或浆液脓性，下层为坏死性物质。

132. 咳嗽咯粉红色泡沫样痰的疾病是

132. 答案：E

解析：粉红色泡沫痰是肺水肿的特征。

A. 扁平胸

B. 鸡胸

C. 桶状胸

D. 漏斗胸

E. 胸廓局限变形

133. 慢性消耗性疾病患者的胸廓是

133. 答案：A

解析：扁平胸见于瘦长体型者，也可见于慢性消耗性疾病，如肺结核等。

134. 慢性阻塞性肺气肿患者的胸廓是

134. 答案：C

解析：桶状胸常见于慢性阻塞性肺气肿及支气管哮喘发作时，亦可见于一部分老年人。

A. 急性白血病

B. 传染性单核细胞增多症

C. 再生障碍性贫血

D. 类白血病反应

E. 特发性血小板减少性紫癜 135.

肝炎病毒可诱发的血液病是

135. 答案：C

解析：再障可以发生于病毒性肝炎之后，且病情较重。

136. 人类 T 淋巴细胞病毒 I 型可诱发的血液病是

136. 答案：A

解析：成人 T 细胞白血病是由 I 型人类 T 细胞白血病 / 淋巴瘤病毒 (HTLV-1) 所致。

A. 病人呼气时进针，吸气时出针

B. 进针时疾速刺入，多捻转，徐徐出针

C. 进针时徐徐刺入，少捻转，疾速出针

D. 出针时摇大针孔而不按

E. 病人吸气时进针，呼气时出针

137. 属于疾徐补法操作的是

答案：C

解析：疾徐补泻法中，进针时徐徐刺入，少捻转，疾速出针者为补法。

138. 属于呼吸泻法操作的是

答案：E

解析：呼吸补泻法中，病人吸气时进针，呼气时出针为泻法。

A. 四肢疼痛

B. 全身疼痛

C. 乳痛

D. 咳嗽

E. 瘾疹

139. 常用大包穴治疗的是

答案：B

解析：大包【主治】①气喘；②胸胁痛；③周身疼痛、四肢无力等肌肉病症。

140. 常用血海穴治疗的是

答案：E

解析：血海【主治】①月经不调.痛经.经闭等妇科病；②瘾疹.湿疹.丹毒，皮肤瘙痒等皮外科病；③膝股内侧痛。

- A. 神门
- B. 通里
- C. 少府
- D. 阴郄
- E. 少海

141. 在腕横纹上 0.5 寸，尺侧腕屈肌腱的桡侧缘的腧穴是

答案：D

解析：阴郄在前臂前区，腕掌侧远端横纹上 0.5 寸，尺侧腕屈肌腱的桡侧缘。

142. 在腕横纹上 1 寸，尺侧腕屈肌腱的桡侧缘的腧穴是

答案：B

解析：通里在前臂前区，腕掌侧远端横纹上 1 寸，尺侧腕屈肌腱的桡侧缘。

- A. 外踝高点上 3 寸，腓骨前缘
- B. 外踝高点上 4 寸，腓骨前缘
- C. 内踝前下方凹陷中，当舟骨结节与内踝尖连线的中点处
- D. 外踝前下方，趾长伸肌腱的外侧凹陷中
- E. 外踝高点上 2 寸，腓骨前缘

143. 悬钟穴的定位是

答案：A

解析：悬钟穴：外踝高点上 3 寸，腓骨前缘。

144. 丘墟穴的定位是

答案：D

解析：丘墟穴：在外踝前下方，趾长伸肌腱的外侧凹陷中。

- A. 目内眦
- B. 目外眦
- C. 目上
- D. 目下
- E. 鼻旁

145. 手少阳经与足少阳经相交接的部位是

答案：B

解析：手少阳经与足少阳经交接于目外眦。

146. 手太阳经与足太阳经相交接的部位是

答案：A

解析：手太阳经与足太阳经交接于目内眦。

- A. 先深后浅，轻插重提，提插幅度大，频率快，操作时间长
- B. 先浅后深，重插轻提，提插幅度小，频率慢，操作时间短
- C. 病人吸气时进针，呼气时出针
- D. 出针时摇大针孔而不按压
- E. 出针后迅速按压针孔

147. 属于提插补法操作的是

答案：B

解析：提插补泻操作：①补法：针下得气后，先浅后深，重插轻提，提插幅度小，频率慢，操作时间短者为补法；②泻法：针下得气后，先深后浅，轻插重提，提插幅度大，频率快，操作时间长者为泻法。

148. 属于开阖补法操作的是

答案：E

解析：开阖补泻操作：①补法：出针后迅速揉按针孔为补法；②泻法：出针时摇大针孔而不按为泻法。

- A. 认为人的本性就是追求快乐和幸福
- B. 研究和探讨人应该具有什么样的美德和品格
- C. 人道主义思想在医学领域中的具体体现
- D. 强调人的责任.义务
- E. 生命神圣与生命质量统一

149. 符合“功利论”的是

149. 答案：A

解析：功利论，是以“功利”作为道德标准的学说。功利论继承发展了历史上幸福论和快乐主义的伦理传统，认为人的本性就是追求快乐和幸福。

150. 符合“道义论”的是

- A. 认为人的本性就是追求快乐和幸福
- B. 研究和探讨人应该具有什么样的美德和品格
- C. 人道主义思想在医学领域中的具体体现
- D. 强调人的责任.义务
- E. 生命神圣与生命质量统一

答案：D

解析：道义论强调人的责任、义务。人与人

之间的相互尊重、关心、帮助成为社会道义。

第二单元

1. 治疗咳血之燥热伤肺证，应首选A.

麦门冬汤

B.清燥救肺汤

C.沙参麦冬汤

D.桑杏汤

E.百合固金汤

答案：D

解析：咳血之燥热伤肺证。证候主症：喉痒咳嗽，痰中带血，口干鼻燥，或有身热，舌质红，少津，苔薄黄，脉数。治法：清热润肺，宁络止血。代表方：桑杏汤加减。

2. 下列哪个部位是胃痞的基本病位A.

肝胆

B.脾胃

C.肝脾

D.脾

E.胃

答案：E

解析：胃痞的病位在胃，与肝、脾的关系密切。

3. 下列不属于外感腰痛的致病病邪是A.

热

B.燥

C.风

D.寒

E.湿

答案：B

解析：腰痛的病因为内伤、外感与跌仆挫伤，其中外感主要为风、寒、湿、热诸邪痹阻经脉所致。

4. 尿血与血淋的鉴别，主要在于

A.有无尿痛

B.尿味的情况

C.尿色的深浅

D.尿量的多少

E.以上均非

答案：A

解析：尿血与血淋都有小便出血，尿色红赤，甚至尿出纯血。其鉴别要点在于有无尿痛。尿血多无疼痛，虽亦间有轻微的胀痛或热痛，

但终不若血淋的小便滴沥而疼痛难忍。

5. 治疗胃痛饮食伤胃证的中医治法是 A.

温胃散寒，行气止痛

B.疏肝解郁，理气止痛

C.清化湿热，理气和胃

D.消食导滞，和胃止痛

E.以上均非

答案：D

解析：胃痛饮食伤胃证。证候主症：胃脘疼痛，胀满拒按，嗳腐吞酸，或呕吐不消化食物，其味腐臭，吐后痛减，不思饮食，大便不爽，得矢气及便后稍舒，舌苔厚腻，脉滑。治法：消食导滞，和胃止痛。

6. 治疗呃逆气机郁滞证，应首选

A.竹叶石膏汤

B.橘皮竹茹汤

C.丁香散

D.益胃汤

E.五磨饮子

答案：E

解析：呃逆气机郁滞证。证候主症：呃逆连声，常因情志不畅而诱发或加重，胸胁满闷，脘腹胀满，嗳气纳减，肠鸣矢气，苔薄白，脉弦。治法：顺气解郁，和胃降逆。代表方：五磨饮子加减。

7. 治疗胃痛脾胃虚寒证，应首选

A.良附丸

B.黄芪建中汤

C.小建中汤

D.理中丸

E.附子理中丸

答案：B

解析：胃痛之脾胃虚寒证。证候主症：胃痛隐隐，绵绵不休，喜温喜按，空腹痛甚，得食则缓，劳累或受凉后发作或加重，泛吐清水，神疲纳呆，四肢倦怠，手足不温，大便溏薄，舌淡苔白，脉虚弱或迟缓。治法：温中健脾，和胃止痛。代表方：黄芪建中汤加减。

8. 气秘的治法是

A.通便止痛

B.益气润肠

C.润肠通便

D.顺气导滞

E.以上均非

答案：D

解析：气秘证候主症：大便干结，或不甚干结，欲便不得出，或便而不爽，肠鸣矢气，腹中胀痛，暖气频作，纳食减少，胸胁痞满，舌苔薄腻，脉弦。治法：顺气导滞。

9. 以下哪项是健忘的表现

A.神情呆滞

B.精神恍惚

C.善忘前事

D.告知不晓

E.智能减退

答案：C

解析：痴呆与健忘的鉴别。健忘是以记忆力减退、遇事善忘为主症的一种病证。而痴呆则以神情呆滞，或神志恍惚，告知不晓为主要表现。

其不知前事或问事不知等表现，与健忘之“善忘前事”有根本区别。痴呆根本不晓前事，而健忘则晓其事却易忘，且健忘不伴有智能减退。

神情呆钝。健忘可以是痴呆的早期临床表现，

这时可不予鉴别。由于外伤、药物所致健忘，

一般经治疗后可以恢复。

10.脾肾两虚型痴呆的治法是

A.补肾益髓，填精养神

B.健脾化浊，豁痰开窍

C.活血化瘀，开窍醒脑

D.益气养血，清心宣窍

E.补肾健脾，益气生精

答案：E

解析：痴呆之脾肾两虚证。证候主症：表情呆滞，

沉默寡言，记忆减退，失认失算，口齿含糊，

词不达意，伴腰膝酸软，肌肉萎缩，食少纳呆，

气短懒言，口涎外溢，或四肢不温，腹痛喜按，

鸡鸣泄泻，舌质淡白，舌体胖大，苔白，或舌红，

苔少或无苔，脉沉细弱，双尺尤甚。证机概要：

气血亏虚，肾精不足，髓海失养。治法：补肾健脾，

益气生精。

11.内伤发热虚证的治疗原则不包括的是A.

清热

B.养血

C.滋阴

D.温阳

E.益气

答案：A

解析：实火宜清，虚火宜补，故答案A为内伤发热实证的治疗原则。

12.冷哮咳痰特点

A.臭脓痰

B.痰稠黄胶黏

C.痰少咯吐不爽，色白而多泡沫

D.痰如白沫量多

E.痰黄白相兼

答案：C

解析：冷哮证证候主症：喉中哮鸣如水鸡声，呼吸急促，喘憋气逆，胸膈满闷如塞，咳不甚，

痰少咯吐不爽，色白而多泡沫，口不渴或渴喜

热饮，形寒怕冷，天冷或受寒易发，面色青

晦，舌苔白滑，脉弦紧或浮紧。

13.下列情况对胃痞和胸痹的鉴别诊断最具有

价值者为

A.诱因

B.转归

C.病位

D.病程

E.起病

答案：C

解析：胸痹是胸中痞塞不通，而致胸膈内外疼

痛之证，以胸闷、胸痛、短气为主症，偶兼脘

腹不舒。而胃痞则以脘腹满闷不舒为主症，多兼

饮食纳运无力之症，偶有胸膈不适，并无胸痛

等表现。所以胃痞和胸痹二者的鉴别，病位较为

有价值。

14.咳嗽之风寒袭肺证，首选方剂是A.

荆防达表汤

B.沙参麦冬汤

C.桑菊饮

D.三拗汤合止嗽散

E.桑杏汤

答案：D

解析：咳嗽之风寒袭肺证。证候主症：咳嗽声

重，气急，咽痒，咳痰稀薄色白，常伴鼻塞，

流清涕，头痛，肢体酸楚，或见恶寒、发热、

无汗等风寒表证，舌苔薄白，脉浮或浮紧。

治法：疏风散寒，宣肺止咳。代表方：三拗

汤合止嗽散加减。

15.不适合用清热法治疗的是

- A.流痰后期，阴虚火旺，虚热不退者
- B.药物性皮炎皮损色红灼热
- C.局部红.肿.热.痛
- D.热毒内传之走黄内陷
- E.疮色晦暗不泽，皮温较低

答案：E

解析：“疮色晦暗不泽，皮温较低”考虑寒邪较重，而非热胜之证，所以不适合用清热法。

16. 疮疡疾患中，部位表浅，范围较小的急性化脓性疾病是

- A.疖
- B.发
- C.流注
- D.有头疽
- E.无头疽

答案：A

解析：疖是指发生在肌肤浅表部位.范围较小的急性化脓性疾病。

17. 中医外科学中，温阳托毒法的代表方剂是

- A.右归丸
- B.托里消毒散
- C.金匱肾气丸
- D.六君子汤
- E.神功内托散

答案：E

解析：中医外科学中内托法的相关代表方剂：透托方，如透脓散；益气托毒方，如托里消毒散；温阳托毒方，如神功内托散。

18. 痛的病因病机

- A.内郁湿火，外感风邪
- B.营卫不和，气血凝滞
- C.汗出不畅，湿热蕴蒸肌肤
- D.搔抓痒子，破伤染毒
- E.感受暑毒

答案：B

解析：外感六淫邪毒，或外来伤害，感染毒邪，或过食膏粱厚味，聚湿生浊，邪毒湿浊留阻肌肤，郁结不散，致使营卫不和，气血凝滞，经络壅遏，化火成毒而成。

19. 属于瘾疹的特点是

- A.呈带状分布的红斑上成簇的水疱
- B.大小不等的风团，色鲜红，骤起骤退
- C.皮肤上浅在性脓疱和脓痂
- D.皮肤油腻，出现红斑，覆有鳞屑
- E.对称分布，多形损害，剧烈瘙痒

答案：B

解析：“呈带状分布的红斑上成簇的水疱”是蛇串疮的特点；

“大小不等的风团，色鲜红，骤起骤退”是瘾疹的特点；

“皮肤上浅在性脓疱和脓痂”是黄水疮的特点；“皮肤油腻，出现红斑，覆有鳞屑”是脂溢性皮炎的特点；

“对称分布，多形损害，剧烈瘙痒”是湿疮的特点。

20. 桃红四物汤宜用于脱疽的哪一证型

- A.气阴两虚证
- B.血脉瘀阻证
- C.热毒伤阴证
- D.寒湿阻滞证
- E.湿热毒盛证

答案：B

解析：脱疽之血脉瘀阻证

证候：患趾（指）酸胀疼痛加重，夜难入寐，步履艰难，患趾（指）皮色暗红或紫暗，下垂更甚，皮肤发凉干燥，肌肉萎缩，趺阳脉搏动消失；舌暗红或有瘀斑，苔薄白，脉弦涩。

治法：活血化瘀，通络止痛。

代表方：桃红四物汤加減。

21. 持“阳非有余，阴常不足”学术观点的医家是

- A.薛己
- B.陈自明
- C.赵献可
- D.陈修园
- E.张介宾

答案：E

解析：《景岳全书》是张介宾总结前人及毕

生经验，博采众说，于晚年编辑而成。其学术观点“阳非有余，阴常不足”是张介宾对人体阴阳状态的著名观点，强调阴阳相互为用，相互转化，“阴以阳为主，阳以阴为根”，“阴不可以无阳，阳不可以无阴”。

22. 脾失统摄，冲任不固可导致的妇科疾病是

- A. 经期延长
- B. 带下臭秽
- C. 经行吐衄
- D. 痛经
- E. 闭经

答案：A

解析：脾失统摄：脾气虚弱，中气不足，统摄无权，冲任不固，可出现月经过多、经期延长、崩漏、胎漏、产后恶露不绝、乳汁自出。

23. 经行乳房胀痛肝气郁结证的治法是A.

- 疏肝解郁，行气止痛
- B. 疏肝理气，和胃通络
- C. 疏肝解郁，活血止痛
- D. 疏肝理气，柔肝止痛
- E. 疏肝解郁，养血止痛

答案：B

解析：经行乳房胀痛肝气郁结证
主要证候：经前或经行乳房胀满疼痛，或乳头痒痛，甚则痛不可触衣。经行不畅，血色黯红，小腹胀痛；胸闷胁胀，精神抑郁；苔薄白，脉弦。

治法：疏肝理气，和胃通络。

方药：逍遥散加减。

24. 治疗经行浮肿脾肾阳虚证，应首选的方剂是

- A. 参苓白术散
- B. 二仙汤合苓桂术甘汤
- C. 肾气丸合苓桂术甘汤
- D. 金匱肾气丸
- E. 右归丸合苓桂术甘汤

答案：C

解析：经行浮肿脾肾阳虚证
主要证候：经行面浮肢肿，按之没指，晨起头面肿甚，月经推迟，经行量多，色淡，质

薄；腹胀纳减，腰膝酸软，大便溏薄；舌淡，苔白腻，脉沉缓，或濡细。

治法：温肾化气，健脾利水。

方药：肾气丸合苓桂术甘汤。

25. 月经产生机制是

- A. 肾气.天癸.冲任.经络协调作用于胞宫
- B. 脏腑.天癸.气血.经络协调作用于胞宫
- C. 肾气.天癸.气血.冲任调作用于胞宫
- D. 脏腑.气血.天癸.冲任调作用于胞宫
- E. 脾胃.气血.冲任.经络调作用于胞宫

答案：B

解析：月经的产生，是女子发育到成熟年龄阶段后，脏腑.天癸.气血.经络协调作用于胞宫的生理现象。

26. 分泌晚期，子宫内膜正常厚度为A.

- 子宫内膜厚达 3mm
- B. 子宫内膜厚达 5mm
- C. 子宫内膜厚达 7mm
- D. 子宫内膜厚达 8mm
- E. 子宫内膜厚达 10mm

答案：E

解析：分泌晚期子宫内膜厚达 10mm，并呈海绵状。

27. 小儿稚阴稚阳学说，是指其生理状态为

- A. 脏气清灵，易趋健康
- B. 脾常不足，肝常有余
- C. 阳常有余，阴常不足
- D. 脏腑娇嫩，形气未充
- E. 生机蓬勃，发育迅速

答案：D

解析：古人将小儿脏腑娇嫩.形气未充这一生理特点归纳为“稚阴稚阳”。

28. 治疗蛔虫病肠虫证，应首选的方剂是A.

- 乌梅丸
- B. 驱虫粉
- C. 使君子散
- D. 化虫丸
- E. 追虫丸

答案：C

解析：蛔虫病之肠虫证
证候：脐腹部疼痛，轻重不一，时作时止，

或不思饮食，或嗜食异物，大便不调，或泄泻或便秘，或便下蛔虫，面色多黄滞，可见面部白斑，白睛蓝斑，唇内粟状白点，夜寐齟齬。甚者，腹部可扪及条索状物，时聚时散，形体消瘦，肚腹胀大，青筋显露。舌苔多见花剥或腻，舌尖红赤，脉弦滑。

治法：驱蛔杀虫，调理脾胃。

代表方剂：使君子散。

29.7 周岁小儿的身长应为

- A.95cm
- B.100cm
- C.105cm
- D.124cm
- E.90cm

答案：D

解析：临床可用以下公式估算 2 岁后至 12 岁儿童的身高：身高（cm）=75+7×年龄。

30. 治疗小儿厌食脾失健运证，应首选的方剂是

- A.异功散
- B.平胃散
- C.不换金正气散
- D.保和丸
- E.健脾丸

答案：C

解析：厌食之脾失健运证

证候：食欲不振，厌恶进食，食而乏味，或伴胸脘痞闷，嗳气泛恶，大便不调，偶尔多食后则脘腹饱胀，形体尚可，精神正常，舌淡红，苔薄白或薄腻，脉尚有力。

治法：调和脾胃，运脾开胃。

代表方剂：不换金正气散。

31. 治疗小儿厌食脾胃气虚证，应首选的方剂是

- A.补中益气汤
- B.不换金正气散
- C.保和丸
- D.异功散
- E.四君子汤

答案：D

解析：厌食之脾胃气虚证

证候：不思进食，食而不化，大便溏薄夹不消化食物，面色少华，形体偏瘦，肢倦乏力，舌质淡，苔薄白，脉缓无力。

治法：健脾益气，佐以助运。

代表方剂：异功散、参苓白术散。

32. 小儿遗尿的病机主要是

- A.肝经郁热，疏泄失司
- B.脾肾气虚，下元不固
- C.肾气不足，膀胱虚寒
- D.肺脾气虚，水道失约
- E.心肾失交，水火不济

答案：C

解析：遗尿多与膀胱和肾的功能失调有关，其中尤以肾气不足、膀胱虚寒为多见。

33. 下列抗菌药物中是治疗肺炎球菌肺炎首选的是

- A.青霉素
- B.红霉素
- C.四环素
- D.庆大霉素
- E.三代头孢菌素

答案：A

解析：肺炎球菌肺炎是由肺炎链球菌感染引起。一经确诊即应立即开始抗生素治疗，不必等待细菌培养结果。对肺炎球菌肺炎，青霉素G为首选；对青霉素过敏者，可选用红霉素，林可霉素和一代头孢菌素。

33. 关于急性白血病的叙述，不正确的是

- A.出血的机制是凝血因子缺乏
- B.呈正细胞正色素性贫血
- C.是造血干细胞的恶性克隆性疾病
- D.半数以上患者以发热起病
- E.感染是最常见的死亡原因之一

答案：A

解析：急性白血病出血与血小板减少有关。

34. 糖化血红蛋白A1 可反映平均血糖水平的

- 时间是
- A.6~8 周
- B.8~12 周
- C.1~2 周

D.2~4 周

E.4~6 周

答案: B

解析: 糖化血红蛋白 A1(GHbA1)测定 GHbA1 可反映取血前 8~12 周的平均血糖状况, 是监测糖尿病病情的重要指标。

35. 关于肺心病的说法, 错误的是

A.COPD 病史最常见

B. 肺动脉瓣区 S2 亢进

C. 剑突下可触及心脏搏动

D. 下肢水肿

E. 心力衰竭以左心衰为主

答案: E

解析: 肺源性心脏病患者, 出现心力衰竭时, 以右心衰竭为主。

36. 癫痫单纯部分性发作一般不超过A.

数十分钟

B.1 小时

C. 不超过 1 分钟

D. 数分钟

E. 十数分钟

答案: C

解析: 癫痫单纯部分性发作一般不超过 1 分钟, 表现为简单的运动、感觉、自主神经或精神症状, 发作时意识始终存在, 发作后能复述发作的细节。

37. 肺癌常见的淋巴结转移部位是A.

颌下淋巴结

B. 颈下淋巴结 C.

颈前淋巴结 D.

锁骨上淋巴结E.

腋窝淋巴结 答

案: D

解析: 锁骨上淋巴结是肺癌常见的转移部位。

38. 慢性肾炎治疗措施中不做常规应用的是

A. 避免有损肾功能的因素

B. 应用血小板解聚药

C. 糖皮质激素及细胞毒药物

D. 积极控制血压

E. 优质低蛋白饮食及低磷饮食

答案: C

解析: 慢性肾小球肾炎的治疗: 糖皮质激素 和细胞毒药物不做常规应用, 患者肾功能正

常或仅轻度受损, 肾脏体积正常, 病理类型较轻(如轻度系膜增生性肾炎、早期膜性肾病等), 尿蛋白较多者, 如无禁忌证可试用。39. 与原发性肝癌发病最密切相关的是

A. 戊型肝炎

B. 自身免疫性肝炎

C. 肝血管瘤

D. 乙型肝炎

E. 多囊肝

答案: D

解析: 乙型病毒性肝炎病毒和丙型病毒性肝炎病毒与原发性肝癌有着明显的相关性。40. 可继发再生障碍性贫血的疾病是

A. 慢性肾炎

B. 肾病综合征

C. 急性胰腺炎

D. 病毒性肝炎

E. 糖尿病

答案: D

解析: 再障可以发生于病毒性肝炎之后, 且病情较重。

41. 救治急性一氧化碳中毒最有效的措施是

A. 输注新鲜全血

B. 输注浓缩红细胞悬液

C. 应用呼吸兴奋剂

D. 进行机械通气

E. 高压氧治疗

答案: E

解析: 救治急性一氧化碳中毒最有效的措施是高压氧治疗。

42. 有机磷杀虫药中毒时患者呼气的特异气味是

A. 大蒜臭味

B. 汗臭味 C.

烂苹果味D.

氨味

E. 肝臭味

答案: A

解析: 有机磷杀虫药中毒时呼出气、呕吐物有刺激性蒜臭味。

43. 下列有关流脑传染源的叙述, 不正确的是

A. 人不是唯一宿主

- B.带菌者是重要的传染源
- C.患者是本病的传染源
- D.流行期间以 A 群为主
- E.B 和 C 群以散发为主

答案：A

解析：流脑传染源：患者和带菌者是本病的传染源，人是唯一宿主。带菌者不易被发现，是重要的传染源。流行期间以 A 群为主，B 和 C 群以散发为主。

44. 下列有关消毒方法的描述，不正确的是
- A.高效消毒法能杀灭一切细菌繁殖体
 - B.中效消毒法能杀灭除细菌芽孢以外的各种微生物
 - C.低效消毒法只能消灭细菌繁殖体.部分真菌和亲脂性病毒
 - D.灭菌法可以杀灭包括细菌芽孢的一切微生物
 - E.超声波消毒法属于低效消毒法

答案：E

解析：中效消毒法能杀灭除细菌芽孢以外的各种微生物。主要有超声波消毒法和中效消毒剂如醇类.碘类.酚类消毒剂等。

45. 属于随时消毒的是
- A.传染病患者的尸体处理
 - B.传染病室日常消毒
 - C.传染病患者转科后病室的消毒
 - D.SARS 患者入院后对其原居住地的消毒
 - E.传染病患者出院后对其所用物品的消毒

答案：B

解析：随时消毒指在传染源仍然存在的疫源地内，对传染源的排泄物.分泌物及其污染过的物品进行的及时性消毒处理。如患者住院时的卫生处理（沐浴.更衣等）；对患者呕吐物.痰液.尿液.粪便及卫生敷料的消毒处理；对病室空气.地面.家具的消毒和接触患者或其污染物品脱手套后的洗手等。

46. 下列肝功能检查指标中，对诊断重型肝炎有重要意义的是
- A.胆碱酯酶下降
 - B.血清胆红素升高
 - C.胆酶分离

- D.凝血酶原活动度（PTA） $\leq 40\%$
- E.血清白/球比值倒置

答案：D

解析：PTA $\leq 40\%$ 为肝细胞大量坏死的肯定界限，为重型肝炎诊断及判断预后的重要指标，如 PTA $< 20\%$ 则预后不良。

47. 发生传染病暴发时，要求有关单位向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告的时限为

- 小时内
- B.2 小时内
- C.3 小时内
- D.4 小时内
- E.5 小时内

答案：B

解析：突发事件的报告情形和报告时限要求突发事件监测机构.医疗卫生机构和有关单位发现有下列情形之一的，应当在 2 小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告；接到报告的卫生行政主管部门应当在 2 小时内向本级人民政府报告，并同时向上级人民政府卫生行政主管部门和国务院卫生行政主管部门报告：

- ① 发生或者可能发生传染病暴发.流行的；
- ② 发生或者发现不明原因的群体性疾病的；
- ③ 发生传染病菌种.毒种丢失的；
- ④ 发生或者可能发生重大食物和职业中毒事件的。

48. 预防肺结核的最主要措施是

- A.禁止随地吐痰
- B.隔离和有效治疗排菌患者
- C.健全防痨组织
- D.加强登记管理
- E.接种卡介苗，化疗

答案：B

解析：预防肺结核的最主要措施是：隔离和有效治疗排菌患者。

49. 中医诊断开办错误的是

- A.中医诊所应当将本诊所的诊疗范围在诊所的明显位置公示

- B. 中医医师的姓名在诊所的明显位置公示
C. 中医诊所的执业范围在诊所的明显位置公示
D. 设备完善的情况下可进行外科手术治疗
E. 需将诊所的名称、地址、诊疗范围、人员配备情况等报所在地县级人民政府中医药主管部门备案

答案：D

解析：举办中医诊所的，将诊所的名称、地址、诊疗范围、人员配备情况等报所在地县级人民政府中医药主管部门备案后即可开展执业活动。中医诊所应当将本诊所的诊疗范围、中医医师的姓名及其执业范围在诊所的明显位置公示，不得超出备案范围开展医疗活动。

50. 未经批准擅自开办医疗机构行医应承担的行政责任主要是

- A. 经济补偿
B. 赔礼道歉
C. 赔偿责任
D. 行政处分
E. 行政处罚

答案：E

解析：卫生行政处罚是指卫生行政机关或者法律法规授权组织在职权范围内对违反卫生行政管理秩序而尚未构成犯罪的公民、法人和其他组织实施的一种卫生行政制裁。

A2

51. 某患者尿血日久，体倦乏力，气短声低，面色不华，舌质淡，脉弱，治疗应首选

- A. 归脾汤
B. 十灰散
C. 小蓟饮子
D. 知柏地黄丸
E. 无比山药丸

答案：A

解析：尿血之脾不统血证。证候主症：久病尿血，甚或兼见齿衄、肌衄，食少，体倦乏力，气短声低，面色不华，舌质淡，脉细弱。治法：补中健脾，益气摄血。代表方：归脾汤

加减。

52. 患者胸胁支满，心下痞闷，胃中有振水音，脘腹喜温畏冷，背寒，呕吐清水痰涎，水入易吐，口渴不欲饮，心悸，气短，头晕目眩，食少，形体逐渐消瘦，舌苔白滑，脉弦细而滑。其治法是

- A. 温化寒湿
B. 逐水化饮
C. 宣肺化饮
D. 淡渗利水
E. 温脾化饮

答案：E

解析：痰饮之脾阳虚弱证。证候主症：胸胁支满，心下痞闷，胃中有振水音，脘腹喜温畏冷，泛吐清水痰涎，饮入易吐，口渴不欲饮水，头晕目眩，心悸气短，食少，大便或溏，形体逐渐消瘦，舌苔白滑，脉弦细而滑。证机概要：脾阳虚弱，饮停于胃，清阳不升。治法：温脾化饮。

53. 患者低热，头晕眼花，身倦乏力，心悸不宁，面白少华，唇甲色淡，舌质淡，脉细弱。其主治方剂是

- A. 清骨散
B. 补中益气汤
C. 归脾汤
D. 金匱肾气丸
E. 以上均非

答案：C

解析：内伤发热之血虚发热证。证候主症：发热，热势多为低热，头晕眼花，身倦乏力，心悸不宁，面白少华，唇甲色淡，舌质淡，脉细弱。治法：益气养血。代表方：归脾汤加减。

54. 患者，女性，31岁，症见入寐困难1个月，多梦，胸闷胁胀，急躁易怒，伴头晕头胀，口干口苦，小便短赤，舌红苔黄，脉弦数。治疗方剂是

- A. 泻心汤
B. 当归龙荟丸
C. 龙胆泻肝汤
D. 滋水清肝饮
E. 礞石滚痰丸

答案：C

解析：不寐之肝火扰心证。证候主症：不寐

多梦，甚则彻夜不眠，急躁易怒，伴头晕头胀，目赤耳鸣，口干而苦，不思饮食，便秘溲赤，舌红苔黄，脉弦而数。证机概要：肝郁化火，上扰心神。治法：疏肝泻火，镇心安神。代表方：龙胆泻肝汤加减。

55. 患者，女性，56岁。有15年肺胀病史，1周前劳累后出现面部水肿，呼吸喘促难续，心悸，胸脘痞闷，尿少，怕冷，纳呆，舌苔白滑，脉沉细。治疗应首选

- A. 参附汤
- B. 金匱肾气丸
- C. 济生肾气丸
- D. 真武汤合五苓散
- E. 实脾饮

答案：D

解析：肺胀之阳虚水泛证：胸部膨满，憋闷如塞，咳痰清稀，胸闷心悸，面浮，下肢浮肿，甚则一身悉肿，腹部胀满有水，脘痞，纳差，尿少，怕冷，面唇青紫，舌苔白滑，舌体胖质黯，脉沉细。证机概要：心肾阳虚，水饮内停。治法：温肾健脾，化饮利水。代表方：真武汤合五苓散加减。

56. 患者平素眩晕，耳鸣，突然发生口舌歪斜，舌强语蹇，半身不遂，但其神志清楚，舌红，脉弦细数。其治法是

- A. 平肝潜阳，活血通络
- B. 祛风化痰通络
- C. 息风清火，豁痰开窍
- D. 滋阴潜阳，息风通络
- E. 以上均非

答案：D

解析：根据题干所述，可以明确诊断为中风（中经络），证型为阴虚风动证。肝肾阴虚，风阳内动，风痰瘀阻经络，故可出现上述症状。治疗宜选用能滋阴潜阳，息风通络的镇肝熄风汤。

57. 某患者，有哮喘反复发作史。气短声低，自汗，怕风，常易感冒，倦怠无力，食少便溏，或喉中时有轻度哮鸣，痰多质稀色白，舌质淡，苔白，脉细弱。其诊断是

- A. 虚喘，肺虚证
- B. 虚喘，肾虚证
- C. 哮喘缓解期，肺脾气虚证
- D. 哮喘缓解期，脾虚证

E. 哮喘缓解期，肾虚证

答案：C

解析：哮喘缓解期之肺脾气虚证

证候主症：有哮喘反复发作史。气短声低，自汗，怕风，常易感冒，倦怠无力，食少便溏，或喉中时有轻度哮鸣，痰多质稀色白，舌质淡，苔白，脉细弱。

58. 患者腹内积块明显，硬痛不移，面黯消瘦，纳食减少，时有寒热，舌紫暗苔薄，脉细涩。其证候是

- A. 瘀血内结证
- B. 正虚瘀结证
- C. 肝气郁滞证
- D. 食滞痰阻证
- E. 气滞血阻证

答案：A

解析：积证之瘀血内结证

证候主症：腹部积块明显，质地较硬，固定不移，隐痛或刺痛，形体消瘦，纳谷减少，面色晦暗黧黑，面颈胸臂或有血痣赤缕，女子可见月事不下，舌质紫或有瘀斑瘀点，脉细涩。

59. 患者胃痛隐隐，喜温喜按，空腹痛甚，得食痛减，神疲乏力，大便溏薄，舌淡苔白，脉虚弱。其治法是

- A. 清化湿热，理气和胃
- B. 化瘀通络，理气和胃
- C. 养阴益胃，和中止痛
- D. 温中健脾，和胃止痛
- E. 以上均非

答案：D

解析：胃痛之脾胃虚寒证

证候主症：胃痛隐隐，绵绵不休，喜温喜按，空腹痛甚，得食则缓，劳累或受凉后发作或加重，泛吐清水，神疲纳呆，四肢倦怠，手足不温，大便溏薄，舌淡苔白，脉虚弱或迟缓。

治法：温中健脾，和胃止痛。

60. 胸痹患者，女性，45岁。胸闷重而心痛微，痰多气短，肢体沉重，形体肥胖，遇阴雨天而易发作或加重，伴有倦怠乏力，纳呆便溏，咯吐痰涎，舌体胖大且边有齿痕，舌苔浊腻，脉滑。其证候是

- A. 寒凝气滞证

- B. 气虚血瘀证
- C. 饮邪上犯证
- D. 痰浊闭阻证
- E. 心血瘀阻证

答案：D

解析：胸痹之痰浊闭阻证

证候主症：胸闷重而心痛微，痰多气短，肢体沉重，形体肥胖，遇阴雨天而易发作或加重，伴有倦怠乏力，纳呆便溏，咯吐痰涎，舌体胖大且边有齿痕，苔浊腻或白滑，脉滑。61. 患者，男，46岁，头痛以前额为甚，面红，牙痛，便干，舌红苔黄，脉弦。处方用药加用白芷，其经络归属为

- A. 厥阴经
- B. 少阳经
- C. 太阳经
- D. 阳明经
- E. 少阴经

答案：D

解析：患者头痛特点是前额痛，牙痛，且用药有白芷，则可判断为阳明经。

62. 张某，女性，28岁。10分钟前进食冰淇淋后，出现呃逆，呃声沉缓有力，胸膈及胃脘不舒，得热则减，口淡不渴，舌苔白润，脉迟缓。其诊断是
- A. 呃逆脾胃阳虚证
 - B. 呃逆气机郁滞证
 - C. 呃逆之胃寒气逆证
 - D. 胃痛脾胃虚寒证
 - E. 呃逆胃火上逆证

答案：C

解析：呃逆之胃寒气逆证

证候主症：呃声沉缓有力，胸膈及胃脘不舒，得热则减，遇寒更甚，进食减少，喜食热饮，口淡不渴，舌苔白润，脉迟缓。

63. 李某，男性，40岁。反复胃脘疼痛8年，近2天，胃脘疼痛，似刀割，痛有定处，按之痛甚，痛时持久，食后加剧，入夜尤甚，黑便，舌质紫暗，脉涩。其治疗应首选的方剂是
- A. 身痛逐瘀汤
 - B. 复元活血汤
 - C. 血府逐瘀汤
 - D. 失笑散合丹参饮

- E. 桃核承气汤

答案：D

解析：胃痛之瘀血停胃证

证候主症：胃脘疼痛，如针刺，似刀割，痛有定处，按之痛甚，痛时持久，食后加剧，入夜尤甚，或见吐血黑便，舌质紫黯或有瘀斑，脉涩。

治法：化瘀通络，理气和胃。

代表方：失笑散合丹参饮加减。

64. 李某，男性，35岁。7天前因外出淋雨，出现高热，时时振寒，汗出烦躁，咳嗽痰多。现症：胸满作痛，转侧不利，咳吐浊痰，呈黄绿色，自觉喉间有腥味，口干咽燥，舌苔黄腻，脉滑数。其诊断是

- A. 肺痈溃脓期
- B. 咳嗽痰热蕴肺证
- C. 肺痈初期
- D. 肺痈恢复期
- E. 肺痈成痈期

答案：E

解析：肺痈之成痈期

证候主症：身热转甚，时时振寒，继则壮热，汗出烦躁，咳嗽气急，胸满作痛，转侧不利，咳吐浊痰，呈黄绿色，自觉喉间有腥味，口干咽燥，舌苔黄腻，脉滑数。

65. 患者，右足怕冷，麻木疼痛，间歇性跛行年余。近两个月来足痛加剧，夜难入寐，步履艰难，足背动脉搏动消失。应诊断为

- A. 痹证
- B. 脱疽
- C. 糖尿病足
- D. 下肢静脉炎
- E. 雷诺综合征

答案：B

解析：脱疽，其临床特点是好发于四肢末端，以下肢多见，初起患肢末端发凉怕冷，苍白，麻木，可伴间歇性跛行，继则疼痛剧烈，日久患趾（指）坏死变黑，甚至趾（指）节脱落。部分患者起病急骤，进展迅速，预后严重，需紧急处理。

66. 患者王某，便时肛内常有肿物脱出，色紫黯，甚则表面溃破糜烂，肛门坠痛，肛内指检有灼热感。舌红，苔黄腻，脉弦数。治

疗宜选用

- A. 萆薢渗湿汤
- B. 补中益气汤
- C. 马勃散
- D. 升麻葛根汤
- E. 以上均非

答案：A

解析：脱肛，湿热下注证

肛内肿物脱出，色紫黯或深红，甚则表面溃破。糜烂，肛内坠痛，肛内指检有灼热感。舌红，苔黄腻，脉弦数。

治法：清热利湿。

方药：萆薢渗湿汤加减。出血多者，加地榆、槐花、侧柏炭。

67. 患者外生殖器出现疣状赘生物，色灰，质软，表面秽浊潮湿，触之易出血，恶臭；伴小便黄或不畅；苔黄腻，脉滑或弦数。其证候是

- A. 血脉瘀阻证
- B. 湿热壅盛证
- C. 营血两伤证
- D. 邪毒内陷证
- E. 湿毒下注证

答案：E

解析：尖锐湿疣之湿毒下注证

证候：外生殖器或肛门等处出现疣状赘生物，色灰或褐或淡红，质软，表面秽浊潮湿，触之易出血，恶臭；伴小便黄或不畅；苔黄腻，脉滑或弦数。

治法：利湿化浊，清热解毒。

方药：萆薢化毒汤酌加黄柏、土茯苓、大青叶。

68. 患者，被毒蜂叮咬后引发皮炎，皮疹较多，成片红肿，水疱较大，瘀斑明显，皮疹附近淋巴结肿大；伴畏寒，发热，头痛，恶心，胸闷；舌红，苔黄，脉数。治疗方剂为

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 五味消毒饮合黄连解毒汤
- C. 萆薢化毒汤合黄连解毒汤
- D. 萆薢渗湿汤合龙胆泻肝汤
- E. 清瘟败毒饮合黄连解毒汤

答案：B

解析：虫咬皮炎热毒蕴结证

证候：皮疹较多，成片红肿，水疱较大，瘀斑明显，皮疹附近淋巴结肿大；伴畏寒，发热，头痛，恶心，胸闷；舌红，苔黄，脉数。治法：清热解毒，消肿止痒。

方药：五味消毒饮合黄连解毒汤加减。

69. 患者，女，46岁。肛门部突然剧烈疼痛，肛缘皮下有一触痛性肿物，排便、坐下、行走，甚至咳嗽等动作均可使疼痛加剧。其诊断是

- A. 静脉曲张性外痔
- B. 结缔组织性外痔
- C. 血栓性外痔
- D. 混合痔
- E. 内痔脱出

答案：C

解析：血栓性外痔的诊断：多发于截石位3、9点，病前有便秘、饮酒或用力负重等诱因。肛门部突然剧烈疼痛，肛缘皮下有一触痛性肿物，排便、坐下、行走，甚至咳嗽等动作均可使疼痛加剧。检查时在肛缘皮肤表面有一暗紫色圆形硬结节，界限清楚，触按痛剧。有时经3~5天血块自行吸收，疼痛缓解而自愈。

70. 患者尿路结石，发病急骤，腰腹疼痛，尿流突然中断，尿频，尿急，尿赤，血尿，舌红，苔黄腻，脉弦数。治疗应首选的方剂是

- A. 济生肾气丸
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 化坚二陈丸合石韦散
- D. 三金排石汤
- E. 金铃子散合石韦散

答案：D

解析：尿石症，湿热蕴结证：腰痛或小腹痛，或尿流突然中断，尿频，尿急，尿痛，小便混赤，或为血尿，口干欲饮。舌红，苔黄腻，脉弦数。

治法：清热利湿，通淋排石。

方药：三金排石汤加减。

71. 患者，男，38岁。左足大趾剧痛，日轻夜重，局部肿胀，皮肤紫暗，溃破腐烂，身热口干，舌红，苔黄腻，脉弦数。其辨证是

- A.寒湿阻络证
- B.血脉瘀阻证
- C.湿热毒盛证
- D.热毒伤阴证
- E.气阴两虚证

答案：C

解析：脱疽，湿热毒盛证：患肢剧痛，日轻夜重，局部肿胀，皮肤紫暗，浸淫蔓延，溃破腐烂，肉色不鲜；身热口干，便秘溲赤；舌红，苔黄腻，脉弦数。治法：清热利湿，解毒活血。代表方：四妙勇安汤加减。

72. 陈某，女，婚后5年未怀孕，月经多推后几天，经来小腹胀痛，经色紫黯，有血块，块下痛减，有时经行不畅；伴见肛门坠痛，性交痛；舌质紫黯，脉弦细涩。治疗选用
- A.少腹逐瘀汤
 - B.苍附导痰丸
 - C.百灵调肝汤
 - D.养精种玉汤
 - E.以上均非

答案：A

解析：不孕症之瘀滞胞宫证

主要证候：婚久不孕，月经多推后或周期正常，经来腹痛，甚或呈进行性加剧，经量多少不一，经色紫黯，有血块，块下痛减；有时经行不畅，淋漓难净，或经间出血；或肛门坠胀不适，性交痛；舌质紫暗或舌边有瘀点，苔薄白，脉弦或弦细涩。

治法：逐瘀荡胞，调经助孕。

方药：少腹逐瘀汤。

73. 已婚女性，26岁。月经延后2周，量少，色淡，质稀，心悸少寐，小腹绵绵作痛，面色苍白，舌淡苔薄白，脉细弱。治疗应首选
- A.大补元煎
 - B.十全大补汤
 - C.人参养营汤
 - D.补中益气汤
 - E.四君子汤

答案：A

解析：月经后期之血虚证

主要证候：周期延后，量少，色淡红，质清稀，或小腹绵绵作痛；或头晕眼花，心悸少

寐，面色苍白或萎黄；舌质淡红，脉细弱。

治法：补血益气调经。

方药：大补元煎。

74. 患者张某，经期烦躁易怒，头晕目眩，口苦咽干，胸胁胀满，不思饮食，月经量多，色深红，舌红，苔黄，脉弦数。其治法是
- A.清肝泄热，解郁安神
 - B.清热化痰，宁心安神
 - C.补血养心，安神定志
 - D.祛痰通络，安神定志
 - E.以上均非

答案：A

解析：经行情志异常肝经郁热证

主要证候：经前或经期，烦躁易怒，或抑郁不乐，头晕目眩，口苦咽干，胸胁胀满，不思饮食，月经量多，色深红；舌红，苔黄，脉弦数。

治法：清肝泄热，解郁安神。

方药：丹栀逍遥散加减。

75. 患者每值月经前后，大便泄泻，或五更泄泻，经色淡，质清稀；腰膝酸软，头晕耳鸣，畏寒肢冷；舌淡，苔白，脉沉迟。中医治法可采用
- A.健脾和胃，益气和血
 - B.疏肝健脾，燥湿止泻
 - C.温阳补肾，健脾止泻
 - D.健脾渗湿，理气调经
 - E.以上均非

答案：C

解析：经行泄泻之肾虚证

主要证候：经行或经后，大便泄泻，或五更泄泻，经色淡，质清稀；腰膝酸软，头晕耳鸣，畏寒肢冷；舌淡，苔白，脉沉迟。

治法：温阳补肾，健脾止泻。

方药：健固汤合四神丸。

76. 患者带下量多，色黄，如豆渣状，阴部瘙痒；脘闷纳差，舌红，苔黄腻，脉滑数。其治法是
- A.健脾益气，升阳除湿
 - B.温肾培元，固涩止带
 - C.滋肾益阴，清热利湿

D.清热利湿，疏风化浊

E.清利湿热，佐以解毒杀虫

答案：E

解析：带下过多湿热下注证

主要证候：带下量多，色黄或呈脓性，质黏稠，有臭气，或带下色白质黏，呈豆渣样，外阴瘙痒；小腹作痛，口苦口腻，胸闷纳呆，小便短赤；舌红，苔黄腻，脉滑数。

治法：清利湿热，佐以解毒杀虫。

方药：止带方。

77.患者，女，25岁，未婚。近半年经前.经期小腹胀痛，经血量少，行而不畅，血色黯有块，块下痛减，伴经行情志抑郁，乳房胀痛，舌紫暗，有瘀斑，脉弦涩。治疗应首选的方剂是

A.少腹逐瘀汤

B.当归芍药散

C.调肝汤

D.圣愈汤

E.膈下逐瘀汤

答案：E

解析：痛经之气滞血瘀证

主要证候：经前或经期小腹胀痛拒按，经血量少，行而不畅，血色紫黯有块，块下痛暂减；乳房胀痛，胸闷不舒；舌质紫黯或有瘀点，脉弦。

治法：理气行滞，化瘀止痛。

方药：膈下逐瘀汤。

78.患儿，3岁。平素饮食肥甘厚味，现症见汗出，以自汗为主，以额.心胸为甚，汗出肤热，汗渍色黄，口臭，口渴不欲饮，小便色黄，舌质红，苔黄腻，脉滑数。诊断为汗证，其治法为

A.益气养阴

B.调和营卫

C.益气固表

D.清热泻脾

E.清热固表

答案：D

解析：汗证之湿热迫蒸证

证候：汗出过多，以额.心胸为甚，汗出肤热，汗渍色黄，口臭，口渴不欲饮，小便色黄，

舌质红，苔黄腻，脉滑数。

治法：清热泻脾。

代表方剂：泻黄散。

79.患儿，5岁。诊断为猩红热，现壮热不解，烦躁口渴，咽喉肿痛，伴有糜烂白腐，皮疹密布，色红如丹，疹由颈.胸开始，继而弥漫全身，压之退色，舌面光红起刺，状如草莓，脉数有力。治疗首选的方剂是

A.益胃汤

B.沙参麦冬汤

C.竹叶石膏汤

D.增液承气汤

E.凉营清气汤

答案：E

解析：猩红热之毒炽气营证

症候：壮热不解，烦躁口渴，咽喉肿痛，伴有糜烂白腐，皮疹密布，色红如丹，甚则色紫如瘀点，疹由颈.胸开始，继而弥漫全身，压之退色，见疹后的1~2天舌苔黄糙，舌质起红刺，3~4天后舌苔剥落，舌面光红起刺，状如草莓，脉数有力。

治法：清气凉营，泻火解毒。

代表方剂：凉营清气汤。

80.患儿，3岁，诊断为肺炎喘嗽，证见咳喘日久不愈，伴有低热盗汗，手足心热，干咳少痰，面色潮红，口干便结，舌红少津，脉细数。其中医辨证为

A.肺脾气虚证

B.阴虚肺热证

C.气阴两虚证

D.风热郁肺证

E.毒热闭肺证

答案：B

解析：肺炎喘嗽之阴虚肺热证

证候：咳喘持久，低热盗汗，手足心热，干咳少痰，面色潮红，口干便结，舌红少津，苔少或花剥，脉细数，指纹淡紫。

治法：养阴清肺，润肺止咳。

代表方剂：沙参麦冬汤。

81.患儿，4岁。突然出现神昏惊厥，伴发热头痛，咳嗽流涕，咽红，舌苔薄黄，脉象浮

数。治疗应首选的方剂是

- A. 桑菊饮
- B. 紫雪丹
- C. 柴葛解肌汤
- D. 银翘散
- E. 银翘散合羚角钩藤汤

答案：D

解析：小儿急惊风之风热动风证

证候：起病急骤，常突然出现神昏惊厥，伴发热，头痛，鼻塞，流涕，咳嗽，咽痛，随即出现烦躁、神昏、惊风，舌苔薄白或薄黄，脉浮数。

治法：疏风清热，息风定惊。

代表方剂：银翘散。

82. 患儿，2岁。患有痫证，起病前常有惊吓史。每次发作时惊叫，吐舌，急啼，面色时红时白，惊惕不安，四肢抽搐，大便黏稠，舌淡红，舌苔白，指纹色青。治疗应首选的方剂是

- A. 镇惊丸
- B. 涤痰汤
- C. 定痫丸
- D. 远志丸
- E. 定魄丸

答案：A

解析：惊痫证

证候：起病前常有惊吓史。发作时惊叫，吐舌，急啼，神志恍惚，面色时红时白，惊惕不安，如人将捕之状，四肢抽搐，舌淡红，舌苔白，脉弦滑，乍大乍小，指纹色青。治法：镇惊安神。

代表方剂：镇惊丸。

83. 患儿，8个月。晨起啼哭不安，阵阵捧腹啼叫，已解清稀大便3次，便多泡沫，臭气轻，可闻肠鸣，恶寒发热，鼻流清涕，指纹淡红。其证候是

- A. 脾虚泻
- B. 脾肾阳虚泻
- C. 湿热泻
- D. 风寒泻
- E. 伤食泻

答案：D

解析：风寒泻证

证候：大便清稀，夹有泡沫，臭气不甚，肠鸣腹痛，或伴恶寒发热，鼻流清涕，咳嗽，舌质淡，苔薄白，脉浮紧，指纹淡红。

治法：疏风散寒，化湿和中。

代表方剂：藿香正气散。

84. 患儿，1岁。形体消瘦显著，面色萎黄，食欲不振，肚腹膨胀，青筋暴露，毛发稀疏结穗，精神烦躁，夜卧不宁，舌淡苔腻，脉沉细而滑。诊断为疳证，治疗宜用

- A. 健脾丸
- B. 资生健脾丸
- C. 消食导滞丸
- D. 肥儿丸
- E. 八珍汤

答案：D

解析：疳证之疳积证：

症状：形体明显消瘦，面色萎黄，肚腹膨胀，甚则青筋暴露，毛发稀疏结穗，精神烦躁，夜卧不宁，或见揉眉挖鼻，吮指磨牙，动作异常，食欲不振或善食易饥，或嗜食异物，舌淡苔腻，脉沉细而滑。

治法：消积理脾。

方药：肥儿丸加减。

85. 患儿流涕、咳嗽4天后，高热不退咳嗽喘促，鼻扇，喉中痰声漉漉，口唇发绀。其证 A. 痰热咳嗽

- B. 心阳虚衰
- C. 风寒闭肺
- D. 风热闭肺
- E. 痰热闭肺

答案：E

解析：患儿咳嗽4天后，高热不退咳嗽喘促，鼻扇，喉中痰声漉漉，口唇发绀，属肺炎喘咳之痰热闭肺。

86. 男性，56岁，身高175cm，体重75kg，因2个月内体重下降5kg而就诊，查空腹血糖7.9mmol/L，下列正确的是

- A. 可诊断糖尿病
- B. 应进行口服葡萄糖耐量试验
- C. 可诊断继发性糖尿病

D.可诊断糖耐量减低

E.应进行 100g 口服葡萄糖耐量试验

答案：A

解析：患者 2 个月内体重下降 5kg 并伴有空腹血糖 7.9mmol/L \geq 7.0mmol/L 因此诊断为糖尿病。糖尿病诊断标准：1.空腹血糖：3.9~6.0mmol/L 为正常；6.1~6.9mmol/L 为空腹血糖受损； \geq 7.0mmol/L 应考虑糖尿病。

2.口服葡萄糖耐量试验：2hPG 低于 7.7mmol/L 为正常糖耐量；7.8~11.0mmol/L 为糖耐量减低； \geq 11.1mmol/L 应考虑糖尿病。

3.糖尿病的诊断标准：糖尿病症状加任意时间血浆葡萄糖 \geq 11.1mmol/L 或空腹血糖 \geq 7.0mmol/L，或口服葡萄糖耐量试验 2hPG \geq 11.1mmol/L。需重复一次确认，诊断才能成立。

87.男性，39 岁，发作时先觉胃部一股气体上升，并有咀嚼、吞咽动作，喃喃自语，走动，似在找东西，呼唤无反应，持续约 4 分钟。

其癫痫的发作类型是

A.强直-阵挛性发作

B.失神发作

C.复杂部分性发作

D.脑缺血发作

E.假性发作

答案：C

解析：根据患者癫痫发作时的症状“先觉胃部一股气体上升，并有咀嚼、吞咽动作，喃喃自语，走动，似在找东西，呼唤无反应，持续约 4 分钟。”可知为癫痫复杂部分性发作。癫痫复杂部分性发作：均有意识障碍，发作时患者对外界刺激无反应，发作后不能或部分不能复述发作的细节。其典型发作特征为发作起始出现错觉、幻觉、似曾相识感、恐惧、胃气上升感、心悸等症状，随后出现意识障碍、自动症和遗忘症；有时发作开始即为意识障碍，持续数分钟至数十分钟；有的仅有意识障碍。自动症患者往往先瞪视不动，然后做出协调无意识 88.患者高热、胸痛、咳嗽、咳痰，经检查诊断为肺炎链球菌肺炎，其治疗应首选的药物

A.青霉素

B.红霉素 C.

甲硝唑 D.

氧氟沙星

E.头孢唑啉钠

答案：A

解析：肺炎链球菌肺炎一经确诊即应予以抗生素治疗，不必等待细菌培养结果。首选青霉素 G，用药途径及剂量视病情轻重及有无并发症而定。对青霉素过敏者，可用红霉素或阿奇霉素、林可霉素等。

89.患者 59 岁，COPD 病史 11 年，近来因咳嗽、痰喘加重就诊，查体示 P2 亢强，剑突下可触及心脏搏动，该患者最可能的诊断是

A.合并支气管肺炎

B.合并支气管扩张

C.合并冠心病

D.慢性肺源性心脏病

E.COPD 急性加重期

答案：D

解析：依据病史诊断为慢性肺源性心脏病。患者 COPD 病史 11 年，近来咳嗽、痰喘加重。且 P2 亢强，剑突下可触及心脏搏动是肺动脉高压和右心室肥大的表现，符合慢性肺源性心脏病的临床表现：1.原发疾病表现 COPD 病史最常见。2.肺动脉高压和右心室肥大体征（1）肺动脉高压：肺动脉瓣区 S2 亢进。（2）右心室肥大：心浊音界向左扩大，剑突下触及心脏收缩期搏动，三尖瓣区闻及收缩期杂音。

90.男性，36 岁，反复浮肿，高血压 4 年，近日常气明显，深大呼吸，查血红蛋白 60g/L，双肺呼吸音清晰，未闻及啰音，心率 92 次/分，节律整齐。患者气喘最可能的原因是 A.

心功能不全

B.贫血

C.酸中毒

D.上呼吸道感染

E.水肿

答案：C

解析：患者无明显其他疾病，高血压 4 年，反复浮肿，考虑慢性肾衰竭导致代谢产物潴留、水电解质和酸碱平衡失调及各系统损害的临床综合征，严重酸中毒时出现深大呼吸。91.女性，54 岁，类风湿关节炎病史 5 年，可生活自理，不能参加工作，活动受限，其关节功能障碍的分级是

A. I 级

- B. II级
- C. III级
- D. IV级
- E. V级

答案: C

解析: 关节功能障碍分级应为II级。关节功能障碍分为4级: I级: 能照常进行日常生活和工作; II级: 能生活自理, 并参加一定工作, 但活动受限; III级: 仅能生活自理, 不能参加工作和其他活动; IV级: 生活不能自理。

92. 女性, 29岁, 因手部关节疼痛、肿胀就诊。发病前有病毒性呼吸道感染史, 慢性起病, 逐渐加重。下列检查结果中, 有助于鉴别类风湿关节炎与系统性红斑狼疮的是

- A. 轻度贫血
- B. 血沉增快
- C. C反应蛋白升高
- D. 心脏超声示少量心包积液
- E. 手部X线检查未见骨质改变

答案: E

解析: 手部X线检查是否见骨质改变是二者主要区别。系统性红斑狼疮早期出现手部关节炎时, 须与类风湿关节炎相鉴别。系统性红斑狼疮特点: ①X线检查无关节骨质改变; ②多为女性; ③常伴有面部红斑等皮肤损害; ④多数有肾损害或多脏器损害; ⑤血清抗核抗体和抗双链DNA抗体显著增高。

93. 女性, 47岁, 既往健康, 晨练时突然出现剧烈头痛伴喷射性呕吐, 拟诊为蛛网膜下腔出血, 尽快确诊应首选的检查是

- A. 脑血流图
- B. 脑脊液检查
- C. 脑血管造影
- D. 出凝血项目检测
- E. 免疫学检查

答案: B

解析: 蛛网膜下腔出血腰穿如果有脑脊液呈血性, 即可给予确诊。所以选B。

94. 男性, 40岁, 慢性肝炎病史14年, 近来腹胀、消瘦。查体: 巩膜黄染, 右上腹部触到拳头大、质硬、表面不光滑包块。最可能的诊断是

- A. 原发性肝癌

- B. 转移性肝癌
- C. 慢性活动性肝炎
- D. 肝脓肿
- E. 肝硬化

答案: A

解析: 凡有肝病史的中年人, 尤其是男性患者, 如有不明原因的肝区疼痛、消瘦、进行性肝肿大, 肝质地坚硬, 边缘不规则, 表面呈结节状应考虑原发性肝癌, 需进一步明确诊断。

A3

(95-97题共用题干)

患者男性, 56岁, 肢体颤动粗大, 程度较重, 不能自制, 眩晕耳鸣, 面赤烦躁, 易激动, 心情紧张时颤动加重, 伴有肢体麻木, 口苦而干, 语言迟缓不清, 流涎, 尿赤, 大便干, 舌质红, 苔黄, 脉弦。

95. 该病诊断为

- A. 颤证
- B. 痹证
- C. 痿证
- D. 癩证
- E. 癲证

答案: A

解析: 颤证风阳内动证

肢体颤动粗大, 程度较重, 不能自制, 眩晕耳鸣, 面赤烦躁, 易激动, 心情紧张时颤动加重, 伴有肢体麻木, 口苦而干, 语言迟缓不清, 流涎, 尿赤, 大便干, 舌质红, 苔黄, 脉弦。

治法: 镇肝息风, 舒筋止颤。

代表方: 天麻钩藤饮合镇肝息风汤加减。

96. 该病治法为

- A. 平肝潜阳, 熄风活络
- B. 舒筋止颤, 镇肝熄风
- C. 填精补髓, 育阴熄风
- D. 益气养血, 濡养筋脉
- E. 清热化痰, 平肝熄风

答案: B

解析: 颤证风阳内动证

肢体颤动粗大, 程度较重, 不能自制, 眩晕耳鸣, 面赤烦躁, 易激动, 心情紧张时颤动加重, 伴有肢体麻木, 口苦而干, 语言迟缓不清, 流涎, 尿赤, 大便干, 舌质红, 苔黄,

脉弦。

治法：镇肝息风，舒筋止颤。

代表方：天麻钩藤饮合镇肝息风汤加减。

97. 该病代表方剂是

A. 导痰汤合羚角钩藤汤

B. 人参养荣汤

C. 龟鹿二仙膏

D. 天麻钩藤汤合镇肝息风汤加减

E. 地黄饮子

答案：D

解析：颤证风阳内动证

肢体颤动粗大，程度较重，不能自制，眩晕耳鸣，面赤烦躁，易激动，心情紧张时颤动加重，伴有肢体麻木，口苦而干，语言迟缓不清，流涎，尿赤，大便干，舌质红，苔黄，脉弦。

治法：镇肝息风，舒筋止颤。

代表方：天麻钩藤饮合镇肝息风汤加减。

(95-97 题共用题干)

患者，女性，48岁。既往有焦虑、忧愁病史，常因情志抑郁起病。此次因与他人发生争执后，症状加重。遂来就诊。现症见：情绪不宁，心悸健忘，失眠多梦，五心烦热，盗汗，口咽干燥，舌红少津，脉细数。

98. 其中医诊断为

A. 郁证

B. 癲证

C. 痫证

D. 狂证

E. 虚火喉痹

答案：A

解析：郁证的诊断要点：

(1) 以忧郁不畅，情绪不宁，胸胁胀满疼痛为主要临床表现，或有易怒易哭，或有咽中如有炙脔，吞之不下，咯之不出之特殊症状。

(2) 患者大多数有忧愁、焦虑、悲哀、恐惧、愤懑等情志内伤的病史。并且郁证病情的反复常与情志因素密切相关。

(3) 多发于青中年女性。无其他病证的症状及体征。

99. 其中医辨证为

A. 心脾两虚证

B. 气郁化火证

C. 心肾阴虚证

D. 肝气郁结证

E. 心神失养证

答案：C

解析：郁证心肾阴虚证

证候主症：情绪不宁，心悸，健忘，失眠，多梦，五心烦热，盗汗，口咽干燥，舌红少津，脉细数。

证机概要：阴精亏虚，阴不涵阳。

治法：滋养心肾。

代表方：天王补心丹合六味地黄丸加减

100. 治疗宜首选的方剂是

A. 归脾汤

B. 天王补心丹

C. 羚角钩藤汤

D. 镇肝息风汤

E. 甘麦大枣汤

答案：B

解析：郁证心肾阴虚证

证候主症：情绪不宁，心悸，健忘，失眠，多梦，五心烦热，盗汗，口咽干燥，舌红少津，脉细数。

证机概要：阴精亏虚，阴不涵阳。

治法：滋养心肾。

代表方：天王补心丹合六味地黄丸加减

(101-103 题共用题干)

患者于某，女性，58岁。两年前曾患“中风”，经治已愈，之后逐渐出现善忘呆滞，言语模糊不清，行为古怪孤僻，时哭时笑，症见两目黯晦，舌黯，脉细涩。

101. 其诊断是

A. 中风恢复期

B. 中风后遗症

C. 郁证

D. 健忘

E. 痴呆

答案：E

解析：痴呆是由髓减脑消，神机失用所导致的一种神志异常的疾病，以呆傻愚笨、智能低下、善忘等为主要临床表现。

102. 其辨证分型是

A. 髓海不足证

- B.瘀血内阻证
- C.风痰瘀阻证
- D.气虚络瘀证
- E.痰浊蒙窍证

答案：B

解析：瘀血内阻证

证候：表情迟钝，言语不利，善忘，易惊恐，或思维异常，行为古怪，伴肌肤甲错，口干不欲饮，双目晦暗，舌质暗或有瘀点瘀斑，脉细涩。

证机概要：瘀血阻滞，脑脉痹阻。

治法：活血化瘀，开窍醒脑。

代表方：通窍活血汤加减。

103. 其治法是

- A.活血化瘀，开窍醒脑
- B.豁痰开窍，健脾化浊
- C.祛风化痰，通络化瘀
- D.益气养血，化瘀通络
- E.搜风化痰，行瘀通络

答案：A

解析：瘀血内阻证

证候：表情迟钝，言语不利，善忘，易惊恐，或思维异常，行为古怪，伴肌肤甲错，口干不欲饮，双目晦暗，舌质暗或有瘀点瘀斑，脉细涩。

证机概要：瘀血阻滞，脑脉痹阻。

治法：活血化瘀，开窍醒脑。

代表方：通窍活血汤加减。

(104-106 题共用题干)

患者，女，52岁。肉瘿病史3年，近来颈前肿块突然增大，质地坚硬如石，推之不动。

104. 应首先考虑的是

- A. 失荣
- B. 瘰疬
- C. 瘰疬
- D. 气瘿
- E. 石瘿

105. 以下不属于此病病因病机的是

- A. 情志不畅
- B. 气滞血瘀
- C. 肉瘿日久转化而来
- D. 痰瘀互结
- E. 外感风邪

106. 首选治疗方法为

- A. 手术切除
- B. 化疗
- C. 理疗
- D. 化疗配理疗
- E. 阳和膏外涂

104. 答案：E

解析：

105. 答案：E

解析：

106. 答案：A

解析：瘿病坚硬如石不可移动者，称为石瘿。其特点是结喉两侧结块，坚硬如石，高低不平，推之不移。故《三因方》说：“坚硬不可移者，名曰石瘿。”好发于40岁以上中年人。相当于西医的甲状腺癌。石瘿病因病机：由于情志内伤，肝脾气逆，痰湿内生，气滞则血瘀，瘀血与痰湿凝结，上逆于颈部而成。亦有由肉瘿日久转化而来。石瘿的治疗原则：石瘿为恶性肿瘤，一旦确诊，宜早期手术切除。

(107-109 题共用题干)

患者，女，33岁，已婚。经血非时而下，淋漓不尽，色紫暗。有块。小腹胀痛。舌紫苔薄白，脉涩。

107. 辨病为

- A. 崩漏
- B. 经间期出血
- C. 经期延长
- D. 月经先后无定期
- E. 痛经

108. 辨证为

- A. 血瘀证
- B. 脾虚证
- C. 虚热证
- D. 肾虚证
- E. 气虚证

109. 治疗首选

- A. 固冲汤
- B. 固本止崩汤
- C. 右归丸
- D. 清热固经汤
- E. 逐瘀止血汤

107. 答案: A

解析:

108. 答案: A

解析:

109.E

解析:崩漏之血瘀证。主要证候:经血非时而下,量时多时少,时出时止,或淋漓不断,或停闭数月又突然崩中,继之漏下,经色暗有血块;小腹疼痛或胀痛;舌质紫黯或尖边有瘀点,脉弦细或涩。治法:活血化瘀,固冲止血。方药:逐瘀止血汤

(110-112 题共用题干)

患儿,2岁。发热咳嗽2天,高热烦躁,咳嗽喘促,气急鼻煽,呼吸困难,突见面色苍白,口唇紫绀,精神萎靡,肋下痞块,舌质紫,苔薄白,指纹紫滞。

110. 根据患者症状此病辨证为

- A. 风热闭肺
- B. 毒热闭肺
- C. 邪陷厥阴
- D. 心阳虚衰
- E. 痰热闭肺

111. 治疗宜采用的治法为

- A. 辛温宣肺,化痰止咳.
- B. 温补心阳,救逆固脱
- C. 清心开窍,平肝息风
- D. 补肺益气,健脾化痰
- E. 清热涤痰,开肺定喘

112. 治疗采用的代表方为

- A. 麻杏石甘汤合葶苈大枣泻肺汤
- B. 人参五味子汤
- C. 参附龙牡救逆汤
- D. 羚角钩藤汤合牛黄清心丸
- E. 麻杏石甘汤

110. 答案: D

解析:

111. 答案: B

解析:

112. 答案: C

解析: 小儿肺炎喘嗽心阳虚衰证。证候:面色苍白,唇指紫绀,呼吸浅促困难,四肢不温,多汗,肋下痞块,心悸动数,虚烦不安,神委淡漠,小便减少,舌质淡紫,脉细弱疾

数,指纹紫滞,可达命关。治法:温补心阳,救逆固脱。代表方剂:参附龙牡救逆汤。

(113-118 题共用题干)

男,24岁。突然意识不清,跌倒,全身强直数秒钟后抽搐,咬破舌。2分钟后抽搐停止。醒后活动正常。

113. 首选应考虑的疾病是

- A. 脑出血
- B. 脑血栓
- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 癫痫
- E. 脑栓塞

答案: D

解析: 由于脑供血不足所引起的短暂性.弥漫性缺血性晕厥与癫痫发作的主要区别是前者的缺血症状多于刺激症状,肢体的无力.肌张力低下更多见。脑源性的晕厥多有动脉硬化的指征。癫痫全身发作,可表现意识丧失,双侧强直后紧接着有阵挛的序列活动;全身骨骼肌持续性收缩;眼球上翻或凝视,咀嚼肌收缩出现口强张,随后猛烈闭合,之后转为痉挛,过后肌张力松弛,意识逐渐恢复。

114. 应进一步做的检查是

- A. 头颅 X 线片
- B. 脑电图
- C. 脑脊液检查
- D. 脑血管造影
- E. 经颅超声多普勒(TCD)

答案: B

解析: 脑电图是诊断癫痫最重要的辅助诊断依据。

115. 治疗的首选药物是

- A. 降压药
- B. 溶栓治疗
- C. 止血药
- D. 扩血管药
- E. 抗癫痫药

答案: E

解析: 通过脑电图与临床症状诊断为癫痫,因此服用抗癫痫药。

(116-118 题共用题干)

男性，55岁的心房颤动患者，近期反复出现发作性眩晕，眼球震颤，伴有恶心、呕吐，每次持续10分钟。查体无神经系统异常。急诊CT未发现与症状相关的病灶。

116. 目前可能的诊断是

- A. 脑动脉瘤
- B. 脑血栓形成
- C. 脑出血
- D. 脑血管畸形
- E. 短暂性脑缺血发作

答案：E

解析：发作性的运动性失语，均于24小时内缓解，查体无神经系统异常，脑CT无异常，符合短暂性脑缺血发作。

117. 出现以上症状及体征，完全恢复最长应在

- A. 6小时内
- B. 12小时内
- C. 24小时内
- D. 48小时内
- E. 72小时内

答案：C

解析：短暂性脑缺血发作（TIA）是指局部脑动脉血供不足引起局部脑组织或视网膜缺血，出现短暂的神经功能缺失的一组疾病，临床症状一般持续不超过1小时，24小时内完全恢复，无本次事件的责任病灶的证据。118. 预防复发应首先的药物是

- A. 阿司匹林
- B. 低分子右旋糖酐
- C. 丙戊酸钠
- D. 胞二磷胆碱
- E. 降纤酶

答案：A

解析：血小板抑制剂，如阿司匹林，可减少栓子发生，预防复发。

C. 延胡索、川楝子

D. 茵陈、黄柏

E. 大黄、芒硝

119. 胁痛肝胆湿热证，若兼见发热、黄疸，应加用

答案：D

解析：胁痛肝胆湿热证，若兼见发热、黄疸者，加茵陈、黄柏以清热利湿退黄。

120. 胁痛肝胆湿热证，如砂石阻滞胆道，应加用

答案：B

解析：若湿热煎熬，结成砂石，阻滞胆道，症见胁肋剧痛，连及肩背者，可加金钱草、海金沙、郁金、川楝子。

A. 小便混浊，白如泔浆，尿道不痛

B. 小便混浊，状如脂膏，尿热涩痛

C. 发热，小便赤热，尿时灼痛

D. 排出砂石，排尿中断，腰酸绞痛

E. 小腹胀满，尿涩疼痛，余沥不尽

121. 膏淋的临床特点是

答案：B

解析：A是尿浊的临床特点。B是膏淋的临床特点。C是热淋的临床特点。D是石淋的临床特点。E是气淋的临床特点。膏淋与尿浊的最大区别就是有无尿痛。

122. 尿浊的临床特点是

答案：A

解析：A是尿浊的临床特点。B是膏淋的临床特点。C是热淋的临床特点。D是石淋的临床特点。E是气淋的临床特点。膏淋与尿浊的最大区别就是有无尿痛。

A. 左归丸

B. 大补元煎

C. 滋水清肝饮

D. 黄连阿胶汤

E. 二阴煎

123. 治肾精不足之眩晕首选

答案：A

解析：眩晕肾精不足证

证候主症：眩晕日久不愈，精神萎靡，腰酸膝软，少寐多梦，健忘，两目干涩，视力减退，或遗精滑泄，耳鸣齿摇。或颧红咽干，

B1

A. 黄芩、黄连

B. 金钱草、海金沙

五心烦热，舌红少苔，脉细数；或面色（白光）白，形寒肢冷，舌淡嫩，苔白，脉弱尺甚。
治法：滋养肝肾，益精填髓。

代表方：左归丸加减。

124. 治疗肾虚头痛首选

答案：B

解析：肾虚头痛

证候主症：头痛且空，眩晕耳鸣，腰膝酸软，神疲乏力，滑精或带下，舌红少苔，脉细无力。

治法：养阴补肾，填精生髓。

代表药：大补元煎加减。

A. 暖气呃逆，呕吐痰涎

B. 水饮不下，面浮足肿

C. 胸膈痞胀，暖气则舒

D. 胸膈刺痛，痛处固定不移

E. 食道干涩，饮食难下

125. 噎膈痰气交阻证的主症特点是

答案：A

解析：噎膈之痰气交阻证

证候主症：吞咽梗阻，胸膈痞满，或疼痛，情志抑郁时则加重，暖气呃逆，呕吐痰涎，口干咽燥，大便艰涩，舌质红，苔薄腻，脉弦滑。

126. 噎膈瘀血内结者的主症特点是

答案：D

解析：噎膈之瘀血内结证

证候主症：饮食梗阻难下，或虽下而复吐出，甚或呕出物如赤豆汁，胸膈疼痛，固着不移，肌肤枯燥，形体消瘦，舌质紫暗，脉细涩。

A. 防风通圣散

B. 龙胆泻肝汤

C. 当归饮子

D. 消风散

E. 麻黄桂枝各半汤

127. 治疗瘾疹风寒束表证，采用的治疗方药为

128. 治疗瘾疹风热犯表证，采用的治疗方药为

127. 答案：E

解析：瘾疹之风寒束表证。证候：风团色白，

遇寒加重，得暖则减；恶寒怕冷，口不渴；舌淡红，苔薄白，脉浮紧。治法：疏风散寒止痒。方药：麻黄桂枝各半汤加减。

128. 答案：D

解析：瘾疹之风热犯表证。证候：风团鲜红，灼热剧痒，遇热加重，得冷则减；伴有发热，恶寒，咽喉肿痛；舌质红，苔薄白或薄黄，脉浮数。

治法：疏风清热止痒。方药：消风散加减。

A. 清热凉血，解毒消斑

B. 清利湿热，解毒通络

C. 养血滋阴，润肤息风

D. 清热泻火，凉血解毒

E. 活血化瘀，解毒通络

129. 治疗白疮湿毒蕴阻证，采用的治疗方法为

130. 治疗白疮火毒炽盛证，采用的治疗方法为

129. 答案：B

解析：白疮湿毒蕴阻证。证候：皮损多发生在腋窝、腹股沟等皱褶部位，红斑糜烂，痂屑黏厚，瘙痒剧烈；或掌跖红斑、脓疱、脱皮；或伴关节酸痛、肿胀、下肢沉重；舌质红，苔黄腻，脉滑。治法：清利湿热，解毒通络。

方药：萆薢渗湿汤加减。

130. 答案：D

解析：白疮火毒炽盛证。证候：全身皮肤潮红、肿胀、灼热痒痛，大量脱皮，或有密集小脓疱；伴壮热、口渴、头痛、畏寒，大便干燥，小便黄赤；舌红绛，苔黄腻，脉弦滑数。治法：清热泻火，凉血解毒。方药：清瘟败毒饮加减。

A. 疏肝理气，散瘀除热

B. 滋养肝肾，育阴清热

C. 补益血气，甘温除热

D. 补益肾气，清热调经

E. 活血化瘀，清热凉血

131. 经行发热肝肾阴虚证的治法是

132. 经行发热血气虚弱证的治法是

131. 答案：B

解析：经行发热肝肾阴虚证。主要证候：经

期或经后，午后潮热，月经量少，色红；两颧红赤，五心烦热，烦躁少寐；舌红而干，脉细数。治法：滋养肝肾，育阴清热。方药：蒿芩地丹四物汤。

132. 答案：C

解析：经行发热血气虚弱证。主要证候：经行或经后发热，热势不扬，动则自汗出，经量多，色淡质薄；神疲肢软，少气懒言；舌淡，苔白润，脉虚缓。治法：补益血气，甘温除热。方药：补中益气汤。

- A. 血热证
- B. 血虚证
- C. 气虚证
- D. 血瘀证
- E. 气滞证

133. 恶露量多，色紫红，有块，腹痛拒按，其辨证是

134. 恶露量多，色红有臭气，其辨证是

133. 答案：D

解析：恶露量多或少。色紫红。有块。小腹痛拒按，多属血瘀；恶露量多。色红有臭气，多属血热；恶露量多。色淡质稀。神疲乏力，多属气虚；产后大便干涩难下，大多属津血不足；乳汁甚少。质稀薄，食少神疲。面色无华者，多属气血虚弱。

134. 答案：A

解析：恶露量多或少。色紫红。有块。小腹痛拒按，多属血瘀；恶露量多。色红有臭气，多属血热；恶露量多。色淡质稀。神疲乏力，多属气虚；产后大便干涩难下，大多属津血不足；乳汁甚少。质稀薄，食少神疲。面色无华者，多属气血虚弱。

- A. 热.烦.渴.饮，疹稠色暗，神昏抽搐
- B. 热.咳.喘.痰，疹稠色暗
- C. 热.咳.涕.泪，麻疹黏膜斑
- D. 热.烦.汗出，皮疹透发 E.

疹没脱屑，低热不退

135. 麻疹邪犯肺卫证的主要证候是

136. 麻疹邪入肺胃证的主要证候是

135. 答案：C

解析：麻疹之邪犯肺卫证（初热期）。证候：发热咳嗽，微恶风寒，喷嚏流涕，咽喉肿痛，

两目红赤，泪水汪汪，畏光羞明，神烦哭闹，纳减口干，小便短少，大便不调。发热第 2~3 天，口腔两颊黏膜红赤，贴近白齿处可见麻疹黏膜斑，周围红晕。舌质偏红，苔薄白或薄黄，脉象浮数。治法：辛凉透表，清宣肺卫。代表方剂：宣毒发表汤。

136. 答案：D

解析：麻疹之邪入肺胃证（出疹期）。证候：壮热持续，起伏如潮，肤有微汗，烦躁不安，目赤眵多，咳嗽阵作，皮疹布发，疹点由细小稀少而逐渐稠密，疹色先红后暗，皮疹凸起，触之碍手，压之退色，大便干结，小便短少，舌质红赤，苔黄腻，脉数有力。治法：清凉解毒，透疹达邪。代表方剂：清解透表汤。

- A. 透疹凉解汤
- B. 银翘散合养阴清肺汤
- C. 桑菊饮
- D. 麻杏石甘汤
- E. 银翘散

137. 奶麻邪郁肌表首选的方剂是

138. 奶麻毒透肌肤首选的方剂是

137. 答案：E

解析：奶麻之邪郁肌表证。证候：骤发高热，持续 3~4 天，神情正常或稍有烦躁，饮食减少，偶有凶填，或见抽风，咽红，舌质偏红，苔薄黄，指纹浮紫。治法：疏风清热，宣透邪毒。代表方剂：银翘散。

138. 答案：B

解析：奶麻之毒透肌肤证。证候：身热已退，肌肤出现玫瑰红色小丘疹，皮疹始见于躯干部，很快延及全身，约经 1~2 天皮疹消退，肤无痒感，或有口干。纳差，舌质偏红，苔薄少津，指纹淡紫。治法：清热生津，以助康复。代表方剂：银翘散合养阴清肺汤。

- A. 甲状腺呈弥漫性或结节性肿大，¹³¹I 摄取率高但能够被 T₃ 所抑制，对 TRH 反应正常
- B. 心悸、出汗、怕热、粗大肌肉震颤，但测定甲状腺功能正常，无突眼
- C. 甲状腺肿大大多呈弥漫性、对称性，较软，可伴震颤及杂音，有突眼，吸碘率增高伴高峰前移

D.有发热，短期内甲状腺肿大，触之坚硬而疼痛。白细胞正常或升高，血沉增高，摄 131 碘率下降

E.易疲劳、怕冷、体重增加、嗜睡，血清 TSH 增高，TT3、TT4 降低

139.Graves 病的特点是

139.答案：C

解析：甲状腺肿大大多呈弥漫性、对称性，较软，可伴震颤及杂音，有突眼，吸碘率增高伴高峰前移是 Graves 病的特点。

140.亚急性甲状腺炎的特点是

140.答案：D

解析：发病与病毒感染有关。多有发热，短期内甲状腺肿大，触之坚硬而疼痛。白细胞正常或升高，血沉增高，摄 131 碘率下降，TGAb、TPOAb 正常或轻度升高。

A. PaO₂ 为 50mmHg，PaCO₂ 为 40mmHg

B. PaO₂ 为 50mmHg，PaCO₂ 为 60mmHg

C. PaO₂ 为 65mmHg，PaCO₂ 为 40mmHg

D. PaO₂ 为 70mmHg，PaCO₂ 为 40mmHg

E. PaO₂ 为 70mmHg，PaCO₂ 为 45mmHg

141.符合 I 型呼吸衰竭的动脉血气标准是

141.答案：A

解析：I 型呼吸衰竭的动脉血气标准是 PaO₂ 为 50mmHg，PaCO₂ 为 40mmHg。

142.符合 II 型呼吸衰竭的动脉血气标准是

142.答案：B

解析：II 型呼吸衰竭的动脉血气标准是 PaO₂ 为 50mmHg，PaCO₂ 为 60mmHg。

A.黄疸

B.呕吐

C.腹泻

D.血便

E.急性发热

143.肠梗阻可见腹痛，并伴有

143.答案：B

解析：腹痛伴腹胀、呕吐隔餐或隔日食物，见于幽门梗阻；伴腹胀、呕吐、停止排便排气，提示肠梗阻。

144.肠套叠可见腹痛，并伴有

144.答案：D

解析：腹痛伴血便，急性者见于急性细菌性

痢疾、肠套叠、绞窄性肠梗阻、急性出血性坏死性结肠炎、过敏性紫癜等；慢性者可见于慢性菌痢、肠结核、结肠癌等；柏油样便提示上消化道出血；鲜血便提示下消化道出血。

A.鼠疫、霍乱

B.狂犬病、流行性乙型脑炎

C.登革热、炭疽

D.阿米巴性痢疾、肺结核

E.黑热病、包虫病

145.丙类传染病是

146.甲类传染病是

145.答案：E

解析：甲类传染病是指：鼠疫、霍乱。丙类传染病是指：流行性感冒、流行性腮腺炎、风疹、急性出血性结膜炎、麻风病、流行性和地方性斑疹伤寒、黑热病、包虫病、丝虫病，除霍乱、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒以外的感染性腹泻病。

146.答案：A

解析：甲类传染病是指：鼠疫、霍乱。丙类传染病是指：流行性感冒、流行性腮腺炎、风疹、急性出血性结膜炎、麻风病、流行性和地方性斑疹伤寒、黑热病、包虫病、丝虫病，除霍乱、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒以外的感染性腹泻病。

A.肥达反应

B.临床表现

C.尿培养

D.粪便培养

E.血培养

147.流脑确诊的依据是

148.伤寒确诊的依据是

147.答案：E

解析：取流脑患者的血液、脑脊液、骨髓等作病原菌培养，阳性者可确诊。

148.答案：E

解析：伤寒确诊有赖于血或骨髓培养检出伤寒杆菌。

A.医师的社会地位

B.医师的执业条件

C.医师的职责

D.医师的权利

E.医师的义务

149. 医师在执业活动中遵守法律规定和技术操作规范体现了

150. 医师在执业活动中，人格尊严、人身安全不受侵犯体现了

149. 答案：E

解析：遵守法律、法规，遵守技术操作规范属于执业医师的义务。

150. 答案：D

解析：在执业活动中，人格尊严、人身安全不受侵犯属于执业医师的权利。