

中医执业助理医师资格考试 历年真题精编 “5+2+1”

金英杰医学教育研究院 编

编委会成员	张云清	孔繁清	赵鸿峰
	刘洋	王冬竹	赵静
	王安琪	赵广华	郭宽
	杨庭瑜	高延凤	王磊
	谢丽	许晓兵	于海波
	鄂鑫	张圣淇	刘雨淇
	付宝桂		

编写说明

中医医师资格考试按照国家医师资格考试相关规定，由国家行业主管部门制定考试大纲，统一组织，单独命题，考试合格者发放中医医师资格证书。

近年来，随着考试的不断改革，试题难度的加大，对参考资料的需求也在不断增加，为了让考生更加准确的了解中医医师资格考试，金英杰医学教育研究院结合5年来的部分真题，结合授课老师多年专业经验，以及金英杰平台数据抓取，凝练出一本集历年真题、易错题、高频考点、模拟试题于一体的综合版备考资料《中医执业助理医师资格考试历年真题精编“5+2+1”》。

5年 历年真题

搜集从2015~2019这五年的部分真题进行分析、归纳，以表格的形式直观呈现出近五年出题方向，方便考生在复习过程中找到重点，提高复习效率。根据历年出题规律提炼出历年高频考点，方便考生记忆，背诵，快速提分。

2年 易错考题

根据金英杰教育集团平台大数据分析，从题库里面进行筛选，将历年来学员容易做错的习题进行整理，分析错误原因，涉及考点。为考生整理一版“错题集”，提高考试复习效率，在“前人”的基础上使考试变得更简单。

1套 模拟试卷

完全模拟考试形式将高质量习题组建一套模拟试卷，让考生了解考试，模拟考试。在考试中找到自己的薄弱科目，有针对性地复习。查缺补漏，在考场上得心应手。

金英杰医学教育研究院成立于2006年，对医学资格考试有着深刻研究，也具有丰富的授课经验，以“严谨治学，踏实科研”为己任，先后出版了多种优质医学教辅图书，广受学员喜爱。尽管编者在图书中倾注了很多心血，但整理中难免有疏漏之处，也希望使用本书的考生能够提出宝贵的意见和建议，以便我们在下一版中完善。

“乘风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”这条艰难且漫长的路，我们陪你一起走过！

最后，衷心祝愿广大考生顺利通过医考！

金英杰医学教育研究院

目 录

第一篇 中医基础理论.....	1
第二篇 中医诊断学	30
第三篇 中药学	56
第四篇 方剂学	84
第五篇 中医内科学.....	112
第六篇 中医外科学.....	152
第七篇 中医妇科学.....	180
第八篇 中医儿科学.....	209
第九篇 针灸学.....	236
第十篇 诊断学基础.....	261
第十一篇 内科学.....	282
第十二篇 传染病学.....	309
第十三篇 医学伦理学.....	331
第十四篇 卫生法规.....	340
模拟试卷	351

第一篇 中医基础理论



考情分布图

		2015	2016	2017	2018	2019
中医基础理论	中医学理论体系的主要特点	2	1	1	1	1
	精气学说	0	0	1	1	0
	阴阳学说	2	1	2	2	3
	五行学说	1	2	2	1	2
	藏象学说	1	0	0	1	0
	五脏	4	4	5	4	5
	六腑	3	3	4	3	4
	奇恒之腑	2	1	2	2	1
	精、气、血、津液、神	1	1	1	2	5
	经络	1	1	1	1	0
	体质	0	0	0	0	0
	病因	0	0	1	1	1
	发病	0	1	1	1	1
	病机	1	0	0	1	0
	防治原则	1	1	1	0	0
	养生与寿夭	0	0	0	1	0



高频考点必背

1. 中医学理论体系包括两个主要特点:一是**整体观念**,二是**辨证论治**。
2. 整体观念是中医学关于**人体自身**的完整性及**人与自然**和**社会环境**统一性的认识。
3. “证”也叫证候,是机体在疾病发展过程中的**某一阶段**或某一类型的病理性概括。
4. 辨证论治是运用中医学理论辨析有关疾病的资料以确立证,论证其治则治法方药并付诸实施的思维和实践过程。
5. **同病异治**指同一种病,由于发病的时间、地域不同,或疾病所处的阶段或类型不同,或病人的体质有异,故反映出的证不同,因而治疗也就有异。
6. **异病同治**指几种不同的疾病,在其发展变化过程中出现了大致相同的病机,大致相同的证,故可用大致相同的治法和方药来治疗。
7. 精的概念,源于“**水地说**”。
8. 气的概念,源于“**云气说**”。
9. 阴阳既可以代表相互**对立的事物或现象**,又可以代表**同一事物或现象**内部对立着的两

个方面。

10.事物阴阳属性的**绝对性**主要表现在其属阴或属阳的**不可变性**,即绝对性。

11.事物阴阳属性的**相对性**包括:①阴阳属性可互相转化。②阴阳之中复有阴阳。③因比较的对象的改变而发生改变。

12.事物和现象五行归类的方法,主要有取象**比类法**和**推演络绎法**两种。

13.阴阳对立制约指属性相反的阴阳双方在一个统一体中的**相互斗争、相互制约和相互排斥**。

14.阴阳互根互用指一切事物或现象中相互对立着的阴阳两个方面,具有**相互依存,互为根本**的关系。

15.阴阳交感互藏指阴阳二气在**运动中相互感应而交合**,亦即发生相摩、相错、相荡的相互作用。

16.阴阳的消长有**阴长阳消、阳长阴消、阴消阳长、阳消阴长**4种形式。

17.阴阳的转化一般都产生于事物发展变化的“**物极**”阶段,即所谓“物极必反”。

18.阴阳的自和与平衡指阴阳双方**自动维持和自动恢复**其协调平衡状态的能力和趋势。

19.“木曰曲直”:引申为凡具有**生长、升发、条达、舒畅**等性质或作用的事物和现象,归属于木。

20.“火曰炎上”:引申为凡具有**温热、上升、光明**等性质或作用的事物和现象,归属于火。

21.“土爰稼穡”:引申为凡具有**生化、承载、受纳**性质或作用的事物和现象,归属于土。

22.“金曰从革”:引申为凡具有**沉降、肃杀、收敛**等性质或作用的事物和现象,归属于金。

23.“水曰润下”:引申为凡具有**滋润、下行、寒凉、闭藏**等性质或作用的事物和现象,归属于水。

24.事物属性的五行归类

自然界							五行	人体									
五音	五味	五色	五化	五气	方位	季节		五脏	五腑	五官	形体	情志	五液	五脉	五华	五声	变动
角	酸	青	生	风	东	春	木	肝	胆	目	筋	怒	泪	弦	爪	呼	握
徵	苦	赤	长	暑	南	夏	火	心	小肠	舌	脉	喜	汗	洪	面	笑	忧
宫	甘	黄	化	湿	中	长夏	土	脾	胃	口	肉	思	涎	缓	唇	歌	哆
商	辛	白	收	燥	西	秋	金	肺	大肠	鼻	皮	悲	涕	浮	毛	哭	咳
羽	咸	黑	藏	寒	北	冬	水	肾	膀胱	耳	骨	恐	唾	沉	发	呻	栗

25.五行相生次序是:**木生火,火生土,土生金,金生水,水生木**。

26.五行相克次序是:**木克土、土克水、水克火、火克金、金克木**。

27.五行相乘次序是:与相克相同。

28.五行相侮次序是:**木侮金,金侮火,火侮水,水侮土,土侮木**。

29.母病及子:指五行中的某一行异常,**累及其子行**,导致母子两行皆异常。

30.子病及母:指五行中的某一行异常,**影响到其母行**,终致子母两行皆异常。

31.**五脏**共同的生理特点是化生和贮藏精气。**藏精气而不泻也,故满而不能实**。

32.**六腑**共同的生理特点是受盛和传化水谷。**化物而不藏,故实而不能满**。

33.心的生理机能:**主血脉;藏神**。

34.肺的生理机能:主气司呼吸;**主行水;朝百脉**,主治节。

- 35.脾的生理机能:主运化;主统血。
- 36.肝的生理机能:主疏泄;主藏血(肝脏具有**贮藏血液、调节血量和防止出血**)。
- 37.肾的生理机能:藏精;主水;**主纳气**。
- 38.胆的生理机能:贮藏和排泄胆汁;**主决断**。
- 39.胃的生理机能:主受纳水谷;**主腐熟水谷**。
- 40.小肠的生理机能:主受盛化物;**主泌别清浊**;**小肠主液**。
- 41.大肠的生理机能:主传化糟粕;**大肠主津**。
- 42.膀胱的生理机能:汇聚水液;**储存和排泌尿液**。
- 43.三焦的生理机能:通行诸气;运行津液;**“上焦如雾”、“中焦如沤”、“下焦如渎”**。
- 44.**狭义之精**特指具有繁衍后代作用的生殖之精,是精的本始含义。
- 45.**广义之精**指一切构成人体和维持人体生命活动的液态精华物质。
- 46.先天之精是源于父母的**生殖之精**,是构成胚胎的原始物质,是生命产生的本原。
- 47.后天之精是源于**饮食水谷**,由脾胃等脏腑吸取饮食精华而产生,是维持人体生命活动的重要物质。
- 48.与**气生成**的相关脏腑包括:①肾为生气之根。②脾胃为生气之源。③肺为生气之主。
- 49.气的基本运动形式为**升、降、出、入**。
- 50.气的运动称作**气机**。
- 51.气机失调包括**气机不畅、气滞、气逆、气陷、气脱、气闭**。
- 52.人体之**气的功能**包括:①推动与调控作用。②温煦与凉润作用。③防御作用;④固摄作用;⑤中介作用。
- 53.元气是人体最根本、最重要的气,是人体生命活动的**原动力**。
- 54.宗气是由**谷气**与**自然界清气**相结合而积聚于**胸中**的气,属后天之气的范畴。
- 55.营气是行于脉中而具有**营养作用**的气。营气在脉中,是**血液**的重要组成部分。
- 56.卫气是运行于脉外而具有**保卫作用**的气。因其有卫护人体,避免外邪入侵的作用。
- 57.血液生化之源包括:①**水谷之精**化血。②**肾精**化血。
- 58.与**血生成**相关的脏腑:①脾胃是血液生化之源。②心肺对血液的生成起重要作用。③肾藏精,精生髓,精髓是化生血液的基本物质之一。
- 59.影响**血液运行**的相关脏腑是心、肝、脾、肺等脏生理机能的相互协调与密切配合。
- 60.血的功能包括:①**濡养作用**。②**化神作用**。
- 61.津:质地较**清稀**,流动性较大,布散于体表皮肤、肌肉和**孔窍**,并能渗入血脉之内,起滋润作用。
- 62.液:质地较**浓稠**,流动性较小,灌注于骨节、脏腑、**脑、髓**等,起濡养作用。
- 63.**气为血之帅**包括:①气能生血。②气能行血。③气能摄血。
- 64.**血为气之母**包括:①血能养气。②血能载气。
- 65.**气与津液的关系**包括:①气能生津。②气能行津。③气能摄津;④津能生气;⑤津能载气。
- 66.**精、血、津液之间的关系**指:①精血同源。②精能化气。③精与气化神;④神驭精气。
- 67.经络是经脉和络脉的总称,是运行全身气血,联络脏腑形体官窍,沟通上下内外,感应传导信息的通路系统,是人体结构的重要组成部分。
- 68.人体的经络系统由**经脉、络脉及其连属部分**组成。

69. 经脉是经络系统的主干,主要有**正经、经别和奇经**三大类。
70. 络脉包括**别络、浮络和孙络**三部分。
71. 连属部分包括**经筋、皮部**两部分。
72. 手三阴经起于**胸中走向手指端**,与手三阳经交会。
73. 手三阳经起于**手指端走向头面部**,与足三阳经交会。
74. 足三阳经起于**头面部走向足趾端**,与足三阴经交会。
75. 足三阴经起于**足趾端走向腹部和胸部**,在胸中与手三阴经交会。
76. **相为表里**的阴经与阳经在**四肢末端**交接。
77. **同名手足**阳经在**头面部**交接。
78. **足手阴经**在**胸部**交接。
79. “手太阳与少阴为表里,少阳与厥阴为表里,阳明与太阴为表里,是为手之阴阳也”。
80. 足太阴脾经与手少阴心经交接于心中。
81. 足少阴肾经与手厥阴心包经交接于胸中。
82. 足厥阴肝经与手太阴肺经交接于肺中。
83. 奇经八脉是督脉、任脉、冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉的总称。
84. 督脉为“**阳脉之海**”。
85. 任脉为“**阴脉之海**”。
86. 冲脉为“**十二经脉之海**”。
87. “**带脉主司带下**”。
88. 跷脉的功能为:①主司**下肢运动**。②司**眼睑开合**。
89. **阴维**有维系联络**全身阴经**的作用;**阳维**有维系联络**全身阳经**的作用。
90. 十二经别循行,多从四肢肘膝以上部位别出,称为“**离**”。
91. 走人体腔脏腑深部,呈向心性循行,称为“**入**”。
92. 然后浅出体表,而上头面,称为“**出**”。
93. 阴经的经别合于相表里的阳经经别,然后一并注入六条阳经,称为“**合**”。
94. 六淫的共同致病特点包括:①**季节性**。②**相兼性**。③**外感性**;④**地域性**。
95. 风性轻扬开泄,易袭阳位;风性善行而数变;风性主动;风为百病之长。
96. 寒为阴邪,易伤阳气;寒性**凝滞**;寒性**收引**。
97. 暑为阳邪,其性炎热;暑性升散,**易扰心神**,**易伤津耗气**;**多夹湿**。
98. 湿为阴邪,易伤阳气;**湿性重浊**;湿性黏滞,易阻气机;湿性趋下,**易袭阴位**。
99. 燥性干涩,易伤津液;**燥易伤肺**;
- 100 火热为阳邪,其性燔灼趋上;**火热易扰心神**;**火热易伤津耗气**;火热易生风动血。

5年 历年真题

1. 补土派医家代表为
- A. 刘完素
C. 李杲
E. 张介宾

- B. 张从正
D. 朱震亨

【答案】C

【解析】金元四大家以及所代表的派别分别是:张从正“攻邪派”、李杲“补土派”、刘元素



配套名师高清视频

“寒凉派”、朱丹溪“滋阴派”。

涉及考点 | 金元四大家

- 2.《灵枢·顺气一日分为四时》说“夫百病者……多以夕加”，是因为
- A.人气始生，病气衰
B.人气长，长则胜邪
C.人气始衰，邪气始生
D.人气入脏，邪气独居于身
E.人气抗邪，卫外为固

【答案】C

【解析】题干的意思是病人多在傍晚病势渐渐增重，而这是由于四时气候的不同变化而造成的。人气衰则抗病能力低下，而邪气始生则病情加重。

涉及考点 | 邪正盛衰

- 3.事物或现象阴阳属性的征兆是
- A.寒热
B.上下
C.水火
D.晦明
E.左右

【答案】C

【解析】根据《素问·阴阳应象大论》中的话，“水火者，阴阳之征兆也”，说明水火是阴阳对立最明显的征兆。

涉及考点 | 阴阳的含义

- 4.阴阳一分为二，合二为一体体现了阴阳之间的哪种关系
- A.阴阳互藏
B.阴阳互根
C.阴阳平衡
D.阴阳制约
E.阴阳转化

【答案】B

【解析】选项 A 是指阴中有阳，阳中有阴。选项 B 是指相互对立着的阴阳两个方面，具有相互依存、互为根本的关系。阴阳一分为二，合二为一对立又统一体现了阴阳互根的关系。选项 C 是指阴阳协调和相对稳定状态。选项 D 是指相关联的阴阳双方之间存在着相互抑制、排斥、牵制的关系。选项 E 是指在一定条件下，可以向其对立面转化。

涉及考点 | 阴阳互根

- 5.“阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也”，体现了阴阳之间的哪种关系
- A.对立制约
B.互根互用
C.平衡协调
D.互为消长
E.互相转化

【答案】B

【解析】阴阳互根，是指一切事物或现象中相互对立着的阴阳两个方面，具有相互依存、互为根本的关系。阴阳互用，是指阴阳双方具有相互资生、促进和助长的关系。《素问·阴阳应象大论》说：“阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也。”指出阳以阴为基，阴以阳为偶；阴为阳守持于内，阳为阴役使于外，阴阳相互为用，不可分离。

涉及考点 | 阴阳学说的基本内容

- 6.重阴必阳，重阳必阴说明了阴阳之间的哪种关系
- A.相互交感
B.对立制约

- C.互根互用
E.相互转化

D.消长平衡

【答案】E

【解析】阴阳转化,是指事物的总体属性,在一定条件下可以向其相反的方向转化。阴阳双方的消长运动发展到一定阶段,事物内部的阴与阳的比例出现了颠倒,该事物的属性即发生转化。一般都产生于事物发展变化的“物极”阶段,即所谓“物极必反”。

涉及考点 | 阴阳的转化

7.关于阴阳学说较准确的说法是

- A.中医的经典理论
B.对立统一的世界观
C.我国古代的一种哲学思想
D.唯物论
E.我国古代朴素的唯物论和辩证法思想

【答案】E

【解析】中医学基本理论是在阴阳概念基础上建立起来的,阴阳五行学说是我国古代朴素的辩证唯物的哲学思想。

涉及考点 | 阴阳学说

8.属于阳中之阳的脏是

- A.肝
B.肺
C.脾
D.心
E.肾

【答案】D

【解析】心肺居于膈上属阳,而心属火,主温通,属阳中之阳。肺属金,主肃降,属阳中之阴。肝脾肾居膈下属阴。而肝属木,主生发,属阴中之阳。肾属水,主闭藏,属阴中之阴。脾属土,主四时,属阴中之至阴。

涉及考点 | 五脏分阴阳属性。

9.中医学的基本特点是

- A.阴阳五行与藏象经络
B.整体观念与辨证论治
C.以五脏为主的整体观
D.望闻问切与辨证论治
E.辨证求因与审因论治

【答案】B

【解析】中医理论体系是经过长期临床实践,在中国古代哲学的指导下逐步形成的,其主要特点是整体观念和辨证论治。其余选项均为这一特点的具体体现。

涉及考点 | 中医学理论体系的主要特点

10.采取同病异治方法的原因是

- A.疾病相同
B.症状不同
C.阶段相同
D.证候不同
E.体征不同

【答案】D

【解析】同病异治是同一病证,因时、因地、因人不同,或由于病情进展程度、病机变化,以及用药过程中正邪消长等差异,治疗上应相应采取不同治法。

涉及考点 | 同病异治

11. 昼夜分阴阳,属于“阴中之阴”的时间是

- A.上午
B.中午
C.下午
D.前半夜
E.后半夜

【答案】D

【解析】昼夜阴阳属性的一般说法是:上午属阳中之阳,下午属阳中之阴,前半夜属阴中之阴,后半夜属阴中之阳。

涉及考点 | 昼夜的阴阳属性

12. 下列不属于病理变化的是

- A.五行制化
B.母病及子
C.子病及母
D.五行相侮
E.五行相乘

【答案】A

【解析】五行学说的基本内容包括五行相生与相克、五行制化、五行相乘与相侮和五行的母子相及四个方面。选项 A 五行的制化是指五行系统中具有的自我调节机制,不属于病理变化。选项 B、C、D、E 是五行之间异常的生克变化。

涉及考点 | 五行学说的基本内容

13. 五行中有收敛、沉降性质的是

- A.火
B.水
C.土
D.木
E.金

【答案】E

【解析】选项 A 凡具有温热、上升、光明等性质或作用的事物和现象,归属于火。选项 B 凡具有滋润、下行、寒凉、闭藏等性质或作用的事物和现象,归属于水。选项 C 凡具有生化、承载、受纳等性质或作用的事物和现象,归属于土。选项 D 凡具有生长、升发、条达、舒畅等性质或作用的事物和现象,归属于木。选项 E 凡具有沉降、肃杀、收敛等性质或作用的事物和现象,归属于金。

涉及考点 | 五行的特性

14. 五志相胜,思所胜的是

- A.喜
B.怒
C.悲
D.恐
E.忧

【答案】D

【解析】思属脾,脾属土,恐属肾,肾属水。根据五行生化克制,土克水,土所胜为水,所以推断得出思所胜为恐。

涉及考点 | 五行制化

15. 五行中“木”的特性是

- A.炎上
B.润下
C.稼穡
D.曲直
E.从革

【答案】D

【解析】“木曰曲直”：“曲”，屈也；“直”，伸也。曲直，是指树木的枝条具有生长、柔和，能屈又能伸的特性，引申为凡具有生长、升发、条达、舒畅等性质或作用的事物和现象，归属于木。

涉及考点 | 五行的特性

16. 言脏腑之阴阳，脾为

- | | |
|----------|---------|
| A. 阴中之阳 | B. 阴中之阴 |
| C. 阴中之至阴 | D. 阳中之阳 |
| E. 阳中之阴 | |

【答案】C

【解析】选项 A 阴中之阳为肝。选项 B 阴中之阴为肾。选项 C 阴中之至阴为脾。选项 D 阳中之阳为心。选项 E 阳中之阴为肺。

涉及考点 | 阴阳学说在组织结构方面的应用

17. 以下属“证候”的是

- | | |
|---------|-------|
| A. 痢疾 | B. 感冒 |
| C. 发热 | D. 头痛 |
| E. 心阳不振 | |

【答案】E

【解析】证候是指疾病过程中某一阶段或某一类型的病理概括，一般由一组相对固定的、有内在联系的、能揭示疾病某一阶段或某一类型病变本质的症状和体征构成。选项 A、B、D 属病。选项 C 属症。

涉及考点 | 证候的定义

18. 药物性味中属阳的是

- | | |
|-------|-------|
| A. 辛味 | B. 酸味 |
| C. 咸味 | D. 苦味 |
| E. 性凉 | |

【答案】A

【解析】《内经》云：“辛甘淡属阳，酸苦咸属阴。”

涉及考点 | 阴阳学说在疾病预防和治疗方面的应用

19. 下列各项，与肺主通调水道功能关系最密切的是

- | | |
|-----------|--------|
| A. 气机的调节 | B. 朝百脉 |
| C. 主宣发与肃降 | D. 司呼吸 |
| E. 宗气的生成 | |

【答案】C

【解析】肺主行水，指肺气的宣发肃降运动推动和调节全身水液的输布和排泄。

涉及考点 | 肺的生理机能与特性

20. 五行学说认为病情较重的色脉关系是

- | | |
|---------------|---------------|
| A. 色与脉的五行属性相符 | B. 色与脉的五行属性相生 |
| C. 客色胜主色 | D. 色与脉的五行属性相克 |
| E. 主色胜客色 | |

【答案】D

【解析】从色与脉之间的五行生克关系来判断疾病的预后。如肝病面色青,见弦脉,为色脉相符。如果不见弦脉,反见浮脉,则属相胜之脉,即克色之脉(金克木),为逆,主预后不良;若见沉脉,则属相生之脉,即生色之脉(水生木),为顺,主预后良好。

涉及考点 | 五行相生与相克

21. 根据情志相胜法,可制约大怒的情志是

- A.喜
B.思
C.悲
D.恐
E.惊

【答案】C

【解析】“怒胜思”“思胜恐”“恐胜喜”“喜胜忧”“悲胜怒”。

涉及考点 | 五行学说在疾病治疗方面的应用

22. 藏象学说中的整体观以何者为中心

- A.五体
B.六腑
C.官窍
D.四肢百骸
E.五脏

【答案】E

【解析】藏象学说的主要特点是以五脏为中心的整体观,通过经络系统“内属于脏腑,外络于肢节”,将六腑、五体、五官、九窍、四肢百骸等全身脏腑形体官窍联结成有机整体。

涉及考点 | 藏象学说的特点

23. 六腑共同的生理特点是

- A.化生精气
B.贮藏精气
C.满而不实
D.藏而不泻
E.受盛传化水谷

【答案】E

【解析】五脏共同的生理特点是化生和贮藏精气,六腑共同的生理特点是受盛和传化水谷。五脏者,藏精气而不泻也,故满而不能实;六腑者,传化物而不藏,故实而不能满也。选项A、B、C、D均为五脏的生理特点。

涉及考点 | 六腑的生理特点

24. 见肝之病,知肝传脾的病机传变是

- A.土侮木
B.木乘土
C.木克土
D.母病及子
E.子病犯母

【答案】B

【解析】肝属木,脾属土,木与土之间为相克的关系。当对被克制的“一行”因克制太过引起异常的反应,称为相乘;当五行中的“一行”过于强盛,对原来克制自己的“一行”进行反克,称为相侮。所以肝病及脾为相乘关系。

涉及考点 | 五行相乘

25. 下列除哪一项外均为五脏具有的共同特点

- A.实而不能满
B.藏精气而不泻
C.可行气于腑
D.实体性器官

E.病则多虚证

【答案】A

【解析】“五脏满而不能实”，“六腑实而不能满”。

涉及考点 | 五脏的生理特点

26.中医“藏象”的基本含义是

A.现代解剖学的概念

B.人体内脏的总称

C.脏腑组织的形象

D.藏于体内的脏腑及其表现于外的征象

E.脏腑的生理功能及其相互联系

【答案】D

【解析】藏指藏于体内的内脏，象指表现于外的生理、病理现象。藏象学说，就是通过对人体生理、病理现象的观察，研究人体各个脏腑的生理功能、病理变化及其相互关系的学说。

涉及考点 | 藏象及藏象学说的概念

(27~28 题共用备选答案)

A.肝病及心

B.肝病及肾

C.肝病及肺

D.肝病及脾

E.脾病及心

27.属五行相乘传变的是

【答案】D

28.属五行相侮传变的是

【答案】C

【解析】相乘即相克太过，超过正常制约程度，属病理变化范畴。如肝气过亢，肺金不能制约肝木，则太过之木便去抑制土，使土更虚而发生肝气犯胃的病证。相侮即反克，又称反侮。侮，恃强凌弱之意。相侮属病理变化范畴。正常情况下，金可克木，若金气不足，或木气偏亢，木就反而抑制金，出现肺金虚损而肝木亢盛的病证。

涉及考点 | 五行相乘与相侮

29.“生之本”指的是

A.肝

B.肺

C.心

D.脾

E.肾

【答案】C

【解析】心的主要生理功能是主血脉，主藏神。由于心的主血脉和主藏神机能起着主宰人体整个生命活动的作用，故称心为“君主之官”“生之本”“五脏六腑之大主”。

涉及考点 | 心的生理功能

30.主要体现以五行学说确立抑强扶弱兼用的治法是

A.抑木扶土法

B.佐金平木法

C.培土制水法

D.泻南补北法

E.阴中求阳法

【答案】A

【解析】选项 A 是治疗肝旺脾虚的方法，肝属木，脾属土，疏肝平肝以健脾。选项 B 即泻肝清肺法，是清肺气以抑制肝木的一种治疗方法，适用于肝火偏盛，影响肺气清肃之证。选项 C

是指通过温运脾阳以治疗水湿停聚的方法,适用于脾虚不运,水湿泛滥而致的水肿胀满之证。选项 D 即泻心火滋养肾阴,适用于心肾不交。

涉及考点 | 五行学说在疾病治疗方面的应用

31. 以下关于症、证、病的说法不正确的是

- A. 症即症状,是指人体对疾病的反应而表现出来的个别表象
- B. 证即证候,是机体在疾病发展过程中的某一阶段的病理性概括
- C. 证概括了病变的部位、原因、性质、趋势及邪正关系
- D. 病即疾病,指机体在一定病因和条件下所发生的病理变化的总过程
- E. 证的重点是全过程,而病的重点在现阶段

【答案】E

【解析】症状是指人体对疾病的反应而表现出来的个别表象;证候是机体在疾病发展过程中的某一阶段的病理性概括,概括了病变的部位、原因、性质、趋势及邪正关系等,能够反映疾病发展过程中某一阶段病理变化的本质;疾病指机体在一定病因和条件下所发生的病理变化的总过程。

涉及考点 | 病、证、症的定义

32. 肝主疏泄的基本生理功能是

- A. 调畅情志活动
- B. 调畅全身气机
- C. 促进脾胃运化
- D. 促进血行和津液代谢
- E. 调节月经和精液的排泄

【答案】B

【解析】肝主疏泄泛指肝疏通、宣泄、条达生发的生理功能,题中选项都与肝主疏泄有关,但肝主要是通过对全身气机的影响来调节其他方面,所以调畅全身气机是基础。

涉及考点 | 肝的生理功能

33. 与四肢强健与否关系密切的是

- A. 肝的功能
- B. 心的功能
- C. 脾的功能
- D. 肺的功能
- E. 肾的功能

【答案】C

【解析】“四肢为脾之外候”(《体仁汇编》)。所谓“脾主四肢”,是说人体的四肢需要脾气输送营养才能维持其正常的功能活动。脾气健运,营养充足,则四肢轻劲,灵活有力;脾失健运,营养不足,则四肢倦怠乏力,甚或痿弱不用。故四肢强健与脾的功能关系密切。

涉及考点 | 脾的生理功能

(34~35 题共用备选答案)

- A. 子病及母
- B. 母病及子
- C. 相乘传变
- D. 相侮传变
- E. 母子同病

34. 脾病及肾,体现的关系是

【答案】C

35. 土壅木郁,体现的关系是

【答案】D

【解析】脾属土,肾属水,肝属木。土克水,脾病及肾为相乘传变;木克土,土病及木为相侮传变。



配套名师高清视频

涉及考点 | 五行相乘相侮与母子相及

36.称为“娇脏”的是

- | | |
|-----|-----|
| A.肝 | B.心 |
| C.脾 | D.肺 |
| E.肾 | |

【答案】D

【解析】由于肺清虚娇嫩,不耐寒热,不容异物。而且肺外合皮毛,在窍为鼻,与外界相通,外感六淫之邪从皮毛口鼻而入,常犯肺而为病,肺易受邪袭。所以称肺为“娇脏”。

涉及考点 | 肺的生理特性

37.五脏之中,具有“刚脏”特性的是

- | | |
|-----|-----|
| A.肺 | B.脾 |
| C.心 | D.肝 |
| E.肾 | |

【答案】D

【解析】选项 A 肺为娇脏。选项 B 脾为孤脏。选项 C 心为火脏。选项 D 肝为刚脏。选项 E 肾为水火之脏。

涉及考点 | 肝的生理特性

38.与肾主水液关系最密切的是

- | | |
|-----------|-----------|
| A.肾精的濡养作用 | B.肾气的固摄作用 |
| C.肾阴的凉润作用 | D.肾阳的蒸化作用 |
| E.肾血的营养作用 | |

【答案】D

【解析】肾气蒸腾气化水液。肾气及肾阴肾阳对胃的“游溢精气”、脾气散精、肺气行水、三焦决渎以及小肠的分清别浊等作用具有推动和调控作用,致使它们稳定发挥输布津液的功能。如果肾气虚亏,或肾阴肾阳失去协调,不能支持上述各脏腑对津液的输布运行,可致津液的代谢失常。

涉及考点 | 肾的生理功能

39.与血液生成关系最密切的脏是

- | | |
|-----|-----|
| A.心 | B.肺 |
| C.脾 | D.肝 |
| E.肾 | |

【答案】C

【解析】脾主运化,具有消化吸收食物中的水谷精微并将其转输至全身的生理功能,人依赖于水谷精微化生气血以维持生命活动。脾为“后天之本,气血生化之源”。与血液生成关系最密切的脏是脾。

涉及考点 | 脾的生理功能

40.脾为气血生化之源的理论基础是

- | | |
|----------|------------|
| A.人以水谷为本 | B.气能生血 |
| C.脾主升清 | D.脾能运化水谷精微 |
| E.脾为后天之本 | |

【答案】D

【解析】脾主运化,脾具有消化吸收食物中的水谷精微并将其转输至全身的生理功能,人依赖于水谷精微化生气血以维持生命活动,故脾为气血生化之源。

涉及考点 | 脾的生理功能

41.“乙癸同源”指的是

- A.心肺关系
- B.肺肝关系
- C.肝脾关系
- D.肝肾关系
- E.脾胃关系

【答案】D

【解析】以天干配五支,肝属乙木,肾属癸水。肝肾之间又称精血同源,肝藏血肾藏精,精血同源源于水谷精微,又能相互资生转化。

涉及考点 | 五脏之间的关系

42.主管人体生长发育是气的什么作用

- A.推动作用
- B.温煦作用
- C.防御作用
- D.固摄作用
- E.中介作用

【答案】A

【解析】气的推动作用,指气具有激发和推动作用。气的推动作用,指气具有激发和推动作用。气是活力很强的精微物质,能激发和促进人体的生长发育以及各脏腑、经络等组织器官的生理功能,能推动血液的生成、运行,以及津液的生成、输布和排泄等。

涉及考点 | 气的功能

43.肝藏血与脾统血的共同生理功能是

- A.贮藏血液
- B.调节血量
- C.统摄血液
- D.防止出血
- E.化生血液

【答案】D

【解析】肝藏血,是指肝有贮藏血液、调节血量及防止出血的功能,使血循经行,人动时血运于诸经,人静时血归于肝脏。脾统血,是指脾有统摄血液在脉内运行,不使其逸出脉外的作用。

涉及考点 | 肝与脾的关系

44.“命门之火”是指

- A.心阳
- B.肺阳
- C.肝阳
- D.肾阳
- E.脾阳

【答案】D

【解析】肾阳亦称“真阳”“元阳”“命门之火”,有温养脏腑的作用,为人体阳气的根本。

涉及考点 | 肾的生理功能

45.心在志为

- A.怒
- B.喜
- C.思
- D.悲
- E.恐

【答案】B

【解析】选项 A 肝在志为怒。选项 B 心在志为喜。选项 C 脾在志为思。选项 D 肺在志为悲。选项 E 肾在志为恐。

涉及考点 | 五脏与五志的关系

46.下列各脏中,其生理特性以升为主的是

- | | |
|-------|-------|
| A.肺与脾 | B.肺与肝 |
| C.肝与肾 | D.心与肾 |
| E.肝与脾 | |

【答案】E

【解析】肝气升发,指肝气的向上升动和向外发散以调畅气机的生理特性。脾气上升,脾气具有向上运动以维持水谷精微的上输和内脏位置相对稳定的生理特性。脾气的升动转输作用可以将胃肠道吸收的水谷精微和水液上输于心、肺等脏,通过心、肺的作用化生气血,以营养濡润全身。

涉及考点 | 肝、脾的生理特性

47.肺之华在

- | | |
|-----|-----|
| A.面 | B.毛 |
| C.唇 | D.发 |
| E.爪 | |

【答案】B

【解析】肝心脾肺肾,爪面唇毛发。肺在体合皮,其华在毛。肺与皮毛相合,是指肺与皮毛的相互为用关系。

涉及考点 | 五脏的外华

48.有主水和纳气功能的脏是

- | | |
|-----|-----|
| A.肝 | B.心 |
| C.脾 | D.肺 |
| E.肾 | |

【答案】E

【解析】选项 A 肝藏血,主疏泄。选项 B 心主血脉,心藏神。选项 C 脾主运化,主升清,主统血。选项 D 肺主气,司呼吸,通调水道,宣散卫气,朝百脉,主治节。选项 E 肾藏精,主水,主纳气。

涉及考点 | 肾的生理功能

49.下列最易发生阴阳互损的脏是

- | | |
|-----|-----|
| A.心 | B.肝 |
| C.脾 | D.肺 |
| E.肾 | |

【答案】E

【解析】《素问·脉要精微论》:“腰者,肾之府。”肾因开窍于二阴而司大小便。又寄藏命门之火,为元阴、元阳之脏,故有“水火之脏”“阴阳之宅”之称,为最易发生阴阳互损的脏腑。

涉及考点 | 肾的生理特性

50.心与肺的关系主要表现在

- A. 气血互用方面
B. 气机升降方面
C. 血液运行方面
D. 精神互养方面
E. 化生气血方面

【答案】C

【解析】心与肺的关系主要表现在血液运行与呼吸吐纳之间的协调关系。

涉及考点 | 心与肺的关系

51. “动极镇之以静”，主要说明的阴阳关系是
A. 阴阳相互转化
B. 阴阳互根互用
C. 阴阳相互消长
D. 阴阳对立制约
E. 阴阳相对平衡

【答案】D

【解析】阴阳的对立制约，是指相互关联的阴阳双方之间存在着相互抑制、排斥、牵制的关系。

涉及考点 | 阴阳的关系

52. 下列属于精的功能是
A. 载气
B. 化气
C. 温煦
D. 中介
E. 滋润

【答案】B

【解析】人体之精的功能体现在以下方面：①繁衍生命。②濡养：精能滋润濡养人体各脏腑形体官窍。③化血：精可以转化为血，是血液生成的来源之一；④化气：精可以化生为气；⑤化神：精是神化生的物质基础之一。

涉及考点 | 人体之精的功能

53. 下列被称为“元神之府”的是
A. 脑
B. 髓
C. 骨
D. 脉
E. 胆

【答案】A

【解析】选项 A 脑为元神之府。选项 C 骨为髓之府。选项 D 脉为血府。选项 E 胆为中精之府、中清之腑。

涉及考点 | 脑的生理功能

54. 自汗，多尿，滑精，是因气的何种作用失常所致
A. 推动
B. 温煦
C. 防御
D. 固摄
E. 气化

【答案】D

【解析】气的固摄作用包括三方面：一是固摄血液，防止血液溢出脉外，保证血液在脉中正常循行；二是固摄汗液、尿液、唾液、胃液、肠液等，控制其分泌量、排泄量，防止体液丢失；三是固摄精液，防止妄泄。

涉及考点 | 人体之气的功能

55.五脏主五志,则忧属

- A.心
B.肾
C.肝
D.肺
E.脾

【答案】D

【解析】选项 A 心在志为喜。选项 B 肾在志为恐。选项 C 肝在志为怒。选项 D 肺在志为忧。选项 E 脾在志为思。

涉及考点 | 五脏与五志的联系

56.水谷精微中的精华部分所化生的是

- A.宗气
B.卫气
C.营气
D.中气
E.元气

【答案】C

【解析】水谷之精化为水谷之气,其中精华部分化生营气,并进入脉中运行全身。内入脏腑,外达肢节,周而复始。

涉及考点 | 气的生成

57.“孤府”指的是

- A.胆
B.胃
C.小肠
D.三焦
E.膀胱

【答案】D

【解析】《灵枢·本输》说:“三焦者,中渎之府也,水道出焉,属膀胱,是孤之府也。”明代张介宾等医家将三焦附会为分布于胸腹腔的包容五脏六腑的一个“大府”,并因其大而称之为“孤府”。

涉及考点 | 三焦的概念

58.中精之府是

- A.三焦
B.胆
C.胃
D.膀胱
E.大肠

【答案】B

【解析】胆为中空的囊状器官,内盛胆汁。因胆汁属人体的精气,故《灵枢·本输》称胆为“中精之府”,亦有医家将其称为“中清之府”。

涉及考点 | 胆的生理功能

59.与女子月经来潮关系最密切的是

- A.肾阳
B.脾阳
C.天癸
D.冲脉
E.任脉

【答案】C

【解析】天癸,是肾精肾气充盈到一定程度时体内出现的一种精微物质,有促进生殖器官发育成熟、女子月经来潮及排卵、男子精气溢泻,因而具备生殖能力的作用。女子胞的发育成

熟、月经按时来潮及其后定期排卵,与天癸的来至和其对胞宫的作用有极其密切的关系。

涉及考点 | 女子胞与脏腑经脉的关系

60. 具有喜润恶燥特性的脏腑是

- A. 肝
B. 肺
C. 脾
D. 胃
E. 大肠

【答案】D

【解析】胃主受纳、腐熟水谷,主通降以降为和。胃中有充足的津液,可以使受纳腐熟功能正常,并可保持通降,使腐熟之水谷下传小肠。胃为阳土,喜润恶燥,若胃中津液受损,则会使胃纳失权,产生饥不欲食等症状。

涉及考点 | 胃的生理特性

(61~62 题共用备选答案)

- A. 泻南补北
B. 扶土抑木
C. 滋水涵木
D. 培土生金
E. 佐金平木

61. 心肾不交的治法是

【答案】A

【解析】泻南补北:又称泻火补水法或滋阴降火法,即泻心火滋养肾阴。

适用于肾阴不足、心火偏亢的心肾不交证。

62. 肝阳上亢的治法是

【答案】C

【解析】滋水涵木:指滋肾阴以养肝阴,以制约肝阳上亢的方法,适用于肾阴不足,水不涵木所致的肝阳上亢证。

涉及考点 | 五行学说在疾病治疗方面的运用

63. 具有加强十二经脉相为表里两经在体表联系的是

- A. 经别
B. 经筋
C. 别络
D. 奇经
E. 皮部

【答案】C

【解析】别络,是络脉的主体,从十二经脉及任、督二脉分出,有一定的分布部位。阴经的别络走向阳经,阳经的别络走向阴经,因而别络具有加强表里两经在体表联系的作用。

涉及考点 | 别络的生理机能

64. 在十二经脉走向中,足之三阴是

- A. 从脏走手
B. 从头走足
C. 从足走胸
D. 从足走腹
E. 从手走头

【答案】D

【解析】《灵枢·逆顺肥瘦》说:“手之三阴,从胸走手;手之三阳,从手走头;足之三阳,从头走足;足之三阴,从足走腹。”

涉及考点 | 十二经脉的走向规律



配套名师高清视频

65.具有推动呼吸和血行功能的气是

- A.心气
B.肺气
C.宗气
D.卫气
E.营气

【答案】C

【解析】选项 A 推动血液的运行。选项 B 推动呼吸。选项 C 宗气由自然界吸入的清气以及脾胃从饮食中运化而来的水谷精微组成,有走息道行呼吸,贯心脉气血的作用。选项 D 起护卫肌表、温煦、调节腠理开阖的作用。选项 E 营养全身和化生血液。

涉及考点 | 人体之气的分类

66.十二经脉中循行于腹部的经脉,自内向外的顺序是

- A.足少阴、足阳明、足太阴、足厥阴
B.足少阴、足阳明、足厥阴、足太阴
C.足太阴、足阳明、足少阴、足厥阴
D.足阳明、足少阴、足太阴、足厥阴
E.足阳明、足太阴、足厥阴、足少阴

【答案】A

【解析】肾经在脐旁开 0.5 寸,胃经在脐旁开 2 寸,脾经在脐旁开 4 寸,肝经位于脐的最外侧。

涉及考点 | 十二经脉的分布规律

67.奇经八脉中既称血海又称经脉之海者是

- A.冲脉
B.任脉
C.督脉
D.带脉
E.维脉

【答案】A

【解析】选项 A 冲脉基本功能为调节十二经气海,有“十二经脉之海”“血海”之称。选项 B 任脉为“阴脉之海”。选项 C 督脉为“阳脉之海”。选项 D 带脉基本功能为约束纵行诸经和主司带下。选项 E 维脉有阴维和阳维之分,阴维功能是“维络诸阴”,阳维功能是“维络诸阳”。

涉及考点 | 冲脉的基本机能

68.由水谷精微之气中的剽悍滑利部分所化生的气是

- A.元气
B.宗气
C.营气
D.卫气
E.脏腑之气

【答案】D

【解析】卫气来源于脾胃运化的水谷精微。水谷之精化为水谷之气,其中剽悍滑利部分化生为卫气。《素问·痹论》说:“卫者,水谷之悍气也。其气剽悍滑利,不能入于脉也。”

涉及考点 | 人体之气的分类

69.肝藏血的生理机能是指肝

- A.贮藏血液
B.调节血量
C.统摄血液
D.贮藏血液和调节血量
E.化生血液与统摄血液

【答案】D

【解析】肝主藏血,指肝脏具有贮藏血液、调节血量和防止出血的功能。

涉及考点 | 肝的生理功能

70.三焦经在上肢的循行部位是

- A.外侧前缘
- B.内侧中线
- C.外侧后缘
- D.内侧前缘
- E.外侧中线

【答案】E

【解析】太阴、阳明在前缘；厥阴、少阳在中线；少阴、太阳在后缘；阴经行于内侧，阳经行于外侧，手少阳三焦经在外侧中线。

涉及考点 | 十二经脉的分布规律

71.具有收引特性的邪气是

- A.风邪
- B.寒邪
- C.火邪
- D.湿邪
- E.燥邪

【答案】B

【解析】凡致病具有寒冷、凝结、收引特性的外邪，称为寒邪。寒性凝滞，寒性收引。

涉及考点 | 寒邪的性质及致病特点

72.外邪侵袭是否发病在于

- A.正气的强弱
- B.邪气的盛衰
- C.阴阳之气的盛衰
- D.气血的盛衰
- E.脏腑功能的盛衰

【答案】A

【解析】邪气侵入机体，正气必然会与之抗争。若正气强盛，抗邪有力，则病邪难以入侵，故不发病。或虽邪气已经进入，但正气盛，能及时抑制或消除邪气的致病力，亦不发病。

涉及考点 | 邪正相搏的胜负与发病

73.肾主纳气的主要生理作用是

- A.使肺之呼吸保持一定的深度
- B.有助于元气的固摄
- C.有助于精液的固摄
- D.有助于元气的生成
- E.有助于肺气的宣发

【答案】A

【解析】肾主纳气，指肾气有摄纳肺所吸入的自然界清气，保持吸气的深度，防止呼吸表浅的作用。

涉及考点 | 肾主纳气的生理作用

74.疾病后期，遗留某些后遗症的病机是

- A.正盛邪退
- B.邪去正虚
- C.邪盛正虚
- D.邪正交争
- E.正虚邪恋

【答案】E

【解析】选项 A 是疾病向好转和痊愈方向发展的一种病理变化。选项 B 多见于重病的恢复期，其最终的转归一般仍然是趋向好转痊愈。选项 C 是疾病趋于恶化、危重，甚至向死亡方面转归的一种病理变化。选项 D 邪正交争过程中，若邪正双方力量对比势均力敌，或正虚邪

恋,出现邪去而正气不复的情况,则疾病多由急性转为慢性,或留下后遗症而持久难愈。所以本题 E。

涉及考点 | 邪正盛衰与疾病转归

75.不属于六淫共同致病特点的是

- | | |
|-------|-------|
| A.季节性 | B.地域性 |
| C.相兼性 | D.传染性 |
| E.外感性 | |

【答案】D

【解析】六淫的共同致病特点:①外感性。②季节性。③地域性;④相兼性。传染性为疠气的致病特点。

涉及考点 | 六淫的共同致病特点

(76~77 题共用备选答案)

- | | |
|-----|-----|
| A.心 | B.肺 |
| C.脾 | D.肝 |
| E.肾 | |

76.与血液运行关系最密切的脏是

【答案】A

【解析】心主血脉,指心气推动和调控血液在脉道中运行,流注全身,发挥营养和滋润作用。

77.对津液代谢起主宰作用的脏是

【答案】E

【解析】肾主水。肾气及肾阴肾阳通过对各脏腑之气及其阴阳的资助和调控,主司和调节着机体津液代谢的各个环节。

涉及考点 | 心、肾的生理机能

78.六淫之中只有外感而无内生的邪气是

- | | |
|-----|-----|
| A.风 | B.寒 |
| C.暑 | D.湿 |
| E.火 | |

【答案】C

【解析】暑为夏季主气,乃火热之气所化,属外邪,无“内暑”。

涉及考点 | 暑邪的致病特点

79.下列关于实的病机概念的叙述,错误的是

- | | |
|----------|----------|
| A.外感邪盛 | B.肌肤经络闭塞 |
| C.气机升降失调 | D.脏腑功能亢进 |
| E.气血壅滞瘀结 | |

【答案】C

【解析】所谓实,是以邪气盛为矛盾主要方面的一种病理反应。其中“邪气”包括了六淫病邪,以及食积、虫积、水饮、痰浊、瘀血和情志内伤等引起脏腑、经络、气血功能失调的有害因素。选项 A、B、D、E 均属“实”的病机。选项 C 是气机运行不畅或升降出入功能失去平衡协调的病理变化,不属于“实”的病机。

涉及考点 | 邪正盛衰与虚实变化

80. 六淫邪气中,具有“阻遏气机”特点的是

- A. 风
- B. 暑
- C. 湿
- D. 寒
- E. 火

【答案】C

【解析】湿为阴邪,易阻遏气机,损伤阳气。

涉及考点 | 湿邪的性质及致病特点

81. 属于阴的味是

- A. 酸
- B. 甘
- C. 淡
- D. 辛
- E. 以上均非

【答案】A

【解析】解释和归纳药物的性能:辛、甘(淡)为阳,酸、苦、咸为阴。

涉及考点 | 五味的阴阳属性

82. 恶心呕吐,呃逆暖气频作,其病机是

- A. 痰浊上壅
- B. 肺气上逆
- C. 肝气上逆
- D. 胃气上逆
- E. 奔豚气逆

【答案】D

【解析】选项 A 可出现咳嗽,痰多。选项 B 可出现咳嗽。选项 C 可出现头痛、眩晕。选项 D 胃以降为顺,胃失和降,胃气上逆,而见恶心呕吐,呃逆暖气。选项 E 气上冲于胸。

涉及考点 | 气的失常

83. 阴偏衰以何脏为主

- A. 心
- B. 脾
- C. 肾
- D. 胃
- E. 肝

【答案】C

【解析】阴气不足,可见于五脏六腑,如肺阴、脾阴、胃阴、心阴、肝阴和肾阴,皆可发生亏虚的病变,但一般以肾阴亏虚为主。肾阴为诸阴之本,“五脏之阴气,非此不能滋”,所以肾阴不足在阴偏衰的病机中占有极其重要的地位。

涉及考点 | 阴阳偏衰

84. 扶正祛邪同时并用的原则是

- A. 先扶正后祛邪
- B. 扶正祛邪并重
- C. 以扶正为主,兼顾祛邪
- D. 扶正不留邪,祛邪不伤正
- E. 先祛邪后扶正

【答案】B

【解析】选项 A 适用于正虚邪实的虚实错杂证而正气虚衰不耐攻的情况。选项 B 扶正与祛邪并重适用于正虚邪实,但二者均不甚重的病证。选项 C 以扶正为主,兼顾祛邪,一主一次。选项 D 属总的治疗原则。选项 E 适用于邪盛为主,正气尚能耐受攻伐者。

涉及考点 | 扶正与祛邪

85.治未病包括

- | | |
|--------------------|-------------|
| A.未病先防与既病防变 | B.顺应自然与养性调神 |
| C.早期诊治与防止传变 | D.避其邪气与药物预防 |
| E.阻截疾病传播途径与先安未受邪之地 | |

【答案】A

【解析】治未病的内容包括未病先防和既病防变两个方面。顺应自然与养性调神、避其邪气与药物预防均属未病先防的内容；早期诊治与防止传变为既病防变的内容。

涉及考点 | 治未病的概念

(86~87 题共用备选答案)

- | | |
|------|------|
| A.元气 | B.宗气 |
| C.营气 | D.卫气 |
| E.中气 | |

86.贯心脉而行气血的气是

【答案】B

【解析】宗气聚于胸中,通过上出息道(呼吸道),贯注心脉及沿三焦下行的方式布散全身。

87.推动生长发育的气是

【答案】A

【解析】元气的生理功能主要有两个方面:一是推动和调节人体的生长发育和生殖机能;二是推动和调控各脏腑、经络、形体、官窍的生理活动。

涉及考点 | 人体之气的分类

88.导致虚热证的阴阳失调是

- | | |
|--------|-------|
| A.阳偏盛 | B.阳偏衰 |
| C.阴偏盛 | D.阴偏衰 |
| E.阳胜阴病 | |

【答案】D

【解析】阴虚则热,阳虚则寒。

涉及考点 | 阴阳失调

(89~90 题共用备选答案)

- | | |
|-------|-------|
| A.心、脾 | B.肝、肺 |
| C.脾、肾 | D.心、肾 |
| E.肝、肾 | |

89.“乙癸同源”的“乙癸”所指的脏是

【答案】E

【解析】肝藏血,肾藏精,精血互生,故肝肾之间关系极为密切,有“肝肾同源”“乙癸同源”之说。

90.“水火既济”的“水火”所指的脏是

【答案】D

【解析】心藏神,肾藏精;心为君火,肾为相火(命门)。心位居上,故心火(阳)必须下降于肾,使肾水不寒;肾位居下,故肾水(阴)必须上济于心,使心火不亢。即达到“心肾相交”“水火既济”的状态。

涉及考点 | 乙癸同源、水火既济的含义

2年 易错题

1. 阴中求阳的治法适用于

- A. 阴虚
B. 阳虚
C. 阴盛
D. 阳盛
E. 阴阳两虚

【答案】B

【解析】阴阳间相互对立,又相互依存,当出现阳虚病证时,除了使用补阳药外,还应适当运用补阴药,使阳得阴助而生化无穷,此为阴中求阳,这是根据阴阳互根理论确定的治疗原则。

涉及考点 | 阴阳在疾病预防和治疗方面的应用

2. 五行中火的“所胜”是

- A. 木
B. 水
C. 土
D. 金
E. 火

【答案】D

【解析】“克我”者是“所不胜”,“我克”者是“所胜”,火的“所胜”,即火“所克”者。根据五行相克次序:水克火,火克金,金克木,木克土,土克水。所以火的“所胜”是金。

涉及考点 | 五行相克

3. 下列关于五行生克规律的表述,正确的是

- A. 木为土之所胜
B. 木为水之子
C. 火为土之子
D. 水为火之所胜
E. 金为木之所胜

【答案】B

【解析】五行相生次序:木生火,火生土,土生金,金生水,水生木。“生我”者为母,“我生”者为子。五行相克次序:木克土,土克水,水克火,火克金,金克木。“克我”者为“所不胜”,“我克”者为“所胜”。

涉及考点 | 五行相生与相克

4. 心主神志最主要的物质基础是

- A. 津液
B. 精液
C. 血液
D. 宗气
E. 营气

【答案】C

【解析】心藏神,心具有主宰人体五脏六腑、形体官窍的一切生理活动和人体精神意识思维活动的功能。心主血脉,心气可推动和调控血液在脉管中正常运行,流注全身。心的这两种功能相互影响:一方面,心主血脉的功能受心神主宰;另一方面,心神又必须得到心血的濡养才能正常地工作。

涉及考点 | 心的生理功能

5. 根据五行的生克乘侮规律,以下说法错误的是

- A.心火不足,肾水乘之
B.木火刑金
C.肝木乘土
D.心火过亢,反侮肺金
E.岁土太过,雨湿流行,肾水受邪

【答案】D

【解析】心属火,肺属金,火克金,心火过亢则称心火乘肺金,不是反侮。

涉及考点 | 五行的相生与相克、相乘与相侮

6.导致津液输布障碍,水湿痰饮潴留的最主要因素是

- A.肺的宣发肃降失职
B.脾的运化功能失健
C.肝的疏泄功能失常
D.肾的主水功能失调
E.三焦疏通水道不利

【答案】B

【解析】脾居中焦,为人体气机升降的枢纽,故在人体水液代谢过程中起着重要的枢纽作用。因此,脾运化水湿的功能健旺,既能使体内各组织得到水液的充分濡润,又不致使水湿过多而潴留。反之,如果脾运化湿的功能失常,必然导致水液在体内的停滞,而产生水湿、痰饮等病理产物,甚则形成水肿。即所谓脾为“生痰之源”。

涉及考点 | 脾的生理功能

7.《素问·上古天真论》记述了肾气由稚嫩到充盛,由充盛到衰少继而耗竭的演变过程,可见的变化是

- A.筋骨坚,发长极,身体盛壮
B.三阳脉衰于上,面皆焦,发始白
C.任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭
D.阳明脉衰,面始焦,发始堕
E.肾气平均,真牙生而长极

【答案】C

【解析】《素问·上古天真论》：“女子七岁，肾气盛，齿更发长。二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子。三七，肾气平均，故真牙生而长极。四七，筋骨坚，发长极，身体盛壮。五七，阳明脉衰，面始焦，发始堕。六七，三阳脉衰于上，面皆焦，发始白。七七，任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。”

涉及考点 | 肾的生理功能

8.“吐下之余,定无完气”的生理基础是

- A.气能生津
B.气能行津
C.气能摄津
D.津能载气
E.津能生气

【答案】D

【解析】津液是气的载体之一,在血脉之外,气必须依附于津液而存在,否则就将涣散不定而无所归。若因汗、吐太过,使津液大量丢失,则气亦随之而外脱,形成“气随津脱”之危候,故曰:“吐下之余,定无完气”。

涉及考点 | 气与津液的关系

9.手阳明大肠经在何处交于何经

- A.在鼻翼旁交于足阳明胃经
B.在拇指端交于手太阴肺经
C.在小指端交于手太阳小肠经
D.在无名指端交于手少阳三焦经
E.在足大趾端交于足太阴脾经

【答案】A

【解析】手阳明大肠经起于示指桡侧端(商阳穴),经过手背行于上肢伸侧前缘,上肩,至肩关节前缘,向后与督脉在大椎穴处相会,再向前下行入锁骨上窝(缺盆),进入胸腔络肺,通过膈肌下行,入属大肠。其分支从锁骨上窝上行,经颈部至面颊,入下齿中,回出夹口两旁,左右交叉于人中,至对侧鼻翼旁,经气于迎香穴处与足阳明胃经相接。

涉及考点 | 十二经脉的交接规律

10. 治疗血行瘀滞,多配用补气、行气药是由于

- A. 气能生血
B. 气能行血
C. 气能摄血
D. 血能生气
E. 血能载气

【答案】B

【解析】气为血之帅,气能生血、行血、摄血。气能行血,指气的推动作用血液循行的动力。气可以直接推动血液运行,又可促进脏腑的功能活动,通过脏腑的功能活动推动血液运行。故治疗血行瘀滞时,多配用补气、行气药,气行则血行。

涉及考点 | 气与血的关系

11. 五行相乘,下列哪种说法是正确的

- A. 母气有余而乘其子
B. 子气有余而乘其母
C. 气有余则乘己所胜
D. 气有余则乘己所不胜
E. 气不及则己所胜侮而乘之

【答案】C

【解析】五行中的某一行过于亢盛,对其所胜行进行超过正常限度的克制,引起其所胜的虚弱,从而导致五行之间的协调关系失常。根据《素问·五运行大论》:“气有余,则制己所胜而侮所不胜;其不及,则己所不胜,侮而乘之,己所胜,轻而侮之”。

涉及考点 | 五行相乘

12. 关于肺气肃降,说法错误的是

- A. 吸入自然界之清气
B. 呼出体内浊气
C. 脾转输至肺的津液及部分水谷精微向下向内布散
D. 将脏腑代谢后产生的浊液下输于膀胱
E. 肺气向内向下的布散运动

【答案】B

【解析】肺气宣发,是肺气向上向外的布散运动,主要体现在以下三个方面:一是呼出体内浊气。二是将脾所转输来的津液和部分水谷精微上输头面诸窍,外达于全身皮毛肌腠。三是宣发卫气于皮毛肌腠,以温分肉,充皮肤,肥腠理,司开阖,将代谢后的津液化为汗液,并控制和调节其排泄。选项 B 为肺气宣发的具体表现,所以本题选 B。

涉及考点 | 肺的生理功能特性

13. “壮水之主,以制阳光”是指

- A. 以阳中求阴之法调整阴阳偏衰
B. 以阴中求阳之法调整阴阳偏衰
C. 泻热之法,调整阳偏衰
D. 以补阴之法,治疗阴虚阳亢之证
E. 以补阳之法,治疗阴虚阳亢之证

【答案】D

【解析】阴虚则热的虚热证,治宜滋阴以抑阳,即王冰所谓“壮水之主,以制阳光”,《内经》所谓“阳病治阴”。

涉及考点 | 阴阳失调

14.“益火之源,以消阴翳”,所指的是

- | | |
|--------|--------|
| A.补阴扶阳 | B.阳病治阴 |
| C.阴中求阳 | D.阳中求阴 |
| E.阴病治阳 | |

【答案】E

【解析】阴阳互制之调补阴阳:阳虚则寒的虚寒证,治宜扶阳以抑阴,即王冰所谓“益火之源,以消阴翳”,《内经》所谓“阴病治阳”。

涉及考点 | 阴阳失调

15.按十二经脉的流注次序,肝经流注于哪条经脉之前

- | | |
|-------|------|
| A.膀胱经 | B.胆经 |
| C.三焦经 | D.心经 |
| E.肺经 | |

【答案】E

【解析】十二经脉流注次序:肺大胃脾心小肠,膀胱肾包焦胆肝藏。

涉及考点 | 十二经脉的流注次序

16.《素问·五藏生成》说:多食辛,则

- | | |
|----------|----------|
| A.肉胝皱而唇揭 | B.筋急而爪枯 |
| C.骨痛而发落 | D.脉凝泣而变色 |
| E.皮槁而毛拔 | |

【答案】B

【解析】《素问·五藏生成》说:“多食咸,则脉凝泣而变色,多食苦,则皮槁而毛拔;多食辛,则筋急而爪枯;多食酸,则肉胝皱而唇揭;多食甘,则骨痛而发落,此五味之所伤也。”

涉及考点 | 饮食偏嗜

17.所谓“得气”体现的经络功能是

- | | |
|----------|----------|
| A.沟通联络作用 | B.运输渗灌作用 |
| C.感应传导作用 | D.调节平衡作用 |
| E.运行气血作用 | |

【答案】C

【解析】经络的生理机能为沟通联系作用、运输渗灌作用、感应传导作用、调节作用。感应传导,是指经络系统具有感应及传导针灸或其他刺激等各种信息的作用。如对经穴刺激引起的感应及传导,通常称为“得气”,即局部有酸、麻、胀的感觉及沿经脉走向传导,就是经络感应传导作用的体现。

涉及考点 | 经络的生理功能

18.患者四肢冰凉,神志昏迷,口臭。口渴引饮,脉有力,辨证为

- | | |
|---------|---------|
| A.表热证 | B.里虚热证 |
| C.表寒里热证 | D.真寒假热证 |

E.真热假寒证

【答案】E

【解析】真热假寒是内热炽盛而外见寒象的证候。四肢冰凉是因内热过盛,阳气闭郁不能外达所致。口臭,口渴引饮,脉有力,此类都是内有实热的表现。

涉及考点 | 真热假寒

19.补阳时适当配伍补阴药的方法是

- | | |
|--------|--------|
| A.阴中求阳 | B.阳中求阴 |
| C.阴病治阳 | D.阳病治阴 |
| E.阴阳双补 | |

【答案】A

【解析】善补阳者,必于阴中求阳,则阳得阴助而生化无穷。根据阴阳互补的原理,补阳时适当佐以补阴药谓之阴中求阳。

涉及考点 | 调整阴阳

(20~21 题共用备选答案)

- | | |
|--------|--------|
| A.津 | B.液 |
| C.受纳水谷 | D.贮存尿液 |
| E.运化 | |

20.小肠主

【答案】B

21.胃主

【答案】C

【解析】选项 A 大肠主津。选项 B 小肠主液。选项 C 胃受纳水谷。选项 D 膀胱贮存尿液。选项 E 脾主运化。

涉及考点 | 胃、小肠的生理机能

(22~23 题共用备选答案)

- | | |
|------|------|
| A.督脉 | B.任脉 |
| C.冲脉 | D.带脉 |
| E.维脉 | |

22.与女子妊娠关系密切,主胞胎的是

【答案】B

【解析】任脉起于胞中,与女子妊娠有关,称“任主胞胎”。

23.与妇女月经关系密切的是

【答案】C

【解析】冲脉有“十二经脉之海”“血海”之称,与女子月经及孕育机能密切相关。

涉及考点 | 任脉、冲脉的基本机能

(24~25 题共用备选答案)

- | | |
|---------|---------|
| A.益火补土法 | B.金水相生法 |
| C.抑木扶土法 | D.培土制水法 |
| E.泻南补北法 | |

24.肾阳虚不能温脾,以致脾阳不振,其治疗宜采用

【答案】A

【解析】益火补土法是温肾阳补脾阳的一种方法,适用于肾阳不能温煦脾土的脾肾阳虚证。

25.脾虚不运或脾肾阳虚,水湿泛滥而致的水肿胀满之证,其治疗宜采用

【答案】D

【解析】培土制水法是通过温运脾阳或健脾温肾治疗水湿停蓄的一种方法,适用于脾虚不运或脾肾阳虚、水湿泛滥而致的水肿胀满之证。

涉及考点 | 五脏疾病的具体治法

26.适用于热结旁流的治则是

- | | |
|--------|--------|
| A.热因热用 | B.寒因寒用 |
| C.通因通用 | D.塞因塞用 |
| E.寒者热之 | |

【答案】C

【解析】通因通用,即以通治通,是用通利的药物来治疗具有通泻症状的实证。适用于“大实有羸状”的真实假虚证。

涉及考点 | 反治

27.《素问·上古天真论》中关于“丈夫五八”在生理上的表现是

- | | |
|------------------|-------------------|
| A.阳气衰竭于上,面焦,发鬓斑白 | B.肾气衰,发堕齿槁 |
| C.肾脏衰,形体皆极 | D.肝气衰,筋不能动,天癸竭,精少 |
| E.三阳脉衰于上,面皆焦,发始白 | |

【答案】B

【解析】丈夫八岁,肾气实,发长齿更。二八,肾气盛,天癸至,精气溢泻,阴阳和,故能有子。三八,肾气平均,筋骨劲强,故真牙生而长极。四八,筋骨隆盛,肌肉满壮。五八,肾气衰,发堕齿槁。六八,阳气衰竭于上,面焦,发鬓斑白。七八,肝气衰,筋不能动,天癸竭,精少,肾藏衰,形体皆极。八八,则齿发去。

涉及考点 | 《素问·上古天真论》

28.《素问·上古天真论》提到女子“三阳脉衰于上,面皆焦,发始白”的年龄是

- | | |
|------|------|
| A.二七 | B.四七 |
| C.五七 | D.六七 |
| E.三七 | |

【答案】D

【解析】女子七岁,肾气盛,齿更发长。二七而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子。三七,肾气平均,故真牙生而长极。四七,筋骨坚,发长极,身体盛壮。五七,阳明脉衰,面始焦,发始堕。六七,三阳脉衰于上,面皆焦,发始白。七七,任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏而无子也。

涉及考点 | 《素问·上古天真论》

29.阳偏盛而导致的实热证,其治疗方法为

- | | |
|--------|--------|
| A.阴病治阳 | B.热因热用 |
| C.热者寒之 | D.寒者热之 |
| E.阳中求阴 | |

【答案】C

【解析】“阳盛则热”的实热证,据阴阳对立制约原理,宜用寒凉药物以泻其偏盛之阳热,此即“热者寒之”之意。

涉及考点 | 正治

30.“湿浊内生”的主要机理是

- A.肺气不足,寒饮内停
- B.胸阳不振,阴寒内盛
- C.恣食生冷,内伤脾胃
- D.脾肾阳虚,阴寒内盛
- E.痰湿内阻,从阴化寒

【答案】C

【解析】内湿的产生,多因过食肥甘,嗜烟好酒,恣食生冷,内伤脾胃,致使脾失健运不能为胃行其津液,或喜静少动,素体肥胖,情志抑郁,致气机不利,津液输布障碍,聚而成湿所致。因此,脾的运化失职是湿浊内生的关键。

涉及考点 | 湿浊内生的机理

第二篇 中医诊断学



考情分布图

		2015	2016	2017	2018	2019
中医诊断学	望诊、闻诊、问诊、切诊	4	5	5	6	14
	八纲辨证	3	3	2	1	3
	气血津液辨证	2	3	4	4	4
	脏腑辨证	6	6	5	4	7



高频考点必背

1. 中医诊断的基本原理：**司外揣内、见微知著、以常衡变**。
2. “四诊合参”，是指**望、闻、问、切**四诊并重，诸法参用，综合收集病情资料。
3. **病**是对疾病**全过程**的特点与规律所作的**概括**。
4. **证**是对疾病**当前阶段**的病位、病性等所作的**结论**。
5. 病注重从贯穿疾病始终的根本矛盾上认识病情，证主要是从机体反应状况上认识病情。辨病有利于从疾病全过程、特征上认识疾病的本质；辨证则重在从疾病当前的表现中判断病变的位置与性质，抓住当前的主要矛盾。
6. **少神**临床表现：**精神不振**，两目乏神，面色少华，肌肉松软，**倦怠乏力**，**少气懒言**，动作迟缓等。临床意义：提示正气不足，精气轻度损伤，脏腑功能减弱。常见于虚证患者，或病后恢复期病人。
7. **假神**是指久病、重病者，**精气本已极度衰竭**，而**突然**一时间**出现**某些神气暂时“**好转**”的虚假表现。古人比喻为回光返照、残灯复明。
8. **神乱**是指神志错乱失常。多见于癲、狂、痴、痫、脏躁等病人。
9. **主色**为人生来就有的基本面色，属于个体特征，终生基本不变。
10. **客色**是指因外界因素（如季节、昼夜、阴晴气候等）的不同，或生活条件的差异，而微有相应变化的面色。如**春应稍青**，**夏应稍红**，**长夏应稍黄**，**秋应稍白**，**冬应稍黑**等。
11. **善色**指病人面色虽有异常，但仍光明**润泽**。说明其病易治，预后较好。
12. **恶色**指病人面色异常，且**枯槁**晦暗。说明病变深重，脏腑精气已衰，胃气不能上荣于面。其病难治，预后较差。
13. **赤色**主**热**证，亦可见于**戴阳**证。**白色**主**虚**证（包括血虚、气虚、阴虚）、**寒**证、**失血**证。
14. **黄色**主**虚**证、**湿**证。
15. **青色**主**寒**证、**气滞**、**血瘀**、**疼痛**和**惊风**。
16. **黑色**主**肾虚**、**寒**证、**水饮**、**瘀血**、**剧痛**。
17. **目内眦及外眦**的血络属**心**，称为“血轮”。**黑珠**属**肝**，称为“风轮”。**白睛**属**肺**，称为“气轮”。**瞳仁**属**肾**，称为“水轮”。**眼胞**属**脾**，称为“肉轮”。
18. 伪膜坚韧，**不易剥离**，**重剥则出血**，或剥去随即复生，此属重证，多是**白喉**，又称“疫喉”，

因肺胃热毒伤阴而成,属烈性传染病。

19. 伪膜:咽部溃烂处上覆白腐,形如**白膜**者。

20. 小儿病理指纹的观察其要点可概括为:**三关测轻重,浮沉分表里,红紫辨寒热,淡滞定虚实**。

21. 有“**舌尖属上脘,舌中属中脘,舌根属下脘**”的说法。

22. 舌尖红赤或破溃,多为**心火上炎**;舌体两侧出现青紫色斑点,多为**肝经气滞血瘀**。

23. 若舌见厚腻苔,多见于脾失健运所致的湿浊、痰饮、食积等;若**舌苔出现剥脱**,在舌中多为**胃阴不足**,在舌根多为肾阴虚等。

24. 舌色红活明润,舌体**活动自如**者,为**有神**之舌。舌色晦暗枯涩,**活动不灵**者,为**无神**之舌。

25. **老舌**多见于**实证**。实邪亢盛,充斥体内,而正气未衰,邪正交争,邪气壅滞于上,故舌质苍老。

26. **嫩舌**多见于**虚证**。气血不足,舌体脉络不充,或阳气亏虚,运血无力,寒湿内生,故舌嫩色淡白。

27. **新病**音哑或失音者,多属实证,多因外感风寒或风热袭肺,或痰湿壅肺,肺失清肃,邪闭清窍所致,即所谓“**金实不鸣**”。

28. **久病**音哑或失音者,多属虚证,多因各种原因导致阴虚火旺,肺肾精气内伤所致,即所谓“**金破不鸣**”。

29. 妇女妊娠末期出现音哑或失音者,称为**妊娠失音(子暗)**,系因胎儿渐长,压迫肾之络脉,使**肾精不能上荣于舌咽**所致。

30. 伤寒病不经过传变,**两经或三经同时出现的病证**,称为“**合病**”。如太阳阳明合病、太阳太阴合病等。

31. 伤寒病凡**一经病证未罢,又见他经病证**者,称为“**并病**”。如太阳少阴并病,太阴少阴并病等。

32. 谵语指神识不清,语无伦次,**声高有力**的症状。多属邪热内扰神明所致,属实证,故《伤寒论》谓“**实则谵语**”。

33. 郑声指神识不清,语言重复,时断时续,**语声低弱模糊**的症状。多因久病脏气衰竭,心神散乱所致,属虚证,故《伤寒论》谓“**虚则郑声**”。

34. 咳声短促,呈阵发性、痉挛性,连续不断,**咳后有鸡鸣样回声**,并反复发作者,称为**顿咳(百日咳)**,多因风邪与痰热搏结所致,常见于小儿。

35. 咳声如**犬吠**,伴有声音嘶哑,吸气困难,是肺肾阴虚,疫毒攻喉所致,多见于**白喉**。

36. 呕吐指饮食物、痰涎从胃中上涌,由口中吐出的症状。有声有物为**呕吐**,有物无声为**吐**,有声无物为**干呕**。

37. 呃逆俗称打呃,唐代以前称“**哕**”。是**胃气上逆**的表现。

38. 暖气古称“**噫**”。是**胃气上逆**的一种表现。

39. **一问寒热二问汗**,三问头身四问便,五问饮食六胸腹,七聋八渴俱当辨,九问旧病十问因,再兼服药参机变,妇女尤必问经期,迟速闭崩皆可见,再添片语告儿科,天花麻疹全占验。

40. 日晡潮热其特点是热势较高,**日晡热甚**,兼见腹胀便秘等。属**阳明腑实证**。

41. 骨蒸潮热午后或夜间潮热:其特点是**午后和夜间有低热**。有热自骨内向外透发的感觉者,称为骨蒸发热,多属**阴虚火旺**所致。

42.湿温潮热午后发热明显,其特点是**身热不扬**,肌肤初扪之不觉很热,扪之稍久即觉灼手,此属湿温,为湿郁热蒸之象。

43.瘀血潮热午后和夜间有低热,可兼见**肌肤甲错**,舌有瘀点瘀斑者,属瘀血积久,郁而化热。

44.战汗指病人先恶寒战栗,表情痛苦,几经挣扎,而后汗出的症状。为疾病好转或恶化的**转折点**。

45.白带是指带下色白量多,质稀如涕,淋漓不绝的症状,多属**脾肾阳虚**,寒湿下注所致。

46.黄带是指带下色黄,质黏,气味臭秽的症状,多属**湿热下注**或湿毒蕴结所致。

47.寸口脉分为寸、关、尺三部。通常以腕后高骨(桡骨茎突)为标记,其内侧的部位关前(腕侧)为寸,关后(肘侧)为尺。两手各有寸、关、尺三部,共六部脉。寸关尺三部又可施行浮、中、沉三候。

48.**结脉**的特点为脉来缓慢,时有中止,止无定数。

49.**促脉**的特点为脉来数而时有一止,止无定数。

50.**代脉**的特点为脉来一止,止有定数,良久方还。

51.**虚里即心尖搏动处**,位于左乳下第四、五肋间,乳头下稍内侧,当心脏收缩时,心尖向胸壁冲击而引起的局部胸壁的向外搏动,可用手指指尖触到。

52.真热假寒指内有真热而外见某些假寒的“**热极似寒**”证候。

53.真寒假热指内有真寒而外见某些假热的“**寒极似热**”证候。

54.**风**为阳邪,其性开泄,易袭阳位,善行而数变,常兼夹其他邪气为患。

55.**寒**为阴邪,具有凝滞、收引、易伤阳气的特性。

56.**暑**为阳邪,具有暑性炎热升散,耗气伤津,易夹湿邪等致病特点。

57.**湿**为阴邪,具有阻遏气机,损伤阳气,黏滞缠绵,重浊趋下等致病特点。

58.**燥**邪具有干燥,伤津耗液,损伤肺脏等致病特点。

59.**火**为阳邪,具有炎上,耗气伤津,生风动血,易致肿疡等特性。

60.喜证是指由于**过度喜乐**,导致神气失常,以喜笑不休、精神涣散等为主要表现的情志证候。

61.怒证是指由于暴怒或**过于愤怒**,导致肝气横逆、阳气上亢,以烦躁多怒、胸胁胀闷、面赤头痛等为主要表现的情志证候。

62.悲恐证是指由于**悲伤过度**,或经受过度惊骇,使气机消沉,以情绪悲哀或恐惧、胆怯易惊、神疲乏力等为主要表现的情志证候。

63.忧思证是指由于**思虑过度**,或过分忧愁,导致心、脾等脏腑气机紊乱,以忧愁不乐、失眠多梦等为主要表现的情志证候。

64.气虚证是指气虚**无力升举**,清阳之气下陷,以自觉**气坠**,或**脏器下垂**为主要表现的虚弱证候。病体虚弱,以神疲、乏力、气短、脉虚为主要表现。

65.气不固证是指**气虚失其固摄**之能,以自汗,或大便、小便、经血、精液、胎元等不固为主要表现的虚弱证候。病体虚弱,以疲乏、气短、脉虚及自汗或二便、经、精等的不固为主要表现。

66.气逆证是指气机失调,**气上冲逆**,以咳嗽喘促、呃逆、呕吐等为主要表现的证候。以咳嗽或呕吐、呃逆等为突出表现。

67.气闭证是指**邪气阻闭神机**或脏器、官窍,以突发昏厥或绞痛为主要表现的实性急重证候。以**突发昏厥或绞痛**、二便闭塞、息粗、脉实为主要表现。

68.气滞证是指人体某一部分或某一脏腑、经络的气机阻滞。运行不畅,以**胀闷疼痛**为主要表现的证候。以胸胁脘腹或损伤部位的胀闷、胀痛、窜痛为主要表现。

69.**痰饮**:饮停胃肠,脘腹痞胀,呕吐清涎,胃中振水音,肠间水声辘辘。

70.**悬饮**:饮停胸胁,胸胁饱满、胀痛,咳嗽、转侧则痛增,脉弦。饮停胸胁,阻碍气机。

71.**支饮**:饮停心肺,胸闷心悸,气短不能平卧等。

72.**溢饮**:饮溢四肢,肢体沉重、酸痛,或浮肿,小便不利。

73.**阳水**:多因外邪侵袭所致,风邪犯肺,通调失职;湿邪困脾,脾失健运,实证,发病急病程短,眼睑、颜面先肿,迅速遍及全身,皮薄光亮,小便短少,伴咽喉肿痛、咳嗽及表证。

74.**阴水**:多因久病脾肾阳气虚衰所致,脾肾阳气虚衰,运化、主水失职;虚实夹杂,发病缓病程长,足胫、下肢先肿,渐至全身,腰以下肿甚,按之凹陷难复,小便短少,兼脾、肾阳虚的表现。

75.心气虚证以**心悸**、神疲与**气虚症状**共见为辨证的主要依据。

76.心阳虚证以**心悸怔忡**、心胸憋闷与**阳虚症状**共见为辨证的主要依据。

77.心阳虚脱证以心悸胸痛、**冷汗**、**肢厥**、脉微等表现为辨证依据。

78.心阳暴脱证是在心阳虚的基础上,突然出现冷汗、肢厥、脉微等**亡阳证候**为特征。

79.心血虚与心阴虚虽均可见心悸、失眠、多梦等症,但**血虚以“色白”为特征**而无热象,**阴虚以“色赤”为特征**而有明显热象。

80.瘀阻心脉证以**刺痛**为特点,伴见舌暗,或有青紫色斑点,脉细涩或结或代等**瘀血**内阻的症状。

81.痰阻心脉证以**闷痛**为特点,多伴体胖痰多,身重困倦,苔白腻,脉沉滑或沉涩等痰浊内盛的症状。

82.寒凝心脉证以**痛势剧烈**、**突然发作**,遇寒加剧,得温痛减为特点,伴见畏寒肢冷,舌淡苔白,脉沉迟或沉紧等寒邪内盛的症状。

83.气滞心脉证以**胀痛**为特点,其发作往往与精神因素有关,常伴见胁胀,善太息,脉弦等气机郁滞的症状。

84.胃热炽盛证以胃脘**灼痛**、消谷善饥等与实火症状共见为辨证的主要依据。

85.寒饮停胃证以脘腹痞胀、胃中有振水声、**呕吐清水**等为辨证的主要依据。

86.食滞胃肠证多有**伤食**病史,以脘腹痞胀疼痛、呕泻酸馊腐臭等为辨证的主要依据。

87.胃肠气滞证以脘腹**胀痛**走窜、嗝气、肠鸣、矢气等为辨证的主要依据。

88.肝阳上亢证以眩晕耳鸣、**头目胀痛**、面红、烦躁、**腰膝酸软**等为辨证的主要依据。

89.肝火炽盛证以头痛,烦躁,耳鸣,胁痛等与**火热症状**共见为辨证的主要依据。

90.肾阳虚证以**腰膝酸冷**、性欲减退、夜尿多与**虚寒症状**共见为辨证的主要依据。

91.肾虚水泛证以**水肿下肢为甚**、尿少、畏冷肢凉等为辨证的主要依据。

92.肝胆湿热证病位主要在肝胆(疏泄功能失职),故以**胁肋胀痛**、肋下痞块、**黄疸**、**口苦**等肝胆疏泄失常症状为主,尚可出现寒热往来及阴部瘙痒,妇女带下黄臭等症。

93.湿热蕴脾证病位主要在脾胃(纳运升降失职),故以脘腹胀闷、纳呆呕恶、**大便溏泄**等受纳运化功能失常症状为主,还可出现肢体困重、身热不扬等症。

5年 历年真题

1. 中医诊断的基本原则是

- A. 整体审察, 诊法合参, 病证结合
- B. 证候真假, 证候错杂, 诊法合参
- C. 辨证求因, 审因论治, 脉症合参
- D. 证候转化, 病证结合, 辨证求因
- E. 司外揣内, 见微知著, 以常衡变

【答案】A

【解析】中医诊断的基本原则是: 整体审察, 诊法合参, 病证结合。选项 B、C、D、E 均不是原则, 所以本题选 A。

涉及考点 | 中医诊断的基本原则

2. 病人表现为假神的临床意义是

- A. 脏腑虚衰, 功能低下
- B. 阴盛于内, 格阳于外
- C. 气血不足, 精神亏损
- D. 精气衰竭, 虚阳外越
- E. 机体阴阳严重失调

【答案】D

【解析】久病、重病之人, 精气本已极度衰竭, 而突然出现某些神气暂时“好转”的虚假表现, 是为假神。假神的出现, 是因为脏腑精气极度衰竭, 正气将脱, 阴不敛阳, 虚阳外越, 阴阳即将离决所致, 常是危重病人临终前的征兆。

涉及考点 | 假神



配套名师高清视频

3. 得神的面色特征是

- A. 面色荣润, 含蓄不露
- B. 面色无华, 晦暗暴露
- C. 面色少华, 黯淡不容
- D. 面似有华, 泛红如妆
- E. 面色无华, 青如草兹

【答案】A

【解析】本题考查的知识点是望神。得神即有神, 是精充气足神旺的表现, 面色荣润含蓄, 表情丰富自然。选项 B 为少神, 选项 C 及选项 E 为失神, 选项 D 为假神, 所以本题选 A。

涉及考点 | 望神

4. 下列各项, 不属于面色青主病的是

- A. 寒证
- B. 惊风
- C. 湿证
- D. 血瘀
- E. 气滞

【答案】C

【解析】面色青主寒证、疼痛、气滞、血瘀、惊风等, 多由寒凝气滞, 或痛则不通, 或瘀血内阻, 或筋脉拘急, 使面部脉络血行受阻所致。湿证多见面色黄。

涉及考点 | 五色主病

5. 肾虚水饮的面色特征是哪一项

- A. 面黑暗淡
- B. 面黑干焦
- C. 眼眶周围色黑
- D. 面色黧黑
- E. 面色晦暗如烟熏

【答案】C

【解析】本题考查的知识点是望面色。黑色主肾虚、寒证、水饮、瘀血、剧痛，眼眶周围色黑着，多属肾虚水饮或寒湿带下。选项 A 属肾阳虚，选项 B 属肾阴虚，选项 D 属瘀血，选项 E 属阴黄，所以本题选 C。

涉及考点 | 五色主病

6.按《素问·刺热》面部分候法，候脾的部位是

- A.额部
- B.鼻部
- C.右颊
- D.左颊
- E.颞部

【答案】B

【解析】《素问·刺热》划分法：左颊候肝，右颊候肺，额候心，鼻候脾，颞候肾。

涉及考点 | 面部色诊

7.按“五轮学说”之两目白睛是

- A.风轮
- B.血轮
- C.肉轮
- D.气轮
- E.水轮

【答案】D

【解析】中医特有的“五轮学说”，即瞳仁属肾，称为水轮；黑睛属肝，称为风轮；两眦及血络属心，称为血轮；白睛属肺，称为气轮；眼胞属脾，称为肉轮。

涉及考点 | 目的脏腑分属

8.手足蠕动多属于

- A.热极生风
- B.虚风内动
- C.狂犬病
- D.痫证
- E.肝火上亢

【答案】B

【解析】手足蠕动多是形容四肢抽动的范围程度小，属于虚证的表现，而其它选项都是实证，所以不会出现手足蠕动。

涉及考点 | 望四肢动态

9.斑与疹的区别主要是

- A.是否色红成片
- B.是否时现时隐
- C.是否抚之碍手
- D.是否压之褪色
- E.是否伴有身热

【答案】C

【解析】斑指皮肤黏膜出现深红色或青紫色片状斑块，平摊于皮肤，摸之不碍手，压之不褪色的症状。疹指皮肤出现红色或紫红色、粟粒状疹点，高出皮肤，抚之碍手，压之褪色的症状。常见于麻疹、风疹、瘾疹等病，也可见于温热病中。

涉及考点 | 斑与疹的主要区别

10.疮疡红肿高大，根盘紧束，焮热疼痛者为

- A.疽
- B.疖
- C.疔
- D.疔

E.热气疮

【答案】B

【解析】选项 A 疔为漫肿无头,肤色不变,疼痛不已;选项 C 疔为形小如粟,根深如钉,麻木痒痛;选项 D 疔为型小而阔,红肿热痛不甚;选项 E 热气疮为针头至绿豆大小的水疮,有瘙痒和灼痛感,好发于口角唇边等;所以本题选 B。

涉及考点 | 痈的特点

11.肝胆郁热的呕吐物为

A.黄绿色

B.紫暗

C.暗红色

D.白稠

E.黄稠

【答案】A

【解析】呕吐黄绿色苦水,多属肝胆郁热,以致胃失和降。故选项 B、C、D、E 都不是正确选项,所以本题选 A。

涉及考点 | 望呕吐物

12.风痰的特征是哪一项

A.色黄黏稠

B.白而清稀

C.清稀多泡沫

D.白滑而量多

E.少而黏稠

【答案】C

【解析】选项 A 为热痰的特征;选项 B 为寒痰的特征;选项 D 为湿痰的特征;选项 E 为燥痰的特征;所以本题选 C。

涉及考点 | 风痰

13.小儿指纹达于气关是

A.邪气入络

B.邪气入经

C.邪入脏腑

D.外感初起

E.病情凶险

【答案】B

【解析】风关以内,为邪在络;在气关,为邪在经;在命关,为邪入脏;透关射甲,即指纹一直延至指端爪甲者,预后不良,病情凶险。

涉及考点 | 望小儿指纹

14.长期使用抗生素后引起的舌苔变化是

A.灰黑苔

B.黑腻苔

C.燥腻苔

D.花剥苔

E.糙苔

【答案】B

【解析】饮食和某些药物可以使舌象发生变化。长期服用某些抗生素,可产生黑腻苔或霉腐苔。

涉及考点 | 舌诊注意事项

15.舌青紫湿润而短缩的主病为

A.痰浊内阻

B.寒凝筋脉

- C.肝风内动
E.风气挟痰
- D.热盛伤津动风

【答案】B

【解析】短缩舌的临床意义:短缩舌伴色淡紫或青紫而湿润,多属阳气暴脱,寒凝筋脉。

涉及考点 | 短缩舌的临床意义

16.阴寒内盛,血行瘀滞的舌象为

- A.舌淡红润泽
C.舌绛紫而干
E.舌青紫湿润
- B.舌红绛少苔
D.舌淡白光莹

【答案】E

【解析】舌色淡紫或青紫湿润,多因阴寒内盛,血脉瘀滞所致。舌淡红润泽为气血调和的征象,常见于正常人。舌红绛少苔提示阴虚阳亢,多由热病后期阴液受损,或久病阴虚火旺,属虚热证。舌绛紫而干多属热盛伤津。舌淡白光莹多属阳虚水停。

涉及考点 | 舌色变化

17.邪热夹酒毒上壅的舌象是

- A.舌色青紫
C.舌紫肿胀
E.舌脉粗长
- B.舌色晦暗
D.舌多瘀斑

【答案】C

【解析】本题考查的知识点是望舌。选项 A 为血瘀所致,还可见于某些先天性心脏病,或药物、食物中毒等病。选项 B 表明津液匮乏,气血大亏。选项 C 多见于酒毒内蕴,酒癖患者。选项 D 由气滞血瘀所致。选项 E 多为瘀血内阻。

涉及考点 | 舌形变化

18.消渴病患者病室的气味可为

- A.尸臭味
C.血腥味
E.烂苹果样气味
- B.腐臭味
D.尿臊味

【答案】E

【解析】病室臭气触人,多为瘟疫类疾病。血腥味:病者多患失血。腐败味:病者疮疡化脓,流脓。尸臭味:病者脏腑衰败,病情重笃。烂苹果味:消渴患者晚期酮症酸中毒。尿臊味(氨气味),见于肾衰患者。

涉及考点 | 嗅气味

19.久病重病,突然语声嘶哑的临床意义是

- A.脏气将绝
C.阴虚火旺
E.咽喉失润
- B.风热袭肺
D.肺气不足

【答案】A

【解析】新病音哑或失音者,多因外感风寒或风热袭肺,或痰湿壅肺,以致肺气不宣,清肃失司,邪闭清窍。声音嘶哑伴有低热、舌红少苔、咽干口燥者,多为阴虚火旺,当情绪发生变化也可突然发生失音,喉部检查无异常,多见于脏躁症。

涉及考点 | 音哑与失音

20. 发热为午后夜间低热的临床意义是

- | | |
|---------|---------|
| A. 阳明腑实 | B. 阴虚火旺 |
| C. 湿温内蕴 | D. 温病入营 |
| E. 热邪客表 | |

【答案】B

【解析】本题考察的是发热的特点。骨蒸潮热午后或夜间潮热：其特点是午后和夜间有低热。有热自骨内向外透发的感觉者，称为骨蒸发热，多属阴虚火旺所致。

涉及考点 | 阴虚发热

21. 外感热病中，正邪相争，提示病变发展转折点的是

- | | |
|-------|-------|
| A. 战汗 | B. 盗汗 |
| C. 自汗 | D. 冷汗 |
| E. 热汗 | |

【答案】A

【解析】战汗指病人先恶寒战栗而后汗出的症状。若汗出热退，脉静身凉，提示邪去正安，疾病好转；若汗出身热不退，烦躁不安，脉来急疾，提示邪盛正衰，病情恶化。

涉及考点 | 特殊汗出

22. 手足心汗出量多是因为

- | | |
|-----------|-----------|
| A. 阴经郁热熏蒸 | B. 阳经郁热熏蒸 |
| C. 阴虚发热 | D. 上焦热盛 |
| E. 气虚发热 | |

【答案】A

【解析】手足心汗出为阳气内郁，阴虚阳亢或中焦湿热熏蒸证。

涉及考点 | 问汗

23. 有形实邪闭阻气机所致的疼痛，其疼痛性质的是

- | | |
|-------|-------|
| A. 胀痛 | B. 灼痛 |
| C. 冷痛 | D. 绞痛 |
| E. 隐痛 | |

【答案】D

【解析】胀痛为气滞作痛的特点。灼痛为火邪窜络，或阴虚火旺，经络被灼所致。冷痛因寒邪阻滞经络所致。绞痛多因有形实邪闭阻气机，或寒邪凝滞气机所致。隐痛多由精血亏虚，或阳气不足，阴寒内盛，机体失去充养、温煦而致。

涉及考点 | 疼痛的性质

24. 下列各项，属痰湿内阻头痛特征的是

- | | |
|-------|-------|
| A. 胀痛 | B. 刺痛 |
| C. 眼花 | D. 耳鸣 |
| E. 昏沉 | |

【答案】E

【解析】选项 A 为气滞疼痛特点；选项 B 为瘀血疼痛特点；选项 E 为湿性疼痛的特点；所以本题选 E。

涉及考点 | 问头痛

25. 口渴不多饮,兼见身热不扬,头身困重,胸闷纳呆,舌苔黄腻,其临床意义为

- A. 湿热内蕴
B. 饮停胃肠
C. 瘀血内阻
D. 热入营分
E. 阴虚火旺

【答案】A

【解析】渴不多饮,兼身热不扬、头身困重、苔黄腻者,属湿热证,由于湿热内蕴,津失布散所致;渴喜热饮,饮水不多,多为痰饮内停,津不上承所致;口干但欲漱水而不欲咽,兼舌紫暗或有瘀斑者,多属瘀血内停,气化不利所致;口渴饮水不多也可见于温病营分证,多因邪热入营,蒸腾营阴上承所致。

涉及考点 | 口渴与饮水

26. 口中黏腻不爽,其临床意义是

- A. 胃火炽盛
B. 湿热蕴脾
C. 胆火上炎
D. 心火上炎
E. 脾胃气虚

【答案】B

【解析】口中黏腻不爽,伴舌苔厚腻,多由湿浊困阻中焦所致;口黏腻而苦,多属肝胆湿热;口黏腻而甜,多为脾胃湿热。口淡多见于脾肾虚弱;口苦多见于心火、肝胆火旺,胆气上逆证;口酸多见于肝胃郁热,或食滞胃脘;口甜多见于脾胃湿热或脾虚之证,口咸多与肾病或寒水上泛有关;口涩多为燥热伤津,或脏腑热盛所致。

涉及考点 | 口味

27. 肝胃蕴热的口味是

- A. 口中泛酸
B. 口中酸馊
C. 口甜黏腻
D. 口中味咸
E. 口中味苦

【答案】A

【解析】酸味入肝,肝郁化热犯胃,胃失和降,则泛吐酸水,是为肝胃郁热证。选项 B 和选项 A 很相似,但它常见于脾胃湿热证。其余选项均不正确。

涉及考点 | 口味

28. 下列各项,除哪项外均属于排便感异常的是

- A. 肛门灼热
B. 排便不爽
C. 里急后重
D. 肛门重坠
E. 完谷不化

【答案】E

【解析】排便感异常有:肛门灼热、排便不爽、里急后重、肛门重坠、大便失禁。完谷不化为便质异常。

涉及考点 | 大便异常

29. 月经先期的临床意义是

- A. 血海空虚
B. 瘀血阻滞
C. 阴寒凝滞
D. 肝郁化热

E.阳气盛衰

【答案】D

【解析】月经先期多因气虚不固,或阳盛血热、肝郁血热、阴虚火旺,以致热扰冲任,血海不宁,或瘀阻胞络,络伤血瘀等所致。

涉及考点 | 经期异常

30.结脉与代脉的主要区别在于

A.节律不同

B.至数不同

C.脉力不同

D.脉位不同

E.流利度不同

【答案】A

【解析】脉来缓而时一止,止无定数为结脉,主阴盛气结,寒痰血瘀,亦主气血虚衰;脉来一止,止有定数,良久方来为代脉,主脏气衰微,亦主风证,痛证,七情惊恐,跌打损伤。

涉及考点 | 常见脉象

31.主阳虚而寒凝血瘀的脉象是

A.沉迟脉

B.沉弦脉

C.沉涩脉

D.沉缓脉

E.弦紧脉

【答案】C

【解析】沉涩脉主血瘀,尤常见于阳虚而寒凝血瘀者;沉迟脉主里寒证,常见于脾肾阳虚、阴寒凝滞的病证;沉弦脉主肝郁气滞或水饮内停;沉缓脉主脾虚而水湿停留;弦紧脉主寒证、痛证,常见于寒凝肝脉,或肝郁气滞等所致疼痛等。

涉及考点 | 相兼脉的主病



配套名师高清视频

32.下列对表证与里证的鉴别表述最恰当的是

A.表证为新病,里证多为久病

B.表证病较轻浅,里证病较深重

C.表证寒热并见,里证寒热单见

D.表证起病较急,里证起病较缓

E.表证多为外感,里证皆属内伤

【答案】C

【解析】表证与里证的鉴别,主要审察寒热症状,发热恶寒同时并见者属表证;但热不寒或但寒不热者属里证。

涉及考点 | 表证与里证

33.久病畏寒的临床意义是

A.寒邪内侵

B.风寒袭表

C.感受风邪

D.风湿外袭

E.阳气虚衰

【答案】E

【解析】畏是畏惧的意思。临床见畏寒多是属于阳气亏虚,属于虚证。而实证多是属于恶寒冷。

涉及考点 | 久病畏寒

34.临床病证的虚实,主要取决于

A.正气的强弱

B.正邪的消长

- C.阴阳的盛衰
E.气机的失调
- D.气血的盛衰

【答案】B

【解析】正气夺则虚，邪气亢则实，所以病症的虚实主要看邪正的消长；所以本题选 B 选项。

涉及考点 | 虚证与实证

35. 下列哪一项不是表寒证的临床表现
- A.恶寒重,发热轻
C.无汗
E.舌苔薄黄
- B.头身疼痛
D.鼻塞流清涕

【答案】E

【解析】表寒证见恶寒重,发热轻,无汗,苔薄白润,脉浮紧,因外感寒邪卫阳受损所致。表热证见发热,微恶风寒或有汗,舌边尖红赤,脉数,因外感热邪卫气被郁所致。舌苔薄黄为表热证表现。

涉及考点 | 证候相兼

36. 干咳无痰或少痰而黏的临床意义是
- A.风热犯肺
C.热邪犯肺
E.痰湿阻肺
- B.燥邪犯肺
D.痰热壅肺

【答案】B

【解析】外感燥邪、肺阴亏虚是干咳无痰或少痰而黏的关键词,因为燥性干涩,或者阴虚是有津液耗伤。

涉及考点 | 咳嗽的临床表现及意义

37. 下列各项,不属于心脾气血虚证临床表现的是
- A.心悸怔忡
C.食欲不振
E.舌红苔少
- B.失眠多梦
D.腹胀便溏

【答案】E

【解析】心脾气虚一般不会见到舌红少苔的表现,舌红少苔临床多见于阴虚。

涉及考点 | 心脾气血虚证临床表现

38. 哮的临床意义是
- A.痰饮内伏,复感外邪
C.水气上凌心肺
E.肺脾气虚,内生痰湿
- B.寒邪、热邪袭肺
D.肺肾亏虚,气失摄纳

【答案】A

【解析】哮证的病机有夙根论一说:素痰伏肺,外邪引动。

涉及考点 | 哮的临床意义

39. 寒滞胃肠证、食滞胃肠证、胃肠气滞证的共同表现是
- A.胃脘冷痛剧烈
C.胃脘疼痛痞胀
- B.脘腹胀痛走窜
D.胃脘隐痛痞胀

E.胃脘疼痛喜按

【答案】C

【解析】选项 A 为寒滞胃肠的表现;选项 B 为胃肠气滞的表现;D、选项 E 为虚证胃痛的表现;选项 C 为几种胃痛共同可见的临床表现;所以本题选 C。

涉及考点 | 寒滞胃肠证、食滞胃肠证、胃肠气滞证

40.患者头痛,痛处固定,痛如针刺的临床意义是

A.心脉痹阻证

B.肝阳上亢证

C.肝火上炎证

D.痰蒙清窍证

E.瘀阻脑络证

【答案】E

【解析】一般题干中看见痛如针刺多是属于瘀血的表现。

涉及考点 | 问疼痛

41.患者,男,40岁。平时性情急躁易怒,近2周失眠多梦,头晕,口舌溃疡肿痛,尿黄,大便干结,舌红苔黄,脉数的临床意义是

A.肝火上炎证

B.心火亢盛证

C.胃火上冲证

D.脾胃湿热证

E.肾火上炎证

【答案】A

【解析】患者平时性情急躁易怒就是属于肝火旺阳盛的体质,最近又出现了失眠多梦,头晕,口舌溃疡肿痛,尿黄,大便干结,舌红苔黄,脉数,可以诊断为肝火上炎证。

涉及考点 | 肝胆病辨证

42.患者惊悸不宁,失眠多梦,烦躁不安,苔黄腻的临床意义是

A.心火亢盛证

B.心阴虚证

C.痰火扰神证

D.胆郁痰扰证

E.痰蒙心神证

【答案】D

【解析】患者有惊悸不宁的表现,多和胆有关系。

涉及考点 | 肝胆病辨证

43.头发成斑片状脱落的临床意义是

A.气血两虚

B.肾精亏损

C.久病体弱

D.血虚受风

E.血热

【答案】D

【解析】血热风燥,病程旷久,阴血暗耗,转为血虚风燥;又有久病尚未康复,气血不足,正气不固,风邪外袭。所以会出现头发成斑片状脱落。

涉及考点 | 望头发的临床意义

44.患者身目发黄,黄色鲜明,腹部胃痞,肢体困重,便溏尿黄,身热不扬,舌红苔黄腻,脉濡数的临床意义是

A.肝胆湿热

B.大肠湿热

C.肝火上炎

D.湿热蕴脾

E.寒湿困脾

【答案】D

【解析】根据题干可以知道患者属于阳黄,与湿热有关,所以是湿热蕴脾。

涉及考点 | 阴黄

45.下列各项,称为“合病”的是

- A.伤寒病初起不从阳经传入,直接邪入于三阴者
- B.伤寒病按六经的顺序相传者
- C.伤寒病不经过传变,两经或三经同时出现病证者
- D.伤寒病一经病证未罢,又见他经病证者
- E.伤寒病按隔一经或两经以上相传者

【答案】C

【解析】两经或三经的病证同时出现者,称为合病;传经是指病邪从外侵入,逐渐向里深入,由一经病证转变为另一经病证;一经病证未罢,又出现另一经病证,称为并病;凡伤寒病初起,病邪不从阳经传入,而直接侵袭三阴经而发病者,称为直中。

涉及考点 | 合病

46.上焦传中焦,中焦传下焦属于三焦病证传变的

- A.逆传
- B.顺传
- C.表里传
- D.循经传
- E.越经传

【答案】B

【解析】三焦病证的传变,一般多由上焦手太阴肺卫开始,传入中焦,进而传入下焦,此为“顺传”,标志着病情由浅入深,由轻到重的病理进程。若病邪从肺卫而传入心包者,称为“逆传”,说明邪热炽盛,病情重笃。

涉及考点 | 顺传

(47~48 题共用备选答案)

- A.肝阳化风证
- B.阴虚动风证
- C.血虚生风证
- D.热极生风证
- E.肝阳上亢证

47.可见步履不稳,眩晕欲仆症状的是

【答案】A

48.可见眩晕肢体震颤,面白无华症状的是

【答案】C

【解析】选项 A 肝阳化风见眩晕欲扑;选项 B 见手足蠕动;选项 C 见面色淡白,手足颤动;选项 D 见高热烦躁甚至神昏;选项 E 见肾阴亏虚,头目胀痛;所以 47 题选 A。48 题选 C。

涉及考点 | 肝阳化风证、血虚生风证临床表现

(49~50 题共用备选答案)

- A.胆郁痰扰证
- B.痰蒙心神证
- C.热扰心神证
- D.痰瘀入络证
- E.痰火扰神证

49.患者表情淡漠,神识痴呆,精神抑郁,苔腻脉滑,其辨证为

【答案】B

50.患者发热口渴,胸闷气粗,心烦失眠甚则神昏谵语,其辨证为

【答案】E

【解析】选项 A 见胆怯易惊,胸胁胀闷,善太息。选项 B 见神志抑郁、错乱、痴呆、昏迷为表现。选项 C 见邪热炽盛,上扰心神,以心悸、失眠、面赤为表现。选项 D 见胸闷,痰多。胸中刺痛,血瘀等证候表现。选项 E 火热痰浊交结,以狂躁、神昏及痰热症状为表现;所以 49 题选 B;50 题选 E。

涉及考点 | 痰蒙心神症,痰火扰神症

(51~52 题共用备选答案)

- | | |
|--------|--------|
| A.指纹淡白 | B.指纹色青 |
| C.指纹鲜红 | D.指纹紫红 |
| E.指纹紫黑 | |

51.外感风寒常见到的小儿指纹是

【答案】C

52.疳积常见到的小儿指纹是

【答案】A

【解析】络脉颜色的变化多反映病邪的性质。若络脉鲜红,多属外感表证。络脉紫红,多属于里热证。络脉色青,主疼痛、惊风。络脉紫黑,为血络郁闭,病属重危。络脉色淡,多见于脾虚、疳积等虚弱患儿。一般来说,指纹色深暗滞者多属实证,是邪气有余;色淡不泽多属虚证,是正气不足。

涉及考点 | 小儿指纹病理变化

(53~54 题共用备选答案)

- | | |
|-------|-------|
| A.痿软舌 | B.强硬舌 |
| C.吐弄舌 | D.短缩舌 |
| E.胖嫩舌 | |

53.热盛伤津动风,可见

【答案】D

54.心脾有热,可见

【答案】C

【解析】痿软舌多见于伤阴或气血俱虚。强硬舌多见于热入心包或高热伤津或风痰阻络。吐弄舌属心脾有热。短缩舌为病情危重,可由寒凝筋脉气血俱虚或热盛伤津所致。胖嫩舌多属水湿内停痰湿上泛。

涉及考点 | 舌态变化

(55~56 题共用备选答案)

- | | |
|--------|--------|
| A.夜间咳甚 | B.咳声不扬 |
| C.咳声低微 | D.咳声重浊 |
| E.天亮咳甚 | |

55.肾水亏之咳嗽,多表现为

【答案】A

56.脾虚之咳嗽,多表现为

【答案】E

【解析】咳声不扬多属热,为热邪犯肺,肺津被灼之故。咳声低微多属虚证,为久病伤肺,肺失宣降之故。咳声重浊多属实,为实邪停聚于肺,肺失宣降之故。夜间咳甚为肾水亏的表现。天亮咳甚为脾虚的表现。

涉及考点 | 咳嗽

(57~58 题共用备选答案)

- | | |
|--------|--------|
| A.气虚阳虚 | B.邪正俱衰 |
| C.邪正俱盛 | D.邪去正复 |
| E.邪盛正衰 | |

57.战汗后身热不退,烦躁不安,脉来疾急的临床意义是

【答案】E

58.战汗后汗出热退,脉静身凉的临床意义是

【答案】D

【解析】战汗:指患者先见恶寒战栗而后汗出者。多见于外感热病中,提示邪正相争剧烈。战汗是病情变化的转折点,应注意观察战汗后的病情变化。若汗出热退,脉静身凉,是邪去正复之佳兆;若汗出而身热不减,烦躁不安,脉来疾急,是邪盛正衰之危候。

涉及考点 | 特殊汗出

(59~60 题共用备选答案)

- | | |
|--------|--------|
| A.阳明热盛 | B.中风 |
| C.心脾两虚 | D.上焦热盛 |
| E.阳虚 | |

59.手足汗出常见于

【答案】A

60.半身汗出常见于

【答案】B

【解析】手足汗出指手足心汗出过多者。常见原因有以下三种:①中焦湿热郁蒸所致者,常兼头身困重、身热不扬、苔黄腻等。②阳明热盛所致者,常兼身热、烦渴饮冷、溲赤便秘、脉洪数等。③阴虚内热所致者,常兼咽干口燥、五心烦热、脉细数等。半身汗出指患者身体的一半出汗,另一半无汗。无汗的半身是病变的部位所在。多因风痰或瘀痰等邪气阻滞经络,营卫不得周流,半身肌肤缺乏气血充养所致,半身无汗多见于中风、痿证及截瘫等。

涉及考点 | 局部汗出

(61~62 题共用备选答案)

- | | |
|------|------|
| A.濡脉 | B.缓脉 |
| C.紧脉 | D.芤脉 |
| E.涩脉 | |

61.失血伤阴的脉象是

【答案】D

62.可见于正常人的脉象是

【答案】B

【解析】濡脉主诸虚,又主湿;缓脉主湿病,脾胃虚弱,生理性缓脉见于正常人,表现为脉来



配套名师高清视频

从容不迫,应指均匀,和缓有力,是神气充沛的正常脉象;紧脉主寒证,痛证,宿食;芤脉主失血,伤阴;涩脉主伤精、血少,气滞、血瘀,夹痰、夹食。

涉及考点 | 脉象

(63~64题共用备选答案)

- A.脉来一止,止有定数,良久方还 B.形细而行迟,往来艰涩不畅,脉势不匀
C.脉形如豆,滑数有力,厥厥动摇,关部尤显 D.往来流利,应指圆滑,如盘走珠
E.脉来数而时有一止,止无定数

63.促脉的脉象特点是

【答案】E

64.动脉的脉象特点是

【答案】C

【解析】选项 A 是代脉的表现;选项 B 是滑脉的表现;选项 C 是动脉的表现;选项 D 是涩脉的表现;选项 E 是促脉的表现;所以 63 题选 E;64 题选 C。

涉及考点 | 脉象

(65~66题共用备选答案)

- A.表寒证 B.真寒假热证
C.虚寒证 D.实寒证
E.亡阳证

65.脘腹冷痛拒按,大便秘结,多见于

【答案】D

66.脘腹冷痛喜按,小便清长,多见于

【答案】C

【解析】脘腹冷痛为寒象,题干中无热象表现,其中实证疼痛特点为拒按,虚证疼痛特点为喜按。

涉及考点 | 寒证

(67~68题共用备选答案)

- A.疫毒痢初期,高热烦渴,舌红脉数,急骤出现四肢厥冷,面色苍白
B.咳嗽吐痰,息粗而喘,苔腻脉滑久之气短而喘,声低懒言
C.初为关节冷痛、重着,病久见患处红肿灼痛
D.自觉发热,欲脱衣揭被,下肢厥冷,面色浮红如妆
E.神识昏沉,四肢厥冷,胸腹灼热,口鼻气灼,舌红苔黄

67.热证转寒的临床表现是

【答案】A

68.真寒假热的临床表现是

【答案】D

【解析】热证转寒是指原为热证,后出现寒证,而热证随之消失的病变。选项 A 疫毒痢初期,高热烦渴,舌红脉数,急骤出现四肢厥冷,面色苍白,原为热证后转为寒证。真寒假热证其表现既有四肢厥冷,下利清谷,小便清长,舌淡苔白等一派真寒之象,又有面赤,身热,口渴,脉大的假热之象。选项 D 虽自觉身热却下肢厥冷,虽面红却浮红如妆,为真寒假热。选项 B 为痰湿阻肺,选项 C 为寒证转热,选项 E 为真热假寒证。

涉及考点 | 证候转化、证候真假

(69~70 题共用备选答案)

- | | |
|-------|-------|
| A.风淫证 | B.寒淫证 |
| C.湿淫证 | D.暑淫证 |
| E.火淫证 | |

69.恶寒重、或伴发热,无汗,头身疼痛鼻流清涕,其证候是

【答案】B

70.突发皮肤瘙痒、风团时隐时现,其证候是

【答案】A

【解析】寒淫证恶寒重,或伴发热,无汗,头身疼痛,鼻塞流清涕,脉浮紧。风淫证恶风,微发热,汗出,头痛,喷嚏,鼻塞流涕,咽喉痒痛,舌苔薄白,脉浮缓,或突发皮肤瘙痒,风团时隐时现。暑淫证耗气伤津,以发热口渴,神疲气短,心悸汗出为主。湿淫证以身体困重,肢体酸重,腹胀腹泻,纳呆为主。火淫证以发热口渴,胸腹灼热,面红,尿黄便秘为主。

涉及考点 | 风淫证、寒淫证

(71~72 题共用备选答案)

- | | |
|-------------|-------------|
| A.胆怯易惊,心悸失眠 | B.精神涣散,喜笑不休 |
| C.哭笑无常,打人毁物 | D.忧愁不乐,胸胁胀满 |
| E.烦躁发狂,头胀头痛 | |

71.悲恐证的临床表现是

【答案】A

72.喜伤证的临床表现是

【答案】B

【解析】选项 A 为悲恐证的临床表现;选项 B 为喜伤证的临床表现;选项 D 为忧伤证的临床表现;C 和 E 见于惊伤证;所以 71 题选 A;72 题选 B。

涉及考点 | 喜伤证、悲恐证

(73~74 题共用备选答案)

- | | |
|--------|--------|
| A.气滞血瘀 | B.气不摄血 |
| C.气随血脱 | D.气血两虚 |
| E.气血失和 | |

73.肝病日久,两胁胀满疼痛,并见舌质瘀斑、瘀点其病机是

【答案】A

74.产后大出血,继则冷汗淋漓,其则晕厥,其病机是

【答案】C

【解析】肝病日久,导致肝的功能失常,肝气瘀滞,进而出现血瘀症状。胁胀疼痛,是血瘀之象。且舌质出现瘀点瘀斑,更加印证了气滞血瘀的病理改变。产后大出血,导致血液丢失过多,使气随血脱,不能顾护人体,出现冷汗淋漓和晕厥的表现。选项 B 见于脾气虚无力固摄,导致出血。选项 C 见于大出血,气随血脱。

涉及考点 | 气滞血瘀、气随血脱证

75.咽喉溃烂处覆白腐,形如白膜者被称为

- | | |
|------|------|
| A.乳蛾 | B.喉痹 |
|------|------|

- C.发颐
E.伪膜

D.咽喉成脓

【答案】E

【解析】咽部溃烂处表面所覆盖的一层黄白或灰白色膜，称为伪膜。若伪膜色灰白，坚韧不易拭去，重剥出血，旋即复生者，称为白喉。咽部一侧或两侧喉核红肿疼痛、形如乳头，或有黄白色脓点，称为乳蛾。咽喉部红肿高突，疼痛剧烈，吞咽困难，身发寒热者，为喉痹。咽喉红肿高突，色深红，周围红晕紧束，发热不退者，多已成脓，称为咽喉成脓。

涉及考点 | 望咽喉形态

76.脾肾两亏的目态是

- A.戴眼反折
C.目睛微定
E.横目斜视

- B.昏睡露睛
D.双睑下垂

【答案】D

【解析】双睑下垂多为先天不足，脾肾亏虚。

涉及考点 | 望目态

77.痰热内闭的目态是

- A.戴眼反折
C.昏睡露睛
E.横目斜视

- B.目睛微定
D.双睑下垂

【答案】B

【解析】痰热内闭的目态是目睛微定。

涉及考点 | 望目态

78.肝经风热者可出现

- A.眼胞赤烂
C.全目赤肿
E.目胞微肿

- B.目眦红赤
D.白睛淡黄

【答案】C

【解析】目赤肿痛多属实热证。如白睛色红为肺火或外感风热；两眦赤痛为心火；睑缘赤烂为脾有湿热；全目赤肿为肝经风热上攻。

涉及考点 | 望目态

79.食滞胃脘呕吐的特点是

- A.喷射状呕吐
C.朝食而暮吐
E.吐黏稠之黄水

- B.饮后即吐出
D.呕吐物酸腐

【答案】D

【解析】厌食伴脘腹胀满、嗳气酸腐，甚或呕吐酸馊食物者，为食滞胃脘；喷射状呕吐为热扰神明；饮后即吐出为妊娠恶阻；朝食而暮吐为胃寒呕吐；吐黏稠之黄水多属实热证。

涉及考点 | 望呕吐物

80.小儿指纹色青者属

- A.外感表证

- B.里实热证

- C.痛证惊风
E.血络闭郁
- D.脾虚痞积

【答案】C

【解析】小儿指纹色鲜红为外感风寒表证；色紫红为热证；色青为痛证、惊风；色紫黑为血络郁闭，病情危重；色青紫为肝经风热、停食、停痰。

涉及考点 | 小儿指纹

- 81.舌淡紫而湿润者主
- A.气滞血瘀
B.气虚血瘀
C.寒凝血瘀
D.热毒极盛
E.阴液耗竭

【答案】C

【解析】舌淡紫而湿润：阴寒内盛，或阳气虚衰所致寒凝血瘀。

涉及考点 | 望舌苔

- 82.阳热有余，蒸腾胃中腐浊邪气上升，其舌苔表现为
- A.白腻苔
B.积粉苔
C.黄腻苔
D.腐苔
E.黏腻苔

【答案】D

【解析】腐苔的形成，多因阳热有余，蒸腾胃中腐浊邪气上泛，聚集于舌面而成。

涉及考点 | 望舌苔

- 83.神识不清，语无伦次，声高有力，属于
- A.谵语
B.郑声
C.独语
D.错语
E.夺气

【答案】A

【解析】谵语神志不清，语无伦次、声高有力；郑声神志不清，语言重复，声音低微；独语自言自语，喃喃不休，见人则止，首尾不续；错语语言错乱，语后自知，不能自主；狂言指精神错乱，语无伦次，狂叫骂詈的症状；言謇神志清楚，思维正常而吐字困难或吐字不清。

涉及考点 | 望神

- 84.肺气不得宣散，上逆喉间，气道窒塞，呼吸急促，称为
- A.喘证
B.哮证
C.上气
D.短气
E.少气

【答案】C

【解析】本题考查的知识点是听声音。选项 A 指呼吸困难，短促急迫，甚则张口抬肩，鼻翼扇动，不能平卧。选项 B 是指呼吸喘促而喉间有哮鸣音。选项 C 上气指肺气上逆，肺气不得宣散，上逆喉间，气道窒塞，呼吸急促。选项 D 指呼吸短促，息虽促而不能接续，气虽急而不伴痰鸣，似喘而不抬肩。选项 E 指呼吸微弱而声低，气少不足以息，言语无力。

涉及考点 | 听声音

- 85.独语、错语病因的共同点是

- A.寒痰阻络
C.心气大伤
E.痰火扰心
- B.热扰心神
D.心气不足

【答案】D

【解析】独语指自言自语，喃喃不休，见人语止，首尾不续的症状。多因心气虚弱，神气不足，或气郁痰阻，蒙蔽心神所致，属阴证。错语是指病人意识清楚而语言错乱，语后自知言错的症候。证有虚实之分，虚证多因心气虚弱，神气不足所致；实证多因痰湿、瘀血、气滞阻碍心窍所致。所以二者的共同病因是心气虚弱，神气不足。选项B见于谵语。选项C见于郑声。选项E见于狂言。

涉及考点 | 独语、错语

86.咳声如犬吠样，常见于

- A.百日咳
C.感冒
E.肺痿
- B.白喉
D.肺癆

【答案】B

【解析】咳声如犬吠，伴有声音嘶哑，吸气困难，是肺肾阴虚，疫毒攻喉所致，多见于白喉。

涉及考点 | 听声音

87.外感风寒或风热之邪，或痰湿壅肺，肺失宣肃导致音哑或失音者被称为

- A.子暗
C.金实不鸣
E.短气
- B.金破不鸣
D.少气

【答案】C

【解析】外感风寒或风热之邪，或痰湿壅肺，肺失宣肃，导致的音哑或失音，称为“金实不鸣”久病音哑或失音者，常因各种原因导致阴虚火旺，肺肾精气内伤所致，即所谓“金破不鸣”。妊娠后出现音哑或失音者称为子暗。

涉及考点 | 音哑与失音

88.午后热甚，身热不扬者辨证为

- A.阴虚潮热
C.小儿疰夏
E.气虚发热
- B.湿温潮热
D.阳明潮热

【答案】B

【解析】湿温潮热午后发热明显，其特点是身热不扬，肌肤初扪之不觉很热，扪之稍久即觉灼手，此属湿温，为湿郁热蒸之象。

涉及考点 | 湿温潮热特点

89.以下哪项可不表现绞痛的症状

- A.心脉痹阻的真心痛
C.结石阻滞于肾的腰痛
E.痰浊阻肺的胸痛
- B.结石阻滞胆管的上腹痛
D.寒邪犯胃的胃脘痛

【答案】E

【解析】心脉痹阻引起的真心痛，结石阻塞尿路引起的腰腹痛，寒邪内侵胃肠所致的脘腹

痛等,往往都具有绞痛的特点。

涉及考点 | 问疼痛

90.前额头痛连及眉棱骨属于

- | | |
|--------|--------|
| A.阳明头痛 | B.少阳头痛 |
| C.厥阴头痛 | D.太阳头痛 |
| E.太阴头痛 | |

【答案】A

【解析】少阴经头痛:头痛连齿;阳明经:前额部连眉棱骨痛;少阳经:两侧头痛;太阳经:后头部连头项痛;厥阴经:巅顶痛。

涉及考点 | 问疼痛

2年 易错考题

1.渴喜热饮而量不多,或水入即吐多为

- | | |
|--------|--------|
| A.湿热内蕴 | B.痰饮内停 |
| C.营分热盛 | D.阴虚津亏 |
| E.瘀血内阻 | |

【答案】B

【解析】渴喜热饮,饮水不多,多为痰饮内停证或阳虚水津不布。

涉及考点 | 问饮食

2.大便时干时稀是因

- | | |
|--------|--------|
| A.脾气虚 | B.脾阳虚 |
| C.食滞胃肠 | D.肝郁脾虚 |
| E.脾肾阳虚 | |

【答案】D

【解析】溏结不调即大便时干时稀的症状,多因肝郁脾虚所致。

涉及考点 | 望二便

3.滑脉、动脉二者脉象相似的特点是

- | | |
|--------|--------|
| A.脉形如豆 | B.来去俱盛 |
| C.来盛去衰 | D.往来流利 |
| E.脉率均快 | |

【答案】D

【解析】滑脉往来流利,如盘走珠,应指圆滑;动脉脉形如豆,厥厥动摇,滑数有力。两脉均见往来流利。

涉及考点 | 脉象

4.不具有短、滑、数3种脉象的特点的是

- | | |
|------|------|
| A.动脉 | B.涩脉 |
| C.弦脉 | D.滑脉 |
| E.数脉 | |

【答案】B

【解析】动脉:脉形如豆,厥厥动摇,滑数有力;涩脉:脉细而缓,往来艰涩不畅,如轻刀刮竹;弦脉:端直以长,如按琴弦;滑脉:往来流利,如盘走珠,应指圆滑;数脉:脉来急促,一息五六至。

涉及考点 | 脉象

5. 以下脉象中除哪项外均易出现于气血两虚证中
- A. 濡脉
 - B. 弱脉
 - C. 细脉
 - D. 涩脉
 - E. 虚脉

【答案】D

【解析】涩脉临床见于气滞血瘀,精伤血少。

涉及考点 | 脉象

6. 下列各项不属于面赤临床意义的是
- A. 肝火上炎
 - B. 阴虚证
 - C. 戴阳证
 - D. 实热证
 - E. 肾精久耗

【答案】E

【解析】本题主要考察的是五色与疾病的关系。面赤多属于阳热有余或者阴虚不足。所以前四个选项都可以,但是肾精久耗一般情况多见黑色,因为五色中肾对应的是黑色。

涉及考点 | 五色与脏腑疾病的关系

7. 阳明经证与腑证的鉴别要点是
- A. 有无汗出
 - B. 有无发热
 - C. 有无神志改变
 - D. 有无燥屎内结
 - E. 有无舌苔黄燥

【答案】D

【解析】阳明经证是指邪热亢盛,充斥阳明经,弥漫全身,而肠中无燥屎内结。阳明腑证指邪热内盛阳明之里,与肠中糟粕相结,燥屎内结所表现的证候。所以两者之间的鉴别要点为有无燥屎内结。

涉及考点 | 阳明病热证、实证

8. 下列各项,不属于气分证临床表现的是
- A. 心烦懊恼
 - B. 便秘尿赤
 - C. 胁痛口苦
 - D. 谵语狂乱
 - E. 身热夜甚

【答案】E

【解析】气分证为里实热证候,临床可见发热,反恶热,口渴,心烦,尿赤,便秘,或时有谵语、狂乱,舌红苔黄,脉数有力。身热夜甚为热入营分的表现。

涉及考点 | 气分证

(9~10 题共用备选答案)

- A. 伸舌时舌体歪向一侧
 - B. 舌体紧缩,不能伸长
 - C. 舌体震颤抖动,不能自主
 - D. 舌伸出口外,不即回缩或立即收回
 - E. 舌体软弱,无力伸缩,痿废不用
9. 颤动舌的舌象特征是

【答案】C

10.吐弄舌的舌象特征是

【答案】D

【解析】伸舌时舌体歪向一侧,称歪斜舌;舌体紧缩,不能伸长,称为短缩舌;舌体不自主地颤动,动摇不宁者,称颤动舌;舌伸于口外,不即回缩者,称为吐舌,伸舌即回缩,或反复舐口唇四周,摇动不宁者,均称弄舌;舌体软弱,无力伸缩,痿废不用称为痿软舌。

涉及考点 | 舌态变化

(11~12 题共用备选答案)

- | | |
|-----|-----|
| A.滑 | B.促 |
| C.弦 | D.涩 |
| E.数 | |

11.胸痹心痛患者,脉象多见

【答案】C

12.心烦不寐患者,脉象多见

【答案】E

【解析】弦脉主疼痛,所以在胸痹心痛中会出现弦脉。数脉主热证,心烦不寐患者多为阳热或虚热导致。

涉及考点 | 常见脉象

(13~14 题共用备选答案)

- | | |
|------------------|----------------------|
| A.面色苍白,口唇青紫 | B.头晕眼花,气短疲乏 |
| C.脘腹坠胀,便意频频,久泻脱肛 | D.神疲乏力,气短,汗出不止,劳累后加重 |
| E.全身瘫痪,神识朦胧 | |

13.气不固证的临床表现为

【答案】D

14.气陷证的临床表现为

【答案】C

【解析】气虚不固证的临床表现:少气懒言,乏力,舌淡,脉虚无力或自汗或出血,或大便失禁,或余沥不尽,遗尿,小便失禁,滑胎小产,遗精早泄。气陷证的临床表现:头晕目眩,少气倦怠,便意频频,久泻久痢,形体消瘦,腹部有坠胀感,内脏下垂,脱肛,子宫脱垂,舌淡苔白,脉弱。

涉及考点 | 气陷证、气不固证

(15~18 题共用备选答案)

- | | |
|-------------------|------------------|
| A.肌肤水肿,无汗,身体疼痛 | B.胸胁胀满,咳唾引痛 |
| C.胸闷,咳喘,不能平卧,其形如肿 | D.喉中有物,吞之不下,吐之不出 |
| E.肠鸣辘辘有声 | |

15.饮留胸胁则见

【答案】B

16.饮在胸膈则见

【答案】C

17.饮留肠间则见

【答案】E

18.饮溢肌肤则见

【答案】A

【解析】胸胁胀满疼痛、呼吸、咳唾，转侧时加重，气短息促，为饮留胸胁。咳喘胸满，不能平卧，呼吸困难，痰如白沫量多，久咳则面目浮肿，为饮留胸膈脘腹胀满而疼，肠间辘辘有声，为饮留胃肠。四肢沉重或关节疼痛，甚则肢体微肿，为饮溢肌肤。

涉及考点 | 饮证

(19~20 题共用备选答案)

- | | |
|-----------|-----------|
| A.咳嗽痰多，胸闷 | B.神昏，喉中痰鸣 |
| C.形体肥胖 | D.脘痞纳呆 |
| E.肌肤见圆滑包块 | |

19.痰泛于肌肤的临床表现是

【答案】E

20.痰浊中阻，胃失和降的临床表现是

【答案】D

涉及考点 | 痰证

(21~22 题共用备选答案)

- | | |
|---------|---------|
| A.脾不统血证 | B.脾虚气陷证 |
| C.寒湿困脾证 | D.脾阳虚证 |
| E.脾气虚证 | |

21.症见神疲乏力，气短懒言，脘腹坠胀，小便混如米泔，其证候是

【答案】B

22.症见脘腹胀闷，泛恶欲呕，腹痛便溏身重，其证候是

【答案】C

【解析】脾虚气陷证的临床表现：除脾气虚证表现外，尚见眩晕耳鸣，脘腹坠胀，便意频数，肛门重坠，或久泻久痢，或小便浑浊如米泔，或脱肛、子宫下垂、胃肾下垂、眼睑下垂，舌淡苔白，脉弱。寒湿困脾的临床表现：脘腹痞闷胀痛，泛恶欲吐，口淡不渴，纳呆便溏，头身困重，或身目发黄，晦暗如烟熏色，或浮肿，小便短少，或妇女白带量多清稀，舌淡胖苔白腻，脉濡缓。

涉及考点 | 脾虚气陷证、寒湿困脾证

(23~24 题共用备选答案)

- | | |
|--------|--------|
| A.真寒假热 | B.真热假寒 |
| C.真实假虚 | D.真虚假实 |
| E.不虚不实 | |

23.热结肠胃，痰食壅积，以致经脉阻滞，气血不能畅达，致倦怠懒言，身羸瘦，脉细，此为

【答案】C

24.脏腑虚衰，气血不足，运化无力，致腹部胀满，呼吸喘促，二便闭涩等，此为

【答案】D

【解析】当病情发展到寒极或热极的时候，有时会出现一些与其寒热本质相反的“假象”症状或体征，即所谓真热假寒、真寒假热。虚证与实证，都有真假疑似的情况。所谓“至虚有盛候”“大实有羸状”，就是指证候的虚实真假。虚实真假的辨别，关键在于脉象的有力无力、有神无神，其中尤以沉取之象为真谛。

涉及考点 | 证候真假

(25~26 题共用备选答案)

- | | |
|---------|---------|
| A.肝阳化风证 | B.阴虚动风证 |
| C.血虚生风证 | D.热极生风证 |
| E.肝阳上亢证 | |

25.可见步履不稳,眩晕欲仆症状的是

【答案】A

26.可见眩晕肢体震颤,面白无华症状的是

【答案】C

【解析】肝阳化风可见眩晕欲仆,步履不稳。阴虚风动以手足蠕动,眩晕耳鸣为主。血虚生风以手足震颤,伴面色无华为主。热极生风以高热烦躁,颈项强直为主。肝阳上亢以眩晕耳鸣,头目胀痛为主。

涉及考点 | 肝风内动四证

(27~28 题共用备选答案)

- | | |
|--------|--------|
| A.肺肾气虚 | B.肺气虚 |
| C.脾肺气虚 | D.心肺气虚 |
| E.肾气不固 | |

27.久病咳喘,乏力少气,呼多吸少,自汗耳鸣,舌淡脉弱。其证候是

【答案】A

28.久病咳喘,胸闷心悸,乏力少气,自汗声低,舌淡脉弱。其证候是

【答案】D

涉及考点 | 肺肾气虚、心肺气虚证

29.假神的病机是

- | | |
|-------------|-------------|
| A.气血不足,精神亏损 | B.机体阴阳严重失调 |
| C.脏腑虚衰,功能低下 | D.精气衰竭,虚阳外越 |
| E.阴盛于内,格阳于外 | |

【答案】D

【解析】久病、重病之人,精气本已极度衰竭,而突然出现某些神气暂时“好转”的虚假表现,是为假神。假神的出现,是因为脏腑精气极度衰竭,正气将脱,阴不敛阳,虚阳外越,阴阳即将离决所致,常是危重病人临终前的征兆。

涉及考点 | 假神

30.气血两虚证的舌象表现为

- | | |
|--------|--------|
| A.舌体淡瘦 | B.舌淡齿痕 |
| C.舌尖芒刺 | D.舌暗瘀点 |
| E.舌红裂纹 | |

【答案】A

【解析】当气血两虚时,气血不能濡养舌体,舌体失于濡养后出现瘦的表现。且因气血虚少,舌色呈现淡白。选项 B 项属脾虚,选项 C 项为心火,选项 D 项为血瘀,选项 E 项为热盛伤津。

涉及考点 | 舌形变化

第三篇 中药学

考情分布图

		2015	2016	2017	2018	2019
中医中药学	中药的性能	0	1	0	0	0
	中药的作用	1	0	0	0	0
	中药的配伍	0	0	0	1	1
	中药的用药禁忌	0	0	1	0	1
	中药的剂量与用法	0	0	0	0	0
	解表药	0	1	1	1	0
	清热药	5	4	5	6	4
	泻下药	0	0	0	0	0
	祛风湿药	1	0	1	0	0
	化湿药	0	1	0	1	1
	利水渗湿药	0	0	0	0	0
	温里药	0	0	0	0	0
	理气药	1	1	1	1	1
	消食药	0	0	0	1	0
	驱虫药	0	0	0	0	0
	止血药	1	2	1	2	2
	活血化瘀药	1	1	1	1	1
	化痰止咳药	1	1	1	0	1
	安神药	1	0	0	1	0
	平肝息风药	3	2	2	3	2
	开窍药	0	0	0	0	0
	补虚药	4	5	4	3	4
	收涩药	1	0	0	0	0
攻毒杀虫止痒药	0	0	0	0	0	

高频考点必背

1. **四气**,指药物的**寒、热、温、凉**四种不同药性,又称四性,它反映了药物对人体阴阳盛衰、寒热变化的作用倾向,是对药物治疗寒热病症作用的概括。

2.寒凉药分别具有**清热泻火、凉血解毒、滋阴除蒸、泻热通便、清热利尿、清化痰热、清心开**

窍、凉肝息风等作用。

3. 温热药分别具有**温里散寒、暖肝散结、补火助阳、温阳利水、温经通络、引火归原、回阳救逆**等作用。

4. 甘:有**补益、和中、调和药性和缓急止痛**的作用。

5. 苦:有**泄、燥湿、坚阴**的作用。即具有清泄火热、泄降气逆、通泻大便、燥湿、坚阴(泻火存阴)等作用。

6. 咸:有**软坚散结、泻下通便**作用。

7. 有些药物**酒制则升,姜炒则散,醋炒收敛,盐炒下行**。

8. **相须**就是两种功效相似的药物配合应用,可以增强原有药物的疗效。

9. **相使**就是以一种药物为主,另一种药物为辅,两种药物合用,辅药可以提高主药的功效。

10. **相畏**就是一种药物的毒副作用能被另一种药物所抑制。

11. “本草明言十八反,半蒺贝菝及攻乌,藻戟遂芫俱战草,诸参辛芍叛藜芦。”

12. 硫黄畏朴硝,水银畏砒霜,狼毒畏密陀僧,巴豆畏牵牛,丁香畏郁金,川乌、草乌畏犀角,牙硝畏三棱,官桂畏赤石脂,人参畏五灵脂。

13. **包煎**主要指那些黏性强、粉末状及带有绒毛的药物,宜先用纱布袋装好,再与其他药物同煎,如**蛤粉、滑石、青黛、旋覆花、车前子、蒲黄及灶心土**等。

14. **另煎**又称另炖,主要是指某些贵重药材,为了更好地煎出有效成分,还应单独另煎。煎液可以另服,也可与其他煎液混合服用。如人参、西洋参、羚羊角、麝香、鹿茸等。

15. 解表药大多**辛散轻扬,主人肺与膀胱经**,偏行肌表,能促进机体发汗,使表邪由汗而解,从而达到治愈表证、防止传变的目的。

16. 麻黄与桂枝均为辛温解表药,有发汗解表之功,治疗风寒表证,常相须为用。但**麻黄**发汗力强,多**用于风寒表实无汗证**,并有宣肺平喘、利水消肿的作用;**桂枝**发汗力缓,外感风寒有**汗、无汗均可应用**。

17. **荆芥与防风**二药皆性微温,温而不燥,长于祛风解表,既可用于风寒表证,也可用于风热表证,二药常相须为用。

18. **白芷**长于止痛,且善**入足阳明胃经**,故阳明经前额头痛以及牙龈肿痛尤为多用。

19. **桑叶与菊花**二药均能疏散风热,平抑肝阳,清肝明目。但桑叶疏散风热之力较强;菊花则平肝明目之力较强。

20. 清热药根据其性能,主要分为**清热泻火、清热燥湿、清热凉血、清热解毒、清虚热**五类。

21. **石膏与知母**二药均能清热泻火,除烦止渴。**石膏**清解力强,**重在清泻火热**,并偏重于清泻肺胃实火;**知母**则**滋阴润燥力强**,重在滋润肺、胃、肾阴,常用于治疗阴虚火旺证。

22. 黄芩、黄连与黄柏,三药均能清热燥湿,泻火解毒。**黄芩善清上焦热邪**,并善清肺热;**黄连**清热燥湿与泻火解毒力尤强,并**善清中焦热邪**,并善泻心火、清胃火;**黄柏善清下焦热邪**,并能退虚热。

23. 生地黄与玄参二药均能清热凉血,养阴生津,适用于热入营血、热病伤阴、阴虚内热等证。但**玄参泻火解毒力强**,可用于痈肿疮毒,咽喉肿痛证;**生地黄清热凉血作用较强**,故血热出血、内热消渴者多用。

24. 泻下药分为**攻下药、润下药、峻下逐水药**三类。泻下药多为沉降之品,主归大肠经。主要有泻下通便作用,以排除胃肠积滞和燥屎等,主要适用于大便秘结,胃肠积滞,实热内结及水肿停饮等里实证。

25.祛风湿药物**味多辛苦**,性或温或凉,能祛留着于肌肉、经络、筋骨的风湿之邪,有的还兼有散寒、舒筋、通络、止痛、活血或补肝肾、强筋骨等作用。

26.化湿药味**辛香温燥**,主入脾、胃经,能促进脾胃运化,消除湿浊,解除因湿浊引起的脾胃气滞,主治湿浊内阻,脾为湿困,运化失常所致的脘腹胃痞、呕吐泛酸、大便溏薄、食少体倦、舌苔白腻等症。

27.利尿渗湿药味多甘淡,**主归膀胱、小肠经**,具有利尿消肿、利尿通淋、利湿退黄之功,主要用于小便不利、水肿、泄泻、痰饮、淋证、黄疸、湿疮、带下、湿温等水湿所致的各种病证。

28.茯苓与猪苓二药均能利尿消肿,渗湿,常用于水肿、小便不利等证。然**猪苓利尿作用较强**,无补益之功。而**茯苓能健脾补中、养心安神**,可治脾虚诸证和心神不安证。

29.**车前子与滑石均具有利尿通淋作用**,用治湿热下注膀胱之小便淋沥涩痛。车前子还可渗湿止泻,明目,祛痰。滑石还可清热解暑,收湿敛疮。

30.**附子**煎服,3~15 g,本品有毒,宜**先煎0.5~1小时**,至口尝无麻辣感为度。

31.**附子与干姜**,二药均能温中散寒、回阳救逆,常用于亡阳证,四肢厥逆,脉微欲绝,脾胃有寒脘腹冷痛泄泻。然附子为“**回阳救逆第一品药**”,并能补火助阳,散寒止痛;干姜长于温中散寒;又有温肺化饮之功。

32.附子与肉桂二药均能补火助阳,散寒止痛,常用治里寒实证、虚寒证以及寒湿痹痛。但**附子能回阳救逆,并长于温补脾肾**;肉桂长于**温补命门,还能引火归原**,温通经脉,并能鼓舞气血生长,以治阴疽与虚寒性溃疡等。

33.**陈皮与青皮二药均能行气消滞**。陈皮性较平和,归脾肺经,主理脾肺气滞;青皮善于疏肝破气。

34.“**止血不留瘀**”,这是运用止血药必须始终注意的问题。

35.**白茅根与芦根**均能清肺胃热而利尿,治疗肺热咳嗽、胃热呕吐和小便淋痛,且常相须为用。然**白茅根偏入血分**,以凉血止血见长;而**芦根偏入气分**,以清热生津为优。

36.三七、茜草与蒲黄,三药均能止血,又能化瘀,具有**止血而不留瘀**的特点,可用治瘀血阻滞之多种出血证。

37.**活血化瘀药**性味多为**辛、苦、温**,部分动物类药味咸,主**入心、肝二经**。味辛则能散、能行,味苦则能通泄,且均入血分,故能行血活血,使血脉通畅,瘀滞消散。活血化瘀药通过活血化痰作用产生多种不同的功效。

38.**川芎善“下调经水,中开郁结”**,为妇科要药,能活血调经,可用治多种妇产科的疾病。

39.延胡索辛散温通,为活血行气止痛之良药,前人谓其能“**行血中之气滞,气中血滞,故能专治一身上下诸痛**”。

40.《妇科明理论》有“**一味丹参散,功同四物汤**”之说。

41.川芎与丹参二药均有活血祛瘀功效,常用于各种瘀血病证。但川芎辛温气香,为**血中气药**;丹参以**活血化瘀为主**,药性寒凉,故适用于血热瘀滞之证。

42.**桃仁与红花二药均能活血祛瘀**,常相须为用治疗血瘀经闭、痛经、产后瘀血腹痛等病证。

43.化痰药主治痰证。**痰**,既是病理产物,又是致病因子,它“**随气升降,无处不到**”。

44.**姜半夏长于降逆止呕,法半夏**长于燥湿且温性较弱,**半夏曲**则有化痰消食之功,**竹沥半夏**能清化热痰。

45.**半夏与天南星**,二药均味辛温有毒,**均能燥湿化痰、温化寒痰**,炮制后又能治疗热痰、风

痰;外用均能消肿止痛,用治疮疡肿毒以及毒蛇咬伤。

46. **川贝母与浙贝母均能清热化痰、散结**,用于治疗热痰以及瘰疬癭瘤等。但川贝母微寒,长于润肺;浙贝母苦寒,长于清热。

47. 瓜蒌皮与瓜蒌仁均能清热化痰、宽胸散结。**瓜蒌皮长于清热化痰**,利气宽胸散结;而**瓜蒌仁则长于润肺化痰**,润肠通便。

48. **苦杏仁与桃仁**均能止咳平喘、润肠通便。苦杏仁止咳平喘和润肠通便作用均较强,桃仁则稍弱。但桃仁尚具有活血化瘀功效。

49. **苦杏仁与紫苏子**均有止咳平喘、润肠通便的功效。但苦杏仁长于宣肺;紫苏子润降,长于降气兼能化痰。

50. **桑白皮与葶苈子**,二药均有泻肺平喘和利水消肿作用。桑白皮甘寒,药性较缓,长于清肺热,降肺火;葶苈子力峻,重在泻肺中水气、痰涎。

51. **朱砂与磁石**均为重镇安神的常用药,二药质重性寒入心经,均能镇惊安神。**朱砂有毒**,镇心、清心而安神,又能清热解毒;**磁石无毒**,益肾阴、潜肝阳;又能平肝潜阳、聪耳明目、纳气平喘。

52. 酸枣仁与柏子仁,二药均为养心安神之品,常相须为用,治疗阴血不足,心神失养的心神不宁病证。但**酸枣仁长于益肝血**,并能敛汗;**柏子仁长于治疗心阴虚**,并能润肠通便,可治肠燥便秘。

53. 平肝息风药具有平肝潜阳、息风止痉的功效,治疗**肝阳上亢、肝风内动证**。

54. 石决明与决明子均有清肝明目之功效,皆可用于治疗**目赤肿痛、翳障**等偏于肝热者。

55. 牡蛎与龙骨二药均能**重镇安神、平肝潜阳、收敛固涩**,常相须为用,治疗心神不安、惊悸失眠、肝阳上亢、头晕目眩以及滑脱不禁诸证。

56. 羚羊角与牛黄均归**心、肝经**,共同功效:**清肝热、息风止痉**。同可用治温热病壮热神昏及肝风惊厥抽搐。

57. 钩藤有凉肝止惊之效,可治**小儿惊啼、夜啼**。

58. 天麻可用治**各种病因之肝风内动**,惊痫抽搐,不论寒热虚实,皆可配伍应用。

59. 莲子既可**补益脾气**,又能**涩肠止泻**。

60. 蜈蚣与全蝎皆有**息风镇痉、解毒散结、通络止痛**之功效,二药常相须为用。全蝎性平,息风镇痉、攻毒散结之力不及蜈蚣;蜈蚣善走窜通达,息风镇痉功效较强,通痹止痛效佳。

61. 开窍药**辛香走窜**,为**救急、治标之品**,且能耗伤正气,只宜暂服,不可久用。

62. 麝香辛温,气极香,走窜之性甚烈,有很强的**开窍通闭、辟秽化浊**作用,为**醒神回苏之要药**。

63. 人参与党参,二药均能**补脾气、补肺气、益气生津、益气生血和扶正祛邪**。人参补气力强,并能大补元气,还能安神益智、益气壮阳;党参补气力弱,但能养血,可用于血虚证等。

64. 人参与黄芪,二药均为补气要药,同用可增强**补气**之效。但人参能**大补元气**,复脉固脱,以及能安神增智,为治内伤气虚第一要药;黄芪则以**补脾、肺之气**为主,并有补气升阳、益卫固表、托毒生肌、利尿消肿等作用。

65. 白术甘苦性温,主归脾胃经,以**健脾、燥湿**为主要作用,被前人誉为“**脾脏补气健脾第一要药**”。

66. 黄芪与白术,二药均能**补气、利水、止汗**,但二药作用有所不同:黄芪补脾肺之气,而白术主要补脾气。

- 67.杜仲与桑寄生共同功效:补肝肾,强筋骨,安胎。均可用治肾虚腰痛或足膝痿弱,肝肾亏虚之胎动不安。
- 68.杜仲与续断,二药均归肝肾经,药性偏温,均能补肝肾、强筋骨,安胎,治肾虚腰痛脚弱、筋骨无力、胎动不安常相须为用。
- 69.当归一般生用,为加强活血作用则酒炒用。通常补血用当归身,活血用当归尾,和血(补血活血)用全当归。
- 70.熟地黄品质润入肾,善滋补肾阴,填精益髓,为补肾阴之要药。古人谓之“大补五脏真阴”,“大补真水”。
- 71.当归与熟地黄,二药均能补血,常相须为用以治血虚诸证。但当归补血行血,调经止痛,为妇科调经要药。
- 72.生地黄与熟地黄,二药均能滋阴,可用治阴虚证。但生地黄性寒,能清热凉血,养阴生津,长于治疗热入营血、热病伤阴、阴虚发热诸证。
- 73.白芍与赤芍,二药《神农本草经》不分,通称芍药,唐末宋初始将二者区分。二药同出一物、性微寒。前人谓“白补赤泻,白收赤散”,一语道破二者的主要区别。
- 74.南沙参与北沙参,二药科属不同,均具有清肺养阴、益胃生津的作用。南沙参兼有化痰及益气作用。北沙参的养阴、清热、生津之力优于南沙参。
- 75.麦冬与天冬,二药均为清热滋阴生津之品,同具养肺阴、润肠通便之功,同治燥咳痰黏、劳嗽咯血、内热消渴及阴亏肠燥便秘。
- 76.龟甲与鳖甲,二药均能滋阴清热,潜阳息风,常相须为用,治疗阴虚发热、阴虚阳亢、阴虚风动等证。
- 77.收涩药大多性味酸涩,分别具有固表止汗、敛肺止咳、涩肠止泻、固精缩尿、收敛止血、止带等作用。
- 78.五味子与乌梅,二药均有敛肺止咳、涩肠止泻、生津止渴作用。同可用于治疗肺虚久咳、久泻及津伤口渴之证。但五味子又能滋肾、固精、敛汗及宁心安神。
- 79.诃子涩肠止泻宜煨用,敛肺清热、利咽开音宜生用。
- 80.肉豆蔻与白豆蔻,二药均能温中散寒、行气消胀、开胃。但肉豆蔻长于涩肠止泻;白豆蔻长于芳香化湿。
- 81.山茱萸酸、微温质润,其性温而不燥,补而不峻,补益肝肾,既能益精,又可助阳,为平补阴阳之要药。
- 82.莲子与芡实,二药均能益肾固精,补脾止泻,止带,补中有涩,常用治肾虚遗精、遗尿,脾虚泄泻,脾肾虚带下等证。
- 83.石菖蒲辛开苦燥温通,芳香走窜,不但有开窍醒神之功,且兼具化湿、豁痰、辟秽之效,故擅长治痰湿秽浊之邪蒙蔽清窍所致之神志昏乱。
- 84.人参能大补元气,复脉固脱,为拯危救脱要药。
- 85.党参性味甘平,主归脾肺二经,以补脾肺之气为主要作用。
- 86.白术与苍术,二药均能健脾燥湿,可治脾失健运,湿浊中阻证。但白术能补气健脾,并能固表止汗、益气安胎;苍术燥湿力强,尤宜于湿盛不虚者,还能祛风湿、发汗解表、明目。
- 87.甘草能补益心气,益气复脉。主要用于心气不足所致结代、心动悸者。
- 88.鹿茸甘温补阳,甘咸滋肾,禀纯阳之性,具生发之气,故能壮肾阳,益精血。
- 89.淫羊藿与巴戟天均能补肾助阳,祛风除湿,均可用治肾阳虚之阳痿、不孕及肝肾不足之

筋骨痿软、风湿久痹等证。

90.菟丝子辛以润燥,甘以补虚,为**平补阴阳之品**,功能补肾阳、益肾精以固精缩尿。

91.当归甘温质润,长于补血,为**补血之圣药**。

92.阿胶为血肉有情之品,甘温质润,为补血要药,多用治血虚诸证。而尤以治疗**出血而致血虚**为佳。

93.何首乌制用可补益精血,**固肾乌须**;生用可解毒,截疟,润肠通便。

94.麦冬味甘柔润,性偏苦寒,长于**滋养胃阴**,生津止渴,兼清胃热。

95.五味子味酸收敛,甘温而润,能上敛肺气,下滋肾阴,为**治疗久咳虚喘之要药**。

5年 历年真题

1.归经的理论基础是

A.阴阳学说

B.五行学说

C.运气学说

D.整体观念

E.脏腑经络理论

【答案】E

【解析】归经就是指药物对于机体某部分的选择性作用,主要对某经(脏腑及其经络)或某几经有明显的作用,而对其他经则作用较小,或没有作用。归经是以脏腑、经络理论为基础,以所治具体病证为依据。

涉及考点 | 归经



配套名师高清视频

2.下列各项,与乌头相反的药物是

A.甘草

B.海藻

C.人参

D.藜芦

E.天花粉

【答案】E

【解析】张子和在《儒门事亲》中记载了“十八反歌”：“本草名言十八反,半萋贝菝及攻乌,藻戟遂芫俱战草,诸参辛芍叛藜芦”里面提到与乌头相反的药物有贝母、瓜萋、半夏、白及、白菝。天花粉是葫芦科植物瓜萋的干燥根,属于瓜萋类。其余几味药不属于与乌头相反的药物类别。

涉及考点 | “十八反”的内容

3.“十九畏”中,人参“畏”的是

A.三棱

B.朴硝

C.硫黄

D.五灵脂

E.密陀僧

【答案】D

【解析】十九畏歌:硫黄原是火中精,朴硝一见便相争,水银莫与砒霜见,狼毒最怕密陀僧,巴豆性烈最为上,偏与牵牛不顺情,丁香莫与郁金见,牙硝难合京三棱,川乌草乌不顺犀,人参最怕五灵脂,官桂善能调冷气,若逢石脂便相欺。可知人参畏五灵脂,故正确答案为选项 D。

涉及考点 | “十九畏”的内容

4.下列各药中,入汤剂宜包煎的药物是

A.砂仁

B.沉香

- C.磁石
E.天南星
- D.五灵脂

【答案】D

【解析】砂仁为干燥的成熟果实,宜后下。沉香为含有树脂的木材,性味芳香辛散,入汤剂宜后下。磁石为矿石,宜打碎先煎。天南星为草本天南星的干燥块茎,无特殊煎法。五灵脂为复齿鼯鼠的干燥粪便,气味腥臭,服后易引起呕吐,故宜包煎。

涉及考点 | 煎煮方法

5.孕妇应慎用的药物是

- A.金银花
B.连翘
C.牛黄
D.鱼腥草
E.蒲公英

【答案】C

【解析】某些药物有损害胎元以致堕胎的副作用,根据药物对胎元的损害程度不同,可分为慎用和禁用两大类。慎用的药物包括通经桂皮,行气破滞,辛热滑利之品,如桃仁、大黄等;牛黄为干燥的牛胆结石,可发生过敏反应,故应慎用。

涉及考点 | 妊娠禁忌药的分类与使用原则

6.一般幼儿的用用量是成人的

- A.1/6
B.1/3
C.1/2
D.2/3
E.1/4

【答案】E

【解析】中药的剂量与年龄等因素相关,一般5岁以下的小儿用成人药量的1/4。

涉及考点 | 影响中药剂量的因素

7.驱虫药的服用时间是

- A.饭前服
B.空腹服
C.饭后服
D.定时服
E.睡前服

【答案】B

【解析】病在胸膈以上,如眩晕、头痛、目疾等宜饭后服;病在胸腹以下,如胃、肝、肾等脏疾病,以及对胃肠道有刺激作用的药物应饭前服;安神药宜睡前服;慢性病应定时服;驱虫药应空腹服。

涉及考点 | 服药时间

8.既治风寒表实无汗,又治风寒表虚有汗的药物是

- A.麻黄
B.紫苏
C.桂枝
D.香薷
E.荆芥

【答案】C

【解析】麻黄用于外感风寒,恶寒发热,头、身疼痛,鼻塞,无汗,脉浮紧等表实证,排除选项A。紫苏用于风寒感冒、恶寒发热、咳嗽、气喘、胸腹胀满,排除选项B。桂枝用于外感风寒表证,无论有汗、无汗均可应用,亦用于表虚有汗者。香薷发散风寒,有发汗解表作用,但多用于

夏季贪凉,感冒风寒所引起的发热、恶寒、头痛、无汗,排除选项 D。荆芥辛散气香,长于发表散风,且微温不烈,药性缓和,排除选项 E。故正确答案为选项 C。

涉及考点 | 桂枝的应用

9.既可用治外感风寒,又可用于外感分风热的药物是

- | | |
|------|------|
| A.麻黄 | B.防风 |
| C.桂枝 | D.紫苏 |
| E.羌活 | |

【答案】B

【解析】防风祛风解表,为治风之通用品,既可治疗外感风寒,亦可治疗外感风热。

涉及考点 | 防风的应用

10.下列解表药中兼有化湿和中功效的是

- | | |
|------|------|
| A.紫苏 | B.香薷 |
| C.生姜 | D.白芷 |
| E.防风 | |

【答案】B

【解析】以上五个备选答案均为解表药。紫苏解表散寒,行气宽中,解鱼蟹毒,生姜解表散寒,温中止呕,温肺止咳,解毒。白芷解表散寒,祛风止痛,通鼻窍,燥湿止带,消肿排脓。防风祛风解表,胜湿止痛,止痉。香薷发汗解表,化湿和中,利水消肿,主治外感风寒,内伤湿邪之阴暑证,有“夏月麻黄”之称。

涉及考点 | 香薷的功效

11.薄荷与牛蒡子均具有的功效是

- | | |
|-------------|-------------|
| A.疏散风热,透疹利咽 | B.疏散风热,解毒消肿 |
| C.疏肝解郁,利咽透疹 | D.清利头目,疏肝解郁 |
| E.利咽透疹,清利头目 | |

【答案】A

【解析】两者都属于发散风热药,薄荷具有疏散风热,清利头目,利咽透疹,疏肝行气的功效。牛蒡子具有疏散风热,宣肺透疹,利咽解毒的功效。所有说两者疏散风热,透疹利咽。

涉及考点 | 薄荷与牛蒡子的功效

12.下列药物中能燥湿止带的是

- | | |
|------|-------|
| A.防风 | B.白芷 |
| C.羌活 | D.苍耳子 |
| E.藁本 | |

【答案】B

【解析】防风祛风解表,胜湿止痛,解痉止泻。白芷解表散寒,祛风止痛,通鼻窍,燥湿止带,消肿排脓。羌活解表散寒,祛风胜湿,止痛。苍耳子发散风寒,通鼻窍,祛风湿,止痛。藁本祛风散寒,除湿止痛。故正确答案为选项 B。

涉及考点 | 白芷的功效

13.下列各项不属于细辛功效的是

- | | |
|--------|--------|
| A.宣通鼻窍 | B.温肺化饮 |
| C.祛风止痛 | D.解表散寒 |

E.燥湿止带

【答案】E

【解析】细辛属于发散风寒药,其功效是解表散寒,祛风止痛,通窍,温肺化饮。A、B、C、D选项均包含在细辛的功效之内,E选项不符。故正确答案为选项E。

涉及考点 | 细辛的功效

14.夏枯草具有的功效是

A.散结消肿

B.润肠通便

C.祛风明目

D.疏散风热

E.清热利湿

【答案】A

【解析】夏枯草有明目作用,但其机理在于泻肝火以明目,而不是祛风明目;只有散结消肿是夏枯草的功效。

涉及考点 | 夏枯草的功效

15.下列具有清热燥湿,杀虫,利尿功效的药

A.茯苓

B.槟榔

C.猪苓

D.苦参

E.皂荚

【答案】D

【解析】茯苓利水渗湿,健脾,宁心。槟榔杀虫消积,行气,利水,截疟。猪苓利水渗湿。苦参清热燥湿,杀虫,利尿。皂荚祛顽痰,通窍开闭,祛风杀虫。故正确答案为选项D。

涉及考点 | 苦参的功效

16.可用于治疗小便不利的药物是

A.金银花

B.大青叶

C.苦参

D.秦皮

E.龙胆

【答案】C

【解析】这几味药都属于清热药,但苦参归心、肝、胃、大肠、膀胱经,具有清热燥湿,杀虫,利尿的功效,因此可治疗湿热小便不利。而金银花、大青叶属于清热解毒药,秦皮、龙胆虽属清热燥湿药,均不归膀胱经,也不用于治疗小便不利。故正确答案为选项C。

涉及考点 | 苦参的主治病证

17.下列各项,不属于玄参主治病证的是

A.温毒发斑

B.津伤便秘

C.经闭痛经

D.痈肿疮毒

E.目赤咽痛

【答案】C

【解析】玄参临床应用于①温邪入营,内陷心包,温毒发斑。②热病伤阴,津伤便秘,骨蒸劳嗽。③目赤咽痛,瘰疬,白喉,痈肿疮毒。所以本题答案是选项C。

涉及考点 | 玄参的主治病证

18.治疗咳喘,水肿,应选用的药物是

A.百部

B.紫菀

- C.五加皮
E.紫苏子

D.桑白皮

【答案】D

【解析】百部主治功效是润肺止咳,杀虫灭虱。紫菀诛之功效是润肺下气,止咳化痰。五加皮主治功效是祛风湿,补肝肾,强筋骨,利水。桑白皮主治功效是泻肺平喘,利水消肿。紫苏子主治功效是降气化痰,止咳平喘,润肠通便。所以本题排除A、B、C、E四个选项,正确答案是选项D。

涉及考点 | 桑白皮的主治病证

19.治疗痰饮喘咳,应选用的药物是

- A.佩兰
B.苍术
C.藿香
D.砂仁
E.厚朴

【答案】E

【解析】佩兰主治功效为化湿,解暑。苍术主治功效为燥湿健脾,祛风散寒。藿香主治功效为化湿,止呕,解暑。砂仁主治功效为化湿行气,温中止泻,安胎。厚朴主治功效为燥湿消痰,下气除满。所以本题排除A、B、C、D四个选项,正确答案为选项E。

涉及考点 | 厚朴的主治病证

20.治疗亡阳证,寒饮喘咳,应选用的药物是

- A.附子
B.肉桂
C.干姜
D.吴茱萸
E.小茴香

【答案】C

【解析】附子主治功效为回阳救逆,补火助阳,散寒止痛。肉桂主治功效为补火助阳,散寒止痛,温通经脉,引火归元。干姜温中散寒,回阳通脉,温肺化饮。吴茱萸主治功效为散寒止痛,降逆止呕,助阳止泻。小茴香主治功效为散寒止痛,理气和胃。所以本题排除A、B、D、E四个选项,正确答案为选项C。

涉及考点 | 干姜的主治病证

21.薤白的主治病证是

- A.肝郁气滞
B.肺热咳嗽
C.虫积腹痛
D.胸痹心痛
E.胃寒呕吐

【答案】D

【解析】薤白的主治功效为通阳散结,行气导滞,临床应用于胸痹心痛;脘腹胃痞胀痛,泻痢里急后重。所以本题正确答案为选项D。

涉及考点 | 薤白的主治病证

22.炒用多用于回乳消胀的药物是

- A.山楂
B.神曲
C.麦芽
D.莱菔子
E.鸡内金

【答案】C

【解析】选项 A 炒山楂用于止泻止痢。选项 B 炒神曲用于消食和胃。选项 C 炒麦芽多用于回乳消胀。选项 D 炒莱菔子消食除胀,降气化痰。选项 E 鸡内金用于消食健胃,涩精止遗。所以本题正确答案为选项 C。

涉及考点 | 麦芽的主治病证

23.下列各项,不属于槟榔功效的是

- | | |
|------|------|
| A.消积 | B.行气 |
| C.利水 | D.截疟 |
| E.止血 | |

【答案】E

【解析】槟榔的功效有杀虫消积、行气、利水、截疟,而无止血功效。

涉及考点 | 槟榔的功效

24.乳香具有的功效是

- | | |
|--------|--------|
| A.消肿生肌 | B.祛风止痛 |
| C.化瘀止血 | D.凉血消痈 |
| E.清利湿热 | |

【答案】A

【解析】乳香的功效是活血行气止痛、消肿生肌。所以本题正确答案为选项 A。

涉及考点 | 乳香的功效

25.患者因失眠就诊,伴视物不清,听力下降,时常耳鸣,治疗应选用的药物是

- | | |
|-------|------|
| A.龙骨 | B.磁石 |
| C.朱砂 | D.远志 |
| E.酸枣仁 | |

【答案】B

【解析】磁石可以入肝、心、肾三经,有镇静安神,平肝潜阳,聪耳明目,纳气平喘的功效。可以治疗耳鸣、耳聋和视物昏花,例如耳聋左慈丸。常常与枸杞子、女贞子、菊花配用。

涉及考点 | 磁石的功效

26.下列各项中,不属于温热药功效的是

- | | |
|--------|--------|
| A.温里祛寒 | B.滋阴除热 |
| C.暖肝散结 | D.引火归原 |
| E.回阳救逆 | |

【答案】B

【解析】温热药分别具有温里散寒、暖肝散结、补火助阳、温阳利水、温经通络、引火归元、回阳救逆等功效,而无滋阴除热功效。所以本题正确答案为选项 B。

涉及考点 | 温热药的功效

27.芒硝具有的功效是

- | | |
|--------|--------|
| A.润燥软坚 | B.去积杀虫 |
| C.峻下冷积 | D.活血化瘀 |
| E.泄水逐饮 | |

【答案】A

【解析】芒硝的功效为泻下攻积、润燥软坚、清热消肿。所以本题正确答案为选项 A。

涉及考点 | 芒硝的功效

28. 宜包煎, 可用治淋证, 目赤肿痛的药物是

- A. 薏苡仁
- B. 海金沙
- C. 车前子
- D. 蒲黄
- E. 石韦

【答案】C

【解析】车前子主治: ①淋证, 水肿。②泄泻。③目赤肿痛, 目暗昏花, 翳障; ④痰热咳嗽。服用方法: 煎服。宜包煎。

涉及考点 | 车前子主治及煎煮方法

29. 药性辛、热, 为温暖中焦的主药是

- A. 干姜
- B. 附子
- C. 肉桂
- D. 生姜
- E. 吴茱萸

【答案】A

【解析】干姜辛热燥烈, 主入脾胃而长于温中散寒、健运脾阳, 为温暖中焦之主药。选项 B 附子辛、甘, 大热, 能上助心阳、中温脾阳、下补肾阳; 选项 C 肉桂辛、甘, 大热, 能补火助阳, 益阳消阴, 为治命门火衰之要药; 选项 D 生姜能治脾胃虚寒、呕吐, 为“呕家圣药”; 选项 E 吴茱萸辛、苦, 热, 能散寒止痛, 降逆止呕, 助阳止泻。

涉及考点 | 干姜的性味和功效

30. 具有行气止痛功效的药物是

- A. 川楝子、乌药
- B. 大腹皮、陈皮
- C. 佛手、陈皮
- D. 香附、沉香
- E. 陈皮、青皮

【答案】A

【解析】选项 A 川楝子具有行气止痛, 杀虫之功效; 乌药有行气止痛, 温肾散寒之功效。选项 B 大腹皮有行气宽中, 利水消肿之功效; 陈皮有理气健脾, 燥湿化痰之功效。选项 C 佛手有疏肝解郁, 理气和中, 燥湿化痰之功效; 陈皮有理气健脾, 燥湿化痰之功效。选项 D 香附有疏肝解郁, 调经止痛, 理气调中之功效; 沉香有行气止痛, 温中止呕, 纳气平喘。选项 E 陈皮有理气健脾, 燥湿化痰之功效; 青皮具有疏肝破气, 消积化滞之功效。

涉及考点 | 川楝子、乌药的功效

31. 大青叶具有的功效是

- A. 清热燥湿, 泻火解毒
- B. 清热解毒, 凉血消斑, 清肝泻火, 定惊
- C. 清热解毒, 凉血消斑
- D. 清热解毒, 凉血, 利咽
- E. 清热解毒, 利咽喉, 散肿止痛

【答案】C

【解析】大青叶属于清热解毒药, 其功效是清热解毒, 凉血消斑, A、B、D、E 四个选项均与题意不符。

涉及考点 | 大青叶的功效

32. 贯众具有的功效是

- A. 止血
- B. 止泻



配套名师高清视频

- C.止呕
E.止痒

D.止咳

【答案】A

【解析】贯众清热解毒、凉血止血、杀虫。并无止泻、止呕、止咳、止痒之功。

涉及考点 | 贯众的功效

33.治疗梅毒的要药是

- A.土茯苓
C.鱼腥草
E.野菊花

- B.漏芦
D.败酱草

【答案】A

【解析】这几味药都属于清热解毒药,但土茯苓可应用于杨梅毒疮,肢体拘挛,对梅毒或因梅毒服汞剂中毒而致肢体拘挛、筋骨疼痛者疗效尤佳,是治梅毒的“要药”,而其余几味药均无此特殊功效。

涉及考点 | 土茯苓的主治病证

34.具有养阴生津功效的药物是

- A.生地黄
C.赤芍
E.金银花

- B.牡丹皮
D.紫草

【答案】A

【解析】生地黄有清热凉血、养阴生津之功,为清热凉血的要药。牡丹皮清热凉血、活血化瘀。赤芍清热凉血、化瘀止痛。紫草清热凉血,活血解毒,透疹,为治疗麻疹的专药。金银花清热解毒,疏散风热。

涉及考点 | 生地黄的功效

35.具有平肝疏肝,祛风明目功效的是

- A.珍珠母
C.刺蒺藜
E.牡蛎

- B.代赭石
D.钩藤

【答案】C

【解析】选项 A 珍珠母功效平肝潜阳,清肝明目,镇惊安神;选项 B 代赭石功效平肝潜阳,重镇降逆,凉血止血;选项 C 刺蒺藜功效平肝疏肝,祛风明目;选项 D 钩藤功效清热平肝,息风定惊;选项 E 牡蛎功效重镇安神,平肝潜阳,软坚散结,收敛固涩。

涉及考点 | 刺蒺藜的功效

36.青蒿的功效是

- A.退虚热,除疳热,清湿热
C.清热凉血,解毒,定惊
E.清热凉血,利尿通淋,解毒疗疮

- B.清热凉血,活血解毒,透疹消斑
D.清虚热,除骨蒸,解暑热

【答案】D

【解析】青蒿属于清虚热药,故排除选项 B、C、E。青蒿的功效是清透虚热,凉血除蒸,解暑,截疟,无除疳热、清湿热的功效,排除选项 A。

涉及考点 | 青蒿的功效

37. 下列药物, 不宜久煎的是

- A. 青蒿
B. 白薇
C. 地骨皮
D. 银柴胡
E. 胡黄连

【答案】A

【解析】这几味药都属于清虚热药, 其中青蒿属于气味芳香的药物。久煎会使芳香类药物的有效成分挥发而降低药效, 因此常后下。而白薇、地骨皮、银柴胡、胡黄连都不属于芳香类药物, 宜久煎。

涉及考点 | 青蒿的用法

38. 芒硝的用法是

- A. 煎服
B. 包煎
C. 烱化
D. 冲服
E. 后下

【答案】D

【解析】芒硝为硫酸钠的天然矿物经精制而成的结晶体, 易溶于水, 故内服时冲入药汁内或开水溶化后服, 用法属于冲服。

涉及考点 | 芒硝的用法

39. 甘遂入丸散的用量是

- A. 0.5~1 g
B. 1.5~3 g
C. 0.6~0.9 g
D. 3~9 g
E. 0.1~0.3 g

【答案】A

【解析】甘遂属于泻下药, 苦, 寒; 有毒, 故用法用量有要求。一般甘遂入丸、散剂, 每次 0.5~1 g, 内服醋制可以减轻毒性。

涉及考点 | 甘遂的用量

40. 独活可用治

- A. 阳明头痛
B. 厥阴头痛
C. 太阳头痛
D. 少阳头痛
E. 少阴头痛

【答案】E

【解析】独活属于祛风湿药, 功效是祛风除湿, 通痹止痛, 解表。善入肾经而搜伏风, 常与细辛、川芎相配, 可治疗风扰肾经, 伏而不出之少阴头痛, 如独活寄生汤。

涉及考点 | 独活的应用

41. 秦艽的归经是

- A. 脾经
B. 肝、胆经
C. 胃、肝、胆经
D. 肾经
E. 三焦经

【答案】C

【解析】秦艽性味辛、苦、平, 归胃、肝、胆经。

涉及考点 | 秦艽的性味归经

42.患者怀孕3月,出现腰膝酸软,胎动不安,首选药物是

- A.紫苏
B.黄芩
C.藿香
D.砂仁
E.桑寄生

【答案】E

【解析】桑寄生属于祛风湿强筋骨药,并且具有安胎的作用,符合患者出现腰膝酸软的表现。

涉及考点 | 桑寄生的功效

43.功能甘淡渗湿,兼能泄热的药物是

- A.茯苓
B.车前子
C.木通
D.泽泻
E.冬瓜皮

【答案】D

【解析】茯苓利水消肿,渗湿,健脾,宁心。车前子利尿通淋,渗湿止泻,明目,祛痰。木通利尿通淋,清心除烦,通经下乳。泽泻利水消肿,渗湿泄热。冬瓜皮利水消肿,清热解暑。

涉及考点 | 泽泻的功效

44.具有清肺止咳功效的药物是

- A.海金沙
B.石韦
C.冬葵子
D.灯心草
E.赤小豆

【答案】B

【解析】海金沙利尿通淋,止痛。石韦利尿通淋,清肺止咳,凉血止血。冬葵子行水利尿通淋,下乳,润肠。灯心草清心降火,利尿通淋。赤小豆利水除湿,和血排脓,消肿解毒。

涉及考点 | 石韦的功效

45.辛甘温热,可温补命门,引火归原的药物是

- A.高良姜
B.附子
C.干姜
D.吴茱萸
E.肉桂

【答案】E

【解析】这几味药都属于温里药。肉桂的功效是补火助阳,散寒止痛,温经通脉,引火归原。肉桂大热入肝肾,是治疗命门火衰之要药,能使因下元虚衰所致上浮之虚阳回归故里,名曰引火归原。高良姜、干姜善治中焦之寒,附子是“回阳救逆第一品药”,吴茱萸为治肝寒气滞诸痛之主药,均与题意不符。

涉及考点 | 肉桂的功效

46.川乌的用法是

- A.后下
B.包煎
C.先煎
D.另煎
E.煎汤代水

【答案】C

【解析】川乌属于祛风湿药,辛、苦、热,有大毒。由于川乌的毒副作用较强,在内服时宜先

煎 45~60 分钟后再下他药,久煎可以降低毒性,安全用药。

涉及考点 | 川乌的用法

47.郁李仁具有的功效是

- | | |
|--------|--------|
| A.活血祛瘀 | B.清肝泻火 |
| C.利水消肿 | D.软坚散结 |
| E.凉血解毒 | |

【答案】C

【解析】郁李仁润肠通便,利水消肿。

涉及考点 | 郁李仁的功效

48.既能疏肝破气,又能散结消滞的药物是

- | | |
|------|------|
| A.橘皮 | B.青皮 |
| C.枳实 | D.木香 |
| E.香附 | |

【答案】B

【解析】橘皮的功效为理气健脾,燥湿化痰,排除选项 A。枳实的功效为破气消积,化痰除痞,排除选项 C。木香的功效为行气止痛,健脾消食,排除选项 D。香附的功效为疏肝解郁,调经止痛,理气调中,排除选项 E。青皮的功效为疏肝破气,消积化滞。

涉及考点 | 青皮的功效

49.具有凉血解毒功效的药物是

- | | |
|------|-------|
| A.大黄 | B.芒硝 |
| C.芦荟 | D.火麻仁 |
| E.桃仁 | |

【答案】A

【解析】芒硝泻下攻积,润燥软坚,清热消肿,排除选项 B。芦荟泻下通便,清肝,杀虫,排除选项 C。火麻仁润肠通便,排除选项 D。桃仁活血祛瘀,止咳平喘,润肠通便,排除选项 E。大黄泻下攻积,清热泻火,凉血解毒,逐瘀通经。

涉及考点 | 大黄的功效

50.具有清热利湿功效的药物是

- | | |
|------|------|
| A.丹参 | B.牛膝 |
| C.苏木 | D.姜黄 |
| E.虎杖 | |

【答案】E

【解析】丹参活血调经,祛瘀止痛,凉血消痈,除烦安神,排除选项 A。牛膝活血通经,补肝肾,强筋骨,利水通淋,排除选项 B。苏木活血疗伤,祛瘀通经,排除选项 C。姜黄活血行气,通经止痛,排除选项 D。虎杖利湿退黄,清热解毒,散瘀止痛,化痰止咳,泻热通便。

涉及考点 | 虎杖的功效

51.太阳经头痛可选用的引经药物是

- | | |
|----------|---------|
| A.羌活、白芷 | B.细辛、葛根 |
| C.川芎、吴茱萸 | D.柴胡、黄芩 |
| E.羌活、川芎 | |

【答案】E

【解析】羌活善治太阳经之头痛，川芎为头痛之“要药”，二者常配伍使用，治疗太阳经头痛。葛根、白芷善治阳明经头痛，柴胡善治少阳经头痛，吴茱萸善治厥阴经头痛，细辛善治少阴经头痛。

涉及考点 | 羌活、川芎的应用

52.可应用治疗肾虚作喘，虚阳上浮的药物是

- A.吴茱萸
- B.小茴香
- C.肉桂
- D.干姜
- E.花椒

【答案】C

【解析】这几味药都属于温里药。其中肉桂辛、甘，大热，入肝肾，具有引火归原的功效，可用于治疗元阳亏虚，虚阳上浮之虚喘、面赤、汗出、心悸、失眠、脉微弱者。其余几味药都不具有引火归原的功效。

涉及考点 | 肉桂的应用

53.川楝子、槟榔皆具有的功效是

- A.杀虫行气
- B.杀虫利水
- C.行气利水
- D.行气疏肝
- E.行气健脾

【答案】A

【解析】川楝子行气止痛，杀虫；槟榔杀虫消积，行气，利水，截疟。二者均可杀虫行气。

涉及考点 | 川楝子与槟榔功效的共同点

54.柴胡与薄荷均具有的功效是

- A.疏肝解郁
- B.理气调中
- C.化湿行气
- D.消积行气
- E.发散风寒

【答案】A

【解析】柴胡具有疏散退热，疏肝解郁，升举阳气的作用。薄荷具有疏散风热，清利头目，利咽透疹，疏肝行气的功效。所有两者都可以疏肝解郁。

涉及考点 | 柴胡与薄荷的功效

55.白茅根具有的功效是

- A.解毒敛疮
- B.消肿生肌
- C.清热利尿
- D.祛痰止咳
- E.活血祛瘀

【答案】C

【解析】白茅根的功效是凉血止血，清热利尿，清肺胃热。

涉及考点 | 白茅根的功效

56.血余炭的功效

- A.收敛止血，化瘀利尿
- B.温经止血，散寒调经，安胎
- C.温中止血，止呕吐泻
- D.止血，化瘀
- E.凉血止血，活血祛瘀

【答案】A

【解析】血余炭的功效是收敛止血，化瘀利尿。

涉及考点 | 血余炭的功效

57. 蒲黄的功效

- | | |
|---------------|-----------------|
| A. 止血, 温胃, 行气 | B. 止血, 敛肺, 下气 |
| C. 止血, 化瘀, 利尿 | D. 止血, 敛肺, 止咳止泻 |
| E. 凉血止血, 活血祛瘀 | |

【答案】C

【解析】蒲黄属于活血化瘀药, 有止血, 化瘀, 通淋的功效。可以治疗出血, 瘀血痛证, 和血淋涩痛。

涉及考点 | 蒲黄的功效

58. 柴胡与升麻均具有的功效是

- | | |
|---------|---------|
| A. 解表生津 | B. 清热解毒 |
| C. 疏肝解郁 | D. 透发麻疹 |
| E. 升阳举陷 | |

【答案】E

【解析】柴胡具有疏散退热, 疏肝解郁, 升举阳气的作用。升麻具有发表透疹, 清热解毒, 升举阳气的作用。所以二者都可以升阳举陷。

涉及考点 | 柴胡与升麻共有的功效

59. 下列药物中, 脾胃虚寒者慎服的是

- | | |
|--------|-------|
| A. 川楝子 | B. 乌药 |
| C. 香橼 | D. 香附 |
| E. 荔枝核 | |

【答案】A

【解析】这几味药都属于理气药。川楝子药性苦寒, 有小毒, 脾胃虚寒者应慎服, 但炒用可降低寒性。乌药药性辛、温, 香橼药性辛、温, 香附药性辛、平, 荔枝核药性辛、温。

涉及考点 | 川楝子的使用注意

60. 具有散瘀消痈功效的药物是

- | | |
|--------|--------|
| A. 大蓟 | B. 地榆 |
| C. 槐花 | D. 白茅根 |
| E. 侧柏叶 | |

【答案】A

【解析】以上五个备选答案均为止血药, 有凉血止血之功, 但又各自兼有其他功效。大蓟能散瘀解毒消痈。地榆有解毒敛疮之功效。槐花兼能清肝明目。白茅根又可清热利尿, 清肺胃热。侧柏叶可化痰止咳。

涉及考点 | 大蓟的功效

(61~62 题共用备选答案)

- | | |
|--------|-------|
| A. 威灵仙 | B. 防己 |
| C. 狗脊 | D. 独活 |
| E. 木瓜 | |



配套名师高清视频

61.既能祛风湿,又能消骨鲠的药物是

【答案】A

62.既能祛风湿,又能强腰膝的药物是

【答案】C

【解析】威灵仙祛风湿,通络止痛,消骨鲠;木瓜疏筋活络,和胃化湿;狗脊祛风湿,补肝肾,强腰膝;防己利水消肿,祛风止痛;独活祛风湿,止痛,解表。

涉及考点 | 威灵仙、狗脊的功效

(63~64 题共用备选答案)

- | | |
|-------|------|
| A.泽泻 | B.滑石 |
| C.茵陈 | D.萆薢 |
| E.地肤子 | |

63.具有利湿去浊,祛风除痹功效的药物是

【答案】D

64.具有利湿退黄,解毒疗疮功效的药物是

【答案】C

【解析】泽泻利水渗湿,泄热;滑石利尿通淋,清热解暑,祛湿敛疮;茵陈利湿退黄,解毒疗疮;萆薢利湿去浊,祛风除痹;地肤子清热利湿,利尿通淋,止痒。

涉及考点 | 萆薢、茵陈的功效

(65~66 题共用备选答案)

- | | |
|--------|--------|
| A.寒湿痹痛 | B.胸痹心痛 |
| C.热毒血痢 | D.寒饮咳喘 |
| E.寒疝腹痛 | |

65.吴茱萸的主治病证是

【答案】E

66.薤白的主治病证是

【答案】B

【解析】吴茱萸主治寒凝腹痛、畏寒呕吐、虚寒泄泻。薤白主治胸痹心痛、脘腹胃痞胀痛、泻痢里急后重。

涉及考点 | 吴茱萸、薤白的主治病证

(67~68 题共用备选答案)

- | | |
|-------|-------|
| A.白及 | B.仙鹤草 |
| C.棕榈炭 | D.血余炭 |
| E.炮姜 | |

67.具有止痢功效的药物是

【答案】B

68.具有杀虫功效的药物是

【答案】B

【解析】白及收敛止血、消肿生肌。仙鹤草收敛止血、止痢、截疟、补虚、解毒杀虫,治疗身体各部位出血均可,又能收涩止泻,杀虫。棕榈炭收敛止血,止泻止带。血余炭功能收敛止血,化痰利尿。炮姜可温经止血,温中止痛。

涉及考点 | 仙鹤草的功效

(69~70 题共用备选答案)

- | | |
|-------|-------|
| A.侧柏叶 | B.仙鹤草 |
| C.白及 | D.三七 |
| E.炮姜 | |

69.具有温经止血功效的药物是

【答案】E

70.只有凉血止血功效的药物是

【答案】A

【解析】侧柏叶凉血止血,祛痰止咳,生发乌发。三七可化瘀止血,活血定痛。

涉及考点 | 炮姜、侧柏叶的功效

(71~72 题共用备选答案)

- | | |
|-------|------|
| A.丁香 | B.肉桂 |
| C.吴茱萸 | D.干姜 |
| E.花椒 | |

71.治疗中焦虚寒,肝气上逆之巅顶头痛,宜选用

【答案】C

72.治疗蛔虫引起的腹痛,呕吐,宜选用

【答案】E

【解析】丁香温中降逆,散寒止痛,温肾助阳;肉桂补火助阳,散寒止痛,温经通脉,引火归原;吴茱萸散寒止痛,降逆止呕,助阳止泻;干姜温中散寒,回阳通脉,温肺化饮;花椒温中止痛,杀虫止痒。

涉及考点 | 吴茱萸、花椒的应用

(73~74 题共用备选答案)

- | | |
|------|------|
| A.独活 | B.秦艽 |
| C.防己 | D.狗脊 |
| E.川乌 | |

73.既能祛风湿,又能温经止痛的药物是

【答案】E

74.既能祛风湿,又能退虚热的药物是

【答案】B

【解析】秦艽功效为祛风湿,通络止痛,退虚热,清湿热。川乌功效为祛风除湿,温经止痛。

涉及考点 | 川乌、秦艽的功效

(75~76 题共用备选答案)

- | | |
|-------|-------|
| A.石膏 | B.知母 |
| C.芦根 | D.天花粉 |
| E.夏枯草 | |

75.治疗胃热呕逆,宜选用

【答案】C

76.治疗热淋涩痛,宜选用

【答案】C

【解析】芦根主治热病烦渴,胃热呕逆,肺热咳嗽,肺痈吐脓,热淋涩痛。

涉及考点 | 芦根的应用

(77~78 题共用备选答案)

- | | |
|-------|-------|
| A.石膏 | B.知母 |
| C.栀子 | D.天花粉 |
| E.夏枯草 | |

77.治疗肝火上炎,目珠疼痛,应选用

【答案】E

78.治疗痰火郁结,瘰疬痰核,应选用

【答案】E

【解析】石膏用治温热病气分热证,肺热喘咳证,胃火牙痛,溃疡不敛;知母用治热病烦渴,肺热燥咳,骨蒸潮热,内热消渴;栀子用治热病心烦,血淋涩痛;天花粉用治热病烦渴,肺热燥咳,内热消渴,疮疡肿毒;夏枯草用治目赤肿痛,头痛眩晕,瘰疬,乳痈肿痛。

涉及考点 | 夏枯草的应用

(79~80 题共用备选答案)

- | | |
|---------|---------|
| A.苦、寒 | B.甘、寒 |
| C.辛、苦、温 | D.甘、苦、温 |
| E.甘、辛、温 | |

79.清热燥湿药的性味多为

【答案】A

80.理气药的性味多为

【答案】C

【解析】清热燥湿类药物性味为苦、寒;理气药的性味为辛、苦、温。

涉及考点 | 四气、五味的适应证

81.治疗大失血、大吐泻所致体虚欲脱,脉微欲绝之证,宜首选

- | | |
|-------|-------|
| A.西洋参 | B.太子参 |
| C.人参 | D.党参 |
| E.黄芪 | |

【答案】C

【解析】西洋参可治疗阴虚火旺的喘咳痰血症及热病气阴两伤之烦渴。太子参为清补之品,适用于脾肺亏虚及热病后期气阴不足者。人参功擅大补元气,故用于挽救元气虚衰、脉微欲绝之脱证,无论因大失血、大吐泻或久病、大病所致者。党参既善补中气又善益肺气,为治肺脾气虚证最常用。黄芪既善补益脾肺之气,又善升举阳气,托毒生肌。

涉及考点 | 人参的应用

82.热闭、寒闭神昏,均常选用的药物是

- | | |
|-------|-------|
| A.石菖蒲 | B.麝香 |
| C.牛黄 | D.羚羊角 |
| E.苏合香 | |

【答案】B

【解析】石菖蒲、牛黄、苏合香皆有开窍醒神之功,但是各有寒热偏性,不可同用于寒闭、热闭。羚羊角平肝息风,清肝明目,清热解毒,无开窍之功。麝香走窜之性甚烈,有极强的开窍通闭醒神作用,为醒神回苏之要药,无论寒闭、热闭,用之皆效。

涉及考点 | 麝香的应用

83.既能息风止痉,又能祛风湿,止痹痛的药物

- | | |
|-------|------|
| A.羚羊角 | B.地龙 |
| C.钩藤 | D.天麻 |
| E.珍珠 | |

【答案】D

【解析】羚羊角为“肝风内动,惊痫抽搐之要药”,其功效为平肝息风,清肝明目,清热解毒。地龙清热定惊,通络平喘,利尿。钩藤息风止痉,平抑肝阳,清肝热。天麻息风止痉,平抑肝阳,祛风通络。珍珠可平肝潜阳,安神,定惊明目,外用燥湿收敛。

涉及考点 | 天麻的功效

84.葶苈子的性味是

- | | |
|----------|-----------|
| A.甘,寒 | B.辛、苦,大寒 |
| C.辛、微苦,平 | D.甘、苦、涩,平 |
| E.辛,温 | |

【答案】B

【解析】葶苈子属于止咳平喘药,药性是苦、辛,大寒,归肺、膀胱经,其功效是泻肺平喘,利水消肿。

涉及考点 | 葶苈子的性味

85.桔梗的功效是

- | | |
|---------------|---------------|
| A.润肺,止咳,下气,化痰 | B.宣肺,利咽,清肺,化痰 |
| C.宣肺,利咽,祛痰,排脓 | D.降气,止咳,祛痰,排脓 |
| E.降气,止呕,祛痰,排脓 | |

【答案】C

【解析】桔梗属于化痰止咳平喘药,药性苦、辛,平。归肺经。其功效是宣肺,祛痰,利咽,排脓。

涉及考点 | 桔梗的功效

86.治疗胸痹结胸,乳痈,应选用的药物是

- | | |
|------|------|
| A.半夏 | B.瓜蒌 |
| C.薤白 | D.桂枝 |
| E.枳实 | |

【答案】B

【解析】薤白、枳实、桂枝三味药常配伍使用,治疗胸阳不振、痰阻胸痹之证,半夏可用于治疗痰热胸痹,这四味药可治疗胸痹结胸,但不能治疗乳痈,均与题意不符。瓜蒌的功效是清热化痰,宽胸散结,润肠通便,可应用于痰热咳嗽,胸痹结胸,肠燥便秘,还可配伍清热解毒药以治疗痈证。

涉及考点 | 瓜蒌的应用

87.具有降逆止呕功效的药物是

- | | |
|------|-------|
| A.白前 | B.旋覆花 |
|------|-------|

- C.桔梗
E.白芥子
- D.前胡

【答案】B

【解析】白前有降气化痰之功效。旋覆花降气化痰、降逆止呕。桔梗宣肺、祛痰、利咽、排脓。前胡降气化痰、疏散风热。白芥子温肺化痰、利气散结、通络止痛。

涉及考点 | 旋覆花的功效

88.丹参治疗疮痈肿痛,其功效是

- A.活血化瘀
B.凉血止血
C.凉血消痈
D.行气止痛
E.凉血活血

【答案】E

【解析】丹参属于活血调经药,其药性苦,微寒,归心,肝经。所以属于凉血活血药,适用于血热瘀滞者。

涉及考点 | 丹参的功效

2年 易错考题

(1~2 题共用备选答案)

- A.山茱萸
B.五倍子
C.莲子
D.诃子
E.金樱子

1.具有补脾止泻,养心安神功效的药物是

【答案】C

2.具有益肾固精,养心安神功效的药物是

【答案】C

【解析】山茱萸补益肝肾,收敛固涩;五倍子敛肺降火,止咳止汗,涩肠止泻,固精止遗,收敛止血,收湿敛疮;莲子补肾固精缩尿,补脾止泻止带,养心安神;诃子敛肺止咳,利咽开音,涩肠止泻;金樱子固精缩尿止带,涩肠止泻。

涉及考点 | 莲子的功效

(3~4 题共用备选答案)

- A.肝、脾经
B.肝、肾经
C.肺、肝、肾经
D.心、脾经
E.肝、心、肾经

3.熟地的归经是

【答案】B

4.白芍的归经是

【答案】A

【解析】熟地和白芍都属于补血药,但是归经不同,功效也不同。熟地归肝、肾经,功效是补血养阴,填精益髓;白芍归肝、脾经,功效是养血敛阴,柔肝定痛,平抑肝阳。

涉及考点 | 熟地、白芍的性味

(5~6 题共用备选答案)

- | | |
|--------|--------|
| A.祛寒除湿 | B.祛风止痒 |
| C.益肝明目 | D.活血止痛 |
| E.温脾止泻 | |

5.补骨脂具有的功效是

【答案】E

6.仙茅具有的功效是

【答案】A

【解析】补骨脂补肾助阳,固精缩尿,温脾止泻,纳气平喘。仙茅温肾壮阳,祛寒除湿。

涉及考点 | 补骨脂、仙茅的功效

(7~8 题共用备选答案)

- | | |
|------------------|------------------|
| A.补肾助阳,固精缩尿,养肝明目 | B.补肺益肾,纳气平喘,助阳益精 |
| C.补肾阳,强筋骨,祛寒湿 | D.补肾阳,强筋骨,祛风湿 |
| E.补肝肾,强筋骨,止崩漏 | |

7.沙苑子的功效是

【答案】A

8.淫羊藿的功效是

【答案】D

【解析】沙苑子和淫羊藿都属于补阳药。沙苑子药性甘,温,归肝、肾经,功效是补肾固精,养肝明目;淫羊藿药性辛、甘,温,归肾、肝经,功效是补肾壮阳,祛风除湿。

涉及考点 | 沙苑子、淫羊藿的功效

(9~10 题共用备选答案)

- | | |
|-------|-------|
| A.合欢皮 | B.酸枣仁 |
| C.远志 | D.琥珀 |
| E.磁石 | |

9.既能活血消肿,又能解郁安神的药物是

【答案】A

10.既能活血散瘀,又能镇惊安神的药物是

【答案】D

【解析】合欢皮解郁安神,活血消肿;酸枣仁养心益肝,安神,敛汗;远志宁心安神,祛痰开窍,消散痈肿;琥珀镇惊安神,活血散瘀,利尿通淋;磁石镇惊安神,平肝潜阳,聪耳明目,纳气定喘。

涉及考点 | 合欢皮、琥珀的功效

(11~12 题共用备选答案)

- | | |
|-------------|----------------|
| A.杀虫,疗癣 | B.清热解毒,凉血止血,杀虫 |
| C.杀虫,解暑 | D.杀虫消积,行气利水,截疟 |
| E.杀虫,润肺下气止咳 | |

11.槟榔的功效是

【答案】D

12.百部的功效是

【答案】E

【解析】槟榔药性辛、苦，温，归胃、大肠经。其功效是杀虫消积，行气，利水，截疟。百部药性甘、苦，微温，归肺经。其功效是润肺下气止咳，杀虫灭虱。

涉及考点 | 槟榔、百部的功效

(13~14 题共用备选答案)

- | | |
|--------|--------|
| A.胃热呕吐 | B.气逆呕吐 |
| C.胃虚呕吐 | D.胃寒呕吐 |
| E.妊娠呕吐 | |

13.竹茹的主治病证是

【答案】A

14.旋覆花的主治病证是

【答案】B

【解析】竹茹属于清热化痰药，其性甘，微寒，归肺胃心胆经，有清热化痰，除烦止呕的功效，可以治疗胃热呕吐。旋覆花属于温化寒痰药，具有降气，消痰，行水，止呕的功效，可以治疗气逆呕吐。

涉及考点 | 竹茹、旋覆花的主治

15.具有息风镇痉、攻毒散结、通络止痛功效的药物是

- | | |
|---------|-----------|
| A.全蝎、蜈蚣 | B.地龙、僵蚕 |
| C.龙骨、牡蛎 | D.石决明、决明子 |
| E.天麻、钩藤 | |

【答案】A

【解析】全蝎、蜈蚣的功效都是息风止痉，攻毒散结，通络止痛，两味药相须有协同增效作用，与题意相符。地龙与僵蚕都有息风之效；天麻与钩藤都有平息肝风止痉之效；龙骨与牡蛎都有重镇安神、平肝潜阳、收敛固涩之效，石决明与决明子都有清肝明目之效。

涉及考点 | 全蝎、蜈蚣的功效

16.治疗外感风热，咳嗽痰多，咽痛音哑，胸闷不舒者，应首选

- | | |
|-------|-------|
| A.百部 | B.川贝母 |
| C.桔梗 | D.杏仁 |
| E.旋覆花 | |

【答案】C

【解析】百部主治新旧咳嗽，百日咳，蛲虫，排除选项 A。川贝母主治虚劳咳嗽，肺热燥咳，排除选项 B。杏仁主治咳嗽气喘，肠燥便秘，排除选项 D。旋覆花主治咳嗽痰多，痰饮蓄结，呕吐，排除选项 E。桔梗主治咳嗽痰多，胸闷不畅，咽喉肿痛，肺痛咳嗽。

涉及考点 | 桔梗的应用

17.半夏的归经是

- | | |
|----------|----------|
| A.心、脾、肾经 | B.肝、脾、肾经 |
| C.肺、胃、肾经 | D.心、肝、胃经 |
| E.肺、脾、胃经 | |

【答案】E

【解析】半夏味辛、性温，有毒，归脾、胃、肺经。

涉及考点 | 半夏的归经

18. 治疗痰壅气逆, 咳喘痰多, 胸闷食少, 甚则不能平卧, 宜选用的药物是

- A. 紫苏子、白芥子、莱菔子
B. 紫菀、款冬花、川贝母
C. 桑叶、贝母、北沙参
D. 杏仁、麻黄、甘草
E. 麻黄、石膏、杏仁

【答案】A

【解析】紫苏子、白芥子、莱菔子用于痰壅气逆, 咳喘痰多, 胸闷食少, 甚则不能平卧, 选项 A 合适。紫菀、款冬花、川贝母用于肺热咳喘, 排除选项 B。桑叶、贝母、北沙参, 用于肺热或燥热伤肺, 咳嗽痰少, 色黄而黏稠, 或干咳, 咽痒等, 排除选项 C。杏仁、麻黄、甘草, 用于治疗风寒外束, 肺气壅遏的喘咳实证, 排除选项 D。杏仁、麻黄、石膏, 用于肺热壅盛, 高热喘急, 排除选项 E。

涉及考点 | 紫苏子、白芥子、莱菔子的应用

19. 可用于治疗血滞经闭, 癥瘕的药物是

- A. 马钱子
B. 三棱
C. 血竭
D. 儿茶
E. 自然铜

【答案】B

【解析】马钱子的功效是通络止痛, 散结消肿。主治跌打损伤, 骨折肿痛; 风湿顽痹, 麻木瘫痪; 痈疽疮毒, 咽喉肿痛。三棱的功效是破血行气, 消积止痛, 其破血力量较强, 善于治疗血滞经闭以及癥瘕。血竭应用于跌打损伤; 心腹疼痛; 外伤出血; 疮疡不敛。儿茶应用于跌仆伤痛; 外伤出血; 吐血衄血; 疮疡不敛; 湿疹; 湿疮; 牙疳; 痔疮; 肺热咳嗽。自然铜应用于跌打损伤; 筋骨折伤; 瘀肿疼痛。

涉及考点 | 三棱的应用

20. 桃仁的功效是

- A. 活血行气, 润肠通便
B. 活血祛瘀, 润肠通便, 止咳平喘
C. 活血止痛, 解毒消痈
D. 活血祛瘀, 止咳平喘
E. 行气活血, 祛风止痛

【答案】B

【解析】桃仁属于活血调经药, 其性苦甘平, 归心肝大肠经, 有活血祛瘀, 润肠通便, 止咳平喘的功效, 可以治疗血瘀证, 肠燥便秘, 咳嗽气喘的病症。

涉及考点 | 桃仁的功效

21. 善治血热便血、痔血及肝热目赤头痛的药物是

- A. 虎杖
B. 槐花
C. 小蓟
D. 地榆
E. 大蓟

【答案】B

【解析】虎杖主治湿热黄疸, 淋浊, 带下; 水火烫伤, 痈肿疮毒, 毒蛇咬伤; 经闭, 癥瘕, 跌打损伤; 肺热咳嗽; 热结便秘。槐花主治血热出血证; 目赤, 头痛。小蓟主治血热妄行的咯血、衄血、吐血、尿血及崩漏; 热毒痈肿。地榆主治下焦血热的便血、痔血、血痢、崩漏; 烫伤、湿疹、疮疡痈肿等。大蓟主治血热出血证; 热毒痈肿。

涉及考点 | 槐花的主治病证

22. 均能治疗蛔虫、蛲虫证, 小儿疳积的药物是

- A. 使君子
- B. 苦楝皮
- C. 麦芽
- D. 稻芽
- E. 槟榔

【答案】A

【解析】使君子功效是杀虫消积, 可应用于蛔虫病、蛲虫病和小儿疳积。而麦芽、稻芽属于消食类药物, 不具有驱虫的功效, 苦楝皮和槟榔虽有驱虫的功效, 却无治疗小儿疳积的功效, 与题意不符。

涉及考点 | 使君子的主治病证

23. 治疗夏伤暑湿, 身热烦渴, 小便不利, 泄泻者, 应首选

- A. 茯苓
- B. 猪苓
- C. 金钱草
- D. 滑石
- E. 泽泻

【答案】D

【解析】茯苓主水肿, 痰饮, 脾虚泄泻, 心悸、失眠, 排除选项 A。猪苓主水肿, 小便不利, 泄泻, 排除选项 B。金钱草主湿热黄疸, 石淋、热淋; 痈肿疔疮、毒蛇咬伤, 排除选项 C。泽泻主水肿, 小便不利, 泄泻, 淋证, 遗精, 排除选项 E。滑石主热淋, 石淋, 尿热疼痛, 暑湿, 湿温, 湿疮, 湿疹, 痱子; 滑石既能利水湿, 又能解暑热, 是治疗暑热常用药。

涉及考点 | 滑石的应用

24. 桑寄生、五加皮除均可祛风湿外, 还具有的功效是

- A. 清热安胎
- B. 利尿消肿
- C. 定惊止痉
- D. 温通经络
- E. 补肝肾, 强筋骨

【答案】E

【解析】桑寄生祛风湿, 补肝肾, 强筋骨, 安胎; 五加皮祛风湿, 补肝肾, 强筋骨, 利水。桑寄生、五加皮除均可祛风湿外, 还能补肝肾、强筋骨。

涉及考点 | 桑寄生、五加皮功效的共同点

25. 既能泻下逐水, 又能去积杀虫的药物是

- A. 槟榔
- B. 甘遂
- C. 使君子
- D. 牵牛子
- E. 京大戟

【答案】D

【解析】槟榔杀虫消积, 行气利水, 截疟, 排除选项 A。甘遂泻水逐饮, 消肿散结, 排除选项 B。使君子杀虫消积, 排除选项 C。京大戟泻水逐饮, 消肿散结, 排除选项 E。牵牛子泻下逐水, 去积杀虫。

涉及考点 | 牵牛子的功效

26. 既能清热燥湿, 又能泻火解毒, 尤善治疗痈疽疔疮的药物是

- A. 决明子
- B. 生地黄
- C. 大血藤
- D. 黄连
- E. 马勃

【答案】D

【解析】这几味药都属于清热药,其中黄连既能清热燥湿,又能泻火解毒,可用于治疗痈肿疔毒。决明子清热明目,润肠通便;马勃清热解毒,利咽,止血;生地黄清热凉血,养阴生津,均不适合治疗痈疽疔疮。大血藤是治疗肠痈的要药,但不能治疗疔疮。

涉及考点 | 黄连的应用

27.黄芩具有而黄柏不具有的功效是

- | | |
|-------|-------|
| A.燥湿 | B.泻火 |
| C.解毒 | D.清肺热 |
| E.退虚热 | |

【答案】D

【解析】黄芩清热燥湿、泻火解毒、凉血止血、安胎。黄柏清热燥湿、泻火解毒、清退虚热。A、B、C三个选项为两者同有功效;选项D为黄芩有而黄柏没有的功效;选项E为黄柏有而黄芩没有的功效。

涉及考点 | 黄芩、黄柏功效的不同点

28.葛根的功效,以下说法错误的是

- | | |
|--------|--------|
| A.解肌退热 | B.升阳止泻 |
| C.透疹 | D.解痉 |
| E.生津止渴 | |

【答案】B

【解析】葛根是属于发散风热药。葛根具有解肌退热,生津止渴,透疹,升阳止泻,通经活络,解酒毒的作用。所以B是错误的。

涉及考点 | 葛根的功效

29.具有收敛止血、止痢、截疟、补虚功效的药物是

- | | |
|-------|-------|
| A.苦楝皮 | B.沙苑子 |
| C.侧柏叶 | D.仙鹤草 |
| E.三七 | |

【答案】D

【解析】苦楝皮的功效是杀虫,疗癣。沙苑子的功效是补肾助阳,固精缩尿,养肝明目。侧柏叶的功效是凉血止血,化痰止咳,生发乌发。仙鹤草的功效是收敛止血,止痢,截疟,补虚。三七的功效是散瘀之血,消肿定痛。

涉及考点 | 仙鹤草的功效

第四篇 方剂学

考情分布图

		2015	2016	2017	2018	2019
方剂学	总论	0	1	0	0	0
	解表剂	1	2	1	1	0
	泻下剂	1	0	1	1	1
	和解剂	1	1	1	1	1
	清热剂	1	0	1	1	1
	祛暑剂	0	0	0	0	0
	温里剂	3	2	3	2	3
	表里双解剂	1	1	1	1	2
	补益剂	1	1	2	1	2
	固涩剂	1	1	1	0	0
	安神剂	0	1	1	0	1
	开窍剂	0	0	0	0	0
	理气剂	1	2	1	1	2
	理血剂	3	3	2	2	2
	治风剂	2	1	2	1	2
	治燥剂	0	1	1	1	0
	祛湿剂	1	1	1	1	2
	祛痰剂	2	1	1	1	1
	消食剂	0	0	0	0	0
	驱虫剂	0	0	0	0	0
治痛疡剂	0	0	0	0	0	

高频考点必背

1. 方剂与治法之间的关系表现为“以法组方”“以法遣方”“以法类方”“以法释方”等四方面,而这四方面又可以简单概括为“以法统方”。

2. 常用治法主要是汗、吐、下、和、温、清、消、补八法。

3. 方剂的组成方法有君臣佐使配伍、气味配伍、升降开阖配伍等。

4. 君臣佐使配伍的方法是:

(1) 君药:即针对主病或主证起主要治疗作用的药物。

(2) 臣药有两种意义。①辅助君药加强治疗主病或主证的药物。②针对重要的兼病或兼

证起主要治疗作用的药物。

(3) 佐药有三种意义。①**佐助药**,即配合君、臣药以加强治疗作用,或直接治疗次要兼证的药物。②**佐制药**,即用以消除或减弱君、臣药物的毒性,或能制约君、臣药物峻烈之性的药物。③**反佐药**,即病重邪甚,可能拒药时,配伍与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用的药物,以防止药病格拒。

(4) 使药有两种意义。①**引经药**,即能引方中诸药至特定病所的药物。②**调和药**,即具有调和方中诸药作用的药物。

5. 方剂的变化形式:①**药味**增减的变化。②**药量**增减的变化。③**剂型**更换的变化

6. 解表剂主要适用于表证。多以辛散轻扬药物为主组方,不宜久煎,以免药性耗散,作用减弱。

7. 麻黄汤中桂枝**既能**助麻黄**解表**,使发汗之力倍增;**又能畅行营阴**,使疼痛之症得解。麻黄、桂枝两药相须为用,是辛温发汗的常用组合。麻黄汤为辛温发汗之峻剂,是治疗外感风寒表实证的基础方。

8. 桂枝汤主治:外感风寒表虚证。桂枝与芍药用量相等(1:1),寓意有三:一为针对营卫失调病机,体现营卫同治,祛邪扶正,邪正兼顾之意;二为相辅相成,桂枝得芍药相助则汗出有源,芍药得桂枝相助则滋而能化;三为相制相成,**散中有收,汗中寓补**。

9. 九味羌活汤中细辛善止少阴头痛,白芷善解阳明头痛,川芎长于止少阳、厥阴头痛,此三味与羌活、苍术合用,为本方“**分经论治**”的基本结构。

10. 半夏白术天麻汤主治:**风痰上扰证**。李东垣《脾胃论》云:“足太阴痰厥头痛,非半夏不能疗;眼黑头眩,风虚内作,非天麻不能除。”本方是在**二陈汤**燥湿化痰的基础上,加入健脾燥湿之**白术**、平肝息风之**天麻**而组成。

11. 银翘散主治:温病初起之风热表证。本方所用药物均系轻清之品,用法强调“香气大出,即取服,勿过煮”,体现了吴氏“**治上焦如羽,非轻莫举**”的用药原则。《温病条辨》称本方为“**辛凉平剂**”,是治疗外感风热表证的常用方。

12. 麻黄杏仁甘草石膏汤主治:外感风邪,邪热壅肺证。麻黄与石膏相配,一辛温,一辛寒,一以宣肺为主,一以清肺为主,俱能透邪于外,合用则相反之中寓有相辅之意,消除致病之因,调理肺的宣发功能;由于本方石膏用量倍于麻黄,仍不失为**辛凉之剂**。

13. 败毒散主治:气虚,外感风寒湿表证。川芎行气活血,并能祛风;柴胡解肌透邪,并能行气。二药既可助君药解表逐邪,又可行气活血以加强宣痹止痛之力。

14. 大承气汤主治:①阳明腑实证。②热结旁流证。乃属“**通因通用**”之法。③里热实证之热厥、痉病或发狂等。为“**寒因寒用**”。

15. 保和丸主治:**食滞胃脘证**。方中重用山楂,能消一切饮食积滞,善于消肉食之积,为君药。**神曲**消食健脾,善于化酒食陈腐油腻之积;**莱菔子**下气消食除胀,善于消谷面之积,共为臣药。

16. 温脾汤主治:阳虚寒积证。本方由温补脾阳药与寒下攻积药配伍组成,温通、泻下、补益三法兼备,温阳以祛寒、攻下不伤正,共奏攻下冷积、温补脾阳之功。

17. 麻子仁丸主治:肠胃燥热,**脾约**便秘证。蜂蜜,既助麻子仁润肠通便,又可缓和小承气汤攻下之力。方中虽用小承气汤泄热通便,取质润多脂之麻仁、杏仁、芍药、白蜜等,一则益阴增液以润肠通便,二则甘润可减缓小承气攻下之力。

18. 济川煎主治:肾阳虚弱,精津不足证(肾虚便秘)。本方既可温肾益精治其本,又能润肠

通便以治标,用药灵巧,补中有泻,降中有升,寓通于补之中,寄降于升之内。

19.乌梅丸主治:脏寒蛔厥证。脘腹阵痛,烦闷呕吐,时发时止,得食则吐,甚则吐蛔,手足厥冷,或久泻久痢。柯琴说“蛔得酸则静,得辛则伏,得苦则下”配伍特点:酸苦辛并进,使蛔虫“得酸则静,得辛则伏,得苦则下”;寒热并用,邪正兼顾。

20.四逆散主治:①阳郁厥逆证。手足不温,或腹痛,或泄利下重,脉弦。②肝脾气郁证。胁肋胀闷,脘腹疼痛,脉弦。

21.逍遥散主治:肝郁血虚脾弱证。当归、白芍与柴胡配伍,补肝之体,助肝之用,使血和则肝和,血充则肝柔。

22.麦门冬汤主治:①虚热肺痿。②胃阴不足证。粳米、大枣益脾胃,助人参益气生津,寓“培土生金”之意

23.白虎汤主治:气分热盛证。壮热面赤,烦渴引饮,汗出恶热,脉洪大有力。知母为臣药,既助石膏清肺胃之热,又可滋阴润燥,救已伤之阴津。

24.三仁汤主治:湿温初起及暑温夹湿之湿重于热证。配伍特点:宣上、畅中、渗下,从三焦分消湿热病邪。杏仁宣利上焦气机,白蔻仁宣畅中焦气机,薏苡仁渗利下焦气机。

25.清营汤主治:热入营分证。此即“入营犹可透热转气”之具体应用

26.犀角地黄汤主治:热入血分证。

(1)热扰心神,身热谵语,舌绛起刺,脉细数。

(2)热伤血络,斑色紫黑、吐血、衄血、便血、尿血等,舌红绛,脉数。

(3)蓄血瘀热,喜忘如狂,漱水不欲咽,大便色黑易解等。

叶天士所谓“入血就恐耗血动血,直须凉血散血”,治当以清热解毒,凉血散瘀为法。

27.黄连解毒汤主治:三焦火毒证。本方为大苦大寒之剂,久服或过量易伤脾胃,非火盛者不宜使用。

28.五苓散主治:膀胱气化不利之蓄水证。猪苓汤主治:水热互结证。

29.苓桂术甘汤主治:中阳不足之痰饮。仲景云:“病痰饮者,当以温药和之。”原方用法之后有“小便当利”之说。此亦即《金匮要略》“夫短气有微饮者,当从小便去之”之意。

30.仙方活命饮主治:阳证痈疡肿毒初起。方中金银花性味甘寒,最善清热解毒疗疮,前人称之为“疮疡圣药”,故重用为君。本方为“疮疡之圣药,外科之首方”,适用于阳证而体实的各类疮疡肿毒。

31.导赤散主治:心经火热证。竹叶甘淡,清心除烦,淡渗利窍,导心火下行,为臣药。《医宗金鉴》以“水虚火不实”五字概括本方证之病机。

32.龙胆泻肝汤主治:①肝胆实火上炎证。②肝经湿热下注证。

33.左金丸主治:肝火犯胃证。全方配伍特点:辛开苦降,肝胃同治,泻火而不至凉遏,降逆而不得火郁,相反相成。黄连与吴茱萸用量比例为6:1。

34.完带汤主治:脾虚肝郁,湿浊带下。配伍特点:培土抑木,肝脾同治,寓补于散,寄消于升。

35.清胃散主治:胃火牙痛。方中升麻,一取其清热解毒,以治胃火牙痛;一取其轻清升散透发,可宣达郁遏之伏火,有“火郁发之”之意。

36.独活寄生汤主治:痹证日久,肝肾两虚,气血不足证。其中白芍与甘草相合,尚能柔肝缓急,以助舒筋止痛;当归、川芎、牛膝、桂心活血,寓“治风先治血,血行风自灭”之意。

37.白头翁汤主治:热毒痢疾。腹痛,里急后重,肛门灼热,下痢脓血,赤多白少,渴欲饮水,

舌红苔黄,脉弦数。

38.青蒿鳖甲汤主治:温病后期,邪伏阴分证。**夜热早凉**,热退无汗,舌红苔少,脉细数。

39.香薷散主治:阴暑。方中香薷辛温芳香,解表散寒,祛暑化湿,具有祛在表之寒湿之功,是夏月解表之要药,又称为**夏月之麻黄**。

40.理中丸主治:①脾胃虚寒证。脘腹绵绵作痛,喜温喜按。②阳虚失血证。便血、吐血、衄血或崩漏等。③脾胃虚寒所致的胸痹,或病后多涎唾,或小儿慢惊等。

41.小建中汤主治:**中焦虚寒**,肝脾不和证。大建中汤主治:中阳衰弱,阴寒内盛之脘腹剧痛证。

42.葛根黄芩黄连汤主治:**协热下利**。原方先煮葛根,后纳诸药,可使“**解肌之力优而清中之气锐**”,本方对热泻、热痢,不论有无表证,皆可用之。

43.大柴胡汤主治:少阳阳明合病。往来寒热,胸胁苦满。

44.防风通圣散主治:风热壅盛,表里俱实证。**憎寒壮热**,头目昏眩

45.参苓白术散《太平惠民和剂局方》主治:脾虚湿盛证。方中桔梗宣利肺气,通调水道,又载药上行,与诸补脾药合用,有“**培土生金**”之意。

46.补中益气汤主治:①脾虚气陷证。②气虚发热证。补中益气汤为“**甘温除热**”法的代表方剂。

47.生脉散主治:①温热、暑热,耗气伤阴证。②久咳伤肺,气阴两虚证。

48.玉屏风散主治:**表虚自汗**。汗出恶风,面色㿔白,舌淡苔薄白,脉浮虚。亦治虚人腠理不固,易感风邪。

49.黄土汤主治:脾阳不足,**脾不统血**证。配伍特点:**刚柔相济**。

50.归脾汤主治:①心脾气血两虚证。②脾不统血证。加减变化崩漏下血偏寒者,可加艾叶炭、炮姜炭,以温经止血;偏热者,加生地炭、阿胶珠、棕榈炭,以清热止血。

51.炙甘草汤主治:①阴血阳气虚弱,心脉失养证。②虚劳肺痿。用法中加清酒煎服,因清酒辛热,温通血脉,以行药力,为使药。

52.六味地黄丸主治:肝肾阴虚证。**三补三泻,以补为主**;肝脾肾三阴并补,以补肾阴为主。

53.左归丸主治:真阴不足证。在补阴之中配伍补阳药,取“**阳中求阴**”之义。

54.百合固金汤主治:肺肾阴亏,虚火上炎证。方中**生地、熟地**并用,既能滋阴养血以**金水相生**,又能清热凉血以止血,共为君药。

55.川芎茶调散主治:外感风邪头痛。方中**羌活**偏治**太阳经**头痛;**白芷**偏治**阳明经**头痛;**细辛**偏治**少阴经**头痛;防风疏散风寒,使风寒向外透散。茶叶**既能清利头目,又能监防辛温药耗散伤正**。

56.肾气丸主治:肾阳不足证。本方并非峻补元阳,而在微微生火,鼓舞肾气,即取“**少火生气**”之义。

57.右归丸主治:**肾阳不足,命门火衰**证。熟地黄、山萸肉、枸杞子、山药滋阴益肾,养肝补脾,填精补髓,取“**阴中求阳**”之义。

58.大补阴丸主治:**阴虚火旺证**。方中知母苦寒而润,上能清润肺金,下能滋清肾水,与黄柏相须为用,清热降火,保存阴液,平抑亢阳,清其源而治其标。

59.八珍汤主治:**气血两虚证**。方中川芎为佐,活血行气,使熟地黄、当归、白芍**补而不滞**。

60.四物汤主治:**营血虚滞证**。全方配伍特点:以熟地黄、白芍阴柔补血之品与辛香之当归、川芎等量相配,动静相宜,**补血而不滞血,行血而不伤血**,补中有行,温而不燥,滋而不膩。

- 61.四君子汤主治:脾胃气虚证。组成:人参、白术、茯苓、炙甘草各等分。
- 62.地黄饮子主治:下元虚衰,痰浊上泛之暗瘖证。舌强不能言,足废不能用,口干不欲饮。方中肉桂还可摄纳浮阳,引火归原;石斛、麦冬、五味子滋养肺肾,金水相生,壮水以济火。
- 63.牡蛎散主治:体虚自汗、盗汗证。常自汗出,夜卧更甚。方中麻黄根甘平,功专收敛止汗,“能引诸药外至卫分而固腠理”
- 64.真人养脏汤主治:久泻久痢,脾肾虚寒证。诃子苦酸温涩,功专涩肠止泻。君臣相须为用,体现“急则治标”“滑者涩之”之法。佐以当归、白芍养血和血,木香调气醒脾,既治下痢腹痛后重,又使全方涩补不滞。费伯雄言其“于久病正虚者尤宜”。
- 65.四神丸主治:脾肾阳虚之肾泄证。肉豆蔻配合补骨脂即《普济本事方》之二神丸,主治“脾肾虚弱,全不进食”
- 66.桑螵蛸散主治:心肾两虚证。小便频数,或尿如米泔色。桑螵蛸得龙骨则固涩止遗之力增,得龟甲则补肾益精之功著。石菖蒲与远志配伍共奏调补心肾、交通上下、补养气血、涩精止遗之功。
- 67.朱砂安神丸主治:心火亢盛,阴血不足证。方中朱砂既重镇安神,又清心经火,治标之中兼能治本。
- 68.天王补心丹主治:阴虚血少,神志不安证。加减变化:失眠重者,可酌加龙骨、磁石以重镇安神;心悸怔忡甚者,可酌加龙眼肉、夜交藤以增强养心安神之功;遗精者,可酌加金樱子、煅牡蛎以固肾涩精。
- 69.开窍剂适用于窍闭神昏证。因温热邪毒内陷心包,痰热蒙蔽心窍所致者,称之为热闭;因寒湿痰浊之邪或秽浊之气蒙闭心窍所致者,称之为寒闭。
- 70.安宫牛黄丸(牛黄丸)主治:邪热内陷心包证。
- 紫雪散主治:温热病,热闭心包及热盛动风证。
- 至宝丹主治:痰热内闭心包证。
- 苏合香丸主治:寒闭证。
- 71.越鞠丸主治:六郁证。气、血、痰、火、湿、食六者相因而郁,称之为六郁。痰郁多因气滞湿聚而成,若气行湿化,则痰郁亦随之而解,故方中不另加治痰之品,此亦治病求本之意。
- 72.半夏厚朴汤主治:梅核气。咽中如有物阻,咯吐不出,吞咽不下满,助半夏散结降逆,是为臣药;二者配伍,半夏散痰结,厚朴行气结,主治痰气互结之证。方中茯苓甘淡渗湿健脾,以助半夏化痰,符合“治痰不理脾胃非其治也”之说。
- 73.桃核承气汤主治:下焦蓄血证。血府逐瘀汤主治:胸中血瘀证。
- 74.补阳还五汤主治:中风之气虚血瘀证。本方既是益气活血法的代表方,又是治疗中风后遗症的常用方。
- 75.桂枝茯苓丸主治:瘀阻胞宫证。本方治漏下之症,采用行血之法,又体现“通因通用”,使癥块得消,血行常道,则出血得止。
- 76.小蓟饮子主治:热结下焦之血淋、尿血。栀子清泄三焦之火,导热从小便而出。
- 77.牵正散主治:风中头面经络。方中全蝎长于通络,僵蚕且能化痰,合用既助君药祛风化痰之力,又能通络止痉。

5年 历年真题

1. 下列各项中,不属于“和法”范畴的是

- A. 透达膜原
B. 疏肝和胃
C. 分消上下
D. 调和营卫
E. 消食和胃

【答案】E

【解析】选项 ABCD 都属于“和法”。“和法”是指通过和解或调和以祛邪愈病的一种治疗方法。主要有和解少阳、透达膜原、调和肝脾、疏肝和胃、分消上下、调和肠胃、表里双解等。

涉及考点 | 方剂学“八法”

2. 病证较重或病情不稳定的患者宜选用的药物是

- A. 丸剂
B. 散剂
C. 汤剂
D. 针剂
E. 丹剂

【答案】C

【解析】选项 A 吸收较慢,药效持久,节省药材,便于服用与携带。选项 B 是将药物粉碎,混合均匀后所制成粉末状的制剂。散剂制作简便,吸收较快,节省药材,便于服用及携带。选项 C 吸收快,能迅速发挥药效;而且可以根据病情需要要进行加减,能照顾每个患者或具体病变的不同阶段,因而多适用于病证较重或病情不稳定的患者。选项 D 和 E 不在大纲范围内选项。

涉及考点 | 剂型的应用

3. 由大承气汤化裁为小承气汤属于

- A. 药味加减与药量增减变化的联合运用
B. 剂型更换的变化
C. 药味加减的变化
D. 药量增减的变化
E. 药味加减与剂型更换变化的联合运用

【答案】A

【解析】方剂的变化形式有三种,药量增减、药味加减及剂型更换。大承气汤化裁为小承气汤是前两种变化均有。

涉及考点 | 方剂的组成与变化

4. 桂枝汤中桂枝与芍药的比例为

- A. 1 : 1
B. 3 : 1
C. 5 : 1
D. 4 : 1
E. 7 : 1

【答案】A

【解析】桂枝汤中桂枝 9 g,芍药 9 g,两药比例为 1 : 1。桂芍等量合用的寓意有三:一为针对卫强营弱,体现营卫同治,邪正兼顾;二为相辅相成,桂枝得芍药,使汗有源,芍药得桂枝,则滋而能化;三为相制相成,散中有收,汗中寓补。

涉及考点 | 桂枝汤的配伍意义



配套名师高清视频

5.下列各项中,麻黄用量最大的方剂是

- A.麻黄汤
- B.大青龙汤
- C.小青龙汤
- D.麻杏石甘汤
- E.麻黄细辛附子汤

【答案】B

【解析】麻黄附子细辛汤麻黄二两,麻黄汤、小青龙汤中麻黄三两,麻杏石甘汤中麻黄四两,唯大青龙汤麻黄六两,因其治风寒表实重证兼里有郁热者,需倍用麻黄,增强发汗之功。

涉及考点 || 大青龙汤的组成药物

6.止嗽散的功用是

- A.宣肺解表,止咳平喘
- B.宣肺利气,疏风止咳
- C.宣肺化痰,止嗽定喘
- D.疏风清热,止咳化痰
- E.宣降肺气,化痰止嗽

【答案】B

【解析】止嗽散主治风邪犯肺之咳嗽证。方用紫菀、百部为君,止咳化痰,桔梗开宣肺气,白前降气化痰,二者一宣一降,恢复肺气之宣降,为臣药。陈皮燥湿化痰,仅用一味荆芥,辛而微温,疏风解表,后用甘草调和诸药,又有利咽之功。诸药配伍,宣肺利气,疏风止咳,则咳痰咽痒得瘥。

涉及考点 || 止嗽散的功用

7.被称为“辛凉平剂”的方剂是

- A.桂枝汤
- B.麻杏石甘汤
- C.白虎汤
- D.桑菊饮
- E.银翘散

【答案】E

【解析】《温病条辨》称银翘散为“辛凉平剂”,是治疗风温初起之常用方。“辛凉轻剂”为桑菊饮,“辛凉重剂”为白虎汤。

涉及考点 || 银翘散的运用

8.大黄牡丹汤的功用是

- A.攻下冷积,温补脾阳
- B.润肠泄热,行气通便
- C.温里散寒,通便止痛
- D.泻热破瘀,散结消肿
- E.泄热通便,补益气血

【答案】D

【解析】本方治疗肠痈初起,湿热瘀滞证。正如方名,大黄、牡丹皮共为本方君药,大黄苦寒攻下,泄热逐瘀,荡涤肠中湿热瘀结之毒;丹皮苦辛微寒,能清热凉血,活血化瘀,两药合用,泻热破瘀。

涉及考点 || 大黄牡丹汤的功用

9.主治“脾约”的方剂是

- A.温脾汤
- B.健脾丸
- C.归脾汤
- D.实脾散
- E.麻子仁丸

【答案】E

【解析】麻子仁丸主治“脾约”证。即肠胃燥热,脾约便秘证。蜂蜜,既助麻子仁润肠通便,又可缓和承气汤攻下之力。方中虽用小承气汤泄热通便,取质润多脂之麻仁、杏仁、芍药、白蜜等,一则益阴增液以润肠通便,二则甘润可减缓小承气攻下之力。

涉及考点 | 麻子仁丸的主治

10. 大黄在大黄牡丹汤中的配伍意义是

- A. 清热泻火,导热下行
- B. 清泻瘀热,分利二便
- C. 荡涤胃肠,泄热泻结
- D. 泻热除湿,通肠逐瘀
- E. 通肠泻热,以下代清

【答案】D

【解析】大黄牡丹汤可荡涤肠间湿热蕴结之毒,其意在泻肠中湿热,祛肠之瘀血。

涉及考点 | 大黄在大黄牡丹汤中的配伍意义

11. 逍遥散所主证候的病机要点是

- A. 肝血不足,疏泄失常
- B. 肝气郁滞,耗伤阴血
- C. 肝郁血虚,脾失健运
- D. 营血虚滞,肝失疏泄
- E. 阴虚肝郁,横犯脾胃

【答案】C

【解析】逍遥散属于调和肝脾剂,有疏肝解郁,养血健脾的功效,可以治疗肝郁血虚脾弱证。

涉及考点 | 逍遥散的主治

12. 往来寒热,胸胁苦满,默默不欲饮食,心烦喜呕,口苦,咽干,目眩,舌苔薄白,脉弦,治症宜首选的方剂是

- A. 逍遥散
- B. 四逆散
- C. 大柴胡汤
- D. 小柴胡汤
- E. 半夏泻心汤

【答案】D

【解析】选项 A 主治肝郁血虚脾弱证。两胁作痛,寒热往来,头痛目眩,口燥咽干,神疲食少,月经不调,乳房作胀,脉弦而虚。选项 B 主治:①阳郁厥逆证。手足不温,或咳,或悸,或小便不利,或腹中痛,或泄利下重者。②肝脾气郁(肝气乘脾)。胁肋胀闷,脘腹疼痛,脉弦。选项 C 主治少阳+阳明病。往来寒热,胸胁苦满,呕不止,郁郁微烦,心下满痛或心下痞硬,大便不解,舌苔黄,脉弦数有力。选项 D 主治:①伤寒少阳证。往来寒热,胸胁苦满,默默不欲饮食,心烦喜呕,口苦,咽干,目眩,苔白,脉弦。②妇人伤寒,热入血室,经水适断,寒热发作有时。③疟疾、黄疸以及内伤杂病而见少阳证等。选项 E 主治寒热错杂之痞证。心下痞,但满而不痛,呕吐,或肠鸣下利,舌苔薄腻而微黄选项。

涉及考点 | 小柴胡汤的主治证候

13. 具有清胆利湿,和胃化痰功用的是

- A. 蒿芩清胆汤
- B. 截疟七宝饮
- C. 四逆散
- D. 逍遥散
- E. 小柴胡汤

【答案】A

【解析】蒿芩清胆汤主治少阳湿热痰浊证。方用青蒿清透少阳邪热,黄芩燥湿清胆热,共

为君药。竹茹清胆胃之热,化痰止呕;枳壳下气宽中,除痰消痞;半夏燥湿化痰,和胃降逆;陈皮理气化痰,宽胸畅膈,共为臣药。赤茯苓、碧玉散清热利湿,为佐使药。诸药合用,达清胆利湿,和胃化痰之功。

涉及考点 | 蒿芩清胆汤的功用

14.半夏泻心汤组成的药物中,除半夏、人参、炙甘草、干姜、大枣外,还有

- | | |
|---------|---------|
| A.黄连、黄柏 | B.栀子、连翘 |
| C.黄连、黄芩 | D.柴胡、枳壳 |
| E.黄芩、黄柏 | |

【答案】C

【解析】本题考查的是重点方剂的组成。半夏泻心汤由半夏、人参、炙甘草、干姜、大枣、黄芩、黄连组成。

涉及考点 | 半夏泻心汤配伍意义

15.和解少阳的代表方剂是

- | | |
|---------|--------|
| A.四逆散 | B.逍遥散 |
| C.小柴胡汤 | D.大柴胡汤 |
| E.半夏泻心汤 | |

【答案】C

【解析】小柴胡汤属于和解少阳的代表方,也是治疗少阳病证的基础方,可以治疗伤寒少阳证,妇人中风,热入血室。疟疾、黄疸等少阳证。

涉及考点 | 小柴胡汤的功用

16.治疗脾肾虚寒,五更泄泻的方剂是

- | | |
|-------|---------|
| A.理中丸 | B.真人养脏汤 |
| C.四神丸 | D.桃花汤 |
| E.固精丸 | |

【答案】C

【解析】选项 A 治疗:①脾胃虚寒证。脘腹绵绵作痛,喜温喜按,自利不渴,呕吐,大便稀溏,不欲饮食,舌淡苔白润,脉沉细或沉迟无力。②阳虚失血证。便血、衄血或崩漏等,血色黯淡,质清稀。③脾胃虚寒所致霍乱、小儿慢惊、病后喜唾涎沫、胸痹等。选项 B 主治久泻久痢,脾肾虚寒证。泻利无度,滑脱不禁,甚至脱肛,或下痢赤白,或大便脓血,里急后重,日夜无度,脐腹疼痛,喜温喜按,倦怠食少,舌淡苔白,脉迟细。选项 C 主治脾肾阳虚之肾泄证。五更泄泻,或久泻不愈,纳呆腹痛,腰酸肢冷,神疲乏力,舌质淡,苔薄白,脉沉迟。选项 D 不在大纲范围内。选项 E 不在大纲范围内。

涉及考点 | 四神丸的功效

17.玉屏风散中黄芪配防风的意义,哪项不适合

- | | |
|--------|---------|
| A.调和营卫 | B.祛邪不伤正 |
| C.补中有散 | D.固表不留邪 |
| E.散中有收 | |

【答案】A

【解析】黄芪和防风都为气分用药,调和营卫不是其配伍意义。

涉及考点 | 玉屏分散的配伍意义

18. 四逆散与四逆汤的组成中均含有的药物是

- A. 茯苓
B. 附子
C. 白术
D. 甘草
E. 人参

【答案】D

【解析】四逆散的组成：柴胡、枳实、芍药、甘草；四逆汤的组成：附子、干姜、甘草。两方中共同含有的药物是甘草。

涉及考点 | 四逆散与四逆汤的组成药物

19. 主治肝郁血虚脾弱证的方剂是

- A. 蒿芩清胆汤
B. 痛泻要方
C. 逍遥散
D. 小柴胡汤
E. 大柴胡汤

【答案】C

【解析】蒿芩清胆汤主治少阳湿热证。痛泻要方主治脾虚肝旺之痛泻。逍遥散主治肝郁血虚脾弱证。小柴胡汤主治：①伤寒少阳证。②热入血室证。③黄疸、疟疾，以及内伤杂病而见少阳证。大柴胡汤主治少阳阳明合病选项。

涉及考点 | 逍遥散的主治证候

20. 清营汤证中舌象应是

- A. 舌绛起刺
B. 舌绛苔干
C. 舌绛苔滑
D. 舌绛苔白
E. 舌绛苔腻

【答案】B

【解析】清营汤主治热入营分证，舌绛苔干。

涉及考点 | 清营汤主治

21. 具有“透热转气”之功的方剂是

- A. 白头翁汤
B. 黄连解毒汤
C. 清瘟败毒饮
D. 清营汤
E. 犀角地黄汤

【答案】D

【解析】白头翁汤主治热毒痢疾。黄连解毒汤主治三焦火毒证。清瘟败毒散主治温疫热毒，气血两燔证。清营汤主治热入营分证，方以金银花、连翘、竹叶清热解毒，轻宣透泄，为“透热转气”的代表药物。犀角地黄汤主治热入血分证选项。

涉及考点 | 清营汤的全方配伍特点

22. 下列选项中，属于暖肝煎组成药物的是

- A. 桂枝、芍药
B. 香附、川楝子
C. 荔枝核、泽泻
D. 乌药、茯苓
E. 吴茱萸、干姜

【答案】D

【解析】暖肝煎由当归、枸杞、小茴香、肉桂、乌药、茯苓及沉香组成。桂枝、芍药、香附、川楝子、荔枝核、泽泻、吴茱萸及干姜均不属于暖肝煎组成药物。

涉及考点 | 暖肝煎组成

23. 黄连解毒汤的功用是

- A. 泻火通便
- B. 清上泄下
- C. 泻火解毒
- D. 清热生津
- E. 清热燥湿

【答案】C

【解析】黄连解毒汤属于清热解毒剂，具有泻火解毒的功效，可以治疗三焦火毒热盛证。

涉及考点 | 黄连解毒汤的功用

24. 下列除哪项外，均为川芎茶调散的主治病证

- A. 目眩鼻塞
- B. 口眼歪斜
- C. 偏正头痛
- D. 巅顶头痛
- E. 恶寒发热

【答案】B

【解析】川芎茶调散的功用是疏风止痛，主治外感风邪头痛。症见偏正头痛，或巅顶作痛，目眩鼻塞，或恶风发热，舌苔薄白，脉浮。

涉及考点 | 川芎茶调散的主治证候

25. 瓜蒌根在仙方活命饮中的主要治疗作用是

- A. 生津止渴
- B. 清热润燥
- C. 清热散结
- D. 解毒消瘀
- E. 消肿生肌

【答案】C

【解析】仙方活命饮主治疮疡肿毒初起，配伍瓜蒌根意在清热散结。

涉及考点 | 瓜蒌根在仙方活命饮中的主要治疗作用

26. 患者，牙痛剧烈，痛引面颊，伴口气热臭，面颊发热，舌红苔黄脉滑数。治宜选用

- A. 玉女煎
- B. 白虎汤
- C. 清胃散
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 黄连解毒汤

【答案】C

【解析】根据患者的临床表现可以辨证出是胃火亢盛。方用清胃散：方中升麻，一取其清热解毒，以治胃火牙痛；一取其轻清升散透发，可宣达郁遏之伏火，有“火郁发之”之意。

涉及考点 | 清胃散的主治证候

27. 患儿，男，2岁。气喘咳嗽，皮肤蒸热，日晡尤甚，舌红苔黄，脉细数，治宜选用

- A. 左金丸
- B. 葶苈汤
- C. 泻白散
- D. 麻杏甘石汤
- E. 以上都不适宜

【答案】C

【解析】选项 A 主治肝火犯胃；选项 B 主治肺痈；选项 C 主治小儿气喘咳嗽，皮肤蒸热，日晡尤甚，舌红苔黄，脉细数；选项 D 主治表寒肺热。所以本题选择 C 选项。

涉及考点 | 泻白散的主治

28. 配伍主以甘寒，清中有润，泻中寓补，清泻肺中伏火以适稚阴娇脏之性的是

- A.左金丸
C.清骨散
E.泻白散
- B.蒿芩清胆汤
D.清胃散

【答案】E

【解析】泻白散中桑白皮甘寒性降，清泻肺热，止咳平喘，为君。地骨皮甘寒入肺，清降肺中伏火，为臣。炙甘草、粳米养胃和中，为佐使。本方配伍主以甘寒，清中有润，泻中寓补，培土生金，祛邪不伤正，清泻肺中伏火以适稚阴娇脏之性。

涉及考点 | 泻白散的配伍意义

29.患者,男,5岁。左脸靠耳部位大片红色皮疹,瘙痒,抓破后渗出流水,病势缠绵,2年反复发作,缠绵不愈,苔薄白,脉浮数,治疗应选用

- A.升麻葛根汤
C.羌活胜湿汤
E.消风散
- B.防风通圣散
D.犀角地黄汤

【答案】E

【解析】在方剂学所选方剂中,专门用于治疗皮肤疾患的方剂为数不多,只有防风通圣散、消风散等。消风散专门用于风疹、湿疹。

涉及考点 | 消风散的功能主治

30.清暑益气汤的君药是

- A.粳米、竹叶
C.西洋参、石斛
E.西瓜翠衣、西洋参
- B.石斛、麦冬
D.荷梗、知母

【答案】E

【解析】本方主治暑热气津两伤证。方中西瓜翠衣清热解暑,西洋参益气生津,养阴清热,共为君药。荷梗助西瓜翠衣清热解暑;石斛、麦冬助西洋参养阴生津,共为臣药。黄连苦寒泻火,以助清热祛暑之功;知母苦寒质润,泻火滋阴;竹叶甘淡,清热除烦,共为佐药。甘草、粳米益胃和中,为使药。

涉及考点 | 清暑益气汤的配伍意义



配套名师高清视频

31.消风散的治疗作用是

- A.祛风止痒
C.养血安神
E.滋阴息风
- B.疏风止痒
D.滋阴柔肝

【答案】B

【解析】消风散属于疏散外风剂,有疏风养血,清热除湿的功效,可以疏风止痒。

涉及考点 | 消风散的主治

32.胸胁支满,目眩心悸,或短气而咳,舌苔白滑,脉弦滑,治宜选用

- A.平胃散
C.实脾散
E.藿香正气散
- B.苓桂术甘汤
D.真武汤

【答案】B

【解析】苓桂术甘汤功能温阳化饮,健脾利湿。主治中阳不足之痰饮证。症见胸胁支满,

目眩心悸,或短气而咳,舌苔白滑,脉弦滑。

涉及考点 | 苓桂术甘汤功能主治

33.理中丸除温中祛寒外,还具有的功用是

- A.和中缓急
- B.和胃止呕
- C.降逆止痛
- D.养血通脉
- E.补气健脾

【答案】E

【解析】理中丸温中祛寒、补气健脾。无和中缓急、止呕、止痛、养血之功,排除A、B、C、D。

涉及考点 | 理中丸的功用

34.吴茱萸汤中吴茱萸的作用是

- A.温胃暖肝,降逆止呕
- B.温中补虚,和胃止呕
- C.疏肝解郁,和胃止呕
- D.温肾暖肝,降逆止呕
- E.温中补虚,疏肝解郁

【答案】A

【解析】吴茱萸汤主治肝胃虚寒,浊阴上逆证。方中吴茱萸味辛苦性热,归肝、脾、胃、肾经,上可温胃散寒,下可温暖肝肾,又能降逆止呕,一药而三经并治,《金镜内台方义》谓“吴茱萸能下三阴之逆气”,故以为君。

涉及考点 | 吴茱萸汤的配伍意义

35.手足厥寒,或腰、股、腿、足、肩臂疼痛,口不渴,舌淡苔白,脉沉细或细而欲绝,治疗宜选

- A.参附汤
- B.当归四逆汤
- C.金匱肾气丸
- D.活血逐瘀汤
- E.六味地黄汤

【答案】B

【解析】当归四逆汤温经散寒,养血通脉,主治血虚寒厥证。由营血虚弱,寒凝经脉,血行不利所致。素体血虚又经脉受寒,寒邪凝滞,血行不利,阳气不能达于四肢末端,营血不能充盈血脉,遂手足厥寒、脉细欲绝。

涉及考点 | 当归四逆汤的主治证候

36.《伤寒论》中吴茱萸汤原方生姜的用量是

- A.三两
- B.四两
- C.五两
- D.六两
- E.半斤

【答案】D

【解析】吴茱萸汤重用生姜,原方用到六两。

涉及考点 | 吴茱萸汤配伍

37.桑杏汤主治

- A.风邪犯肺的咳嗽
- B.凉燥犯肺的咳嗽
- C.温燥犯肺的咳嗽
- D.风热犯肺的咳嗽
- E.风寒犯肺的咳喘

【答案】C

【解析】桑杏汤的功用是清宣温燥,润肺止咳。主治外感温燥证。症见身热不甚,口渴,咽

干鼻燥,干咳无痰或少痰而黏,舌红,苔薄白而干,脉浮数而右脉大者。

涉及考点 | 桑杏汤的主治证候

38. 体现里热实证之热厥,痉病或发狂的方剂是

- A. 麻子仁丸
- B. 大黄牡丹汤
- C. 桃活承气汤
- D. 大承气汤
- E. 小承气汤

【答案】D

大承气汤主治证候:阳明腑实证;热结旁流,下利清水,脐腹疼痛,按之坚硬有块,口舌干燥,脉滑实;热厥、痉病、发狂等由里热实证所致者。

涉及考点 | 大承气汤的主治

39. 下列药物为麦门冬汤组成部分的是

- A. 人参、生姜、甘草、大枣
- B. 人参、干姜、甘草、大枣
- C. 人参、大枣、甘草、粳米
- D. 人参、干姜、甘草、粳米
- E. 人参、生姜、甘草、粳米

【答案】C

【解析】麦门冬汤的药物组成为麦门冬、半夏、人参、甘草、粳米、大枣。

涉及考点 | 麦门冬汤的组成

40. 防风通圣散的功用是

- A. 解表散热,清里消积
- B. 解积散邪,清热止利
- C. 疏风清热,宣肺止咳
- D. 辛凉疏表,清肺平喘
- E. 疏风解表,泻热通便

【答案】E

【解析】防风通圣散的功用是疏风解表,泻热通便,主治风热壅盛,表里俱实证。

涉及考点 | 防风通圣散的功用

41. 参苓白术散的主治病证是

- A. 脾虚湿盛证
- B. 脾胃气虚证
- C. 脾虚气陷证
- D. 心脾两虚证
- E. 脾肾两虚证

【答案】A

【解析】人参、白术、茯苓益气健脾渗湿为君。山药、莲子肉助君药以健脾益气,兼止泻;白扁豆、薏苡仁助白术、茯苓以健脾渗湿,均为臣药砂仁行气化湿,健脾和胃,为佐药。桔梗宣肺利气,通调水道,又载药上行,培土生金;甘草健脾和中,调和诸药,共为佐使。诸药相合,益气健脾,渗湿止泻,主治脾虚夹湿证。

涉及考点 | 参苓白术散的主治证候

42. 归脾汤除益气补血外,还具有的功用是

- A. 健脾养心
- B. 补血调血
- C. 敛阴止汗
- D. 滋阴复脉
- E. 益阴降火

【答案】A

【解析】归脾汤益气补血、健脾养心,主治心脾两虚、脾不统血。除益气补血外,还具有的

功用是健脾养心。

涉及考点 | 归脾汤的功用

43.炙甘草汤中配伍阿胶的用意是

- A.滋养心阴
- B.益气养心
- C.益气养血
- D.滋阴养血
- E.滋阴润燥

【答案】D

【解析】本方主治阴血不足,阳气虚弱证;虚劳肺痿。方中以生地黄为君,滋阴养血;臣以炙甘草益气养心;麦门冬滋养心阴;桂枝温通心阳;佐以人参补中益气;阿胶滋阴养血;麻仁滋阴润燥;大枣益气养血;生姜温通阳气。

涉及考点 | 炙甘草汤的配伍意义

44.下列关于六味地黄丸的说法中错误的是

- A.重用熟地黄为君
- B.功用是滋阴养血,益气温阳,复脉定悸
- C.症见脉结代,心动悸,虚羸少气
- D.主治虚劳肺痿
- E.药物组成为肾气丸去附子、肉桂

【答案】E

【解析】六味地黄丸的功用为填精滋阴补肾;主治肾阴精不足证;症见腰膝酸软,头晕目眩,视物昏花,耳鸣耳聋,盗汗,遗精,消渴,骨蒸潮热,手足心热,舌燥咽痛,牙齿动摇,足跟作痛,以及小儿囟门不合,舌红少苔,脉沉细数。排除B、C、D选项。方中重用熟地黄为君药,填精益髓,滋补阴精,排除A选项。药物组成为肾气丸减去桂枝、附子而成选项。

涉及考点 | 六味地黄丸的组成药物、功用、主治证候、配伍意义

45.“培土生金”法体现在下列哪个方剂中

- A.百合固金汤
- B.补中益气汤
- C.参苓白术散
- D.四君子汤
- E.人参蛤蚧散

【答案】C

【解析】参苓白术散是“培土生金”法的代表方剂,以众多的补气健脾渗湿之品为主,伍以砂仁、桔梗理气行脾,开提肺气,调畅气机,即通过补脾土,间接收到益肺金的功效。

涉及考点 | 参苓白术散的配伍

46.补中益气汤和参苓白术散两方中均含有的药味是

- A.当归、陈皮
- B.白术、人参
- C.茯苓、桔梗
- D.山药、升麻
- E.黄芪、甘草

【答案】B

【解析】补中益气汤组成为黄芪、人参、白术、甘草、陈皮、当归、升麻、柴胡;参苓白术散组成为人参、茯苓、白术、甘草、山药、薏苡仁、莲子肉、扁豆、桔梗、砂仁。

涉及考点 | 补中益气汤、参苓白术散组成

47.左归丸在补阴之品中配伍补阳药的意义是

- A.培本清源
- B.温补元阳
- C.阴中求阳
- D.阳中求阴

E.壮水济火

【答案】D

【解析】左归丸是张介宾由六味地黄丸化裁而成,去“三泻”,加入枸杞、龟板胶、牛膝加强滋补肾阴之力,又加入鹿角胶、菟丝子温润之品。以补阳益阴,阳中求阴,即所谓“善补阴者,必阳中求阴,则阴得阳升而泉源不竭”之义。配伍特点为纯补无泻,阳中求阴。

涉及考点 | 左归丸的配伍意义

48.生地、熟地同用的方剂是

A.地黄饮子

B.一贯煎

C.百合固金汤

D.炙甘草汤

E.独活寄生汤

【答案】C

【解析】百合固金汤主治肺肾阴亏,虚火上炎证。症见咳嗽气喘,痰中带血,咽喉燥痛,头晕目眩,午后潮热,舌红少苔,脉细数。方中生地、熟地并用滋肾壮水,其中生地兼能凉血止血。

涉及考点 | 百合固金汤的组成药物

49.败毒散中配伍少量人参的意义在于

A.扶正祛邪

B.补气生津

C.益气安神

D.益气升阳

E.益气固表

【答案】A

【解析】败毒散为扶正解表剂。配伍少量人参的意义在于“虚弱之体,必用人参三、五、七分,入表药中少助元气,以为驱邪之主,使邪气得药,一涌而出”。

涉及考点 | 败毒散配伍意义

50.理中丸证的病机是

A.中阳不足,肝脾失调

B.中阳不足,阴寒内盛

C.中阳不足,运化失权

D.中阳不足,气机不畅

E.中阳不足,水寒阻遏

【答案】B

【解析】理中丸可治疗胃痛、胃痞、失血、胸痹、病后多涎唾、小儿慢惊等多种病症,其病机总属脾胃虚寒。

涉及考点 | 理中丸主治

51.治疗五更泻的首选方剂是

A.吴茱萸汤

B.理中丸

C.真人养脏汤

D.四神丸

E.金匱肾气丸

【答案】D

【解析】五更泻,多由命门火衰,火不暖土,脾失健运所致。吴茱萸汤主治胃寒呕吐证;肝寒上逆证;肾寒上逆证。理中丸主治脾胃虚寒证;阳虚失血证;胸痹等。真人养脏汤主治久泻久痢,脾肾阳虚证。四神丸主治脾肾阳虚之五更泻。金匱肾气丸主治肾阳不足证。

涉及考点 | 四神丸的主治证候

52.固冲汤的组成药物中不含有的是

- A.白术
B.生黄芪
C.五味子
D.海螵蛸
E.山萸肉

【答案】C

【解析】固冲汤的组成药物：白术、生黄芪、龙骨、牡蛎、山萸肉、杭芍、海螵蛸、茜草、棕边炭、五倍子。五味子不是固冲汤的组成药物。

涉及考点 | 固冲汤的组成

53.酸枣仁汤组成中含有的药物是

- A.龙眼肉、远志
B.川芎、柏子仁
C.茯苓、朱砂
D.知母、川芎
E.甘草、石菖蒲

【答案】D

【解析】酸枣仁汤的功用是养血安神，清热除烦，主治肝血不足，虚热内扰证。主要组成为：酸枣仁、甘草、知母、茯苓、川芎。

涉及考点 | 酸枣仁汤的组成药物

54.心肝血虚，虚热内扰而虚烦失眠、眩晕心悸者。治宜选用

- A.天王补心丹
B.酸枣仁汤
C.磁朱丸
D.甘麦大枣汤
E.朱砂安神丸

【答案】B

【解析】酸枣仁汤主治肝血不足之虚烦失眠伴头目眩晕，脉弦细等。天王补心丹主治心肾阴虚血少，虚火内扰之虚烦失眠伴手足心热，舌红少苔，脉细数者。磁朱丸主治肾阴不足，心阳偏亢，心肾不交之失眠心悸、耳鸣耳聋、视物昏花等。甘麦大枣汤主治心阴不足，肝气失和之脏躁，精神恍惚、喜悲伤欲哭等。朱砂安神丸主治心火亢盛，阴血不足之失眠、惊悸、舌红、脉细数等。

涉及考点 | 酸枣仁汤的主治证候

55.完带汤的功用特点是

- A.健脾化湿止带，兼以清热
B.健脾收湿止带，兼以化湿
C.健脾化湿止带，兼以疏肝
D.益气健脾和营，兼以止带
E.健脾渗湿止带，兼以养血

【答案】C

【解析】完带汤具有健脾疏肝，化湿止带作用。

涉及考点 | 完带汤的功用

56.患者，男，32岁。小便频数，白如米泔，凝如膏糊，舌淡苔白，脉沉。治宜选用

- A.金锁固精丸
B.缩泉丸
C.天台乌药散
D.桑螵蛸散
E.萆薢分清饮

【答案】E

【解析】选项 A 与选项 B 均不在大纲范围内；选项 C 主治肝经气滞寒凝证；选项 D 主治

心肾两虚之尿频、滑精。萆薢分清饮功能温肾利湿,分清化浊。主治下焦虚寒之膏淋、白浊选项。

涉及考点 | 萆薢分清饮功能

57.增液汤的组成药物中含有

- | | |
|------|------|
| A.党参 | B.白参 |
| C.玄参 | D.沙参 |
| E.丹参 | |

【答案】C

【解析】增液汤的药物组成:玄参、麦冬、生地。玄参为增液汤的组成药物。

涉及考点 | 增液汤的组成药物

58.酸枣仁汤中养肝血,安心神的药物是

- | | |
|-------|------|
| A.知母 | B.川芎 |
| C.茯苓 | D.甘草 |
| E.酸枣仁 | |

【答案】E

【解析】酸枣仁汤养血安神,清热除烦。酸枣仁养肝血,安心神为主药;川芎调养肝血;茯苓宁心安神;知母补不足之阴,清内炎之火,滋清兼备;甘草清热和药。

涉及考点 | 酸枣仁汤的配伍意义

59.紫雪的功用是

- | | |
|-------------|-------------|
| A.辟秽解毒,清热开窍 | B.辟秽解毒,化痰开窍 |
| C.清热开窍,息风止痉 | D.清热开窍,化浊解毒 |
| E.芳香开窍,行气止痛 | |

【答案】C

【解析】紫雪的功用为清热开窍,息风止痉。主治温热病,热闭心包及热盛动风证。症见高热烦躁,神昏谵语,痉厥,口渴唇焦,尿赤便闭,舌质红绛,苔黄燥,脉数有力或弦数;以及小儿热盛惊厥。

涉及考点 | 紫雪的功用

60.至宝丹的功用是

- | | |
|-------------|-------------|
| A.开窍定惊,清热化痰 | B.清热解毒,开窍醒神 |
| C.清热解毒,开窍安神 | D.化浊开窍,清热解毒 |
| E.清热开窍,息风止痉 | |

【答案】D

【解析】至宝丹化浊开窍,清热解毒。

涉及考点 | 至宝丹的功用

61.不属于苏合香丸主治证候的是

- | | |
|--------|--------|
| A.心腹卒痛 | B.高热烦躁 |
| C.牙关紧闭 | D.苔白 |
| E.脉迟 | |

【答案】B

【解析】苏合香丸主治寒闭证。症见突然昏倒,牙关紧闭,不省人事,苔



配套名师高清视频

白,脉迟。亦治心腹卒痛,甚则昏厥,属寒凝气滞者。

涉及考点 | 苏合香丸的主治证候

62.越鞠丸的组成药物中不含

- | | |
|------|------|
| A.香附 | B.白术 |
| C.神曲 | D.川芎 |
| E.栀子 | |

【答案】B

【解析】越鞠丸主治六郁证。功用为行气解郁。主要组成为香附、川芎、苍术、栀子、神曲。

涉及考点 | 越鞠丸的组成药物

63.越鞠丸的君药是

- | | |
|------|------|
| A.神曲 | B.香附 |
| C.栀子 | D.川芎 |
| E.苍术 | |

【答案】B

【解析】越鞠丸治疗六郁之证。六郁之中以气郁为先,故以治气郁的香附为君。

涉及考点 | 越鞠丸的君药

64.治疗湿热黄疸,应首选

- | | |
|---------|---------|
| A.龙胆泻肝汤 | B.柴胡疏肝散 |
| C.旋覆花汤 | D.一贯煎 |
| E.茵陈蒿汤 | |

【答案】E

【解析】龙胆泻肝汤的功用是清泻肝胆实火,清利肝胆湿热;主治肝胆实火上炎证;肝经湿热下注证。柴胡疏肝散的功用是疏肝行气,活血止痛;主治肝气郁滞证。旋覆花汤的功用是下气散结;主治消渴,腹胁虚胀,心下满闷。一贯煎的功用是滋阴疏肝;主治肝肾阴虚,肝气郁滞证。茵陈蒿汤的功用是清热利湿退黄;主治湿热黄疸。

涉及考点 | 茵陈蒿汤的主治证候

65.半夏厚朴汤、厚朴温中汤和枳实消痞丸中均含有的药物是

- | | |
|------|------|
| A.生姜 | B.干姜 |
| C.茯苓 | D.木香 |
| E.甘草 | |

【答案】C

【解析】半夏厚朴汤组成为半夏、厚朴、紫苏叶、茯苓、生姜。枳实消痞丸由枳实、人参、茯苓、白术、甘草、麦芽、半夏曲、厚朴、干生姜、黄连组成。厚朴温中汤由厚朴、白蔻仁、茯苓、甘草、干生姜、陈皮、木香组成。三方中都含有茯苓。

涉及考点 | 半夏厚朴汤、厚朴温中汤和枳实消痞丸组成

66.半夏厚朴汤中体现湿去则痰无生“治痰不理脾胃非其治也”的药物是

- | | |
|------|------|
| A.茯苓 | B.半夏 |
| C.厚朴 | D.生姜 |
| E.苏叶 | |

【答案】A

【解析】半夏厚朴汤主治痰气郁结于咽喉之梅核气,组方以行气散结,降逆化痰为法。方中半夏辛温入脾胃,化痰散结,降逆和胃,为君药;厚朴苦辛性温,下气除满,为臣药;茯苓甘淡渗湿健脾,湿去则痰无由生;生姜辛温散结,和胃止呕,且制半夏之毒;苏叶芳香,理肺疏肝,助厚朴行气宽中、宣通郁结之气,共为佐药。

涉及考点 | 半夏厚朴汤的配伍意义

67. 卫外不固,汗出恶风,身重,小便不利,舌淡苔白,脉浮者,治宜选用

- | | |
|----------|----------|
| A. 玉屏风散 | B. 五皮散 |
| C. 桂枝汤 | D. 防己黄芪汤 |
| E. 防己茯苓汤 | |

【答案】D

【解析】防己黄芪汤治疗风水或风湿,症见汗出恶风,身重,小便不利,舌淡苔白,脉浮。

涉及考点 | 防己黄芪汤主治

68. 下列各项,不属于血府逐瘀汤组成的药物是

- | | |
|-------|-------|
| A. 牛膝 | B. 柴胡 |
| C. 地黄 | D. 白芍 |
| E. 枳壳 | |

【答案】D

【解析】血府逐瘀汤主治胸中血瘀证,功用为活血化瘀,行气止痛。方中主要由桃仁、红花、当归、生地黄、川芎、赤芍、牛膝、桔梗、柴胡、枳壳、甘草组成。

涉及考点 | 血府逐瘀汤的组成药物

69. 补阳还五汤的组成药物中不含

- | | |
|-------|-------|
| A. 地龙 | B. 红花 |
| C. 黄芪 | D. 生地 |
| E. 赤芍 | |

【答案】D

【解析】补阳还五汤主治中风之气虚血瘀证。功用为补气、活血、通络。方中主要由黄芪、当归、赤芍、地龙、川芎、红花、桃仁组成。

涉及考点 | 补阳还五汤的组成药物

70. 组成药物中含有炮姜、川芎的方剂是

- | | |
|----------|----------|
| A. 生化汤 | B. 温经汤 |
| C. 血府逐瘀汤 | D. 通窍活血汤 |
| E. 身痛逐瘀汤 | |

【答案】A

【解析】生化汤的药物组成:全当归、川芎、桃仁、炮姜、甘草。温经汤的药物组成:吴茱萸、当归、芍药、川芎、人参、桂枝、阿胶、牡丹皮、生姜、甘草、半夏、麦冬。血府逐瘀汤的药物组成:桃仁、红花、当归、生地黄、川芎、赤芍、牛膝、桔梗、柴胡、枳壳、甘草;通窍活血汤的药物组成:赤芍、川芎、桃仁、红花、老葱、鲜姜、红枣、麝香、黄酒;身痛逐瘀汤的药物组成:秦艽、川芎、桃仁、红花、甘草、羌活、没药、当归、五灵脂、香附、牛膝、地龙。

涉及考点 | 生化汤的组成药物

(71~72 题共用备选答案)

- A. 辅助君药加强治疗主病或主证的药物 B. 减轻或消除君、臣药毒性的药物
C. 引方中诸药以达病所的药物 D. 针对兼病或兼证起治疗作用的药物
E. 协助君、臣药以加强治疗作用

71. 佐助药指

【答案】E

72. 引经药指

【答案】C

【解析】方剂的组方原则即君臣佐使。其中佐药有三种意义：①佐助药。②佐制药。③反佐药。佐助药，即配合君、臣药以加强治疗作用，或直接治疗次要兼证的药物。此处应与臣药相区别，佐助药仅针对次要兼证，故排除 D 选项。使药有两种意义：①引经药。②调和药。引经药，即引方中诸药至特定病所的药物为臣药；B 选项为佐制药。所以 81 题选 E 选项，82 题选 C 选项。

涉及考点 | 方剂的组成原则

(73~74 题共用备选答案)

- A. 玉女煎 B. 导赤散
C. 六一散 D. 黄连解毒汤
E. 竹叶石膏汤

73. 心胸烦热，口渴面赤，口舌生疮者，治疗应选用

【答案】B

74. 小便短赤，溲时热涩刺痛者，治疗应选用

【答案】B

【解析】玉女煎清胃热，益肾阴，主治胃热阴虚证；六一散清暑利湿，主治暑湿证；黄连解毒汤清热解毒，主治三焦火盛证；竹叶石膏汤清热生津、益气和胃，主治气津两伤证。心胸烦热，口渴面赤，口舌生疮，为心经热盛之表现。小便短赤，溲时热涩刺痛，亦为心经热盛，心热移于小肠之表现。导赤散清心养阴，利水通淋，主治心经热盛。

涉及考点 | 导赤散的主治证候

(75~76 题共用备选答案)

- A. 9 : 1 B. 7 : 1
C. 5 : 1 D. 3 : 1
E. 1 : 1

75. 麦门冬汤组成中麦门冬与半夏的用量比例是

【答案】B

76. 旋覆代赭汤组成中旋覆花与代赭石的用量比例是

【答案】D

【解析】麦门冬汤的功用是清养肺胃，降逆下气，主治虚热肺痿以及胃阴不足证。方中重用麦冬为君，既养肺胃之阴又清肺胃虚热，佐以半夏降逆下气，化其痰涎，其使用比例力 7 : 1。旋覆代赭汤的功用是降逆化痰、益气和胃，主治胃虚痰阻气逆证。故 85 题选 B 选项。方中重用旋覆花下气消痰，降逆止噎为君，代赭石质重沉降，善镇冲逆，气味苦寒，用量较小，比例为 3 : 1。所以 86 题选 D 选项。

涉及考点 | 麦门冬汤、旋覆代赭汤的配伍意义

(77~78 题共用备选答案)

- | | |
|------|------|
| A.白术 | B.泽泻 |
| C.猪苓 | D.滑石 |
| E.猪苓 | |

77.五苓散中起补气健脾作用的方剂是

【答案】A

78.猪苓汤中起清热利水作用的方剂是

【答案】D

【解析】五苓散的功用是利水渗湿,温阳化气,方中重用泽泻为君,甘淡利水渗湿,臣以茯苓、猪苓淡渗,增强其利水渗湿之力,佐以白术,和茯苓健脾以运化水湿,佐以桂枝温阳化气以助利水,解表散邪以祛表邪。猪苓汤的功用是利水养阴清热,方中猪苓为君,专以淡渗利湿,臣以泽泻、茯苓甘淡,增加猪苓利水渗湿之力,且泽泻性寒能泄热,茯苓尚可健脾运湿,佐以滑石甘寒,利水、清热两彰其功,阿胶滋阴润燥,既益已伤之阴,又防诸药渗利重伤阴血。

涉及考点 | 五苓散、猪苓汤的配伍意义

(79~80 题共用备选答案)

- | | |
|-----------|----------|
| A.祛风湿止泻 | B.祛风湿止痛 |
| C.祛风胜湿清热 | D.祛风胜湿化痰 |
| E.祛风湿,补肝肾 | |

79.九味羌活汤和羌活胜湿汤共同点是

【答案】B

80.羌活胜湿汤和独活寄生汤共同点是

【答案】B

【解析】九味羌活汤的功用是发汗祛湿,兼清里热,主治外感风寒湿邪,内有蕴热证。羌活胜湿汤的功用是祛风、胜湿、止痛,主治风湿在表之闭证。九味羌活汤和羌活胜湿汤均可祛风胜湿、治头身痛。独活寄生汤的功用是祛风湿,止痹痛,益肝肾补气血主治痹证日久、肝肾两虚、气血不足证。羌活胜湿汤和独活寄生汤均可祛风胜湿止痛。

涉及考点 | 九味羌活汤、羌活胜湿汤、独活寄生汤的功用

2年 易错考题

1.主治外感风寒湿邪,内有蕴热证的方剂是

- | | |
|-------------|---------|
| A.败毒散 | B.九味羌活汤 |
| C.羌活胜湿汤 | D.柴葛解肌汤 |
| E.麻黄杏仁甘草石膏汤 | |

【答案】B

【解析】九味羌活汤以羌活为君,散表寒,祛风湿,利关节,止痹痛,为治太阳风寒湿邪在表之要药。以苍术、防风解表除湿为臣。细辛、白芷、川芎“分经论治”头痛,生地、黄芩清泄里热,以上五味俱为佐药。甘草调和为使。诸药配伍,既兼治内外,又属六经,协调表里而成发汗祛湿,兼清里热之剂。

涉及考点 | 九味羌活汤的主治证候

2. 银翘散中辛而微温, 协君药开皮毛以助祛邪的是

- A. 薄荷、桔梗
- B. 芦根、竹叶
- C. 薄荷、牛蒡子
- D. 荆芥穗、淡豆豉
- E. 金银花、连翘

【答案】D

【解析】银翘散于辛凉之中配伍少量辛温之品。荆芥穗、淡豆豉辛而微温, 解表散邪, 虽属辛温, 但辛而不烈, 温而不燥, 配入辛凉解表方中, 增强辛散透表之力, 是为去性取用之法。

涉及考点 | 银翘散的配伍意义

3. 完带汤中起燥湿运脾作用的药物是

- A. 苍术
- B. 车前子
- C. 白术
- D. 白芍
- E. 荆芥穗

【答案】A

【解析】完带汤的功用是补脾疏肝, 化湿止带。方中重用白术、山药为君, 意在补脾祛湿, 使脾气健运, 湿浊得消; 山药并有固肾止带之功。臣以人参补中益气, 以助君药补脾之力; 苍术燥湿运脾, 以增祛湿化浊之力; 白芍柔肝理脾, 使肝木条达而脾土自强; 车前子利湿清热, 令湿浊从小便分利。佐以陈皮理气燥湿, 既可使补药补而不滞, 又可行气以化湿; 柴胡、芥穗之辛散, 得白术则升发脾胃清阳, 配白芍则疏肝解郁; 使以甘草调药和中。

涉及考点 | 完带汤的配伍意义

4. 四逆散配伍中体现“一升一降, 升清降浊”作用的药物是

- A. 柴胡、芍药
- B. 甘草、枳实
- C. 枳实、芍药
- D. 柴胡、甘草
- E. 柴胡、枳实

【答案】E

【解析】四逆散中柴胡入肝胆经, 升发阳气, 疏肝解郁, 透邪外出, 为君药。佐以枳实理气解郁, 泄热破解, 与柴胡为伍, 一升一降, 加强舒畅气机之功, 并奏调和肝脾之效。

涉及考点 | 四逆散的配伍意义

5. 清营汤主治证候所见的热象是

- A. 但热不寒
- B. 往来寒热
- C. 夜热早凉
- D. 身热夜甚
- E. 日晡潮热

【答案】D

【解析】清营汤治热入营分证。邪热传营, 伏于阴分, 入夜阳气内归于营阴, 与热相合, 故身热夜甚。

涉及考点 | 清营汤的主治证候

6. 体现叶天士“入血就恐耗血动血, 直须凉血散血”的方剂是

- A. 清营汤
- B. 芍药汤
- C. 白虎汤
- D. 黄连解毒汤

E.犀角地黄汤

【答案】E

【解析】犀角地黄汤治热入血分证。热入血分，一则热扰心神；二则热邪迫血妄行，血不循经，溢于脉外则出血，离经之血则为瘀血；三则血分热毒耗伤血中津液，而成瘀。此时不清其热则血不宁，不散其血则瘀不去，不滋其阴则火不息，故叶天士所谓“入血就恐耗血动血，直须凉血散血”，故组方配伍当以清热解毒，凉血散瘀为法。

涉及考点 | 犀角地黄汤的配伍意义

7.仙方活命饮中的君药是

- A.赤芍
B.当归
C.陈皮
D.天花粉
E.金银花

【答案】E

【解析】仙方活命饮主治痈疡肿毒初起。方中金银花善清热解毒疗疮，乃“疮疡圣药”，重用为君。

涉及考点 | 仙方活命饮的配伍意义

8.治疗凉燥的代表方剂是

- A.银翘散
B.桂枝汤
C.香薷散
D.杏苏散
E.小青龙汤

【答案】D

【解析】杏苏散属于清宣外燥剂，有清宣凉燥，理肺化痰的功效。可以治疗外感凉燥证。

涉及考点 | 杏苏散的主治证候

9.下列各项中，既能治疗自汗又能治疗盗汗的是

- A.四物汤
B.归脾汤
C.六味地黄丸
D.肾气丸
E.镇肝息风汤

【答案】B

【解析】归脾汤主治心脾气血两虚证之心悸怔忡，健忘失眠，盗汗食少；脾不统血证之便血，紫癜，崩漏，月经提前，或淋漓不止。其出处《正体类要》所写主治尚有跌仆损伤，自汗，大便不调。

涉及考点 | 归脾汤的主治

10.配伍中体现“阳中求阴”之法的方剂是

- A.百合固金汤
B.八珍汤
C.左归丸
D.清瘟败毒饮
E.右归丸

【答案】C

【解析】左归丸是张介宾由六味地黄丸化裁而成，去“三泻”，加入枸杞、龟板胶、牛膝加强滋补肾阴之力，又加入鹿角胶、菟丝子温润之品。以补阳益阴，阳中求阴，即所谓“善补阴者，必阳中求阴，则阳得阴生而泉源不竭”之义。配伍特点为纯补无泻，阳中求阴。

涉及考点 | 左归丸的全方配伍特点

11.薄荷在逍遥散中的作用是

- A.疏散肺经风热
- B.透达肝经郁热
- C.辛凉散邪利咽
- D.清利头目利咽
- E.辛凉解表疏肝

【答案】B

【解析】逍遥散属于调和肝脾剂,具有疏肝解郁,养血健脾的功效。方中加入薄荷少许,疏散郁遏之气,透达肝经郁热。

涉及考点 | 逍遥散的配伍意义

12.以下除哪项外,均是独活寄生汤的功用

- A.补气血
- B.降浊气
- C.祛风湿
- D.益肝肾
- E.止痹痛

【答案】B

【解析】独活寄生汤功能祛风湿,止痹痛,益肝肾,补气血。主治痹证日久,肝肾两虚,气血不足证。

涉及考点 | 独活寄生汤的功用

13.下列哪项不是八正散主治证的症状

- A.小便涩痛
- B.小腹急满
- C.恶心呕吐
- D.舌苔黄腻
- E.脉数有力

【答案】C

【解析】八正散功能清热泻火,利水通淋。主治湿热淋证。症见尿频尿急,溺时涩痛,淋漓不畅,尿色浑赤,甚或癃闭不通,小腹急满,口燥咽干,舌苔黄腻,脉滑数。

涉及考点 | 八正散主治

14.越鞠丸中以行气为主的药物是

- A.木香
- B.沉香
- C.香附
- D.枳壳
- E.厚朴

【答案】C

【解析】越鞠丸的药物组成:香附、川芎、山栀子、苍术、神曲。其中香附行气解郁以治气郁;川芎活血祛瘀以治血郁;栀子清热泻火以治火郁;苍术燥湿运脾以治湿郁;神曲消食导滞以食郁。从越鞠丸的药物组成可排除A、B、D、E选项。

涉及考点 | 越鞠丸的配伍意义

15.患者,男,43岁。患乙型肝炎半年余,症见两胁胀满,口苦,食欲不振,有时欲呕,咽喉发干,舌苔薄白,脉弦。宜选何方治疗

- A.四逆散
- B.大柴胡汤
- C.柴胡疏肝散
- D.小柴胡汤
- E.逍遥散

【答案】D

【解析】小柴胡汤的主治有七大症,是寒热往来,胸胁苦满,心烦喜呕,不欲饮食,口苦,咽

干,目眩。大柴胡汤应该具备承气汤的阳明证,柴胡疏肝散以气滞为主,而逍遥散应该有血虚之证,都不合适。

涉及考点 | 小柴胡汤的主治

16. 患者,男,28岁。高热烦躁,神昏谵语,口干舌燥,痰涎壅盛,舌绛,脉数。治宜选用
- A. 安宫牛黄丸
B. 苏合香丸
C. 紫雪
D. 牛黄清心丸
E. 至宝丹

【答案】A

【解析】选项 A 安宫牛黄丸长于清心解毒,常用于邪热内陷心包、痰热壅闭心窍之高热、神昏谵语;选项 B 治疗寒闭;选项 C 清热开窍,息风止痉;选项 D 超纲;选项 E 治疗痰热内闭心包证选项。

涉及考点 | 安宫牛黄丸功效

17. 下列各项,不属于苏合香丸主治证候的是
- A. 心腹卒痛
B. 高热烦躁
C. 牙关紧闭
D. 苔白
E. 脉迟

【答案】B

【解析】苏合香丸的主要症状表现是,突然昏倒,牙关紧闭,不省人事,苔白脉迟。亦治寒凝气滞,心腹猝痛,及痰厥等。

涉及考点 | 苏合香丸的主治症状

18. 血府逐瘀汤的臣药为
- A. 桃仁、生地
B. 桔梗、枳壳
C. 桃仁、红花
D. 生地、当归
E. 赤芍、川芎

【答案】E

【解析】血府逐瘀汤主治胸中血瘀证。本方以活血化瘀,行气止痛为法。方中桃仁破血行滞润燥,红花活血祛瘀止痛,共为君药;赤芍、川芎助君药活血祛瘀,牛膝活血通经,祛瘀止痛,引血下行,共为臣药;生地、当归养血益阴,清热活血,桔梗、枳壳,一升一降,宽胸行气,柴胡疏肝解郁,升达清阳,与桔梗、枳壳同用,尤善理气行滞,使气行则血行,以上均为佐药;桔梗并能载药上行,兼有使药之用,甘草调和诸药,亦为使药。

涉及考点 | 血府逐瘀汤的配伍意义

19. 咳血方主治证的病机是
- A. 肝火犯肺,灼伤肺络
B. 脾阳不足,统血失常
C. 阴虚火旺,损伤肺络
D. 血热妄行,损伤肺络
E. 心脾两虚,气不摄血

【答案】A

【解析】咳血方清火化痰,敛肺止咳,主治肝火犯肺,灼伤肺络。

涉及考点 | 咳血方的主治证候

20. 食积属湿热积滞者,宜选用
- A. 保和丸
B. 乌梅丸

- C.香连丸
E.健脾丸

D.枳实导滞丸

【答案】D

【解析】本题所有选项均可用于治疗泻痢。保和丸主治食积。乌梅丸主治蛔厥证。香连丸主治湿热痢疾。枳实导滞丸主治湿热食积。健脾丸主治脾虚停食证。

涉及考点 | 枳实导滞丸的主治证候

(21~22 题共用备选答案)

- A.枳实消痞丸
C.半夏厚朴汤
E.柴胡疏肝散

- B.金铃子散
D.天台乌药散

21.具有行气散结,降逆化痰功用的方剂是

【答案】C

22.具有行气疏肝,散寒止痛功用的方剂是

【答案】D

【解析】半夏厚朴汤的功用是行气散结、降逆化痰。所以 23 题选 C 选项。枳实消痞丸的功用是消痞除满、健脾和胃。金铃子散的功用是疏肝泄热、活血止痛。天台乌药散的功用是行气疏肝、散寒止痛。所以 24 题选 D 选项。柴胡疏肝散的功用是疏肝行气、活血止痛。

涉及考点 | 半夏厚朴汤、天台乌药散的功用

(23~24 题共用备选答案)

- A.防风
C.白芷
E.羌活

- B.细辛
D.川芎

23.川芎茶调散中偏于治阳明经头痛的药物是

【答案】C

24.川芎茶调散中偏于太阳经头痛的药物是

【答案】E

【解析】川芎茶调散主治外感风邪头痛。李东垣谓“头痛须用川芎,如不愈,各加引经药,太阳羌活,阳明白芷”。方中川芎长于治疗少阳、太阳经头痛;羌活长于治疗太阳经头痛;白芷长于治疗阳明经头痛;细辛长于治疗少阴经头痛。

涉及考点 | 川芎茶调散的配伍意义

(25~26 题共用备选答案)

- A.桂枝汤
C.小建中汤
E.补中益气汤

- B.归脾汤
D.当归补血汤

25.劳倦内伤,气血俱乏,营卫失调,手足烦热,咽干口燥,舌淡苔白,脉细弦者,治宜选用

【答案】C

26.产后血虚,发热头痛,肌热面赤,烦渴欲饮,脉大而虚者,治宜选用

【答案】D

【解析】小建中汤主治虚劳里急证,症见手足烦热。舌淡苔白,脉细弦。其病机特点是气血俱乏。当归补血汤主治血虚发热证,症见肌热面赤,烦渴欲饮,脉大而虚,亦治产后血虚,发

热头痛。

涉及考点 | 小建中汤主治、当归补血汤主治

(27~28 题共用备选答案)

A.胡麻仁、阿胶、麦冬、生地

B.白芍、阿胶、麦冬、当归

C.胡麻仁、阿胶、麦冬

D.胡麻仁、当归、生地

E.生地、玄参、麦冬、白芍

27.清燥救肺汤中所用的养阴药是

【答案】C

28.复脉汤中所用的养阴药是

【答案】A

【解析】清燥救肺汤中养阴药为胡麻仁、阿胶、麦冬。复脉汤重用生地为君,其他养阴药为胡麻仁、阿胶、麦冬。

涉及考点 | 清燥救肺汤、复脉汤组成及含义

第五篇 中医内科学

考情分布图

		2015	2016	2017	2018	2019
中医内科学	肺系病证	7	9	6	6	7
	心系病证	6	5	8	6	3
	脑系病证	5	6	5	6	3
	脾胃病证	8	6	7	7	6
	肝胆病证	3	6	3	4	7
	肾系病证	3	4	6	5	5
	气血津液病证	5	5	5	6	6
	肢体经络病证	4	3	5	4	5

高频考点必背

- 1.感冒四季均可发生,尤以**冬春两季**为多。
- 2.感冒的基本病机是**卫表不和,肺失宣肃**。感冒病位在**肺卫**,主要在**卫表**。
- 3.感冒临床常见**风寒、风热、暑湿**三证。
- 4.感冒病程一般**3~7**日,普通感冒多不传变,时行感冒多呈**流行性**。
- 5.感冒首先应辨别**普通、时行感冒**;其次须辨别**虚体、实体感冒**。
- 6.感冒的病位在卫表肺系,治疗应因势利导,从表而解,采用**解表达邪**的治疗原则。
- 7.感冒实证初期一般**忌用补敛之品**,以免留邪。
- 8.咳嗽的基本病机为**邪犯于肺,肺气上逆**。
- 9.咳嗽的病理因素主要为“**痰**”与“**火**”,病理性质多为虚实夹杂。
- 10.咳嗽的病位在肺,与**肝、脾**有关,久则及**肾**。
- 11.咳嗽首先应辨**外感、内伤**,其次要辨**虚实**,最后辨**咳嗽、痰液**的特点。
- 12.咳声**粗浊**者,多为风热或痰热伤津所致。
- 13.外感咳嗽,多为实证,应**祛邪利肺**。
- 14.**凉燥证**,乃燥证与风寒并见,表现为干咳少痰或无痰,咽干鼻燥。
- 15.哮病的病因为**外邪侵袭,饮食不当,体虚病后**。
- 16.哮病的病理因素以**痰**为主。
- 17.哮病的病理性质,发作为**痰阻气闭**,以**邪实**为主。
- 18.哮病的辨证首先辨哮证发病特点,其二辨哮之寒热偏盛,其三辨**肺脾肾**之虚。
- 19.根据哮病的临床特点,分为**发作期**和**缓解期**。
- 20.喘证的基本病机是**肺气上逆,宣降失职**,或**气无所主,肾失摄纳**。
- 21.喘证的病位主要在**肺和肾**,涉及**肝脾**。
- 22.喘指气息而言,哮指声响而言,必见喉中哮鸣有声。**喘未必兼哮,而哮必兼喘**。

- 23.喘证的辨证首当分清**虚实**,实喘又当辨**外感内伤**,虚喘应辨**病变脏腑**。
- 24.肺痈临床以**咳嗽、胸痛、发热、咯吐腥臭浊痰**甚则脓血相兼为主要特征。
- 25.肺痈的病位在**肺**。基本病机为邪热郁肺,蒸液成痰,邪阻肺络,血滞为瘀,痰热与瘀血互结,蕴酿成痈。
- 26.**溃脓期**是肺痈病情转归的关键点。
- 27.肺痈治疗当以**祛邪**为原则,采用**清热解毒、化瘀排脓**的治法
- 28.肺痿的基本病机为**虚体虫侵,阴虚火旺**。
- 29.肺痿应首辨病变之脏器,次辨虚损之性质,三辨**夹火、夹痰、夹瘀**之不同。
- 30.肺胀的病因为久病肺虚,感受外邪。病变首先在**肺**,继而影响**脾、肾**,后期病及于**心**。
- 31.肺胀的病理因素主要为**痰浊、水饮与血瘀**互结。
- 32.痿证的基本病机为**气血津液输布不畅,筋肉四肢失养而痿弱不能用**。
- 33.心悸的基本病机是**气血阴阳亏虚,心失所养**,或邪扰心神,心神不宁。
- 34.惊悸发病,多与**情绪因素**有关;怔忡多由**久病体虚,心脏受损**所致。
- 35.胸痹的主要病机为心脉痹阻,病位在**心**,涉及**肝、肺、脾、肾**等脏。
- 36.胸痹其位在**心**,其本在**肾**,总的病机为**本虚标实**,而在急性期则以**标实**为主。
- 37.不寐的病机,为阳盛阴衰,阴阳失交。其病位主要在**心**,与**肝、脾、肾**密切相关。
- 38.不寐的治疗当以**补虚泻实、调整脏腑阴阳**为原则。
- 39.头痛应首辨其**外感内伤**,次辨其**相关经络脏腑**,再辨其影响因素。
- 40.眩晕的基本病机主要是**脑髓空虚,清窍失养**,或**痰火上逆,扰动清窍**。本病的病位在于头窍,其病变脏腑与肝、脾、肾三脏相关。其常见病理因素有**风、火、痰、瘀**。
- 41.中风是以**猝然昏仆,不省人事,半身不遂,口眼歪斜,语言不利**为主症的病证。
- 42.中风临证,首辨**中经络或中脏腑**,中脏腑者辨闭证与脱证,闭证应辨阳闭阴闭,同时应辨当前所处病期。
- 43.中风急性期为发病后二周以内,中脏腑可至一个月;**恢复期指发病二周后或一个月至半年内**;后遗症期指发病半年以上。
- 44.中风之中经络的治疗以**平肝息风,化痰祛瘀通络**为主。中脏腑闭证,治当息风清火,豁痰开窍,通腑泄热;脱证急宜救阴回阳固脱。
- 45.中风的病理因素主要为**风、火、痰、瘀**。其病理性质多属本虚标实,上盛下虚。本虚为肝肾阴虚。
- 46.痿证的病位在**筋脉、肌肉**,与肝、肾、肺、胃关系最为密切。病理因素主要为**湿和热**。
- 47.颤证是以**头部或肢体摇动颤抖,不能自制**为主要临床表现的一种病证。
- 48.痫病的临床以**突然意识丧失,甚则仆倒,不省人事,强直抽搐,口吐涎沫,两目上视或口**
中怪叫为特征,移时苏醒,一如常人为特征。
- 49.痫病的基本病机为脏腑失调,痰浊阻滞,气机逆乱,风痰内动,蒙蔽清窍。病理因素主要有**风、火、痰、瘀**,又以**痰**为重要。
- 50.痴呆的基本病机为**髓海不足,神机失用**。其病位在脑,与心、肾、肝、脾均有关系。
- 51.胃痛基本病机是**胃气阻滞,胃失和降,不通则痛**。胃痛的病变部位在胃,但与肝、脾的关系极为密切。病理因素主要有**气滞、寒凝、热郁、湿阻、血瘀**。
- 52.胃痞是指以**自觉心下痞塞,胸膈胀满,触之无形,按之柔软,压之无痛**为主要症状的病证。中焦气机不利,脾胃升降失职为本病发生的基本病机。

- 53.胃痞的治疗原则为**调理脾胃升降、行气除痞消满**。
- 54.呕吐的发病机理总为**胃失和降、胃气上逆**。和胃降逆为其总的治疗原则。
- 55.噎膈的基本病机是**津枯血燥、痰气瘀互结、食道狭窄**。
- 56.腹痛的基本病机为脏腑气机阻滞,气血运行不畅,经脉痹阻,“**不通则痛**”,或脏腑经脉失养,**不荣而痛**。
- 57.泄泻的病机特点是**脾虚湿盛,致肠道功能失司**。泄泻的治疗大法为运脾化湿。
- 58.霍乱是一种**上吐下泻**并作的病证,发病特点是来势急骤,变化迅速,病情凶险。
- 59.痢疾是以大便次数增多、腹痛、**里急后重、痢下赤白黏冻**为主症的病证。是夏秋季常见的肠道传染病。
- 60.痢疾的病机主要是邪滞于肠,气血壅滞,肠道传化失司,脂络受伤,腐败化为脓血而为痢。病位在**肠**,与**脾胃**密切相关,可涉及**肾**。
- 61.便秘的基本病机属大肠传导失常,气机不畅,糟粕内停。同时与肺、脾、胃、肝、肾等脏腑的功能失调有关。病理性质可概括为**寒、热、虚、实**四个方面。
- 62.胁痛的基本病机为肝络失和,其病理变化可归结为“**不通则痛**”与“**不荣则痛**”两类。其病变脏腑主要在于肝胆,又与脾胃及肾相关。
- 63.胁痛之治疗原则当根据“通则不痛”的理论,以**疏肝和络止痛**为基本治则。
- 64.黄疸是以**目黄、身黄、小便黄**为主症的一种病证,其中**目睛黄染**尤为本病的重要特征。
- 65.黄疸的辨证,应首辨**阳黄、阴黄**。次辨阳黄湿热之轻重、胆腑郁热及疫毒炽盛。三辨阴黄之病因。四辨黄疸病势轻重。
- 66.黄疸的治疗大法,主要为**化湿邪,利小便**。
- 67.颤证的基本病机为**肝风内动,筋脉失养**。其病位在筋脉,与肝、肾、脾等脏关系密切。病理因素为风、火、痰、瘀。病理性质总属本虚标实。
- 68.腰痛的病因为**外邪侵袭、体虚年衰、跌仆闪挫**。
- 69.腰痛的病位在**腰府**,与肾脏及膀胱经、任、督、冲、带脉等诸经脉相关。
- 70.水肿发病的基本病机为肺失通调,脾失转输,肾失开阖,三焦气化不利,水液泛滥肌肤。其病理因素为**风邪、水湿、疮毒、瘀血**。
- 71.淋证是指以**小便频数短涩,淋漓刺痛,小腹拘急或痛引腰腹**为主症的病证。
- 72.淋证的基本病机为湿热蕴结下焦,肾与膀胱气化不利。其病位在**膀胱与肾**。其病理因素主要为**湿热**之邪。
- 73.癃闭是以小便量少,**排尿困难**,甚则小便闭塞不通为主症的一种病证。
- 74.腰痛是以腰部疼痛为主。基本病机为**筋脉痹阻,腰府失养**。病理因素主要是**湿与瘀**。
- 75.郁证的基本病机是**肝失疏泄**、脾失健运、心失所养、脏腑阴阳气血失调。郁证的发病与**肝**的关系最为密切。
- 76.血证的病机特点可以归结为**火热熏灼、迫血妄行,气虚不摄、血溢脉外及瘀血阻络、血不循经**三类。
- 77.痰饮病的基本病机为**肺、脾、肾**三脏功能失调,三焦气化失宣,津液停积于机体某部位而成。
- 78.饮邪具有流动之性,饮留**胃肠**,则为**痰饮**;饮流**胁下**,则为**悬饮**;饮流**肢体**,则为**溢饮**;聚于**胸肺**,则为**支饮**。
- 79.痰饮病的病变脏腑为肺、脾、肾、三焦,以**脾**首当其冲。

- 80.痰饮病的辨证,首辨**饮停部位**,次辨标本的主次,三辨病邪的兼夹。
- 81.消渴的基本病机主要是**阴津亏损,燥热偏盛**。其病变的脏腑主要在肺、胃、肾,尤以肾为关键。本病的病理因素主要是**虚火、浊瘀**。
- 82.汗证的基本病机为**阴阳失调,腠理不固,营卫失和,汗液外泄失常**。
- 83.汗证的病变脏腑涉及心、肝、脾、胃、肺、肾。**自汗多为气虚,盗汗多为阴虚**。
- 84.内伤发热的基本病机是**气血阴阳亏虚,脏腑功能失调**。病理性质大体可归纳为**虚、实**两类。
- 85.内伤发热首先应辨明证候**虚实**,其次辨病情轻重,再次辨清病位。
- 86.虚劳的病损主要在**五脏**,尤以**脾肾**为主。虚劳的病理性质主要为气、血、阴、阳的亏虚。
- 87.癌病的基本病理变化为**正气内虚**,气滞、血瘀、痰结、湿聚、热毒等相互纠结,日久积滞而成有形之肿块。
- 88.癌病治疗的基本原则是**扶正祛邪,攻补兼施**。
- 89.厥证的基本病机为**气机逆乱,升降乖戾,气血阴阳不相顺接**。厥证的病位在心、肝,涉及脾、肾。
- 90.痹证的病机根本为**邪气痹阻经脉**,即**风、寒、湿、热、痰、瘀**等邪气滞留于肢体筋脉、关节、肌肉、经脉,气血痹阻不通,不通则痛。病理因素为风、寒、湿、热。
- 91.痹证首辨**病邪**,其次辨别虚实,再辨体质。
- 92.痹证治疗应以**祛邪通络**为基本原则,根据邪气的偏盛,分别予以祛风、散寒、除湿、清热、化痰、行瘀,兼顾“宣痹通络”。
- 93.痿证是指肢体筋脉弛缓,软弱无力,**不能随意运动**,或伴有**肌肉萎缩**的一种病证。

5年 历年真题

- 1.治疗虚体感冒之气虚感冒证,首选的方剂是
- A.葱豉桔梗汤
B.加减葳蕤汤
C.荆防达表汤
D.新加香薷饮
E.参苏饮

【答案】E

【解析】气虚感冒证见恶寒较甚,气短乏力,自汗咳嗽,痰白,平素神疲体弱,易感冒。舌淡苔薄白,脉浮无力。治疗应当选用参苏饮;益气解表,调和营卫。

涉及考点 | 感冒的辨证论治

- 2.下列哪项不是时行感冒的特征
- A.传染性强
B.证候相似
C.集中发病
D.老幼易感
E.流行性强

【答案】D

【解析】本题是要求选择哪一项不是时行感冒的特征,时行感冒的特征是起病急,具有传染性,证候相似,集中发病;全身的症状较重,高热,全身酸痛,退热之后肺系症状明显。时行感冒可见于任何年龄。选项D老幼易感不是其特征。

涉及考点 | 感冒的诊断与病证鉴别



配套名师高清视频

3. 阴虚感冒的治疗, 应选用的方剂是

- A. 银翘散
B. 参苏饮
C. 新加香薷饮
D. 加减葳蕤汤
E. 葱豉桔梗汤

【答案】D

【解析】选项 A 治疗的是风热感冒。选项 B 治疗的是气虚感冒。选项 C 治疗的是气虚感冒。选项 D 治疗的是阴虚感冒。选项 E 治疗的是风热感冒。

涉及考点 | 感冒的辨证论治

4. 下列关于常人感冒的各项叙述中, 哪项是错误的

- A. 一般以风寒、风热、暑湿症状为主
B. 病程短, 痊愈快
C. 无反复感邪、反复发病之势
D. 无气、血、阴、阳虚损症状
E. 治疗上当扶正解表

【答案】E

【解析】感冒的病位在卫表肺系, 治疗应因势利导, 从表而解, 采用解表达邪的治疗原则。

涉及考点 | 感冒的辨证论治

5. 治疗常人感冒之风寒束表证, 应首选的方剂是

- A. 银翘散
B. 加减葳蕤汤
C. 荆防败毒散
D. 新加香薷饮
E. 参苏饮

【答案】C

【解析】感冒之风寒束表证治法为辛温解表。方剂可选用荆防达表汤或荆防败毒散加减。

涉及考点 | 感冒的辨证论治

6. 哮喘缓解期表现为肺肾两虚证候者, 宜选用的方剂是

- A. 六君子汤
B. 补中益气汤
C. 玉屏风散
D. 金匮肾气丸
E. 生脉地黄汤合金水六君煎

【答案】E

【解析】哮喘缓解期之肺肾两虚证的治法应补肺益肾。方剂选用生脉地黄汤合金水六君煎。选项 A 六君子汤用于哮喘缓解期表现为肺脾气虚证者。

涉及考点 | 哮喘的辨证论治

7. 暑湿感冒临床表现为肢体酸重或疼痛, 心烦口渴者, 治疗应选用的方剂是

- A. 三物香薷饮
B. 黄连香薷饮
C. 藿朴夏苓饮
D. 新加香薷饮
E. 藿香正气散

【答案】D

【解析】暑湿感冒, 以身热, 微恶风, 汗少, 肢体酸重或疼痛, 头昏重胀痛, 咳嗽痰黏, 鼻涕, 心烦口渴等为主症, 代表方剂是新加香薷饮加减。

涉及考点 | 感冒的辨证论治

8. 咳嗽肺阴亏耗证, 其咳嗽的特点是

- A. 痰中带血有腥臭味
B. 痰多, 色黄, 质稠

- C.痰白,质稀
D.痰黏腻,带灰色
E.痰少,质黏,夹有血丝

【答案】E

【解析】肺阴亏耗,肺失清润,则干咳痰少、质黏、夹有血丝;痰多色黄、质稠是痰热郁肺证的特点;痰白质稀,是由于寒邪袭肺。

涉及考点 | 咳嗽的辨证论治

- 9.下列关于外感咳嗽与内伤咳嗽的鉴别点中,无意义是
A.病程的长短
B.起病的缓急
C.咳痰的多少
D.是否兼有脏腑受损的兼症
E.是否兼有表证

【答案】C

【解析】外感咳嗽多为新病,起病急,临床以肺卫表证,实证为主。内伤咳嗽,多为久病,起病缓,伴有其他脏腑兼证,多为虚实夹杂。

涉及考点 | 咳嗽的鉴别诊断

- 10.虚喘证的病位在
A.肺、脾
B.肺、肾
C.心、肾
D.肝、肾
E.肺、心

【答案】B

【解析】喘证的病理性质有虚实之分。实喘在肺,为外邪、痰浊、肝郁气逆、邪壅肺气,宣降不利所致;虚喘责之于肺、肾两脏,因阳气不足,阴精亏耗,而致肺肾出纳失常,且尤以气虚为主。

涉及考点 | 喘证的病因病机

- 11.下列各项,属热哮证临床表现的是
A.喉中痰鸣如吼,面赤或有身热
B.喉中痰涎壅盛,寒热不显
C.喉中哮鸣有声,发热恶寒
D.喉中哮鸣如水鸡声
E.短气息促,动则为甚

【答案】A

【解析】热哮是由于外感或内伤,肺热炽盛,导致肺失宣降,肺气上逆所致。其中B是痰的症状并无寒热偏盛。C是哮证病因由于感受外邪,也无寒热偏盛。

涉及考点 | 喘证的辨证论治

- 12.肺痈初期的治疗,应首选的方剂是
A.银翘散
B.《千金》苇茎汤
C.加味桔梗汤
D.沙参清肺汤
E.桔梗杏仁煎

【答案】A

【解析】肺痈初期以表证为主,治法应当疏风散热,清肺化痰,方剂选银翘散加减。《千金》苇茎汤适用于肺痈成痈期的治疗,加味桔梗汤适用于肺痈溃脓期的治疗,沙参清肺汤和桔梗杏仁煎则适用于肺痈恢复期的治疗。

涉及考点 | 肺痈的辨证论治

13. 治疗肺痈成痈期, 应首选的方剂是

- A. 银翘散
B. 《千金》苇茎汤
C. 加味桔梗汤
D. 沙参清肺汤
E. 桔梗杏仁煎

【答案】B

【解析】肺痈成痈期治当清肺解毒, 化痰消痈, 方选《千金》苇茎汤加减。银翘散适用于肺痈初期, 加减桔梗汤适用于肺痈溃脓期, 沙参清肺汤和桔梗杏仁煎则适用于肺痈恢复期。

涉及考点 | 肺痈的辨证论治

14. 治疗肺痈溃脓期, 应首选的方剂是

- A. 《千金》苇茎汤
B. 桔梗白散
C. 如金解毒散
D. 桔梗杏仁煎
E. 加味桔梗汤

【答案】E

【解析】肺痈溃脓期热壅血瘀, 血败肉腐, 痈肿内溃, 脓液外泄, 治宜排脓解毒, 可用加味桔梗汤。《千金》苇茎汤合如金解毒散用于成痈期, 桔梗白散峻下逐脓, 药性猛烈, 一般不宜轻用, 体弱者禁用。桔梗杏仁煎用于肺痈的恢复期。

涉及考点 | 肺痈的辨证论治

15. 下列哪项不是肺癆的病因

- A. 营养不良
B. 感染癆虫
C. 外感风寒
D. 禀赋不足
E. 久病体弱

【答案】C

【解析】肺癆的病因一方面为感染“癆虫”; 另一方面, 由于禀赋不足、酒色劳倦、病后失调或营养不良导致正气虚弱, 难抵“癆虫”侵袭。外感风寒与肺癆发病无直接关系。

涉及考点 | 肺癆的病因

16. 肺癆之肺阴亏损证的治疗, 最佳选方为

- A. 保真汤
B. 月华丸
C. 八珍汤
D. 补天大造丸
E. 补肺汤

【答案】B

【解析】肺阴亏虚所致肺癆者治当滋阴润肺, 方选月华丸加减。本方功在补虚抗癆, 养阴润肺止咳, 化痰消瘀止血, 是治疗肺癆的基本方剂, 可用于阴虚咳嗽、咯血。

涉及考点 | 肺癆的辨证论治

17. 患者, 男, 42岁。久病体虚, 四肢痿弱, 肌肉瘦削, 手足麻木不仁, 四肢青筋显露, 伴有肌肉活动时隐痛不适。舌痿不能伸缩, 舌质暗淡, 有瘀点、瘀斑, 脉细涩。治疗应选用的方剂是

- A. 圣愈汤合补阳还五汤
B. 参苓白术散
C. 虎潜丸
D. 加味二妙散
E. 清燥救肺汤

【答案】A

【解析】患者主症为久病体虚, 四肢痿弱, 肌肉瘦削, 见手足麻木不仁, 四肢青筋显露, 伴有

肌肉活动时隐痛不适。舌瘦不能伸,舌质暗淡有瘀点,脉细涩,可知为气虚血瘀,脉络失养。辨证为痿证之脉络瘀阻证。代表方剂为圣愈汤合补阳还五汤。选项 C 用于痿证肝肾亏损证,选项 D 用于痿证湿热浸淫证。

涉及考点 | 痿证的辨证论治

18. 患者症见眩晕,头重昏蒙,或伴视物旋转,胸闷恶心,呕吐痰涎,食少多寐,舌苔白腻,脉濡滑。治疗应首选的方剂是

- | | |
|------------|----------|
| A. 三子养亲汤 | B. 贝母瓜蒌散 |
| C. 半夏白术天麻汤 | D. 小陷胸汤 |
| E. 黄连温胆汤 | |

【答案】C

【解析】患者眩晕,头重昏蒙,或伴视物旋转,诊断为眩晕。痰浊中阻,上蒙清窍,清阳不升,可见眩晕,头重昏蒙,或伴视物旋转,胸闷恶心,呕吐痰涎,食少多寐;舌苔白腻,脉濡滑均为痰浊中阻,辨证为痰湿中阻证,治当化痰祛湿,健脾和胃,方选半夏白术天麻汤加减。

涉及考点 | 眩晕的辨证论治

19. 治疗心悸之阴虚火旺证,应首选的方剂是

- | | |
|---------------|------------------|
| A. 黄连温胆汤 | B. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤合参附丸 |
| C. 桃仁红花煎 | D. 天王补心丹合朱砂安神丸 |
| E. 天王补心丹合炙甘草汤 | |

【答案】D

【解析】心悸之阴虚火旺证治当滋阴清火养心安神,方选天王补心丹合朱砂安神丸加减。桂枝甘草龙骨牡蛎汤合参附丸适用于心阳不振证,桃仁红花煎适用于瘀阻心脉证,黄连温胆汤适用于痰火扰心证。

涉及考点 | 心悸的辨证论治

20. 心悸不论虚实应酌情配伍的治法是

- | | |
|---------|---------|
| A. 滋补肝肾 | B. 培土生金 |
| C. 镇心安神 | D. 补益心脾 |
| E. 温补脾肾 | |

【答案】C

【解析】由于心悸以心神不宁为其病理特点且虚实的主次、缓急也各有不同,治疗相应兼顾。故应酌情配合安神镇心之法。

涉及考点 | 心悸的辨证论治

21. 治疗心悸之瘀阻心脉证,应首选的方剂是

- | | |
|---------------|----------------|
| A. 黄连温胆汤合炙甘草汤 | B. 半夏泻心汤合当归活血饮 |
| C. 桃仁红花煎 | D. 参附汤 |
| E. 通窍活血汤 | |

【答案】C

【解析】选项 A 用于心悸之痰火扰心证。选项 B 半夏泻心汤辛开苦降,寒热并调。选项 D 用于心悸之心阳虚证。心悸之瘀阻心脉证,治当活血化瘀,理气通络,方剂应选桃仁红花煎加减。

涉及考点 | 心悸的辨证论治

22.心悸实证的治疗大法不包括下列哪项

- A.祛痰
- B.行瘀
- C.化饮
- D.祛风
- E.清火

【答案】D

【解析】心悸的治疗应分清虚实。虚证分别予以补气、养血、滋阴、温阳；实证则应祛痰、化饮、清火、行瘀。但本病以虚实错杂为多见，同时，由于心悸以心神不宁为其病理特点且虚实的主次、缓急各不相同，治疗当相应兼顾。故应酌情配合安神镇心之法。

涉及考点 | 心悸的辨证论治

23.胸痹标实的治法应选用下列哪一项

- A.益气固脱
- B.补气温阳
- C.活血化瘀
- D.滋阴益肾
- E.补益心气

【答案】C

【解析】胸痹发作期以标实为主，缓解期以本虚为主，其治疗原则应先治其标，后治其本，先从祛邪入手，然后再予扶正，必要时可根据虚实标本的主次，兼顾同治。标实当泻，针对气滞、血瘀、寒凝、痰浊而疏理气机，活血化瘀，辛温通阳，泄浊豁痰，尤重活血通脉治法。

涉及考点 | 胸痹的辨证论治

24.治疗不寐之痰热内扰证，应首选的方剂是

- A.黄连温胆汤
- B.朱砂安神丸
- C.安神定志丸
- D.六味地黄丸
- E.甘麦大枣汤

【答案】A

【解析】不寐之痰热内扰证乃痰热内盛，扰乱心神所致，治疗应清化痰热，和中安神，方选黄连温胆汤。朱砂安神丸可清心泻火，安神宁心，适用于心火炽盛型不寐。安神定志丸有镇惊安神定志的功效，适用于心胆气虚型不寐。六味地黄丸可滋阴降火，适用于心肾不交型不寐。甘麦大枣汤养心安神，和中缓急，为治疗脏躁的主方，以精神恍惚，悲伤欲哭为证治要点。

涉及考点 | 不寐的辨证论治

25.患者，男67岁。平素头痛眩晕，突然发生口眼歪斜，舌强语蹇，口苦，尿赤，舌质红，苔黄，脉弦。治疗应首选的方剂是

- A.镇肝息风汤
- B.补阳还五汤
- C.天麻钩藤饮
- D.大秦苳汤
- E.地黄饮子

【答案】C

【解析】据患者症状可诊断为中风之中经络。患者平素头痛眩晕为肝阳上亢，引动肝风，横窜经络而出现半身不遂，口舌歪斜，舌强语蹇。口苦，尿赤便干，舌红苔黄，脉弦数皆为热象。此为中风中经络风阳上扰证，治宜平肝潜阳，活血通络，首选天麻钩藤饮。大秦苳汤祛风清热，养血活血；补阳还五汤益气养血，化瘀通络，用治中风恢复期气虚络瘀证；镇肝息风汤滋阴潜阳，息风通络，用治中风中经络阴虚风动证；地黄饮子滋养肝肾，合左归丸用治中风恢复期肝肾亏虚证。

涉及考点 | 中风的辨证论治

26. 不寐的病机是

- A. 阴虚火旺, 心肾不交
B. 脾虚不运, 心神失养
C. 气血阴阳亏虚, 心失所养
D. 邪扰心神, 心神不宁
E. 阳盛阴衰, 阴阳失交

【答案】E

【解析】不寐的病因虽多, 但其病理变化, 总属阳盛阴衰, 阴阳失交。一为阴虚不能纳阳; 一为阳盛不得入于阴。病位主要在心, 与肝、脾、肾密切相关。

涉及考点 | 不寐的病机

27. 内伤头痛的发病与下列哪些脏腑关系密切

- A. 心、脾、肾
B. 肺、胃、肾
C. 心、肺、肾
D. 心、肝、肾
E. 肝、脾、肾

【答案】E

【解析】肝主疏泄, 性喜调达。头痛因于肝者, 或因肝失疏泄, 气郁化火, 阳亢火升, 上扰头窍而致; 或因肝肾阴虚, 肝阳偏亢而致; 肾主骨生髓, 脑为髓海。头痛因于肾者, 多因房劳过度, 或禀赋不足, 使肾精久亏, 无以生髓, 髓海空虚, 发为头痛。脾为后天之本, 气血生化之源, 头窍有赖于精微物质的滋养。头痛因于脾者, 或因脾虚生化不足, 气血亏虚, 清阳不升, 头窍失养而致头痛; 或因脾失健运, 痰浊内生, 阻塞气机, 浊阴不降, 清窍被蒙而致头痛。所以内伤头痛之病机多与肝、脾、肾三脏的功能失调有关。



配套名师高清视频

涉及考点 | 头痛的病机

28. 不寐的辨证首先要辨

- A. 病程
B. 阴阳
C. 寒热
D. 虚实
E. 年龄

【答案】D

【解析】不寐辨证首分虚实。虚证, 多属阴血不足, 心失所养, 临床特点为体质瘦弱, 面色无华, 神疲懒言, 心悸健忘。实证为邪热扰心, 临床特点为心烦易怒, 口苦咽干, 便秘溲赤。次辨病位, 病位主要在心。

涉及考点 | 不寐的辨证论治

29. 胸痹之气阴两虚证的胸痛性质为

- A. 心痛彻背
B. 心痛憋闷
C. 心胸隐痛
D. 胸闷重而心痛微
E. 心痛如绞

【答案】C

【解析】胸痹之气阴两虚证胸痛的特点是心胸隐痛, 时作时休; 心肾阴虚证胸痛的特点是心痛憋闷; 痰浊闭阻证的胸痛特点是胸闷重而心痛微, 寒凝心脉证胸痛的特点是猝然心痛如绞, 心痛彻背, 喘不得卧。

涉及考点 | 胸痹的辨证论治

30. 不寐之心胆气虚证, 治疗应首选的方剂是

- A.六味地黄丸
B.交泰丸
C.黄连温胆汤
D.归脾汤
E.安神定志丸合酸枣仁汤

【答案】E

【解析】不寐之心胆气虚证治当益气镇惊，安神定志，方选安神定志丸合酸枣仁汤加减治疗。六味地黄丸和交泰丸适用于心肾不交证的治疗。黄连温胆汤适用于痰热扰心证。归脾汤适用于心脾两虚证的治疗。

涉及考点 | 不寐的辨证论治

31.患者,男,28岁。症见胃痛暴作,恶寒喜暖,脘腹得温则痛减,口不渴,喜热饮,舌苔薄白,脉弦紧。治疗应首选的方剂是

- A.藿朴夏苓汤
B.良附丸
C.小建中汤
D.黄芪建中汤
E.理中汤

【答案】B

【解析】患者胃痛,恶寒喜暖,得温痛减,辨证为寒邪客胃证,治法宜温胃散寒,行气止痛,应用方剂良附丸。选项A解表化湿,选项C、D、E温中力量皆不及良附丸,且建中类方剂是以补虚为主。

涉及考点 | 胃痛的辨证论治

32.治疗肝阳头痛,应首选的方剂是

- A.加味四物汤
B.天麻钩藤饮
C.通窍活血汤
D.半夏白术天麻汤
E.芎芷石膏汤

【答案】B

【解析】肝阳头痛治当平肝潜阳息风,方选天麻钩藤饮加减。加味四物汤用于治疗血虚头痛,通窍活血汤用于治疗瘀血头痛,半夏白术天麻汤适用于痰浊头痛,芎芷石膏汤用于治疗风热头痛。

涉及考点 | 头痛的辨证论治

33.患者,女,28岁。近一周以来,不易入睡,多梦易醒,心悸健忘,神疲食少,四肢倦怠,腹胀便溏,面色少华,舌淡苔薄,脉细无力。其证候是

- A.心胆气虚证
B.心肾不交证
C.心脾两虚证
D.痰热扰心证
E.肝火扰心证

【答案】C

【解析】心脾两虚证多为脾气虚,心血虚。脾虚不运则运化水谷精微失常,精气不能分布于四肢则四肢倦怠。心血虚不能上荣于面,故面色少华。心神失养则心悸健忘。

涉及考点 | 不寐的辨证论治

34.眩晕的辨证论治中,应首辨的要点是

- A.标本虚实
B.寒热虚实
C.病变脏腑
D.虚实缓急
E.外感内伤

【答案】C

【解析】眩晕病在清窍，与肝、脾、肾三脏功能失调密切相关。肝阳上亢之眩晕兼见头胀痛、面色潮红、急躁易怒、口苦脉弦等症状。脾胃虚弱，气血不足之眩晕，兼有纳呆、乏力、面色苍白等症状。脾失健运，痰湿中阻之眩晕，兼见纳呆呕恶、头痛、苔腻诸症。肾精不足之眩晕，多兼有腰酸腿软、耳鸣如蝉等症。所以应当首辨其相关脏腑。

涉及考点 | 眩晕的辨证论治

35. 中风之风痰瘀阻证，治疗应首选的方剂是

- A. 还少丹
- B. 补阳还五汤
- C. 温胆汤
- D. 真方白丸子
- E. 半夏白术天麻汤合桃仁红花煎

【答案】E

【解析】中风之风痰瘀阻证，治当息风化痰，活血通络，方选半夏白术天麻汤合桃仁红花煎加减。本方化痰通络，用于治疗风痰客于经络，症见口眼歪斜，舌强不语，手足不遂等症。

涉及考点 | 中风的辨证论治

36. 痴呆的某本病机为

- A. 阴精不足，气血亏虚
- B. 髓海不足，神机失用
- C. 脏腑亏虚，痰瘀内阻
- D. 以虚为本，虚实夹杂
- E. 气滞血瘀，痰浊内阻

【答案】B

【解析】痴呆为一种全身性疾病，其基本病机为髓海不足，神机失用。由精、气、血亏损不足，髓海失充，脑失所养，或气、火、痰、瘀诸邪内阻，上扰清窍所致。

涉及考点 | 痴呆的病机

(37~38 题共用备选答案)

- A. 加减葳蕤汤
- B. 参苏饮
- C. 荆防败毒散
- D. 再造散
- E. 银翘散

37. 患者症见身热，微恶风寒，少汗，头昏，心烦，口干咽燥，干咳少痰，舌红少苔，脉细数。治疗应首选的方剂是

【答案】A

38. 患者反复感冒，感冒则症见恶寒较重，发热，无汗，头痛身楚，咳嗽，痰白，咳痰无力，平素神疲体弱，气短懒言，反复易感，舌淡苔白，脉浮而无力。治疗应首选的方剂是

【答案】B

【解析】患者主症皆为发热恶寒，一见微恶风寒，手足心热，少汗，头昏口干，可知为阴亏津少；一见恶寒较重，头痛，汗出，倦怠乏力，气短，咳嗽咳痰无力，可知为气虚卫弱。辨证为阴虚感冒用加减葳蕤汤；气虚感冒用参苏饮。C 选项用于风寒感冒，E 选项用于风热感冒。

涉及考点 | 感冒的辨证论治

39. 痫病之风痰闭阻证的治法是

- A. 息风开窍，化痰定志
- B. 清肝泻火，化痰开窍
- C. 涤痰开窍，化痰通络
- D. 涤痰息风，开窍定痫
- E. 化痰通络，镇心安神

【答案】D

【解析】痫病之风痰闭阻证是指风痰蒙闭心窍，壅塞经络，气机逆乱，元神失控而发病，与其余各项中分别提到的肝、心、痰的病变关系不密切。化痰定志法治疗程度弱于涤痰定痫法。

涉及考点 | 痫病的辨证论治

40. 中风、厥证、痫病的共同症状是

- | | |
|---------|---------|
| A. 角弓反张 | B. 四肢抽搐 |
| C. 昏不知人 | D. 喉中有声 |
| E. 项背强直 | |

【答案】C

【解析】中风与痫病典型发作均见突然仆倒，昏不知人。痫病与厥证、痉证均可见四肢抽搐和怪叫。痉证还可见角弓反张，身体强直。

涉及考点 | 痫病的病证鉴别

41. 痴呆不包括下列哪一项

- | | |
|-------------|----------|
| A. 神志异常 | B. 记忆力下降 |
| C. 学习能力下降 | D. 情绪不稳 |
| E. 语言对答能力下降 | |

【答案】C

【解析】痴呆是由髓减脑消、神机失用所致的一种神志异常疾病。痴呆是以记忆力、判定认知能力、计算力与识别空间位置结构的能力减退，理解别人语言和有条理地回答问题的能力障碍等为主症。伴性情孤僻，表情淡漠，语言重复，自私狭隘，顽固固执，或无理由地欣快，易于激动或暴怒。其抽象思维能力下降，不能解释或区别词语的相同点和不同点，道德伦理缺乏，不知羞耻，性格特征改变。并没有神志的异常。

涉及考点 | 痴呆的概念

42. 中风之脱证的临床表现除下列哪项外均是

- | | |
|--------------|--------------|
| A. 突然昏仆，不省人事 | B. 口噤不开，牙关紧闭 |
| C. 手撒肢冷，二便自遗 | D. 目合口开，汗多不止 |
| E. 舌痿，脉微欲绝 | |

【答案】D

【解析】中风之脱证属虚证，乃为五脏真阳散脱，阴阳即将离决之候，临床可见突然昏仆，不省人事，目合口张，鼻鼾息微，手撒肢冷，汗多，大小便自遗，肢体软瘫；舌痿，脉细弱或脉微欲绝。口噤不开，牙关紧闭是中风闭证的临床表现。

涉及考点 | 中风的辨证论治

43. 痴呆之痰浊蒙窍证，治疗应选用的方剂是

- | | |
|----------|------------|
| A. 涤痰汤 | B. 半夏白术天麻汤 |
| C. 天麻钩藤饮 | D. 半夏厚朴汤 |
| E. 黄连温胆汤 | |

【答案】A

【解析】痴呆痰浊蒙窍证，治当豁痰开窍，健脾化痰，方用涤痰汤加减。本方重在豁痰开窍，兼以益气健脾，适用于痰浊蒙窍之痴呆的治疗。

涉及考点 | 痴呆的辨证论治

44. 治疗腹痛之中脏虚寒证,应首选的方剂是

- A. 枳实导滞丸
B. 吴茱萸汤
C. 小建中汤
D. 少腹逐瘀汤
E. 理中丸

【答案】C

【解析】腹痛中脏虚寒证,治当温中补虚,缓急止痛,方选小建中汤加减。枳实导滞丸适用于饮食积滞证,少腹逐瘀汤适用于瘀血内停证,理中丸适用于脾胃虚寒证,吴茱萸汤适用于胃寒呕吐证。

涉及考点 | 腹痛的辨证论治

45. 治疗呕吐之肝气犯胃证,应首选的方剂是

- A. 柴胡疏肝散
B. 四七汤
C. 四磨汤
D. 逍遥散
E. 金铃子散

【答案】B

【解析】呕吐之肝气犯胃证治当疏肝理气,和胃降逆,方选四七汤加减。四七汤具有理气宽中,和胃,降逆止呕之功效,适用于因肝气郁结,气逆犯胃的呕吐。

涉及考点 | 呕吐的辨证论治

46. 噎膈的病位在

- A. 胃
B. 脾
C. 肾
D. 肝
E. 食管

【答案】E

【解析】噎膈的病因以内伤饮食、情志,年老肾虚,脏腑失调为主,且三者之间常相互影响,互为因果,共同致病,形成本虚标实的病理变化。噎膈的病位在食管,属胃气所主,与肝脾肾也有密切关系。

涉及考点 | 噎膈的病位

47. 泄泻的治疗大法是

- A. 健脾益气
B. 消食导滞
C. 运脾化湿
D. 清热利湿
E. 芳香化湿

【答案】C

【解析】泄泻的基本病机为脾虚与湿盛,致肠道功能失司而发为泄泻。病理因素主要是湿,湿为阴邪,易困脾阳。脾主运化,喜燥恶湿,若脾失健运导致小肠无以分清泌浊,则发为泄泻,所以泄泻的治疗大法是运脾化湿。

涉及考点 | 泄泻的辨证论治

48. 治疗噎膈之痰气交阻证应首选的方剂是

- A. 通幽汤
B. 丁香散
C. 四七汤
D. 通关散
E. 启膈散

【答案】E

【解析】痰气交阻证,治以开郁、化痰、润燥,方用启膈散。通幽汤主治疗血内结证;丁香散主治胃中寒冷证;通关散通关开窍;四七汤主治七情之气,结成痰涎。

涉及考点 | 噎膈的辨证论治

49.治疗呃逆之胃火上逆证的方剂是

- | | |
|--------|---------|
| A.麦门冬汤 | B.一贯煎 |
| C.增液汤 | D.竹叶石膏汤 |
| E.理中丸 | |

【答案】D

【解析】呃逆之胃火上逆证,治当清胃泄热,降逆止呃,方选竹叶石膏汤加减。本方有清热生津、和胃降逆功能,用于治疗呃声洪亮、口臭烦渴、喜冷饮之呃逆。

涉及考点 | 呃逆的辨证论治

50.治疗腹痛之饮食积滞证,应首选的方剂是

- | | |
|---------|-------|
| A.保和丸 | B.越鞠丸 |
| C.枳实导滞丸 | D.枳术丸 |
| E.木香顺气丸 | |

【答案】C

【解析】保和丸用于食积停滞,脘腹胀满,嗳腐吞酸,不欲饮食,排除选项 A。越鞠丸用于六郁腹痛,或胸满吐酸,饮食不消,排除选项 B。枳术丸用于脾胃虚弱,食少不化,脘腹胃痞,排除选项 D。木香顺气丸用于脘腹胀痛,恶心,噯气,排除选项 E。枳实导滞丸用于腹痛饮食积滞重证。

涉及考点 | 腹痛的辨证论治

51.胃痛之胃阴亏耗证,其中医治法是

- | | |
|-------------|-------------|
| A.疏肝理气,和胃止痛 | B.化瘀通络,脉络瘀滞 |
| C.温中健脾,和胃止痛 | D.清化热湿,理气和胃 |
| E.养阴益胃,和中止痛 | |

【答案】E

【解析】胃痛之胃阴亏耗证,治法为养阴益胃,和中止痛;瘀血停胃证,治法为化瘀通络,理气和胃;脾胃虚寒证,治法为温中健脾,和胃止痛;湿热中阻证,治法为清化热湿,理气和胃;肝气犯胃证,治法为疏肝理气,和胃止痛。

涉及考点 | 胃痛的辨证论治

52.泄泻的基本病机是

- | | |
|--------------------|---------------|
| A.肝气郁结,胃失和降 | B.肝脾湿热,络脉不和 |
| C.脏腑气机阻滞,经脉痹阻 | D.脾虚湿盛,肠道功能失司 |
| E.邪滞于肠,气血壅滞,肠道传化失司 | |

【答案】D

【解析】泄泻的基本病机变化为脾胃受损,湿困脾土,肠道功能失司,病位在肠,脾失健运是关键,同时与肝、肾密切相关。脾主运化,喜燥恶湿,大小肠司泌浊、传导;肝主疏泄,调节脾运;肾主命门之火,能暖脾助运,腐熟水谷。若脾运失职,小肠无以分清泌浊,大肠无法传化,水反为湿,谷反为滞,合污而下,则发生泄泻。

涉及考点 | 泄泻的病机

53. 以下哪项不是噎膈初期的治法

- A. 降火
- B. 消痰
- C. 化痰
- D. 散寒
- E. 理气

【答案】D

【解析】噎膈初期重在治标，宜理气、化痰、消痰、降火为主；后期重在治本，宜滋阴润燥，或补气温阳为主。

涉及考点 | 噎膈的辨证论治

54. 关于泄泻的治疗，下列哪一项叙述是不正确的

- A. 急性泄泻不可骤用补涩
- B. 久泻不可分利太过
- C. 补虚不可纯用甘温
- D. 清热需大量使用苦寒
- E. 重度泄泻应防止津液亏损

【答案】D

【解析】泄泻的治疗大法为运脾化湿。急性泄泻多以湿盛为主，重在化湿，佐以分利，再根据寒湿和湿热的不同，分别采用温化寒湿与清化湿热之法。夹有表邪者，佐以疏解；兼有伤食者，佐以消导。久泻以脾虚为主，当重健脾。肝气乘脾者，宜抑肝扶脾；因肾阳虚衰者，宜温肾健脾。中气下陷者，宜升提；久泻不止者，宜固涩。暴泻不可骤用补涩，以免关门留寇；久泻不可分利太过，以防劫其阴液。

涉及考点 | 泄泻的辨证论治

55. 黄疸最主要的辨证要点是下列哪一项

- A. 急黄之病因
- B. 黄疸病势轻重缓急
- C. 辨阳黄和阴黄
- D. 阳黄湿热之轻重
- E. 阴黄之病因

【答案】C

【解析】黄疸的辨证以阴阳为纲，分为阳黄和阴黄。阳黄以湿热疫毒为主，有热重于湿、湿重于热、胆腑郁热及疫毒炽盛的不同；阴黄以脾虚寒湿为主，需注意有无血虚血瘀表现。

涉及考点 | 黄疸的辨证论治

56. 治疗寒湿痢，应首选的方剂是

- A. 平胃散
- B. 藿香正气散
- C. 不换金正气散
- D. 胃苓汤
- E. 香连丸

【答案】C

【解析】寒湿痢疾症见：下痢白多赤少或纯白冻，里急后重，舌质淡，苔白腻，脉濡缓。病机是脾胃不和，痰湿中阻，不换金正气散用于温中燥湿，调和气血。

涉及考点 | 痢疾的辨证论治

57. 便秘的基本病机是

- A. 肝气郁结
- B. 肺失肃降
- C. 肝胃不和
- D. 大肠传导失常
- E. 脾失运化

【答案】D

【解析】便秘的基本病变属大肠传导失常,同时与肺、脾、胃、肝、肾等脏腑功能失调有关。如胃热过盛,津液耗伤,则肠失濡润;脾肺气虚,则大肠传送无力;肝气郁结,气机壅滞,或气郁化火伤津,则腑失通利;肾阴不足,则肠道失润;肾阳不足,则阴寒凝滞,津液不通,故皆可影响大肠的传导。

涉及考点 | 便秘的病机

58.治疗便秘之热秘应首选的方剂是

- A.麻子仁丸
- B.六磨汤
- C.黄芪汤
- D.增液承气汤
- E.济川煎

【答案】A

【解析】便秘之热秘治当泻热导滞,润肠通便,方选麻子仁丸加减。六磨汤适用于便秘之气秘,黄芪汤适用于便秘之气虚秘,增液承气汤适用于便秘之阴虚秘,济川煎适用于便秘之阳虚秘。



配套名师高清视频

涉及考点 | 便秘的辨证论治

59.腹部可见块垒,但触之有积块,固定不移动,痛有定处,应诊断为

- A.积证
- B.聚证
- C.胃痛
- D.腹痛
- E.疟疾

【答案】A

【解析】积聚是腹内结块,或痛或胀的病证。分别言之,积属有形,结块固定不移,痛有定处,病在血分,是为脏病;聚属无形,包块聚散无常,痛无定处,病在气分,是为腑病。因积与聚关系密切,故两者往往一并论述。

涉及考点 | 积与聚的主症特点和病机的异同点

60.胁痛的基本病机为

- A.气滞血瘀
- B.肝脾不调
- C.肝络失和
- D.不通则痛
- E.瘀阻心脉

【答案】C

【解析】胁痛的基本病机为肝络失和,其病理变化可归结为“不通则痛”与“不荣则痛”两类。其病理性质有虚实之分,其病理因素,不外乎气滞、血瘀、湿热三者。因肝郁气滞、瘀血停着、湿热蕴结所导致的胁痛多属于实证,是为“不通则痛”。而因阴血不足,肝络失养所导致的胁痛则为虚证,属于“不荣则痛”。

涉及考点 | 胁痛的病机

61.治疗久泻不止,不宜过用

- A.理气
- B.补肾
- C.升提
- D.分利
- E.固涩

【答案】D

【解析】久泻以脾虚为主,当以健脾。因肝气乘脾者,宜抑肝扶脾。因肾阳虚衰者,宜温肾健脾。中气下陷者宜升提。久泄不止者,宜固涩。暴泻不可骤用补涩,以免关门留寇。久泻不

可分利太过,以防劫其阴液。

涉及考点 | 泄泻的辨证论治

62. 治疗黄疸之胆腑郁热证,应首选的方剂是

- A.茵陈术附汤
B.龙胆泻肝汤
C.茵陈五苓散
D.茵陈蒿汤
E.大柴胡汤

【答案】E

【解析】黄疸胆腑郁热证是由湿热砂石郁滞,脾胃不和,肝胆失疏所致,治应疏肝泄热,利胆退黄,方用大柴胡汤加减。茵陈术附汤主治黄疸寒湿阻遏证;茵陈五苓散主治黄疸湿重于热证;茵陈蒿汤主治黄疸热重于湿证;龙胆泻肝汤主治肝胆湿热证。

涉及考点 | 黄疸的辨证论治

63. 治疗黄疸之阴黄寒湿证,应首选的方剂是

- A.麻黄连翘赤小豆汤
B.栀子柏皮汤
C.茵陈五苓散
D.茵陈术附汤
E.茵陈蒿汤

【答案】D

【解析】阴黄由寒湿所致,黄色晦暗如烟熏;治宜温中化湿、健脾和胃,方选茵陈术附汤治疗。而麻黄连翘赤小豆汤清热化湿兼解表,适用于湿热兼表型黄疸。栀子柏皮汤清热利湿,常用于伤寒身热发黄。茵陈五苓散利湿退黄,适用于阳黄,湿重于热,小便不利者。茵陈蒿汤清热利湿退黄,适用于阳黄,热重于湿者。

涉及考点 | 黄疸的辨证论治

64. 患者,女,39岁。便秘20余年。现症:大便干结,面色无华,皮肤干燥,头晕目眩,眠差,口唇色淡,舌质淡,少苔,脉细。该患者所患疾病证属

- A.阳虚秘
B.阴虚秘
C.血虚秘
D.冷秘
E.气虚秘

【答案】C

【解析】血虚不能上荣于面则面色无华,不能濡养肌肤见皮肤干燥,脑窍失养故头晕眠差。

涉及考点 | 便秘的辨证论治

(65~66题共用备选答案)

- A.加味桔梗汤
B.银翘散
C.月华丸
D.桑杏汤
E.桔梗杏仁煎

65. 治疗咳嗽之风燥伤肺证,应首选的方剂是

【答案】D

66. 治疗肺痈之溃脓期,应首选的方剂是

【答案】A

【解析】咳嗽风燥伤肺证,治当疏风清肺,润燥止咳,方选桑杏汤加减。肺痈溃脓期,治当排脓解毒,方选加味桔梗汤加减。银翘散适用于肺痈初期,月华丸适用于肺癆肺阴亏虚证,桔梗杏仁煎适用于肺痈恢复期。

涉及考点 | 咳嗽、肺病的辨证论治

67. 石淋的治法是

- A. 清热通淋, 凉血止血
- B. 清热利湿, 分清泄浊
- C. 清热利湿, 排石通淋
- D. 健脾益气, 升清固摄
- E. 理气疏导, 通淋利尿

【答案】C

【解析】石淋的病机为湿热蕴结下焦, 尿液煎熬成石, 膀胱气化失司。症见尿中夹砂石, 排尿涩痛, 或排尿时突然中断, 尿道窘迫疼痛, 少腹拘急; 往往突发, 一侧腰腹绞痛难忍, 甚则牵及外阴, 尿中带血, 舌红苔薄黄, 脉弦或带数。治宜清热利湿, 排石通淋。

涉及考点 | 淋证的辨证论治

68. 患者, 女, 26岁。症见腹痛阵阵, 痛而拒按, 便后腹痛暂缓, 痢下赤白脓血, 黏稠如胶冻, 腥臭, 腹部疼痛, 里急后重, 肛门灼热, 小便短赤, 舌苔黄腻, 脉滑数。治疗应首选的方剂是

- A. 连理汤
- B. 不换金正气散
- C. 真人养脏汤
- D. 芍药汤
- E. 葛根芩连汤

【答案】D

【解析】患者主症为痢下赤白脓血, 黏稠如胶冻, 腥臭, 见肛门灼热, 小便短赤, 舌苔黄腻, 脉滑数, 为湿热蕴结肠道, 辨为痢疾之湿热痢, 治法为清肠化湿, 调和气血, 方选芍药汤加减。

涉及考点 | 痢疾的辨证论治

69. 水肿发病涉及的脏腑是

- A. 心、肝、肾
- B. 肝、脾、肾
- C. 肺、脾、肾
- D. 脾、肾、心
- E. 肾、心、肺

【答案】C

【解析】肺失宣降, 不能通调水道; 脾失健运, 不能转输水液; 肾失开合, 不能化气行水; 三焦气化不利, 水液代谢失常, 溢于肌表而为水肿, 所以水肿发病与肺、脾、肾关系密切。

涉及考点 | 水肿的病机

70. 治疗淋证之气淋, 应首选的方剂是

- A. 小蓟饮子
- B. 程氏萆薢分清饮
- C. 八正散
- D. 沉香散
- E. 补中益气汤

【答案】D

【解析】淋证之气淋病机为气机郁结, 膀胱气化不利, 治宜理气疏导, 通淋利尿, 方用沉香散。小蓟饮子主治血淋, 八正散主治热淋, 程氏萆薢分清饮主治膏淋, 补中益气汤主治劳淋。

涉及考点 | 淋证的辨证论治

71. 患者, 女, 39岁。起病缓慢, 下肢肢体痿软无力, 症见腰膝酸软, 不能久立, 甚至步履全废, 腿胫大肉渐脱, 伴有眩晕耳鸣, 舌咽干燥, 月经不调, 舌红少苔, 脉细数。治疗应选用的方剂是

- A. 补血荣筋丸
- B. 圣愈汤
- C. 鹿角胶丸
- D. 虎潜丸

E.独活寄生汤

【答案】D

【解析】患者肢体痿软无力,尤以下肢明显,腰膝酸软,不能久立,甚至步履全废,诊断为痿证;肝肾亏虚,精血不能濡养筋骨经脉,久则髓枯筋燥,腿胫大肉消脱,痿废不起,故见腰膝酸软,不能久立;目为肝之窍,耳为肾之窍,发为血之余,肝肾精血亏虚,失之荣养濡润,故见眩晕耳鸣,舌咽干燥;肾虚不能藏精,则见遗精或遗尿;肝肾亏损,冲任失调,故见女月经不调;舌红少苔,脉细数均为阴虚内热之象,辨证属于肝肾亏损证,治宜补益肝肾,滋阴清热,方选虎潜丸加减。

涉及考点 | 痿证的辨证论治

72.患者眩晕耳鸣,头胀痛,每因烦劳或恼怒而增剧,急躁易怒,少寐多梦,舌红苔黄,脉弦数。治疗应首选的方剂是

- A.柴胡疏肝散
- B.当归芍药散
- C.天麻钩藤饮
- D.丹栀逍遥散
- E.黄连温胆汤

【答案】C

【解析】眩晕之肝阳上亢证的治法为平肝潜阳,清火息风,方剂选用天麻钩藤饮加减。

涉及考点 | 眩晕的辨证论治

73.治疗淋证之膏淋,应首选的方剂是

- A.小蓟饮子
- B.补中益气汤
- C.八正散
- D.石韦散
- E.程氏萆薢分清饮

【答案】E

【解析】膏淋病机为湿热下注,阻滞络脉,脂汁外溢,治宜清热利湿,分清泄浊,方选程氏萆薢分清饮加减。小蓟饮子主治血淋,补中益气汤主治劳淋,八正散主治热淋石韦散主治石淋。

涉及考点 | 淋证的辨证论治

74.治疗郁证之痰气郁结证,应首选的方剂是

- A.甘麦大枣汤
- B.半夏厚朴汤
- C.柴胡疏肝散
- D.丹栀逍遥散
- E.小陷胸汤

【答案】B

【解析】郁证痰气郁结证的病机为气郁痰凝,阻滞胸咽,治宜行气开郁,化痰散结,方选半夏厚朴汤加减甘麦大枣汤主治郁证心神失养证;柴胡疏肝散主治郁证肝气郁结证;丹栀逍遥散主治郁证气郁化火证。

涉及考点 | 郁证的辨证论治

75.按照痰饮停积的部位分类,饮流胁下的是

- A.痰饮
- B.溢饮
- C.悬饮
- D.支饮
- E.伏饮

【答案】C

【解析】饮邪具有流动之性,饮留胃肠,则为痰饮;饮流胁下,则为悬饮;饮流肢体,则为溢

饮；聚于胸肺，为支饮。

涉及考点 | 痰饮的分类

76.治疗“梅核气”应首选的方剂是

- | | |
|---------|---------|
| A.柴胡疏肝散 | B.丹栀逍遥散 |
| C.五磨饮子 | D.半夏厚朴汤 |
| E.甘麦大枣汤 | |

【答案】D

【解析】郁证痰气郁结证称为“梅核气”，表现为咽中如有物梗塞，吞之不下，咳之不出，为气郁痰凝，阻滞胸咽所致，治宜行气开郁，化痰散结，方选半夏厚朴汤加减。

涉及考点 | 郁证的辨证论治

77.治疗紫斑之阴虚火旺证，应首选的方剂是

- | | |
|---------|---------|
| A.知柏地黄丸 | B.无比山药丸 |
| C.犀角地黄丸 | D.茜根散 |
| E.归脾汤 | |

【答案】D

【解析】紫斑阴虚火旺证为虚火内炽，灼伤脉络，血溢肌腠，治宜滋阴降火，宁络止血，方选茜根散加减。知柏地黄丸主治尿血肾虚火旺证；无比山药丸主治尿血肾气不固证；犀角地黄丸主治齿衄阴虚火旺证；归脾汤主治脾不统血证。

涉及考点 | 紫斑的辨证论治

78.脏躁的治疗代表方剂是

- | | |
|---------|---------|
| A.柴胡疏肝散 | B.甘麦大枣汤 |
| C.丹栀逍遥散 | D.滋水清肝饮 |
| E.半夏厚朴汤 | |

【答案】B

【解析】脏躁的临床表现为精神恍惚，心神不宁，多疑易惊，悲忧善哭，喜怒无常，为营阴耗伤，心神失养之郁证；治宜甘润缓急，养心安神，方选甘麦大枣汤加减。柴胡疏肝散主治郁证肝气郁结证；滋水清肝饮主治郁证气郁化火证之热盛伤阴者；丹栀逍遥散主治郁证气郁化火证肝火较旺者；半夏厚朴汤主治郁证痰气郁结证。

涉及考点 | 郁证的辨证论治

79.痰饮的治疗原则是下列哪一项

- | | |
|------|------|
| A.宣肺 | B.健脾 |
| C.温化 | D.补肾 |
| E.发汗 | |

【答案】C

【解析】病痰饮者，应当以温药和之，故以温阳化饮为痰饮的基本治疗原则。

涉及考点 | 痰饮的辨证论治

80.治疗支饮之寒饮伏肺证，应首选的方剂是

- | | |
|----------|---------|
| A.柴枳半夏汤 | B.甘遂半夏汤 |
| C.香附旋覆花汤 | D.小青龙汤 |
| E.金匱肾气丸 | |

【答案】D

【解析】支饮之寒饮伏肺证的病机为寒饮伏肺，遇感引动，肺失宣降，治疗宜宣肺化饮，方选小青龙汤加减。柴枳半夏汤主治悬饮邪犯胸肺证；香附旋覆花汤主治悬饮络气不和证；甘遂半夏汤主治痰饮饮留胃肠证；金匱肾气丸主治支饮脾肾阳虚证。

涉及考点 | 支饮的辨证论治

81. 消渴的病变脏腑主要是

- | | |
|----------|----------|
| A. 肝、胃、肾 | B. 脾、胃、肾 |
| C. 肺、胃、肾 | D. 肺、脾、肾 |
| E. 心、肝、肾 | |

【答案】C

【解析】消渴的病机主要在于阴津亏损，燥热偏胜，而以阴虚为本，燥热为标。两者互为因果，阴愈虚则燥热愈盛，燥热愈盛则阴愈虚；病变的脏腑主要在肺、胃、肾，尤以肾为关键。

涉及考点 | 消渴的辨证要点

82. 患者，男，65岁。咳嗽气粗，喉中有痰声，痰多质黏腻黄稠，咳吐不爽，有热腥味，舌质红，苔黄腻，脉滑数。治疗应首选的方剂是

- | | |
|----------|----------|
| A. 桑菊饮 | B. 桑杏汤 |
| C. 杏苏散 | D. 清金化痰汤 |
| E. 沙参麦冬汤 | |

【答案】D

【解析】患者以咳嗽咳痰为主症，诊断为咳嗽。痰热壅肺，肺失肃降，可见咳嗽气粗，或喉中有痰声，痰多质黏腻或黄稠，咳吐不爽，或有热腥味；舌质红，舌苔黄腻，脉滑数为痰热内蕴之症，辨证属痰热郁肺证，治法为清热肃肺，豁痰止咳，方用清金化痰汤加减。

涉及考点 | 咳嗽的辨证论治

83. 治疗消渴之胃热炽盛证，应首选的方剂是

- | | |
|----------|--------|
| A. 茜根散 | B. 消渴方 |
| C. 玉女煎 | D. 清中汤 |
| E. 七味白术散 | |

【答案】C

【解析】胃热炽盛证见多食易饥，口渴，尿多，形体消瘦，大便干燥，苔黄，脉滑实有力，为胃火内炽，胃热消谷，耗伤津液所致；治宜清胃泻火，养阴增液；方用玉女煎加减。七味白术散主治消渴之气阴亏虚证；消渴方主治消渴肺热津伤证；茜根散主治紫斑阴虚火旺证；清中汤主治胃痛湿热中阻证。

涉及考点 | 消渴的辨证论治

84. 内伤发热之阳虚发热证的治疗首选方剂是

- | | |
|----------|--------|
| A. 归脾汤 | B. 右归丸 |
| C. 中和汤 | D. 清骨散 |
| E. 金匱肾气丸 | |

【答案】E

【解析】阳虚发热的病机为肾阳虚衰，火不归原，治宜温补阳气，引火归原，方选金匱肾气丸加减。右归丸用于肾阳不足，命门火衰；中和汤主治内伤发热之痰湿郁热证；清骨散主治阴

虚发热;归脾汤主治血虚发热。

涉及考点 | 内伤发热的辨证论治

85.痿证的病理因素主要是

- | | |
|-------|-------|
| A.湿、热 | B.风、湿 |
| C.燥、热 | D.痰、瘀 |
| E.寒、湿 | |

【答案】A

【解析】痿证形成的原因颇为复杂,包括感受温毒、湿热浸淫、饮食毒物

所伤、久病房劳、跌仆瘀阻等,致使精血津液亏损,不能束骨而利关节,以致肌肉软弱无力,消瘦枯萎,发为痿证,由此可见湿热邪气为痿证的主要病理因素。

涉及考点 | 痿证的病机



配套名师高清视频

86.患者,女,65岁。咳喘多年,2天前外感后,症见喘逆上气,胸胀或痛,息粗,鼻扇,咳而不爽,吐痰稠黏,伴形寒,身热,烦闷,身痛,无汗,口渴,舌苔薄白,舌边红,脉浮数。治疗应选用的方剂是

- | | |
|-----------|---------|
| A.苏子降气汤 | B.桑白皮汤 |
| C.麻黄汤合华盖散 | D.麻杏石甘汤 |
| E.定喘汤 | |

【答案】D

【解析】根据患者症状,诊断为喘证之表寒肺热证。方剂选择麻杏石甘汤治疗。

涉及考点 | 喘证的辨证论治

87.寒湿腰痛的治疗主方是

- | | |
|---------|---------|
| A.甘姜苓术汤 | B.金匱肾气丸 |
| C.右归丸 | D.独活寄生汤 |
| E.附子汤 | |

【答案】A

【解析】寒湿腰痛的病机为寒湿痹阻,滞碍气血,经脉不利,治宜散寒行湿,温经通络,方选甘姜苓术汤加减。右归丸主治肾阳虚腰痛;独活寄生汤主治寒湿腰痛寒邪较甚者。

涉及考点 | 腰痛的辨证论治

88.治疗瘀血腰痛,应首选的方剂是

- | | |
|---------|---------|
| A.身痛逐瘀汤 | B.独活寄生汤 |
| C.甘姜苓术汤 | D.人参养荣汤 |
| E.血府逐瘀汤 | |

【答案】A

【解析】瘀血腰痛的病机为瘀血阻滞,经脉痹阻,不通则痛,治宜活血化瘀,通络止痛,方选身痛逐瘀汤加减。独活寄生汤主治寒湿腰痛寒较盛者;甘姜苓术汤主治寒湿腰痛湿较盛者;人参养荣汤主治脾肺气虚证;血府逐瘀汤主治胸中血瘀证。

涉及考点 | 腰痛的辨证论治

89.中消的发病病机为

- | | |
|--------|--------|
| A.气阴两虚 | B.胃热炽盛 |
| C.脾失运化 | D.胃阴不足 |

E. 血脉瘀滞

【答案】B

【解析】消渴辨证首先分清三消的脏腑病位。多饮症状较为突出者为上消，以肺燥津伤为主；多食症状较为突出者为中消，以胃热炽盛为主；多尿症状较突出者为下消，以肾虚为主。其次辨标本。本病以阴虚为主，燥热为标，两者互为因果。常因病程长短及病情轻重的不同，而阴虚和燥热之表现也各有侧重。一般初病多以燥热为主，病程较长者则阴虚与燥热互见，日久则以阴虚为主，进而由于阴损及阳，导致阴阳俱虚。

涉及考点 | 消渴的辨证要点

90. 薛某，男，69岁。呼吸气促，喉中哮鸣有声，胸闷如窒息，口不渴，形寒怕冷，面色晦暗，舌苔白滑，脉弦紧。治疗应首选的方剂是

- A. 二陈汤
B. 麻黄汤
C. 定喘汤
D. 射干麻黄汤
E. 平喘固本汤

【答案】D

【解析】患者呼吸急促，喉中哮鸣有声，可诊断该患者为哮病。且患者表现为形寒怕冷，应以寒邪为主，寒痰伏肺，痰升气阻而见呼吸气促，喉中哮鸣有声；寒痰闭郁，肺气不宣，而见胸闷如窒，病因于寒，内无郁热则胸闷如窒，舌苔白滑，脉弦紧皆为寒盛之象，此为寒痰引起的冷哮，应以温肺散寒，化痰平喘为主。选项 A 燥湿化痰；选项 B 辛温解表，皆用于表证；选项 C 宣肺平喘，治疗热哮证；选项 D 温肺散寒，宣肺祛痰，下气止咳，治疗哮病之冷哮；选项 E 补肺纳肾，降气化痰。治疗虚哮证。

涉及考点 | 哮病的辨证论治

91. 治疗胸痹心血瘀阻证，若伴气虚自汗者，可选用的方剂为

- A. 四君子汤合复方丹参滴丸
B. 人参养营汤合桃红四物汤
C. 补中益气汤合失笑散
D. 生脉散合失笑散
E. 补中益气汤合当归活血饮

【答案】B

【解析】桃红四物汤以祛瘀为核心，辅以养血、行气。方中以强劲的破血之品桃仁、红花为主，力主活血化痰；以甘温之熟地、当归滋阴补肝、养血调经；芍药养血和营，以增补血之力；川芎活血行气、调畅气血，以助活血之功。全方配伍得当，使瘀血祛、新血生、气机畅，化瘀生新是该方的显著特点。而人参养营汤则针对气虚自汗，可以温补气血。

涉及考点 | 胸痹的辨证论治

92. 许某，男性，68岁。反复发作气急痰鸣10年余。喉中痰涎壅盛，声如拽锯，喘急胸满，但坐不得卧，咳痰黏腻难出，或为白色泡沫痰液，无明显寒热倾向，面色青暗，起病多急，常倏忽来去，发作前自觉鼻、咽、眼、耳发痒，喷嚏，鼻塞，流涕，胸部憋塞，随之迅即发作，舌苔厚浊，脉滑实。治疗应选用的方剂是

- A. 小青龙汤
B. 射干麻黄汤
C. 定喘汤
D. 苏子降气汤
E. 三子养亲汤

【答案】E

【解析】患者反复发作气急痰鸣10年余，喉中痰涎壅盛，声如拽锯，诊断为哮病。痰浊伏

肺,风邪引触,肺气郁闭,升降先司,可见喉中痰涎壅盛,声如拽锯,或鸣声如吹哨笛,喘急胸满,但坐不得卧,咳痰黏腻难出,或为白色泡沫痰液;风邪侵袭,可见面色青暗,起病多急,常倏忽来去,结合舌脉,辨证属风痰哮证,治当祛风涤痰,降气平喘,方剂选三子养亲汤加减。

涉及考点 | 哮病的辨证论治

93.颤证的基本病机是

- A.阴血不足,肝失濡养,筋脉刚劲太过 B.外邪侵袭肢体,经络痹阻
C.脏腑功能失调 D.肝风内动,筋脉失养
E.气机突然逆乱,升降乖戾,气血阴阳不相顺接

【答案】D

【解析】颤证基本病机为肝风内动,筋脉失养。“肝主身之筋膜”,为风木之脏,肝风内动,筋脉不能自主,随风而动,牵动肢体及头颈颤抖摇动。其中又有肝阳化风、血虚生风、阴虚风动、瘀血生风、痰热动风等不同病机。

涉及考点 | 颤证的病机

94.患者,女,78岁。喘促日久,动则喘甚,呼多吸少,气不得续,汗出肢冷,跗肿,面青唇紫,舌淡苔白,脉沉弱。治疗应选用的方剂是

- A.平喘固本汤 B.金匱肾气丸合参蛤散
C.参附汤合黑锡丹 D.生脉散合补肺汤
E.生脉地黄汤合金水六君煎

【答案】B

【解析】患者喘促日久,动则喘甚,日久必伤正气。呼多吸少,气不得续,汗出肢冷,面青唇紫,舌淡苔白,脉沉弱,此为肾气虚的表现。因此患者属肾虚不纳型喘证,治疗以补肾纳气为主。方用金匱肾气丸合参蛤散治疗。

涉及考点 | 喘证的辨证论治

95.患者,男,32岁。素日嗜酒,外出着凉后,时时振寒,继则壮热,汗出烦躁,咳嗽气急,胸满作痛,转侧不利,咳吐浊痰,呈黄绿色,自觉喉间有腥味,口干咽燥,舌苔黄腻,脉滑数。治疗应选用的方剂是

- A.银翘散 B.《千金》苇茎汤合如金解毒散
C.沙参清肺汤 D.桔梗杏仁煎
E.加味桔梗汤

【答案】B

【解析】肺痈主要表现为咳嗽、胸痛、发热、咳吐腥臭浊痰,甚则咳吐脓血为特征的病证,根据患者症状不难诊断为肺痈,为邪热入里,热毒内盛引起,患者咳嗽气急,咳吐腥臭浊痰处于肺痈成痈期,选项B清热解毒,化痰消痈。选项A用于初期,选项E用于溃脓期,选项C、D用于恢复期。

涉及考点 | 肺痈的辨证论治

96.患者,女,28岁。干咳少痰,咳声短促,痰中带血,五心烦热,时有盗汗,形体消瘦,胸部闷痛隐隐,舌红少苔,脉细数。其诊断是

- A.咳嗽,肺阴亏耗证 B.肺痿,肺阴亏损证
C.哮病,肺虚证 D.喘证肺虚证
E.虚劳,肺阴虚证

【答案】B

【解析】患者干咳少痰,咳声短促,痰中带血,是肺癆的主要症状,痰少,五心烦热,盗汗,形体消瘦,胸部隐痛提示肺阴虚,舌红少苔,脉细数均为阴虚的表现。故患者可诊断为肺癆之肺阴虚证。内伤咳嗽肺阴亏耗证主症虽也见干咳,或痰中带血丝,但并无胸部闷痛隐隐等症状。哮病则以发作时喉中痰鸣有声,呼吸困难为特点。喘证则以呼吸困难,甚则张口抬肩,鼻翼扇动为特点。

涉及考点 | 肺癆的诊断和辨证论治

97.于某,男,35岁。两年来心中悸动不安,眩晕,胸闷胃痞,渴不欲饮,恶心,流涎,舌淡胖,苔白滑,脉沉细而滑。治疗应选用的方剂是

- | | |
|---------|---------|
| A.清气化痰丸 | B.归脾汤 |
| C.甘麦大枣汤 | D.黄连温胆汤 |
| E.苓桂术甘汤 | |

【答案】E

【解析】患者两年来心中悸动不安,诊断为心悸。脾肾阳虚,水饮内停,上凌于心,扰乱心神,可见悸动不安,眩晕,胸闷胃痞,渴不欲饮,恶心,流涎,舌淡胖,苔白滑,脉沉细而滑。辨证属于水饮凌心证,治当振奋心阳化气行水,宁心安神,方选苓桂术甘汤加减。

涉及考点 | 心悸的辨证论治

98.胸痹患者,女,66岁。症见胸闷如窒而痛,气短喘促,肢体沉重,体胖痰多,舌苔浊腻,脉滑。其证候是

- | | |
|--------|--------|
| A.饮邪上犯 | B.痰浊壅塞 |
| C.心血瘀阻 | D.心火亢盛 |
| E.寒凝气滞 | |

【答案】B

【解析】胸痹之痰浊闭阻证的主症:胸闷重而心痛微,痰多气短,肢体沉重,形体肥胖,遇阴雨天而易发作或加重,伴有倦怠乏力,纳呆便溏,咯吐痰涎,舌体胖大且边有齿痕,苔浊腻或白滑,脉滑。

涉及考点 | 胸痹的辨证论治

99.患者,女,35岁。心悸不宁,头晕目眩,耳鸣,腰痛,舌红少苔,脉细数。其证候是

- | | |
|--------|--------|
| A.心血不足 | B.心虚胆怯 |
| C.心阴亏虚 | D.阴虚火旺 |
| E.心火内盛 | |

【答案】D

【解析】患者主症心悸不宁,伴有头晕目眩,耳鸣,腰痛,应为肾阴虚,手足心热,舌红少苔,脉细数,为阴虚火旺的表现。故该患者为心悸之阴虚火旺证。心血不足无手足心热;心虚胆怯以善惊易恐为特点;心火内盛伴有胸闷烦躁。

涉及考点 | 心悸的辨证论治

100.患者,女,46岁。近来心悸易惊,心烦失眠,五心烦热,口干,盗汗,思虑劳心则症状加重,伴有耳鸣,腰酸,头晕目眩,舌红少津,少苔,脉细数。治疗应选用的方剂是

- | | |
|---------|-------------|
| A.安神定志丸 | B.苓桂术甘汤 |
| C.天王补心丹 | D.桂枝甘草龙骨牡蛎汤 |

E.桃仁红花煎

【答案】C

【解析】患者主症为心悸，见心烦失眠，五心烦热，口干，盗汗，一派阴虚之象。辨证为心悸之阴虚火旺证。代表方剂天王补心丹合朱砂安神丸。选项A用于心悸心虚胆怯证，选项B用于心悸水饮凌心证，选项D用于心悸心阳不振证，选项E用于心悸瘀阻心脉证。

涉及考点 | 心悸的辨证论治

101.魏某，男性，67岁。反复发作气急痰鸣10年余。症见喉中哮鸣有声，胸膈烦闷，呼吸急促，喘咳气逆，咳痰不爽，痰色黄，发热，恶寒，无汗，身痛，口干欲饮，大便干，舌苔白腻，舌尖边红，脉弦紧。治疗应选用的方剂是

A.定喘汤或越婢加半夏汤

B.小青龙加石膏汤

C.三子养亲汤

D.射干麻黄汤或小青龙汤

E.平喘固本汤

【答案】B

【解析】患者反复发作气急痰鸣10年余，喉中哮鸣有声，诊断为哮病。痰热壅肺复感风寒，客寒包火，肺失宣降，可见胸膈烦闷，呼吸急促，喘咳气逆，咳痰不爽，痰色黄，烦躁，发热，恶寒，无汗等症，结合舌脉，辨证属寒包热哮证，治以解表散寒，清化痰热，方选小青龙加石膏汤或厚朴麻黄汤加减。

涉及考点 | 哮病的辨证论治

102.患者，男，60岁。症见胸闷疼痛，痰多气短，肢体沉重，形体肥胖，倦怠乏力，纳呆便溏，舌苔油腻，脉滑。治疗应选用的方剂是

A.瓜蒌薤白半夏汤合涤痰汤

B.枳实薤白桂枝汤

C.血府逐瘀汤

D.瓜蒌薤白白酒汤

E.柴胡疏肝散

【答案】A

【解析】患者痰多气短，肢体沉重，倦怠乏力，为痰浊壅塞，痹阻心脉之象，属胸痹之痰浊壅塞证，治以通阳泄浊，豁痰开结，方用瓜蒌薤白半夏汤合涤痰汤。枳实薤白桂枝汤通阳散结，祛痰下气，主治寒凝心脉证。血府逐瘀汤主治心血瘀阻证。瓜蒌薤白白酒汤主治阴寒凝滞证。柴胡疏肝散主治气滞心胸证。

涉及考点 | 胸痹的辨证论治



配套名师高清视频

103.患者症见不易入睡，多梦易醒，心悸健忘，神疲食少，伴头晕目眩，四肢倦怠，腹胀便溏，面色少华，舌淡苔薄，脉细无力。治疗应选用的方剂是

A.酸枣仁汤

B.归脾汤

C.交泰丸

D.天王补心丹

E.安神定志丸

【答案】B

【解析】患者心悸健忘，为心血虚；神疲食少，头晕目眩，四肢倦怠，为脾气虚，属不寐之心脾两虚证。治以补益心脾，养血安神，方用归脾汤。酸枣仁汤合安神定志丸主治心胆气虚之不寐；交泰丸合六味地黄丸主治心肾不交之不寐，天王补心丹主治阴虚火旺证。

涉及考点 | 不寐的辨证论治

104.患者,女,49岁。症见不寐多梦,甚则彻夜不眠,急躁易怒,伴头晕头胀,目赤耳鸣,口干而苦,不思饮食,便秘溲赤,舌红苔黄,脉弦而数。治疗应选用的方剂是

- A.归脾汤
B.龙胆泻肝汤
C.朱砂安神丸
D.天王补心丹
E.安神定志丸

【答案】B

【解析】患者不寐多梦,甚则彻夜不眠,诊断为不寐。肝郁化火,可见急躁易怒,伴头晕头胀,目赤耳鸣,口干而苦,不思饮食,便秘赤溲,结合舌脉,辨证属于肝火扰心证,治当疏肝泻火,镇心安神,方剂选龙胆泻肝汤加减。

涉及考点 | 不寐的辨证论治

105.王某,男,58岁。近年来心烦不寐,入睡困难,心悸多梦,腰膝酸软,潮热盗汗,咽干少津,舌红少苔,脉细数。治疗此病证首选方剂是

- A.左归丸合酸枣仁汤
B.六味地黄丸合交泰丸
C.右归丸合酸枣仁汤
D.安神定志丸合酸枣仁汤
E.六味地黄丸合安神定志丸

【答案】B

【解析】患者心烦不寐,入睡困难,心悸多梦,诊断为不寐。肾水亏虚,不能上济于心,心火炽盛,不能下交于肾,可见心烦不寐,心悸多梦,腰酸膝软,潮热盗汗,咽干少津,结合舌脉,辨证属于心肾不交证,治当滋阴降火,交通心肾,方选六味地黄丸合交泰丸加减。

涉及考点 | 不寐的辨证论治

106.患者,男,28岁。症见头痛而胀,甚则头胀如裂,恶风,面口渴喜饮,便秘,溲赤,舌红,苔薄黄,脉浮数。治疗应选用的方剂是

- A.川芎茶调散
B.加味四物汤
C.羌活胜湿汤
D.天麻钩藤饮
E.芎芷石膏汤

【答案】E

【解析】患者头痛而胀甚则头胀如裂,诊断为头痛。风热外袭,上扰清空,窍络失和,可见头痛而胀,甚则头胀如裂,恶风;面红目赤,口渴喜饮,大便便秘,溲赤均为实热之证,结合舌脉,辨证为风热头痛,治当疏风清热和络,方选芎芷石膏汤加减。

涉及考点 | 头痛的辨证论治

107.腰痛患者症见腰部冷痛重着,转侧不利,逐渐加重,静卧病痛不减,寒冷和阴雨天则加重,舌质淡,苔白腻,脉沉而迟缓。其证候是

- A.肾虚
B.风寒
C.瘀血
D.湿热
E.寒湿

【答案】E

【解析】寒湿腰痛主症为:腰部冷痛重着,转侧不利,静卧不减,阴雨天加重。肾虚腰痛,症见腰痛而酸软,喜按喜揉,足膝无力,遇劳更甚,卧则减轻,常反复发作,排除选项A;风寒腰痛,症见腰痛处伴有热感,热天或雨天疼痛加重,活动后可减轻,尿赤,排除选项B;瘀血腰痛,症见腰痛痛有定处,刺痛,排除选项C;湿热腰痛,症见腰痛处伴有热感,热天或雨天疼痛加重,活动

后可减轻,尿赤,排除选项D。

涉及考点 | 腰痛的辨证论治

(108~109题共用备选答案)

- | | |
|---------|---------|
| A.射干麻黄汤 | B.三子养亲汤 |
| C.定喘汤 | D.厚朴麻黄汤 |
| E.麻杏石甘汤 | |

108.治疗哮喘之寒包热哮证,应首选的方剂是

【答案】D

109.治疗哮喘之风痰哮证,应首选的方剂是

【答案】B

【解析】寒包热哮证,治以解表清里,方用小青龙加石膏汤或厚朴麻黄汤;风痰哮证,治以祛风化痰,方用三子养亲汤;射干麻黄汤主治寒哮;定喘汤主治热哮。

涉及考点 | 哮喘的辨证论治

(110~111题共用备选答案)

- | | |
|---------|-------|
| A.桑白皮汤 | B.泻白散 |
| C.苏子降气汤 | D.定喘汤 |
| E.麻杏石甘汤 | |

110.治疗热哮发作期,应首选的方剂是

【答案】D

111.治疗喘证痰热郁肺证,应首选的方剂是

【答案】A

【解析】桑白皮汤用于治疗喘证,痰热郁肺;麻杏石甘汤用于治疗喘证,表寒里热;苏子降气汤,治疗上实下虚之喘咳;定喘汤用于热哮发作期;泻白散用于肺热咳喘证。

涉及考点 | 哮喘、喘证的辨证论治

(112~113题共用备选答案)

- | | |
|---------|-----------|
| A.血府逐瘀汤 | B.复元活血汤 |
| C.通窍活血汤 | D.失笑散合丹参饮 |
| E.加味四物汤 | |

112.治疗胃痛之瘀血停胃证,首选的方剂是

【答案】D

113.治疗头痛之血虚头痛证,首选的方剂是

【答案】E

【解析】胃痛之瘀血停胃证,治当化瘀通络,理气和胃,方选失笑散合丹参饮加减。前方活血化瘀,后方化瘀止痛,两方合用加强活血化瘀作用,适宜治疗胃痛如针刺或痛有定处之证。头痛之血虚头痛证,治当养血滋阴,和络止痛,方剂选加味四物汤加减。

涉及考点 | 胃痛、头痛的辨证论治

(114~115题共用备选答案)

- | | |
|----------|-------|
| A.桃花汤 | B.芍药汤 |
| C.驻车丸 | D.连理汤 |
| E.不换金正气散 | |

114. 治疗痢疾之休息痢, 应首选的方剂是

【答案】D

115. 治疗痢疾之湿热痢, 应首选的方剂是

【答案】B

【解析】休息痢治以温中清肠, 佐以调气化滞, 方用连理汤。湿热痢治以清热解毒调气行血, 方用芍药汤。

涉及考点 | 痢疾的辨证论治

(116~117 题共用备选答案)

A. 葛根芩连汤

B. 不换金正气散

C. 藿香正气散

D. 白头翁汤

E. 芍药汤

116. 患者症见泄泻腹痛, 泻下急迫, 或泻而不爽, 粪色黄褐, 气味臭秽, 肛门灼热, 烦热口渴, 小便短黄, 舌质红, 苔黄腻, 脉滑数或濡数。治疗应首选的方剂是

【答案】A

117. 患者症见腹痛拘急, 痢下赤白黏冻, 白多赤少, 里急后重, 口淡乏味, 脘胀腹满, 头身困重, 舌质或淡, 舌苔白腻, 脉濡缓。治疗应首选的方剂是

【答案】B

【解析】泄泻腹痛, 泻下急迫, 粪色黄褐, 气味臭秽, 肛门灼热, 烦热口渴, 舌质红, 苔黄腻, 脉滑数, 为湿热伤中型泄泻, 方用葛根芩连汤。腹痛拘急, 痢下赤白黏冻, 白多赤少, 里急后重, 脘腹胀满, 舌苔白腻, 脉濡缓, 为寒湿痢, 方用不换金正气散。白头翁汤适用于治疗疫毒痢。芍药汤适用于治疗湿热痢。

涉及考点 | 泄泻、痢疾的辨证论治

(118~119 题共用备选答案)

A. 肝、肾

B. 肺、脾

C. 肺、肾

D. 脾、肾

E. 肺、肝

118. 阳水的病位在

【答案】B

119. 阴水的病位在

【答案】D

【解析】由于水肿的致病因素及体质的差异, 其病理性质有阴水、阳水之分; 阳水属实, 多由外感风邪、疮毒、水湿而成, 病位在肺、脾。阴水属虚或虚实夹杂, 多由饮食劳倦、禀赋不足、久病体虚所致, 病位在脾、肾。

涉及考点 | 水肿的病机

(120~121 题共用备选答案)

A. 十灰散

B. 半夏厚朴汤

C. 柴胡疏肝散

D. 黄土汤

E. 滋水清肝饮

120. 郁证之肝气郁结证的代表方剂是

【答案】C

121.便血之脾胃虚寒证的代表方剂是

【答案】D

【解析】郁证肝气郁结证为肝郁气滞，脾胃失和，治宜疏肝解郁，理气畅中，方选柴胡疏肝散加减；便血脾胃虚寒证为中焦虚寒，统血无力，血溢胃肠；治宜健脾温中，养血止血，方选黄土汤加减。

涉及考点 | 郁证、血证的辨证论治

(122~123 题共用备选答案)

- | | |
|-------|---------|
| A.桑杏汤 | B.柴枳半夏汤 |
| C.桑菊饮 | D.黄土汤 |
| E.归脾汤 | |

122.患者症见鼻燥衄血，口干咽燥，或兼有身热，恶风，头痛，咳嗽，痰少等症，舌质红，苔薄，脉数。治疗应首选的方剂是

【答案】C

123.患者症见喉痒咳嗽，痰中带血，口干鼻燥，或有身热，舌质红，少津，苔薄黄，脉数。治疗应首选的方剂是

【答案】A

【解析】患者主症一为鼻燥衄血，见口干咽燥，身热，咳嗽痰少，舌质红，苔薄，脉数；一为咳嗽痰中带血，见口干鼻燥，身热，舌质红，少津，苔薄黄，脉数。皆为燥热伤肺所致动血，辨证为鼻衄热邪犯肺证，选用方剂桑菊饮；咳之血燥热伤肺证选用方剂为桑杏汤。

涉及考点 | 血证的辨证论治

(124~125 题共用备选答案)

- | | |
|------------|-------------|
| A.温化 | B.补虚泻实 |
| C.化湿邪，利小便 | D.清热润燥，养阴生津 |
| E.治火、治气、治血 | |

124.消渴的治疗大法是

【答案】D

125.黄疸的治疗大法是

【答案】C

【解析】消渴的基本病机是阴虚为本，燥热为标，故清热润燥、养阴生津为本病的治疗大法；黄疸的病机关键是湿，由于湿邪困遏脾胃，壅塞肝胆，疏泄失常，胆汁泛溢而发生黄疸，其治疗大法主要为化湿邪，利小便。

涉及考点 | 消渴、黄疸的辨证论治

(126~127 题共用备选答案)

- | | |
|---------|---------|
| A.玉女煎 | B.消渴方 |
| C.丹参饮 | D.人参健脾丸 |
| E.六味地黄丸 | |

126.消渴之中消证，治疗应首选的方剂是

【答案】A

127.消渴之下消证，治疗应首选的方剂是

【答案】E

【解析】消渴分为上、中、下消。上消肺热津伤证治宜清热润肺,生津止渴,用消渴方。中消胃热炽盛证治宜清胃泻火,养阴增液,用玉女煎;气阴亏虚证治宜益气健脾,生津止渴,用七味白术散。下消肾阴亏虚证治宜滋阴固肾,用六味地黄丸;阴阳两虚证治宜滋阴温阳,补肾固涩,用金匱肾气丸。

涉及考点 | 消渴的辨证论治

(128~129 题共用备选答案)

- A.痹痛游走不定,屈伸不利者为
B.关节疼痛,局部灼热红肿
C.肢体关节、肌肉酸楚、重着、疼痛
D.关节疼痛较剧,痛有定处,得热痛减,遇寒痛增

E.关节红肿,疼痛剧烈,入夜尤甚,壮热烦渴

128.行痹的主症是

【答案】A

129.着痹的主症是

【答案】C

【解析】痹证的辨证,一是要辨邪气的偏盛,二是要辨别虚实。临床痹痛游走不定者为行痹,属风邪盛;痛势较甚,痛有定处,遇寒加重者为痛痹,属寒邪盛;关节酸痛、重着、漫肿者为着痹,属湿邪盛;关节肿胀,肌肤焮红,灼热疼痛为热痹,属热邪盛。关节疼痛日久,肿胀局限,或见皮下结节者为痰;关节肿胀,僵硬,疼痛不移,肌肤紫暗或瘀斑等为瘀。

涉及考点 | 痹证的辨证论治

2年 易错考题

1.下列哪项不是时行感冒和普通感冒的鉴别要点

- A.普通感冒病情轻
B.时行感冒发病急
C.普通感冒具有流行性
D.时行感冒具有传染性
E.普通感冒在气候变化时发生率升高

【答案】C

【解析】普通感冒病情较轻,全身症状不重,少有传变,在气候变化时发病率可以升高,但无明显流行特点。时行感冒病情较重,发病急,全身症状显著,具有广泛的传染性、流行性。

涉及考点 | 感冒的病证鉴别

2.外感咳嗽与内伤咳嗽的鉴别,下列哪项无意义

- A.病程的长短
B.起病的缓急
C.疾病的新久
D.咳嗽的多少
E.属实属虚

【答案】D

【解析】外感咳嗽,起病急,病程短,常伴肺卫表证。内伤咳嗽,常反复发作,病程长,多伴其他兼证。

涉及考点 | 咳嗽的辨证论治

3.时行感冒与风热感冒的区别,关键在于

- A.恶寒的轻与重
B.发热的轻与重

- C.有无咽喉肿痛
D.有无流行性
E.是否脉数

【答案】D

【解析】时行感冒由时行病毒引起,具有广泛的传染性和流行性;感冒风热证由外感风热引起,一般呈散发性。两者的最大区别在于有无流行性。

涉及考点 | 感冒的病证鉴别

4.患者,女,65岁。咳喘多年,2天前外感后,症见喘息咳逆,呼吸急促,胸部胀闷,痰多稀薄而带泡沫,色白质黏,头痛,恶寒,口不渴,无汗,舌苔薄白而滑,脉浮紧。治疗应选用的方剂是

- A.苏子降气汤
B.桑白皮汤
C.麻黄汤合华盖散
D.麻杏石甘汤
E.定喘汤

【答案】C

【解析】根据患者症状,诊断为喘证之风寒壅肺证。方剂选择麻黄汤合华盖散治疗。

涉及考点 | 喘证的辨证论治

5.哮病发作的病因病机关键是

- A.宿痰内伏于肺
B.邪客于肺,气道不利
C.痰气相激,气道被阻
D.外邪侵袭,触动伏痰
E.脏腑虚弱,气失所主

【答案】D

【解析】哮病的病理因素以痰为主。发作时的基本病机为“伏痰”遇感引触,痰随气升,气因痰阻,相互搏结,壅塞气道,气道挛急,通畅不利,肺气宣降失常,引动停积之痰,而致痰鸣如吼,气息喘促。

涉及考点 | 哮病的病因病机

6.患者,男,65岁。膏淋病久不已,反复发作,淋出如脂,涩痛不甚,形体日见消瘦,头昏无力,腰膝酸软,舌淡,苔腻,脉细无力。治疗应首选的方剂是

- A.沉香散
B.膏淋汤
C.补中益气汤
D.七味都气丸
E.程氏萆薢分清饮

【答案】B

【解析】患者膏淋病久不已,反复发作,淋出如脂,诊断为膏淋虚证;膏淋日久反复不愈,脾肾两虚,气不固摄,故见淋出如脂,涩痛不甚,形体日见消瘦,头昏无力,腰膝酸软,舌淡等虚证。治宜益肾固涩,方选膏淋汤。

涉及考点 | 淋证的辨证论治

7.治疗黄疸(阳黄)热重于湿证,首选的方剂是

- A.茵陈术附汤
B.大柴胡汤
C.茵陈五苓散
D.茵陈蒿汤
E.龙胆泻肝汤

【答案】D

【解析】茵陈蒿汤具有清热,利湿,退黄之功效。主治湿热黄疸。一身面目俱黄,黄色鲜

明,发热,无汗或但头汗出,口渴欲饮,恶心呕吐,腹微满,小便短赤,大便不爽或秘结,舌红苔黄腻,脉沉数或滑数有力。

涉及考点 | 黄疸的辨证论治

8. 下列哪一项不属于水肿与鼓胀的鉴别要点

- A. 肿胀部位
- B. 小便通利与否
- C. 肿处皮肤的色泽
- D. 肿胀的先后顺序
- E. 腹壁青筋有无暴露

【答案】B

【解析】鼓胀与水肿的鉴别:鼓胀主要为肝、脾、肾受损,气血水互结于腹中。以腹部胀大为主,四肢肿不甚明显。晚期方伴肢体浮肿,每兼见面色青晦,面颈部有血痣赤缕,胁下癥积坚硬,腹皮青筋显露等。水肿主要为肺、脾、肾功能失调,水湿泛滥肌肤。其浮肿多从眼睑开始,继则延及头面及肢体,或下肢先肿,后及全身,每见面色晄白、腰酸倦怠等,水肿较甚者亦可伴见腹水。

涉及考点 | 水肿的鉴别诊断

9. 治疗痿证之肝肾亏损证,应首选的方剂是

- A. 圣愈汤
- B. 虎潜丸
- C. 鹿角胶丸
- D. 补血荣筋丸
- E. 独活寄生汤

【答案】B

【解析】痿证日久,多累及肝肾,阴虚生内热,故肝肾亏损宜滋补肝肾,滋阴清热,用虎潜丸最合适。圣愈汤偏于补气血;鹿角胶丸用于久病阴损及阳;补血荣筋丸治肝衰筋缓;独活寄生汤治风湿痹证。

涉及考点 | 痿证的辨证论治

10. 按痰饮停积的部位分类,饮留胃肠的是

- A. 痰饮
- B. 支饮
- C. 溢饮
- D. 悬饮
- E. 伏饮

【答案】A

【解析】水饮属于阴类,非阳不运,若阳气虚衰,气不化津,则阴邪偏盛,寒饮内停。饮留肠胃,则为痰饮。饮留胁下,则为悬饮。饮留肢体,则为溢饮、聚于胸肺,则为支饮。

涉及考点 | 痰饮的辨证论治

11. 下列哪项不属于胁痛的病理因素

- A. 肝气郁结
- B. 肝阴不足
- C. 瘀血凝滞
- D. 肝胆湿热
- E. 胃气上逆

【答案】E

【解析】病理性质有虚有实,而以实为多。实证中以气滞、血瘀、湿热为主,三者又以气滞为先。虚证多属阴血亏损,肝失所养。一般说来,胁痛初病在气,日久气滞转为血瘀,或气滞血瘀并见。实证日久,化燥伤阴,故临床可见虚实夹杂之证。

涉及考点 | 胁痛的病理病机

12.患者,女,65岁。身体素弱,饮食稍有不慎即呕吐未消化食物,面色晄白,倦怠乏力,四肢不温,便溏,舌淡苔白,脉濡弱。治疗应首选的方剂是

- A.吴茱萸汤
- B.理中汤
- C.黄芪建中汤
- D.苓桂术甘汤
- E.四君子汤

【答案】B

【解析】辨证为呕吐之脾胃阳虚证,治法为温中健脾,和胃降逆。代表方剂选用理中汤加减。

涉及考点 | 胁痛的病理病机

13.患者,男,71岁。平时头痛耳鸣,腰酸,突然发生口眼歪斜,语言不利,口角流涎,手足抽搐,半身不遂,舌质红,苔腻,脉弦细数。其证候是

- A.风痰入络证
- B.风阳上扰证
- C.阴虚风动证
- D.痰浊瘀闭证
- E.痰火瘀闭证

【答案】C

【解析】平时头痛耳鸣,腰酸,突然发生口眼歪斜,舌质红,苔腻,脉弦细数,肝肾阴虚,风阳内动,风痰瘀阻经络,诊断为中风中经络之阴虚风动证。

涉及考点 | 中风的辨证论治

14.治疗中风后遗症半身不遂,气虚血瘀证。应选用的方剂是

- A.天麻钩藤饮
- B.半夏白术天麻汤
- C.镇肝息风汤
- D.补阳还五汤
- E.局方至宝丹

【答案】D

【解析】中风恢复期的分证论治,气虚络瘀证治法应益气养血,化瘀通络,方剂选用补阳还五汤加减。

涉及考点 | 中风的辨证论治

15.患者,男,31岁。发热,咳嗽,胸痛,咳吐腥臭浊痰,甚则脓血相兼,其诊断为

- A.风热咳嗽
- B.痰热咳嗽
- C.肝火犯肺咳嗽
- D.虚热肺痿
- E.肺痈

【答案】E

【解析】患者发热,咳嗽,胸痛,咳吐腥臭浊痰,甚则脓血相兼,诊断为肺痈。

涉及考点 | 肺痈的诊断

16.下列不属于郁证常见病因的是

- A.痰气郁结证
- B.心神失养证
- C.津液亏虚证
- D.肝气郁结证
- E.气郁化火证

【答案】C

【解析】郁证的病因总属情志所伤,发病与肝的关系最为密切,其次涉及心、脾。肝失疏泄、脾失健运、心失所养、脏腑阴阳气血失调是郁证的主要病机,故临床可见肝气郁结证,气郁

化火证,痰气郁结证,心神失养证,心脾两虚证,心肾阴虚证。

涉及考点 | 郁证的辨证

17. 治疗咳嗽,应以治肺为主,还应注意治疗

- | | |
|----------|----------|
| A. 肝、胃、肾 | B. 心、肝、肾 |
| C. 心、脾、肾 | D. 心、肝、脾 |
| E. 肝、脾、肾 | |

【答案】A

【解析】咳嗽的病位在肺,与肝、脾有关,久则及肾。咳嗽除了肺脏本身的病变外,还可因脾虚生痰,痰浊壅肺,肺气上逆发为咳嗽;肝火犯肺,肃降无权,肺气上逆,发为咳嗽;肾虚,肾不纳气,上逆而咳。与心、胃关系不密切。

涉及考点 | 咳嗽的辨证论治

18. 哮病夙根的形成原因是

- | | |
|----------------|--------------|
| A. 禀赋不足,病后体弱 | B. 肝气郁结,气机不畅 |
| C. 过食生冷,寒饮内停 | D. 外感风寒或风热之邪 |
| E. 津液运化失常,凝聚成痰 | |

【答案】E

【解析】哮病的病理因素以痰为主。痰的产生主要由于人体津液代谢失常,凝聚而成,痰伏藏于肺,成为发病的“夙根”。

涉及考点 | 哮病的病机

19. 肺痿的辨证,应首辨的要点是

- | | |
|---------|-------|
| A. 脏腑 | B. 表里 |
| C. 寒热 | D. 虚实 |
| E. 外感内伤 | |

【答案】A

【解析】对于肺痿的辨证,当首先辨病变脏器及病理性质。其病变脏器主要在肺,以肺阴虚为主。久则损及脾肾两脏,肺损及脾,以气阴两伤为主;肺肾两伤,元阴受损,则表现阴虚火旺之象;甚则由气虚而致阳虚,表现阴阳两虚之候。

涉及考点 | 肺痿的辨证要点

20. 患者,女性,61岁。反复发作的气急痰鸣二十余年。现短气息促,动则为甚,吸气不利,咳痰质黏起沫,脑转耳鸣,腰酸腿软,心慌,不耐劳累。五心烦热,颧红,口干,舌质红少苔,脉象细数。其诊断是

- | | |
|----------------|----------------|
| A. 喘证之肺气虚耗证 | B. 哮病发作期之风痰哮证 |
| C. 哮病缓解期之肺肾两虚证 | D. 哮病缓解期之肺脾气虚证 |
| E. 喘证之肾虚不纳证 | |

【答案】C

【解析】患者反复发作气急痰鸣二十余年,诊断为哮病。哮病久发,精气亏乏,肺肾摄纳失常,气不归原,津凝为痰,可见短气息促;动则为甚,吸气不利,咳痰质黏起沫;肾阴亏虚可见五心烦热,颧红,口干,舌质红少苔,脉细数;肾阳亏虚可见畏寒肢冷,面色苍白,舌苔淡白,质胖,脉沉细。辨证为肺肾两虚证,治当补肺益肾,方选生脉地黄汤合金水六君煎加减。

涉及考点 | 哮病的诊断

21. 用于治疗中风中脏腑之阳闭证的方剂是

- A. 天麻钩藤饮
- B. 半夏白术天麻汤合桃仁红花煎
- C. 星萎承气汤
- D. 涤痰汤合用苏合香丸
- E. 羚羊角汤合安宫牛黄丸

【答案】E

【解析】中风中脏腑之阳闭证代表方：羚羊角汤合用安宫牛黄丸。阴闭证代表方：涤痰汤合用苏合香丸。

涉及考点 | 中风的辨证论治

22. 患者,男,43岁。突发黄疸,黄疸迅速加深,其色如金,皮肤瘙痒,高热口渴,胁痛腹满,神昏谵语,烦躁抽搐,或见衄血、便血,肌肤瘀斑,舌质红绛,苔黄而燥,脉弦滑或数。其治法是

- A. 清热通腑,利湿退黄
- B. 利湿化浊运脾,佐以清热
- C. 清热解毒,凉血开窍
- D. 疏肝泄热,利胆退黄
- E. 利湿清热,以除余邪

【答案】C

【解析】根据患者临床表现,诊断为黄疸。湿热疫毒炽盛,故见黄疸色如金黄,皮肤瘙痒,高热口渴;热入营血,内陷心肝,故见胁痛胀满,神昏谵语,烦躁抽搐,或见衄血、便血,肌肤瘀斑;舌质红绛,舌黄而燥,脉弦滑为湿热疫毒炽盛的表现,辨证为疫毒炽盛证,治宜清热解毒,凉血开窍。

涉及考点 | 黄疸的辨证论治

23. 不寐实证,其病位多在

- A. 肝、胆、脾
- B. 心、肝、小肠
- C. 心、肺、大肠
- D. 心、脾、肝
- E. 心、肝、胃

【答案】E

【解析】不寐辨证首分虚实。虚证多属阴血不足,心失所养。实证为邪热扰心次辨病位,病位主要在心,且与肝、胆、脾、胃、肾相关。如急躁易怒而不寐,多为肝火内扰;脘闷苔腻而不寐,多为胃腑宿食,痰热内盛;心烦心悸,头晕健忘而不寐,多为阴虚火旺,心肾不交;面色少华,肢倦神疲而不寐,多属脾虚不运,心神失养;心烦不寐,触事易惊,多属心胆气虚等。

涉及考点 | 不寐的病位

24. 下列各项,不属于肺痈逆证表现的是

- A. 饮食少进
- B. 气喘鼻扇
- C. 脉象缓滑
- D. 音嘎无力
- E. 爪甲青紫带弯

【答案】C

【解析】肺痈溃脓期是病情顺与逆的转折点,逆症表现为:溃后音嘎无力,脓血如败卤,腥臭异常,气喘,鼻扇,胸痛,坐卧不安,饮食少进,身热不退,颧红,爪甲青紫带弯,脉短促或弦急,为肺叶腐败之恶候。

涉及考点 | 肺痈的转归预后

25. 阳明头痛的“引经药”应首选

- A. 葛根、白芷、知母
- B. 羌活、川芎、蔓荆子

C.柴胡、黄芩、川芎

D.藁本、吴茱萸、钩藤

E.细辛、白芷、羌活

【答案】A

【解析】头痛归经不同治疗选用不同的引经药,对发挥药效有重要的意义。选项B用于太阳头痛;选项A用于阳明头痛;选项C少阳头痛;选项D用于厥阴头痛。

涉及考点 | 根据头痛的不同部位选用不同的“引经药”

26.眩晕的证候分类中不包括的是

A.肝阳上亢证

B.肝火上炎证

C.气血两虚证

D.瘀血阻窍证

E.肾精不足证

【答案】B

【解析】眩晕病在清窍,与肝、脾、肾三脏功能失调密切相关。眩晕的证候可分为肝阳上亢证、气血亏虚证、肾精不足证、痰湿中阻证、瘀血阻窍证。肝火上炎证不是其分类。

涉及考点 | 眩晕的辨证论治

27.痫病的辨证,应首先辨别的要点是

A.证候虚实

B.脏腑经络

C.病情轻重

D.外感内伤

E.寒热虚实

【答案】C

【解析】判断本病之轻重要注意两个方面,一是病发持续时间之长短,一般持续时间长则病重,短则病轻;二是发作间隔时间之久暂,即间隔时间短暂则病重,间隔时间长久则病轻。其临床表现的轻重与痰浊之浅深和正气之盛衰密切相关。

涉及考点 | 痫病的辨证论治

28.噎膈与梅核气最主要的鉴别要点是

A.有无进行性消瘦

B.有无吞咽困难

C.有无自觉咽中梗塞不舒

D.有无情志不畅、酒食不节史

E.有无胸骨后不适,呈烧灼感

【答案】B

【解析】二者均见咽中梗塞不舒的症状。噎膈是有形之物瘀阻于食道,吞咽困难。梅核气则为气逆痰阻于咽喉,为无形之气,无吞咽困难及饮食不下的症状。痰气窒塞于咽喉之间,咳之不出,咽之不下,状如梅核,即咽中有梗塞不舒的感觉,无食物哽噎不顺,或吞咽困难,食入即吐的症状。

涉及考点 | 噎膈的病证鉴别

29.便秘之热秘,服药后大便不爽者、治疗宜选用的方剂是

A.麻子仁丸

B.六磨汤

C.青麟丸

D.更衣丸

E.大承气汤

【答案】C

【解析】便秘属热秘者,当泻热导滞,润肠通便,方选麻子仁丸。若兼郁怒伤肝,易怒目赤者,加服更衣丸以清肝通便,若燥热不甚,或药后大便不爽者,可用青麟丸以通腑缓下,若热势

较盛,胃痞燥实坚者,可用大承气汤急下存阴。六磨汤则适用于便秘属气秘者。

涉及考点 | 便秘的辨证论治

30.肺胀的病位在肺,继影响到

- A.心、脾,后期病及于肾
- B.脾、肾,后期病及于心
- C.肝、肾,后期病及于心
- D.肝、脾,后期病友于心
- E.心、肝,后期病及于肾

【答案】B

【解析】病变首先在肺,继则影响脾、肾,后期病及于心、肝。因肺主气,开窍于鼻,外合皮毛,主表卫外,故外邪从口鼻、皮毛入侵,每多首先犯肺。若肺病及脾,子盗母气,脾失健运,则可导致肺脾两虚。肺为气之主,肾为气之根,肺伤及肾。肺与心脉相通,肺气辅佐心脏运行血脉,肺虚治节失职,则血行涩滞,循环不利,血瘀肺脉,肺气更加壅塞,造成气虚血滞,血滞气郁,由肺及心的恶性后果。心阳根于命门真火,肾阳不振,进一步导致心肾阳衰,可呈现喘脱危候。

涉及考点 | 肺胀的病机

31.自觉咽中如物梗塞,吐之不出,吞之不下,但不妨碍进食的病证是

- A.反胃
- B.梅核气
- C.噫气
- D.呃逆
- E.噎膈

【答案】B

【解析】反胃见食后脘腹胀满,朝食暮吐,暮食朝吐。噎膈见吞咽时哽咽不顺,饮食不下,或食入即吐。呃逆症见气逆上冲,喉间呃呃连声,声短而频,不能自止,呃声或高或低,或疏或密,间歇时间不定。梅核气症见自觉咽中如物梗塞,吐之不出,吞之不下,但不妨碍进食。

涉及考点 | 噎膈、梅核气的鉴别诊断

32.癃闭的基本病机是

- A.膀胱气化失调
- B.膀胱气化不利
- C.膀胱气化无权
- D.肾失封藏
- E.肾脏分清泌浊失常

【答案】A

【解析】①《素问》膀胱不利为癃,阐明了膀胱气化失调是癃闭的基本病机。②肾阳不足气化不及州都,则膀胱气化无权,亦可发生癃闭,与肾失封藏,肾脏分清泌浊失常无关。

涉及考点 | 癃闭的病因病机

33.下列各项,不属于淋证病因的是

- A.外感湿热
- B.饮食不节
- C.情志内伤
- D.禀赋不足
- E.瘀浊内停

【答案】E

【解析】①饮食不节:多食辛热肥甘之品,或嗜酒太过,脾胃运化失常,积湿生热,下注膀胱,乃成淋证。②外感湿热:因下阴不洁,秽浊之邪从下侵入人体,上犯膀胱,发为淋证。③情志失调:肝郁化火,气火郁于膀胱,导致淋证。④禀赋不足:肾和膀胱先天畸形。

涉及考点 | 淋证的病因

34. 水肿风水相搏证, 其病位在

- A. 心
- B. 肺
- C. 肝
- D. 脾
- E. 肾

【答案】B

【解析】肺主一身之气, 有主治节, 通调水道, 下输膀胱的作用。风邪犯肺, 肺气失于宣降, 不能通调水道, 风水相搏, 发为水肿。水化于气, 故其标在肺。

涉及考点 | 水肿的病位

第六篇 中医外科学

考情分布图

		2015	2016	2017	2018	2019
中医外科学	中医外科疾病的病因病机	1	0	1	1	1
	中医外科疾病辨证	1	2	1	0	0
	中医外科疾病治法	1	1	1	1	0
	疮疡	2	1	1	2	2
	乳房疾病	2	2	2	1	2
	瘰	1	1	1	1	1
	瘤、岩	1	1	1	1	1
	皮肤及性传播疾病	3	3	3	2	3
	肛门直肠疾病	3	2	2	1	3
	泌尿男性疾病	2	2	3	1	2
	其他外科疾病	1	1	1	1	0
	周围血管疾病	0	1	1	1	1

高频考点必背

1. 发病过程中,由于**风、寒、暑、燥**诸邪毒均能化热生火,故外科疾病发生,尤以“**热毒**”“**火毒**”最常见。
2. 邪正盛衰决定“**邪气盛则实**”“**精气夺则虚**”的证候特性,并直接影响疾病预后与转归。
3. 外来伤害致病的因素有跌仆损伤、沸水、火焰、寒冻及金刃竹木创伤。
4. 局部气血凝滞,营气不从,经络阻塞,以致脏腑功能失和等,是外科疾病总的发病机理,但**阴阳平衡失调**是疾病发生、发展的**根本原因**。
5. **阴阳**是八纲辨证的总纲,也是一切外科疾病辨证的总纲。
6. 阳证**易消、易溃、易敛**,预后多顺(良好);阴证**难消、难溃、难敛**,预后多逆(不良)。
7. 辨肿块结节时应注意**大小、形态、质地、活动度、位置、界限、有无疼痛**及生内容物。
8. **痛**是气血凝滞,阻塞不通的反映。疼痛增剧与减轻又为病势进展与消退的标志。
9. **痒**是因风、湿、热、虫之邪客于皮肤肌表,引起皮肉间气血不和,郁而生微热所致;或因血虚风燥阻于皮肤,肤失濡养,内生虚热而发。
10. 外科内治有**消、托、补**三法。
11. 确认成脓的方法:①**接触法**。②**透光法**。③**点压法**;④**穿刺法**;⑤**B超**。
12. 消法:是运用不同治疗方法和方药,**使初起肿疡得到消散**,是一切肿疡初起的治法总则。适用于尚未成脓的初期肿疡和非化脓性肿块性疾病及各种皮肤性疾病。
13. 托法:是用补益气血和透脓的药物,扶助正气,托毒外出,以免毒邪扩散和内陷的治疗

法则。适用于外疡中期,即成脓期。

14.补法:是用补养药物,恢复其正气,助养其新生,使疮口早日愈合的治疗法则。适用于溃疡后期。凡气血虚弱者,宜补养气血;脾胃虚弱者,宜理脾和胃;肝肾不足者,宜补益肝肾等。但毒邪未尽之时,切勿用补法。

15.手术疗法常用的有切开法、烙法、砭镰法、挑治法、挂线法、结扎法等。

16.其他疗法有引流法、垫棉法、药筒拔法、针灸法、熏法、熨法、热烘疗法、漏渍法、冷冻疗法和激光疗法等。

17.箍围药用于肿疡初期,促其消散;或毒已结聚,促使疮形缩小,趋于局限,早日成脓和破溃;或肿疡破溃,余肿未消,能消肿,截其余毒。

18.掺药包括消散药、提脓去腐药、腐蚀药与平胬药、祛腐生肌药、生肌收口药、止血药、清热收涩药、酊剂、洗剂等。

19.白降丹,适用于溃疡疮口太小,脓腐难去;或肿疡脓成不能穿溃,同时不愿接受手术治疗者;或赘疣、瘰疬。

20.枯痔散一般用于痔疮。

21.平胬丹适用于疮面胬肉突出。

22.回阳玉龙散温阳活血,去腐生肌,适用于阴证溃疡,腐肉难脱,肉芽暗红或腐肉已脱,肉芽灰白,新肉不长者。

23.月白珍珠散、拔毒生肌散用于阳证溃疡。月白珍珠散清热解毒,去腐生肌,用于腐肉脱而未尽,新肉不生,久不收口者。

24.拔毒生肌散拔毒生肌,用于腐肉未脱,常流毒水,疮口下陷,久不生肌者。

25.黄芪六一散、回阳生肌散用于虚证溃疡,脓水清稀,久不收口,前者补气和营生肌,擅治偏气虚,后者回阳生肌,擅治偏阳虚。

26.红灵酒活血、消肿、止痛,用于冻疮、脱疽未溃之时;10%土槿皮酊、复方土槿皮酊杀虫、止痒,适用于鹅掌风、灰指甲、脚湿气等;白屑风酊祛风、杀虫、止痒,适用于面游风。

27.垫棉法是用棉花或纱布折叠成块以衬垫疮部的一种辅助疗法。适用于溃疡脓出不畅有袋脓者;或疮孔窦道形成脓水不易排尽者;或溃疡脓腐已尽,新肉已生,但皮肉一时不能黏合者。

28.针灸法包括针法与灸法。适用于瘰疬、乳痈、乳癖、湿疮、瘾疹、蛇串疮、脱疽、内痔术后疼痛、排尿困难等。

29.疔病好发于项后发际、背部、臀部。

30.疔的特点与种类:其特点是疮形虽小,但根脚坚硬,状如钉钉,病情变化迅速,易毒邪走散。发于颜面部的疔疮,易走黄而有生命危险;发于手足部的疔疮,易损筋伤骨而影响功能。

31.痈的特点:局部光软无头,红肿疼痛(少数初起皮色不变),结块范围多在6~9 cm左右,发病迅速,易肿、易脓、易溃、易敛,或伴恶寒、发热、口渴等症状。

32.发是病变范围较痈大的急性化脓性疾病。其特点是初起无头、红肿蔓延成片,中央明显,四周较淡,边界不清,灼热疼痛,有的3~5日后中央色褐腐溃,周围湿烂,全身症状明显。

33.常见的发有生于咽喉处的锁喉痈、生于臀部的臀痈、生于手背部的手发背、生于足背的足发背。

34.丹毒有不同的病名,如生于躯干部的内发丹毒,发于头面部的抱头火丹,发于小腿足部

的**流火**,多生于新生儿臀部的**赤游丹毒**等。

35.丹毒以血热火毒为患。发于头面部者,多夹风热;发于胸腹腰胯部者,多夹肝脾郁火;发于下肢者,多夹湿热;发于新生儿者,多有胎热火毒。

36.确定一个肿块的性质,还需要结合年龄、病史及其他辅助检查方法。触诊的正确性取决于**经验、手感、正确的检查方法**等。

37.乳痈治疗当以消为贵。郁滞者以通为主,成脓者以彻底排脓为要。对并发脓毒败血症者,及时采用中西医结合综合疗法。

38.乳癖特点是单侧或**双侧乳房疼痛**并出现**肿块**,乳痛和肿块**与月经周期及情志变化密切相关**。乳房肿块**大小不等,形态不一,边界不清,质地不硬,活动度好**。本病好发于**25~45岁的中青年妇女**

39.乳核特点是**好发于20~25岁青年妇女**,乳中**结核**,形如**丸卵**,**边界清楚,表面光滑,推之活动**。

40.乳岩特点是乳房部出现**无痛、无热、皮色不变而质地坚硬的肿块,推之不移**,表面不光滑,**凹凸不平**,或乳头溢血,晚期溃烂,**凹如泛莲**。是女性最常见的**恶性肿瘤**之一。

41.肉瘿临床特点是颈前喉结一侧或两侧结块,柔韧而圆,**如肉之团**,随**吞咽动作而上下移动**,发展缓慢。好发于青年女性及中年人。

42.肉瘿一般多采用内治法,以**理气解郁、化痰软坚**为主。

43.瘰疬是瘰疬病中一种急性炎症性疾患。其特点是**结喉两侧结块**,色红灼热,疼痛肿胀,甚而化脓,常伴有**发热、头痛**等症状。

44.瘰疬相当于西医的**急性甲状腺炎、亚急性甲状腺炎**。

45.辅助检查:急性期,白细胞总数及中性粒细胞增高,**甲状腺超声波探测**有助于诊断瘰疬。

46.坚硬如石不可移动者,称为石瘿。其特点是结喉两侧结块,坚硬如石,高低不平,推之不移。石瘿为恶性肿瘤,一旦确诊,宜**早期手术切除**。

47.脂瘤又称**粉瘤**。临床特点是皮肤间出现圆形质软的肿块,中央有粗大毛孔,可挤出有臭味的粉渣样物。肿块呈**圆形或椭圆形,边界清楚,与皮肤无粘连**,表皮紧张,中央导管开口处呈青黑色小孔,**挤压后可有粉渣样内容物溢出**,有臭味。

48.血管瘤是指体表血络扩张,纵横丛集而形成的肿瘤。特点是病变局部色泽鲜红或暗紫,或呈局限性柔软肿块,**边界不清,触之如海绵状**。常见的有毛细血管瘤和海绵状血管瘤。

49.毛细血管瘤多在**出生后1~2个月内**出现,部分在**5岁左右自行消失**,表现为在皮肤上有红色丘疹或小的红斑,逐渐长大,界限清楚,大小不等,质软可压缩,色泽为鲜红色或紫红色,**压之可褪色,抬手复原**。

50.海绵状血管瘤表现为质地柔软**似海绵**,常呈局限性半球形、扁平或高出皮面的隆起物,肿物**有很大压缩性**。

51.对于浅表较小的血管瘤可采用**冷冻**方法治疗。对于范围较大的血管瘤也可应用**放射**治疗。

52.肉瘤是发于皮里膜外、由脂肪组织过度增生而形成的**良性肿瘤**。特点是软似棉,肿似馒,皮色不变,不紧不宽,**如肉之隆起**。

53.蛇串疮特点:皮肤上出现红斑、水疱或丘疱疹,累累如串珠,**排列成带状,沿一侧周围神经分布区出现**,局部刺痛或伴淋巴结肿大。多数患者愈后很少复发,极少数患者可多次发病。

54.发于手背、手指、头皮等处者,称千日疮、疣目、枯筋箭或癩子;发于颜面、手背、前臂等处者,称扁瘡;发于胸背部有脐窝的赘疣,称鼠乳;发于足跖部者,称跖疣;发于颈周围及眼睑部位,呈细软丝状突起者,称丝状疣或线瘡。

55.白秃疮相当于西医的白癬。病发根部包绕有白色鳞屑形成的菌鞘。自觉瘙痒。发病部位以头顶、枕部居多,但发缘处一般不被累及。青春期可自愈,秃发也能再生,不遗留疤痕。

56.肥疮特征有黄癬痂堆积,癬痂呈蜡黄色,肥厚,富黏性,边缘翘起,中心微凹,上有毛发贯穿,质脆易粉碎,有特殊的鼠尿臭。当病变痊愈后,则在头皮留下广泛、光滑的萎缩性疤痕。

57.圆癬初起为丘疹或水疱,逐渐形成边界清楚的钱币形红斑,其上覆盖细薄鳞屑。病灶中央皮疹消退,呈自愈倾向,但向四周蔓延,有丘疹、水疱、脓疱、结痂等损害。

58.花斑癬本病常发于多汗体质青年,可在家庭中互相传染。

59.圆癬皮损有糜烂痒痛者,宜选用青黛膏外涂。

60.油风是一种头发突然发生斑块状脱落的慢性皮肤病。因头发脱落之处头皮光亮而得名,又称鬼舐头、鬼剃头。

61.接触疥疮患者后,用肥皂水洗手。患者所用衣服、被褥、毛巾等均需煮沸消毒,或在阳光下充分曝晒,以便杀灭疥虫及虫卵。

62.湿疮相当于西医的湿疹。皮损对称分布,多形损害,剧烈瘙痒,有渗出倾向,反复发作,易成慢性等。根据病程可分为急性、亚急性、慢性三类。

63.湿疮的发生与心、肺、肝、脾四经的病变有密切的关系。

64.慢性湿疮可外搽青黛膏、5%硫黄软膏、10%~20%黑豆馏油软膏。

65.药毒总由禀赋不耐,邪毒侵犯所致。

66.急性湿疮以丘疱疹为主,炎症明显,易渗出;慢性湿疮以苔藓样变为主,易反复发作。

67.牛皮癣特点:皮损多为圆形或多角形的扁平丘疹融合成片,剧烈瘙痒,搔抓后皮损肥厚,皮沟加深,皮嵴隆起,极易形成苔藓样变。

68.内痔是发生于齿线上,由直肠上静脉丛瘀血、扩张、屈曲所形成的柔软静脉团,好发于膀胱截石位3、7、11点处,以便血、坠胀、肿块脱出为主要临床表现。

69.外痔是发生于齿线下,由痔外静脉丛扩大、曲张,或痔外静脉丛破裂,或反复发炎纤维增生所形成的疾病。以自觉坠胀、疼痛和有异物感为主要临床表现。

70.混合痔是直肠上、下静脉丛瘀血、扩张、屈曲、相互沟通吻合而形成的静脉团。其位于齿线上下同一点位,表面分别为直肠黏膜和肛管皮肤所覆盖。

71.内痔分期:

(1) I期内痔:无明显自觉症状,痔核小,便时粪便带血,或滴血,量少,无痔核脱出,镜检痔核小,质软,色红。

(2) II期内痔:周期性、无痛性便血,呈滴血或射血状,量较多,痔核较大,便时痔核能脱出肛外,便后能自行还纳。

(3) III期内痔:便血少或无便血,痔核大,呈灰白色,便时痔核经常脱出肛外,甚至行走、咳嗽、喷嚏、站立时也会脱出肛门,不能自行还纳,须用手托、平卧休息或热敷后方能复位。

(4) IV期内痔:平时或腹压稍大时痔核即脱出肛外,手托亦常不能复位,痔核经常位于肛外,易感染,形成水肿、糜烂和坏死,疼痛剧烈。

72.结扎术:在痔核深部用粗线贯穿结扎,使痔核缺血坏死而脱落,以达到痊愈的目的。单纯结扎法适应于I、II期内痔。贯穿结扎法适应于II、III期内痔,对纤维型内痔更为适宜。

73.直肠脱垂可分为三度:

(1)一度脱垂:为直肠黏膜脱出,脱出物淡红色,长3~5 cm,触之柔软,无弹性,不易出血,便后可自行回纳。

(2)二度脱垂:为直肠全层脱出,脱出物长5~10 cm,呈圆锥状,淡红色,表面为环状而有层次的黏膜皱襞,触之较厚,有弹性,肛门松弛,便后有时需用手回复。

(3)三度脱垂:为直肠及部分乙状结肠脱出,长达10 cm以上,呈圆柱形,触之很厚,肛门松弛无力。

74.中国九分法将全身体表面积分为11个9等份。成人头、面、颈部为9%;双上肢为2×9%;躯干前后包括外阴部为3×9%;双下肢包括臀部为5×9%+1%=46%。

75.神经毒者有银环蛇、金环蛇、海蛇,血循毒者有蝥蛇、尖吻蝥蛇、竹叶青蛇和烙铁头蛇,混合毒者有眼镜蛇、眼镜王蛇和蝥蛇。

76.阑尾穿孔并发弥漫性腹膜炎伴有肠麻痹者,应行胃肠减压,目的在于抽吸上消化道所分泌的液体,以减轻腹胀,并为灌入中药准备条件。

77.脱疽是指发于四肢末端,严重时趾(指)节坏疽脱落的周围血管疾病,又称脱骨疽。

临床一般可分为三期。

一期(局部缺血期):患肢末端发凉,怕冷,麻木,酸痛,间歇性跛行。

二期(营养障碍期):患肢发凉,怕冷,麻木,坠胀疼痛,间歇性跛行加重,并出现静息痛。

三期(坏死期或坏疽期):坏疽可先为一趾或数趾,逐渐向上发展,合并感染时,足趾紫红肿胀、溃烂坏死,呈湿性坏疽,或足趾发黑,干瘪,呈干性坏疽。

78.脱疽的辅助检查是肢体动脉彩色多普勒超声、血流图、甲皱微循环、计算机扫描血管三维成像(CTA)、动脉造影等影像学检查及血脂、血糖等实验室检查,可以明确脱疽的诊断,并有助于鉴别诊断,了解病情严重程度。

5年 历年真题

1.湿邪所致外科疾病多发于人体的部位是

- A.上部
- B.中部
- C.胸部
- D.背部
- E.下部

【答案】E

【解析】湿性趋下,重浊黏腻,冒雨涉水或居处潮湿均可感受,外科疾病发于身体下部者多与湿邪有关。

涉及考点 | 外感六淫致病

2.尿石症患者小腹痛,尿流突然中断,尿频,尿急,尿痛,小便混赤,口干欲饮,舌红,苔黄腻,脉弦数。治疗应首选的方剂是

- A.金铃子散
- B.石韦散
- C.化坚二陈汤
- D.三金排石汤
- E.济生肾气丸

【答案】D



配套名师高清视频

【解析】 湿热蕴结证主症：腰痛或小腹痛，或尿流中断，尿频，尿急，尿痛，舌红苔黄腻，脉弦数。治法为清热利湿，通淋排石。方药为三金排石汤加减。

涉及考点 | 尿石症湿热蕴结证的治法方药

3. 下列属于外科特殊之毒的是

- A. 红丝疔
- B. 失荣
- C. 药毒
- D. 水火烫伤
- E. 冻伤

【答案】 C

【解析】 特殊之毒包括虫毒、蛇毒、疯犬毒、药毒、食物毒和疫毒。选项 A 因皮肤破损感染毒邪、内有火毒凝聚。选项 B 病因为情志内伤、痰瘀脏毒凝结。选项 D、E 属外来伤害。

涉及考点 | 感受特殊之毒致病

4. “痛无定处，忽彼忽此，走注甚速”，其疼痛的原因是

- A. 风痛
- B. 湿痛
- C. 痰痛
- D. 热痛
- E. 化脓痛

【答案】 A

【解析】 痛无定处，忽彼忽此为风痛。选项 B 为痛而酸胀，肢体沉重，按之出现可凹水肿或见糜烂流滋。选项 C 疼痛轻微，或隐隐作痛，皮色不变，压之酸痛。选项 D 皮色焮热疼痛，遇冷则减。选项 E 痛势急胀，痛无止时，如同鸡啄，按之中软应指。

涉及考点 | 辨痛

5. 外感六淫中，属于暑邪的致病特性的是

- A. 发病迅速，来势猛击，焮红灼热
- B. 热轻则痒，热甚则痛，热胜则肉腐
- C. 肿势散漫，痛无定处，不红不热
- D. 其性趋下，重浊黏腻，酸胀沉重
- E. 肿势宣浮，痛无定处，走注甚速

【答案】 B

【解析】 暑邪的致病特性是热轻则痒，热甚则痛，热胜则肉腐。

涉及考点 | 暑邪的致病特性

6. 下列各项，属外科辨别阴证、阳证要点的是

- A. 有无麻木
- B. 有无脓液
- C. 有无出血
- D. 有无灼热
- E. 有无瘙痒

【答案】 D

【解析】 外科辨别阴证、阳证要点是有无灼热。

涉及考点 | 外科辨别阴证、阳证

7. 外科疾病辨证的总纲是

- A. 脏腑
- B. 经络
- C. 气血
- D. 阴阳
- E. 局部

【答案】 D

【解析】 外科疾病辨证的总纲是阴阳。

涉及考点 | 外科疾病辨证的总纲

8. 患者小便频数黄赤 3 年,尿道灼热涩痛,排尿不畅,时有点滴不通,小腹胀满,大便干燥,口苦口黏,舌暗红,苔黄腻,脉滑数。B 超示前列腺 6.5 cm×5.5 cm×5 cm,光滑无结节。其治法是

- A. 清热利湿,消癥通闭
- B. 补脾益气,温肾利尿
- C. 行气活血,通窍利尿
- D. 滋补肾阴,通窍利尿
- E. 温补肾阳,通窍利尿

【答案】A

【解析】湿热蕴结证主症:尿频,尿急,尿痛,尿道有灼热感,排尿终末或大便时偶有白浊,苔黄腻,脉滑数。治法为清热利湿。

涉及考点 | 尿石症湿热蕴结证治法

9. 脓液不多且位于组织深部时,应采用的方法是

- A. 推拿法
- B. 接触法
- C. 穿刺法
- D. 透光法
- E. 点压法

【答案】C

【解析】确认成脓方法有接触法、透光法、点压法、穿刺法、B 超。排除选项 A、B。选项 C 适用于脓液不多且位于组织深部的辨脓。透光法适用于指、趾部甲下的辨脓。选项 E 适用于在指(趾)部,当病灶处脓液很少的情况下的辨脓。

涉及考点 | 辨脓

10. 患者,男,70 岁。进行性排尿困难 2 年。症见精神不振,面色晄白,畏寒喜暖,腰膝冷,夜尿 3~4 次/日,舌苔薄白,脉沉细。其证候是

- A. 湿热下注,膀胱涩滞
- B. 中气下陷,膀胱失约
- C. 肾阴不足,水液不利
- D. 肾阳不足,气化无权
- E. 下焦蓄血,瘀阻膀胱

【答案】D

【解析】肾阳虚损证主症:多见于中年人,排尿淋漓,腰膝酸软。阳痿早泄,形寒肢冷。

涉及考点 | 慢性前列腺炎肾阳虚损证候特征

11. 烧伤面积的计算按中国九分法,双上肢面积占

- A. 9%
- B. 18%
- C. 27%
- D. 36%
- E. 45%

【答案】B

【解析】中国九分法将全身体表面积分为 11 个 9 等份。成人头、面、颈部为 9%;双上肢为 2×9%;躯干前后包括外阴部为 3×9%;双下肢包括臀部为 5×9%+1%=46%。

涉及考点 | 烧伤面积的计算方法

12. 患者,男,27 岁。左眉上出现一坚硬肿块,约 1 cm×1 cm,中有一粟粒样脓头,坚硬根深,如钉丁之状,疼痛剧烈,左上眼睑肿胀明显,不能睁眼,伴发热头痛。其诊断是

- A. 痈
- B. 发
- C. 疔
- D. 疔疮

E.有头疽

【答案】D

【解析】选项 A 疔的特点是局部光软无头,红肿疼痛,结块范围多在 6~9 cm 左右。选项 B 发特点是初起无头、红肿蔓延成片,中央明显,四周较淡,边界不清,灼热疼痛。选项 C 疖的特点是肿势局限,范围多在 3 cm 左右,突起根浅,色红、灼热、疼痛,易脓、易溃、易敛。选项 D 疔疮好发于面部和指端,本病初起状如粟粒,色或黄或紫,或起脓水疱、脓疱,根结坚硬如钉,自觉麻痒而疼痛轻微,继则红肿灼热,疼痛增剧,多有寒热。选项 E 好发于项后、背部等皮肤厚韧之处。

涉及考点 | 颜面部疔疮的临床表现

13.创面边缘整齐,坚硬削直而如凿成,基底部高低不平,有稀薄臭秽分泌物。其溃疡属于

A.压迫性溃疡

B.麻风性溃疡

C.疮痍性溃疡

D.梅毒性溃疡

E.岩性溃疡

【答案】D

【解析】选项 A 发生于人体易摩擦的部位,如臀、背、足跟等处,疮面坏死不易脱落或疮口凹陷甚深,肉色不鲜,日久不易愈合。选项 B 初期皮肤暗紫,很快变黑并坏死,滋水、液化、腐烂,脓液有臭味,可深及筋膜、肌肉、骨膜。多见于褥疮。选项 C 疮口多呈凹陷形或潜行空洞或漏管,创面肉色不鲜,脓水清稀,并夹有败絮状物,疮口愈合缓慢或反复溃破,经久难愈。选项 D 创面边缘整齐,坚硬削直而如凿成,基底部高低不平,有稀薄臭秽分泌物。选项 E 疮面多呈翻花如岩穴,有的在溃疡底部见有珍珠样结节,内有紫黑坏死组织,渗流血水。

涉及考点 | 梅毒性溃疡

14.疮面呈翻花如岩穴,在溃疡底部见有珍珠样结节,内有坏死组织,渗流血水,伴腥臭味。其溃疡属于

A.麻风性溃疡

B.压迫性溃疡

C.梅毒性溃疡

D.岩性溃疡

E.疮痍性溃疡

【答案】D

【解析】选项 A 呈穿凿形,常可深及骨部,并发出腐臭气味。选项 B 初期皮肤暗紫,很快变黑并坏死,滋水、液化、腐烂,脓液有臭味,可深及筋膜、肌肉、骨膜。多见于褥疮。选项 C 其边缘削直而如凿成或略微内凹,基底高低不平。选项 D 疮面多呈翻花如岩穴,有的在溃疡底部见有珍珠样结节,内有紫黑坏死组织,渗流血水。选项 E 疮口多呈凹陷形或潜行空洞或漏管,创面肉色不鲜,脓水清稀,并夹有败絮状物,疮口愈合缓慢或反复溃破,经久难愈。

涉及考点 | 辨溃疡

15.中医外科内治法中,温阳托毒法的代表方

A.透脓散

B.托里消毒散

C.神功内托散

D.右归丸

E.桂附八味丸

【答案】C

【解析】选项 A 是透托法的代表方。选项 B 是益气托毒法的代表方。选项 C 是温阳托毒法的代表方。选项 D、E 是补益助阳法的代表方。所有本题选 B。

涉及考点 | 内托法的代表方剂

16. 肿疡毒势方盛, 正气已虚。治疗应首选的方剂是

- A. 透脓散
- B. 托里消毒散
- C. 逍遥散
- D. 四物汤
- E. 四君子汤

【答案】B

【解析】肿疡毒势方盛, 正气已虚者首选托里消毒散。

涉及考点 | 托里消毒散

17. 患者, 女, 26岁。患腿痛1周, 溃腐3天, 脓腐稠厚且多, 不易脱落。外用掺药应首选

- A. 青黛散
- B. 八二丹
- C. 红灵丹
- D. 八宝丹
- E. 三石散

【答案】B

【解析】痛的外用掺药应首选八二丹。

涉及考点 | 药物应用

18. 蛇咬伤后立刻用绳子在伤口上方超过1个关节结扎的目的是

- A. 以防邪毒内陷
- B. 破坏蛇毒
- C. 促进局部排毒
- D. 以防创口闭合
- E. 避免局部感染

【答案】A

【解析】毒蛇咬伤后, 应立即用柔软的绳子或布袋在伤口上方超过1个关节结扎, 结扎松紧度以能阻断淋巴液和静脉血的回流但不妨碍动脉血为宜, 故目的是防止邪毒内陷。

涉及考点 | 毒蛇咬伤的治疗措施

19. 疮疡的半阴半阳证应选用的外用药物是

- A. 冲和膏
- B. 太乙膏
- C. 阳和解凝膏
- D. 咬头膏
- E. 玉露膏

【答案】A

【解析】选项A适用于半阴半阳证。选项B性偏清凉, 适用于阳证疮疡, 为肿疡、溃疡通用方。选项C性偏温热, 适用于阴证疮疡未溃者。选项D具有腐蚀性, 功能蚀破疮头, 适用于肿疡脓成, 不能自破, 以及患者不愿接受手术切开排脓者。选项E适用于阳证疮疡。

涉及考点 | 油脂的临床应用

20. 乳房部脓肿切开引流正确的切口选择是

- A. 乳晕旁弧形切口
- B. 乳晕处放射状切口
- C. 乳房下缘弧形切口
- D. 以乳头为中心弧形切口
- E. 以乳头为中心放射状切口

【答案】E

【解析】成脓期局部按之有波动感或经穿刺抽脓抽得脓液者, 应及时切开引流。一般采用与乳头方向呈放射状的切口, 切口位置选择脓肿稍低的部位, 切口长度与脓腔基底的大小基本一致, 使引流通畅不致袋脓, 但需避免手术损伤乳络形成乳漏。而乳晕部的浅表脓肿、乳房后

的脓肿或乳房周边脓肿,则可在乳晕边缘或乳房周边作弧形切口。若脓腔较大者,必要时可在脓腔最低部位作对口引流。脓肿小而浅者可用针吸穿刺抽脓。

涉及考点 | 切开法的具体应用

21. 下列各项中不是典型血瘀为病的是

- A. 白疔
- B. 痈肿
- C. 脱疽
- D. 漆疮
- E. 肾岩

【答案】D

【解析】漆疮是皮肤接触漆等外界刺激物后与接触部位引起的皮肤炎症反应性皮肤病。与血瘀无关。

涉及漆疮的概念

22. 溃疡脓腐已尽,新肉已生,但皮肉一时不能黏合者,治疗应选用

- A. 结扎法
- B. 箍围法
- C. 针灸法
- D. 垫棉法
- E. 引流法

【答案】D

【解析】选项 A 适用于瘤、赘疣、痔、脱疽等病,以及脉络断裂引起的出血之症。选项 B 均用于外疡初起、成脓及溃后,肿势散漫不聚,而无集中之硬块者。选项 C 针灸法:针刺适用于瘰疬、乳痈、乳癖、湿疮、瘾疹、蛇串疮、脱疽、内痔术后疼痛、排尿困难等。灸法适用于肿疡初起坚肿,特别是阴寒毒邪凝滞筋骨,而正气虚弱,难以起发,不能托毒外达者;或溃疡久不愈合,脓水稀薄,肌肉僵化,新肉生长迟缓者。选项 D 适用于溃疡脓出不畅有袋脓者;或疮孔窦道形成脓水不易排尽者;或溃疡脓腐已尽,新肉已生,但皮肉一时不能黏合者。选项 E:①药线引流适用于溃疡疮口过脓水不易排出者;或已成瘰管、窦道者。②导管引流适用于附骨疽、流痰、流注等脓腔较深、脓液多且不易畅流者。③扩创引流适用于痈、有头疽溃后有袋脓者,瘰疬溃后形成空腔者,脂瘤继发感染化脓时。

涉及考点 | 垫棉法的适应证

23. 蛇眼疔的成脓时间是

- A. 2~3 天
- B. 10 天左右
- C. 7~10 天
- D. 3~5 天
- E. 2 周

【答案】A

【解析】蛇眼疔初起多局限于手指甲一侧边缘的近端处,有轻微的红肿疼痛,一般 2~3 天即成脓,可在指甲背面透现一点黄色或灰白色,或整个甲身内有脓液。待出脓后即肿退痛除,迅速愈合;严重者脓出不畅,甲下溃空或有赘肉突出,甚至指(趾)甲脱落。

涉及考点 | 手足部疔疮的临床表现

24. 哺乳期乳房疼痛有肿块,按之痛甚。首先考虑的诊断是

- A. 乳癖
- B. 乳痈
- C. 乳癌
- D. 乳核
- E. 乳癆

【答案】B

【解析】乳痈多见于产后3~4周的哺乳期妇女。

涉及考点 | 乳痈

25. 发生在肌肤浅表部位、范围较小的急性化脓性疾病是

- A. 痈
- B. 疔
- C. 疖
- D. 有头疽
- E. 无头疽

【答案】C

【解析】疖是指发生在肌肤浅表部位、范围较小的急性化脓性疾病。痈是一种发于皮肉之间的急性化脓性疾病。疔是一种发病迅速而危险性较大的急性化脓性疾病。以其形小根深坚硬,如钉钉之状而得名。有头疽是一种发于肌肤间的急性化脓性疾患。

涉及考点 | 疖的概念

26. 下列各项不属于乳痈外治法初期的是

- A. 鲜菊花捣烂外敷
- B. 金黄散外敷
- C. 乳房按摩
- D. 及时切开排脓
- E. 局部外敷

【答案】D

【解析】乳痈外治法初期未成脓,因此不包括切开排脓。

涉及考点 | 乳痈初期外治法



配套名师高清视频

27. 治疗颈痈初起应选用的方剂是

- A. 牛蒡解肌汤
- B. 黄连解毒汤
- C. 仙方活命饮
- D. 普济消毒饮
- E. 五味消毒饮

【答案】A

【解析】颈痈初起多为风热痰毒证,治法为散风清热,化痰消肿。用牛蒡解肌汤或银翘散加减。

涉及考点 | 颈痈的治疗

28. 股肿湿热下注证,证见发病较急,下肢粗肿,局部发热,发红,疼痛,活动受限,舌质红,苔黄腻,脉弦滑。选方为

- A. 活血通脉汤
- B. 四妙勇安汤
- C. 参苓白术散
- D. 大黄牡丹汤
- E. 附子薏苡仁汤

【答案】B

【解析】股肿内治常见3个证型。湿热下注证治宜清热利湿,活血化瘀,方药为四妙勇安汤加味。血脉瘀阻证治宜活血化瘀,通络止痛,方药为活血通脉汤加减。气虚湿阻证治宜益气健脾,祛湿通络,方药为参苓白术散加减。选项A、C、D、E均排除,所以本题选B。

涉及考点 | 股肿的辨证论治

29. 下列哪项不是乳岩肿块的特点

- A. 无痛无热
- B. 皮色不变
- C. 表面光滑
- D. 质地坚硬
- E. 推之不移

【答案】C

【解析】初期肿块小,质地硬,表面不甚光滑,与周围组织分界不清,不宜被推动。肿块逐渐增大时,局部皮肤往往凹陷,乳房缩小变硬,乳头抬高内缩,同侧腋淋巴结变硬。发病至晚期,则肿块大且坚硬如石,表面凹凸不平,推之不移,皮肤呈橘皮样,甚则破溃形成溃疡。

涉及考点 | 乳岩的诊断

30.患者,女,50岁。乳房局部可见一肿块,皮色不变,质硬而边界不清,性情急躁,胸闷胁胀,苔薄,脉弦。治疗应首选的方剂是

- A.银花甘草汤
B.逍遥散合桃红四物汤
C.丹栀逍遥散
D.神效瓜蒌散合开郁散
E.二仙汤合开郁散

【答案】D

【解析】乳房局部可见一肿块,皮色不变,质硬而边界不清,可诊断为乳岩,好发于40~60岁。其人肝郁气滞,脾失健运,痰湿内生,以致气郁痰湿交阻乳络,故乳房肿块,皮色不变,质地坚硬,边界不清;肝失疏泄,故性情急躁;肝郁气滞,故胸闷胁胀;舌淡、苔薄、脉弦均为肝郁气滞之象。治法为疏肝解郁,化痰散结。方药为神效瓜蒌散合开郁散加减。

涉及考点 | 乳岩的辨证分型治疗

31.患者,女,19岁。半月前无意中发现颈部粗大,无异常不适,颈部呈弥漫性肿大,边缘不清,皮色不变,无触痛,并可扪及数个大小不等的结节,随吞咽动作而上下移动。具体诊断是

- A.气瘰
B.石瘰
C.瘰疬
D.肉瘰
E.颈痈

【答案】A

【解析】选项A气瘰,肿块柔软无痛,可随喜怒而消长。选项B石瘰,即甲状腺癌,特点是喉结两侧结块,坚硬如石,高低不平,推之不移。选项C瘰疬,喉结两侧肿块,色红灼热,疼痛肿胀,甚而化脓。选项D肉瘰,即甲状腺良性肿瘤,无痛,发展缓慢,随吞咽上下移动。选项E颈痈,多见于儿童,冬春易发,初起时局部肿胀、灼热、疼痛而皮色不变,结块边界清楚,具有明显的风温外感症状,相当于颈部急性化脓性淋巴结炎。

涉及考点 | 气瘰的临床表现

32.下列各项中不属肉瘰特点的是

- A.如肉之团
B.发展缓慢
C.柔韧而圆
D.漫肿质软
E.结喉一侧或两侧结块

【答案】D

【解析】肉瘰是瘰疬中常见的一种,其临床特点是颈前喉结一侧或两侧结块,柔韧而圆,如肉之团,随吞咽运动上下移动,发展缓慢,好发于青年女性及中年人。

涉及考点 | 肉瘰的特点

33.患者,女,27岁。发现颈前部右侧结块半月,自觉作胀。检查:肿块约有1.5 cm×1.5 cm,边界清,表面光滑,柔韧而圆,随吞咽上下移动,无压痛。其诊断是

- A.气瘰
B.肉瘰
C.瘰疬
D.颈痈

E.石瘿

【答案】B

【解析】选项A气瘿，肿块柔软无痛，可随喜怒而消长。选项B肉瘿，即甲状腺良性肿瘤，无痛，发展缓慢，随吞咽上下移动。选项C瘰疬，喉结两侧肿块，色红灼热，疼痛肿胀，甚而化脓。选项D颈痛，多见于儿童，冬春易发，初起时局部肿胀、灼热、疼痛而皮色不变，结块边界清楚，具有明显的风温外感症状，相当于颈部急性化脓性淋巴结炎。选项E石瘿，即甲状腺癌，特点是喉结两侧结块，坚硬如石，高低不平，推之不移。

涉及考点 | 肉瘿的特点

34.下列各项，不属于瘰疬特征的是

A.微有灼热

B.皮色不变

C.颈中两侧结块

D.疼痛牵引至耳后枕部

E.容易化脓

【答案】B

【解析】瘰疬特点是结喉两侧结块，色红灼热，疼痛肿胀，甚而化脓，相当于西医的急性甲状腺炎、亚急性甲状腺炎。

涉及考点 | 瘰疬特点

35.患者，男，27岁。结喉两侧局部见肿块，疼痛明显，常牵扯颌下、耳后或枕部，拒按，伴恶寒发热、头痛、口渴、咽干，舌红苔薄黄，脉浮数或滑数。治疗应首选的方剂是

A.牛蒡解肌汤

B.柴胡疏肝散

C.四海疏郁丸

D.海藻玉壶汤

E.逍遥散

【答案】A

【解析】风热客于肺胃，灼津为痰，积热扶痰上壅，蕴结于结喉，故颈部结块；风热痰凝，蕴阻经络，气血运行不畅，故结块疼痛；毒热炽盛，故见寒战高热、咽干、脉滑数等热象；苔薄黄、脉浮数均为风热上壅之象。治法为疏风清热化痰。方用牛蒡解肌汤加减。

涉及考点 | 瘰疬的辨证论治

36.患者，女，48岁。颈前肿物，生长迅速，质地较硬，轻度疼痛，表面不平，推之不动，声音嘶哑，随吞咽活动减弱，同位素¹³¹I扫描显示为冷结节，应首选的治疗措施是

A.中药外敷

B.中药内服

C.中药内服、外敷

D.内服、外敷、熏洗

E.手术治疗

【答案】E

【解析】根据患者临床表现：颈前肿物，生长迅速，质地较硬，轻度疼痛，表面不平，推之不动。再结合甲状腺同位素¹³¹I扫描显示为冷结节，可初步诊断为石瘿。石瘿为恶性肿瘤，一旦确诊，宜早期手术切除。

涉及考点 | 石瘿的治疗原则

37.患者，男，45岁。左臂内侧有一肿块，呈半球形，暗红色，质地柔软，状如海绵，压之缩小。应首先考虑的是

A.气瘤

B.脂瘤

C.筋瘤

D.血管瘤

E.肉瘤

【答案】D

【解析】选项 A 是以皮肤间发生单个或多个柔软结核,按之凹陷,放手凸起,状若有气,皮色如常或褐色斑为主要表现的肿瘤性疾病。选项 B 是瘤的一种,又名粉瘤。多因痰凝气结而生,常发于头面、项背、臀部等处,小的似豆,大的如鸡蛋,生长缓慢,软而不硬,皮色淡红,推之可移动,顶端常有稍带黑色的小口,可挤压出有臭味的豆腐渣状物质。选项 C 以发于下肢,色暗红、温度稍高、青筋垒垒,盘曲成团块,如蚯蚓聚结为主要表现的静脉曲张性疾病。选项 D 以病变局部色泽鲜红或暗紫,或局限以柔软肿块,边界不清,触之如海绵状为主要表现的瘤病。选项 E 为湿痰与气血凝结所致,多少不一,大小不定,瘤体软,推之可移,有时瘤肿略硬,皮色不变,也无痛感,发展较缓慢。

涉及考点 | 血瘤的诊断

38.患者,男,40岁。左肩部可见一肿块,呈扁平团状,边界清楚,触之柔软,推之可动。无明显疼痛。应首先考虑的是

- | | |
|------|------|
| A.血瘤 | B.失荣 |
| C.肾岩 | D.肉瘦 |
| E.肉瘤 | |

【答案】E

【解析】选项 A 以病变局部色泽鲜红或暗紫,或局限以柔软肿块,边界不清,触之如海绵状为主要表现的瘤病。选项 B 一般表现为颈部淋巴结肿大,生长较快,质地坚硬。病变开始时多为单发结节,可活动;后期肿块体积增大,数量增多,融合成团块或连结成串,表面不平,固定不移。一般无疼痛,但合并染毒时可有压痛。选项 C 多发于中老年人,初起时在包皮系带附近、阴茎头部、冠状沟部或尿道口处可见丘疹、红斑、结节、疣状增生等,逐渐增大、刺痒,甚至破溃,状如翻花石榴子样,并有恶臭分泌物,疼痛加重,严重者阴茎溃烂脱落。选项 D 即甲状腺良性肿瘤,无痛,发展缓慢,随吞咽上下移动。选项 E 即甲状腺良性肿瘤,无痛,发展缓慢,随吞咽上下移动。

涉及考点 | 肉瘤的临床表现特点

39.顾步汤适用的脱疽证候是

- | | |
|--------|--------|
| A.寒湿阻络 | B.血脉瘀阻 |
| C.湿热毒盛 | D.热毒伤阴 |
| E.气阴两虚 | |

【答案】D

【解析】脱疽内治常见 5 个证型。选项 A 治宜温阳散寒,活血通络,用阳和汤加减。选项 B 治宜活血化瘀,通络止痛,用桃红四物汤加减。选项 C 治宜清热利湿,解毒活血,用四妙勇安汤加减。选项 D 治宜清热解毒,养阴活血,用顾步汤加减。选项 E 治宜益气养阴,用黄芪鳖甲汤加减。

涉及考点 | 脱疽的辨证论治

40.患者,男,68岁。因感冒伴发口唇成群小水疱,破碎后呈糜烂与结痂,自觉瘙痒,灼热。应首选

- | | |
|-----------|------------|
| A.内服黄连解毒汤 | B.内服普济消毒饮 |
| C.内服五味消毒饮 | D.外搽青吹口散油膏 |

E.外搽白玉膏

【答案】D

【解析】热疮是发热后或高热过程中在皮肤黏膜交界处所发生的急性疱疹性皮肤病,相当于西医的单纯疱疹,其特点是:皮损为成群的水疱,有的互相融合,好发于口唇、鼻孔周围、面颊、等皮肤黏膜交界处。局部外用药以清热、解毒、燥湿、收敛为主,可用紫金锭或金黄散或青吹口散油膏、黄连膏等。

涉及考点 | 热疮特点及用药

41.蛇串疮的皮损特点是

A.皮损为多形态,全身分布

B.皮疹为对称性分布

C.水疱散在性分布

D.水疱簇集呈带状分布

E.以上均不是

【答案】D

【解析】本病四季均发,尤以春秋季节多见。好发于成人,任何部位均发,尤以胸,胁,腰,面部多见。成群簇集的小水泡沿一侧神经呈带状分布,伴有患病区域神经疼痛为本病的主要症状特征。

涉及考点 | 蛇串疮的发病特点

42.患儿,男,9岁。头皮部初起丘疮色红,灰白色鳞屑成斑,毛发干枯,容易折断,易于拔而不疼痛,已有年余,自觉痛痒。其诊断是

A.肥疮

B.牛皮癣

C.白秃疮

D.白庖

E.圆癣

【答案】C

【解析】选项 A 初起时毛发根部有小丘疹或小脓疱,有特殊臭味,由于毛囊破损,愈后留有瘢痕而局部秃发。选项 B 指皮肤状如牛项之皮,厚而且坚。选项 C 特征为头皮有圆形或不规则的覆盖灰白鳞屑的斑片,病损区毛发干枯无泽,头发易剥落且无疼痛。选项 D 特点为表面覆盖有干燥的银色鳞屑,轻轻刮除鳞屑,可见小片血点。选项 E 皮损多呈钱币状,圆形,多发于股腠、外阴处。

涉及考点 | 头癣的临床特点和诊断

43.患者,男,54岁。平素嗜食辛辣厚味,现症见脱发成片,偶有头皮瘙痒,或伴头部烘热,心烦易怒,急躁不安;舌质红,苔薄,脉弦。其证候为

A.肝肾不足证

B.血热风燥证

C.气血两虚证

D.肝郁气滞证

E.气血瘀滞证

【答案】B

【解析】“发为血之余”,油风的发生与血热、血瘀、血虚有关。过食辛辣厚味,情志不遂,抑郁化火,损耗阴血,血热生风,风热上窜巅顶,故毛发失于阴血濡养而突然脱落;头部烘热,血热风燥,故头皮瘙痒;舌质红、苔薄、脉弦均为气郁化热表现。

涉及考点 | 油风的治疗

44.湿疮湿热蕴肤证,应首选的方剂是

A.龙胆泻肝汤合五味消毒饮

B.龙胆泻肝汤合萆薢渗湿汤

- C.小儿化湿汤
E.四物消风饮
- D.当归饮子

【答案】B

【解析】湿疮湿热蕴肤证的治疗主方为龙胆泻肝汤合萆薢渗湿汤。脾虚湿蕴证,方药为除湿胃苓汤或参苓白术散加紫荆皮、地肤子、白鲜皮。血虚风燥证,方药为当归饮子或四物消风饮加丹参、鸡血藤、乌梢蛇。

涉及考点 | 湿疮湿热浸淫证

- 45.下列有皮肤损害的疾病,禁用糖皮质激素的是
- A.牛皮癣
B.天疱疮
C.接触性皮炎
D.湿疹
E.水痘

【答案】E

【解析】水痘为病毒感染,糖皮质激素禁用于病毒感染。

涉及考点 | 水痘的用药禁忌

46.患者,女,26岁。3天前突发生面、颈部红肿与水疱,自觉痒痛,伴恶寒,发热,头痛,舌苔薄黄,脉滑数。怀疑接触过敏引起,治疗应首选

- A.桑菊饮
B.银翘散
C.普济消毒饮
D.龙胆泻肝汤
E.黄连解毒汤

【答案】C

【解析】据患者恶寒、发热等临床表现,为风寒束表证。选项A用于风热表证。选项B用于风热表证。选项C用于内有热邪,外有表证,清热解毒,疏风散邪。选项D用于湿热毒蕴证。选项E用于热毒盛证,偏于中焦热。

涉及考点 | 接触性皮炎的治疗

- 47.首发药毒的潜伏期一般是
- A.10天以内
B.5~20天
C.1个月
D.24小时内
E.药后半小时

【答案】B

【解析】有一定的潜伏期,第二次发病多在用药后5~20天内,重复用药常在24小时内发生,短者甚至在用药后瞬间或数分钟内发生。

涉及考点 | 药毒的潜伏期

- 48.药毒之热毒入营证,应首选的方剂是
- A.萆薢渗湿汤
B.清营汤
C.增液汤合益胃汤
D.消风散
E.五神汤

【答案】B

【解析】药毒之热毒入营证主症:皮疹鲜红或紫红,灼热痒痛,伴高热,神志不清,舌红绛,镜面舌,脉洪数。治法为清热凉血,解毒护阴。方药为清营汤加减。选项A适用于湿毒蕴肤证。选项C适用于气阴两虚证。

涉及考点 | 药毒之热毒入营证

49. 药毒之气阴两虚证的治疗方剂首选

- A. 萆薢渗湿汤
- B. 清营汤
- C. 增液汤合益胃汤
- D. 消风散
- E. 五神汤

【答案】C

【解析】药毒之气阴两虚证主症：药疹后期大片脱屑，伴低热，神疲乏力，口干欲饮，舌红少苔，脉细数。治法为益气养阴清热。方药为增液汤合益胃汤加减。

涉及考点 | 药毒气阴两虚证

50. 患者，男，27岁。颈项部皮肤增厚，瘙痒反复发作一年余，局部皮肤呈苔藓化。其诊断是

- A. 风热疮
- B. 风瘙痒
- C. 牛皮癣
- D. 白屑风
- E. 慢性湿疮

【答案】C

【解析】选项 A 皮损分布以躯干和四肢近端为主，呈对称性。选项 B 没有任何原发性皮疹，瘙痒呈阵发性，久之可出现色素沉着或色素减退、湿疹样变或苔藓样变，有泛发性和局限性之分。选项 C 好发于颈项部、额部。皮损干燥而结实，久之融合成片，皮肤增厚，稍有脱屑，长期搔抓可使皮肤浸润肥厚，呈苔藓化。常多年不愈，易反复发作。选项 D 主要发于头皮。选项 E 多局限于某一部位，表现为皮肤肥厚粗糙，触之较硬，色暗红或紫褐，皮纹显著或呈苔藓样变。皮损表面常附有鳞屑，伴抓痕、血痂、色素沉着，发生于手关节部位者常易出现破裂，自觉疼痛，影响活动。

涉及考点 | 牛皮癣的皮损特点

51. 属于混合毒类的毒蛇有

- A. 眼镜蛇
- B. 竹叶青蛇
- C. 蝰蛇
- D. 烙铁头蛇
- E. 银环蛇

【答案】A

【解析】我国的毒蛇中对人体构成较大威胁的有 10 种，神经毒者有银环蛇、金环蛇、海蛇。血循毒者有蝰蛇、尖吻蝮蛇、竹叶青蛇和烙铁头蛇。混合毒者有眼镜蛇、眼镜王蛇和蝮蛇。

涉及考点 | 我国常见毒蛇的种类

52. 尿道口有白色分泌物溢出，可诊断为

- A. 淋病
- B. 尿路感染
- C. 梅毒
- D. 阴道感染
- E. 尖锐湿疣

【答案】A

【解析】淋病特点：通常以尿道轻度不适起病，数小时后出现尿痛和脓性分泌物。当病变扩展至后尿道时可出现尿频、尿急。检查可见脓性黄绿色尿道分泌物，尿道口红肿，因细菌感染引起，腹股沟区淋巴结可肿大。



配套名师高清视频

涉及考点 | 淋病的诊断

53. 患者,男,33岁。患白疔,发病较久,皮疹多呈斑片状,颜色淡红,鳞屑减少,干燥皲裂,自觉瘙痒,伴口干,舌质淡红,苔少,脉沉细。其治法是

- A.清利湿热,解毒通络
B.清热泻火,凉血解毒
C.活血化瘀,解毒通络
D.养血滋阴,润肤息风
E.清热凉血,解毒消斑

【答案】D

【解析】白疔血虚风燥证主症:皮疹呈斑片状,颜色淡红,鳞屑较少,干燥皲裂,自觉瘙痒,舌红,苔少,脉沉细。治法为养血滋阴,润肤息风。方药为当归饮子加减。

涉及考点 | 白疔血虚风燥证

54. 下列各项,属神经毒类的毒蛇是

- A.蝥蛇
B.竹叶青蛇
C.尖吻蝥蛇
D.海蛇
E.眼镜蛇

【答案】D

【解析】蝥蛇,竹叶青蛇,尖吻蝥蛇属于血循环毒类,眼镜蛇属于混合毒类。银环蛇、金环蛇、海蛇属于神经毒类。

涉及毒蛇的分类

55. 下列哪一项为尖锐湿疣的中医病因病机

- A.湿热秽浊由下焦前阴入侵,阻于膀胱及肝经,热毒邪搏于肌肤而生
B.湿热秽浊之邪侵及肝经、下注阴部
C.淫秽疫毒与湿热、风邪杂合所致
D.秽浊之毒酿生湿热,下注皮肤黏膜

【答案】D

【解析】尖锐湿疣的中医病因病机是秽浊之毒酿生湿热,下注皮肤黏膜。

涉及考点 | 尖锐湿疣的中医病因病机

56. 患者,男,28岁,大便带血,血色鲜红,便后脱出,不能自行回纳,须用手送回,无疼痛,可能的诊断是

- A.脱肛(Ⅰ度脱垂)
B.脱肛(Ⅱ度脱垂)
C.脱肛(Ⅲ度脱垂)
D.内痔三期
E.内痔二期

【答案】D

【解析】大便带血,颜色深红,患者为成年男性,排除脱肛。内痔二期便后可自行回纳,三期不能自行回纳。

涉及内痔与脱肛的区别

57. 肛漏的主要症状是

- A.便血,便秘,脱出
B.肛门肿物,剧痛,不出血
C.周期性疼痛,便血,便秘
D.肛周流脓,疼痛,瘙痒
E.肛门异物感,肿胀,疼痛

【答案】D

【解析】在非急性炎症期以流脓疼痛,瘙痒等局部症状为主;当出现急性炎症和反复发作

的慢性复杂性肛漏时,则可伴有发热,消瘦,疲劳,面色无华,等全身症状。

涉及肛漏的主要症状

58.患者,男,30岁。便后肛门部疼痛、出血反复发作10年。检查:肛门截石位6点有结缔组织外痔,并有梭形裂口通向肛内,边缘不齐,创面较深,术中见肛管狭窄明显。应首选的治疗措施是

- A.扩肛疗法
- B.注射疗法
- C.切除疗法
- D.纵切横缝
- E.肛裂切开

【答案】D

【解析】有梭形裂口通向肛内,边缘不齐,创面较深,术中见肛管狭窄明显,首选的治疗措施是:纵切横缝。

涉及考点 | 肛裂的治法

59.关于一次切开挂线法治疗肛痛的适应证,错误的是

- A.肛门旁皮下脓肿
- B.坐骨直肠间隙脓肿
- C.骨盆直肠间隙脓肿
- D.直肠后间隙脓肿
- E.马蹄形脓肿

【答案】A

【解析】一次切开挂线法:适应证适用于高位脓肿,如由肛隐窝感染而致坐骨直肠间隙脓肿,骨盆直肠间隙脓肿,直肠后间隙脓肿及马蹄形脓肿等。

涉及考点 | 挂线法

60.下列各项,不属于锁肛痔排便习惯改变的是

- A.排便次数增多
- B.便秘
- C.便血
- D.便意频频
- E.排便不尽感

【答案】C

【解析】锁肛痔排便习惯改变,也是直肠癌常见的早期症状。表现为排便次数增多,便意频繁,便不尽感等。有时为便秘,同时肛门内有不适或下坠感。

涉及考点 | 锁肛痔排便习惯改变

61.肛漏手术成败的关键在于

- A.切除瘻管管壁
- B.避免损伤内括约肌
- C.正确找到内口并切开或切除
- D.将外口及瘻管切除
- E.以上都不是

【答案】C

【解析】肛漏手术成败的关键在于正确找到内口并切开或切除。

涉及考点 | 肛漏手术特性

62.电烙法适用于

- A.低位带蒂息肉
- B.小儿无蒂息肉
- C.较高位的小息肉
- D.较低位的小息肉
- E.以上都不是

【答案】C

【解析】电烙法适用于较高位的小息肉。

涉及考点 | 电烙法适应证

63. 患者1周前,因外伤出现右手示指红肿热痛。肿胀呈圆柱状。皮色光亮,关节轻度屈曲,不能伸展,现局部跳痛明显,拟切开排脓。应选择的切口部位是

- A. 指掌侧面
- B. 指掌正中
- C. 手指侧面
- D. 手指正中
- E. 示指关节处

【答案】C

【解析】手指脓肿应从侧方切开。关节区附近的脓肿,切口尽量避免损坏关节。若为关节区脓肿,一般施行横切口,弧形切口或“S”形切口,因力纵切口在疤痕形成后易影响关节功能。

涉及考点 | 切开法的具体应用

64. 治疗子痲气滞痰凝证的代表方剂是

- A. 小金丸
- B. 橘核丸
- C. 二陈汤
- D. 抵当丸
- E. 橘核汤

【答案】B

【解析】子痲气滞痰凝证表现为附睾结节,子系粗肿,轻微触痛,或牵引少腹不适,多无全身症状,舌淡苔薄白或腻,脉弦滑。应治以疏肝理气,化痰散结。方用橘核丸加减。

涉及考点 | 子痲的治疗

65. 子痰初起内治宜选

- A. 透脓散
- B. 五味消毒饮
- C. 黄连解毒汤
- D. 阳和汤
- E. 滋阴除湿汤

【答案】D

【解析】子痰初起硬结期,肾子处坠胀不适,附睾硬结,子系呈串珠状肿硬,苔薄,脉滑,属痰凝凝结证,应治以温经通络,化痰散结。方药用阳和汤加减,配服小金丹。

涉及考点 | 子痰的治疗

66. 慢性前列腺炎的主要临床表现是

- A. 无痛性血尿
- B. 精液中有血
- C. 尿中有血,并有腰部剧痛
- D. 尿频、进行性排尿困难
- E. 尿频急而痛,尿末常有白色分泌物

【答案】E

【解析】慢性前列腺炎临床表现不一,患者可出现轻微的尿频、尿急、尿痛、尿道内灼热不适或排尿不净之感。有的在排尿终末或大便秘结时,自尿道滴出少量乳白色的前列腺液。

涉及考点 | 慢性前列腺炎的诊断

67. 患者,女,29岁。便血伴肛痛五月余,病起于产后,因大便干结所致,每次便后肛痛,持续数小时方缓,大便带血,量少色红,便干结,状如羊屎,伴面色潮红,形体消瘦,苔少,脉细数。截石位12点,肛管裂伤约0.2 cm×0.8 cm,伴见赘皮外痔。其为

- A. 内痔
- B. 结缔组织性外痔

- C.早期肛裂
E.肛窦炎
- D.陈旧性肛裂

【答案】D

【解析】肛裂是齿状线下肛管皮肤纵形全层裂开或形成的缺血性溃疡,主要表现为周期性疼痛,便血、量不多、色红,便秘等,故可诊断为肛裂。根据病程长短及病情轻重分为早期肛裂和陈旧性肛裂,患者肛裂五月余未经适当治疗,裂口组织发炎、充血,引起水肿及结缔组织增生,形成赘皮性外痔,属陈旧性肛裂。

涉及考点 | 肛裂的主要症状与分类

68.睾丸及附睾的急性化脓性感染称为

- A.子痰
C.子痈
E.卵子瘟
- B.囊痈
D.脱囊

【答案】C

【解析】选项 A 是发生于肾子的疮疡性疾病,相当于西医的附睾结核。选项 B 是发于睾丸以外的阴囊部位的急性化脓性疾病。选项 C 指睾丸及附睾的化脓性疾病。选项 D 指阴囊红肿溃破,甚至睾丸外悬。选项 E 由腮腺炎病毒经血侵入睾丸所致,患者忽然囊红发热,睾丸一侧或双侧肿大。

涉及考点 | 子痰的定义

(69~70 题共用备选答案)

- A.缠腰火丹
C.流火
E.内发丹毒
- B.抱头火丹
D.赤游丹

69.发于躯干部的丹毒称为

【答案】E

70.发于小腿部的丹毒称为

【答案】C

【解析】丹毒是以患部突然皮肤鲜红成片,色如涂丹,灼热肿胀,迅速蔓延为主要表现的急性感染性疾病。本病发无定处,生于胸腹腰胯部者,称内发丹毒;发于头面部者,称抱头火丹;发于小腿足部者,称流火;新生儿多生于臀部,称赤游丹。

涉及考点 | 不同部位丹毒的命名

(71~72 题共用备选答案)

- A.阳和汤
C.顾步汤
E.附桂八味丸
- B.桃红四物汤
D.人参养荣汤

71.治疗脱疽寒湿阻络证,应首选的方剂是

【答案】A

72.治疗脱疽热毒伤阴证,应首选的方剂是

【答案】C

【解析】脱疽内治法中,寒湿阻络证用阳和汤。血脉瘀阻证用桃红四物汤。湿热毒盛证用四妙勇安汤。热毒伤阴证用顾步汤。气阴两虚证用黄芪鳖甲汤。

涉及考点 | 脱疽的辨证论治

(73~74 题共用备选答案)

- A. 痈
B. 瘰疬
C. 流痰
D. 有头疽
E. 红丝疔

73. 易发生内陷的疾病是

【答案】D

74. 可发生走黄的疾病是

【答案】E

【解析】选项 A 不仅局部病变比疔重,且易并发全身性化脓性感染。选项 B 预后一般良好,少数体虚的人可继发流痰,治愈后每因体虚或过度劳累而复发。选项 C 起病缓慢,漫肿酸痛,不红不热,化脓亦迟,溃出脓水清稀,并夹有豆腐花样物质,形成窦道后,迁延不愈,易损筋坏骨,轻则致残,重则成为虚癆,危及生命。选项 D 若治疗失控或处治失时或误治,往往造成内陷之并发。选项 E 好发于前臂及小腿的内侧,病变在深部,皮色暗红,或不见红丝,但可见条索状肿胀和压痛,如不消退则化脓,严重者可引起“走黄”。

涉及考点 | 有头疽、红丝疔的特点

(75~76 题共用备选答案)

- A. 程氏萆薢分清饮
B. 三金排石汤
C. 金铃子散合石韦散
D. 十全大补汤
E. 八正散或龙胆泻肝汤

75. 治疗尿石症之气血瘀滞证,应首选的方剂是

【答案】C

76. 治疗尿石症之湿热蕴结证,应首选的方剂是

【答案】B

【解析】尿石症的气血瘀滞证,应治以理气活血,通淋排石,选用金铃子散合石韦散加减。湿热蕴结证,应治以清热利湿,通淋排石,选用三金排石汤加减。

涉及考点 | 尿石症的治疗方法

2年 易错考题

1. 下列各项,不属于外科疾病成脓期特点的是

- A. 疼痛剧烈呈鸡啄样
B. 皮肤肿胀,皮薄光亮
C. 局部皮肤瘙痒
D. 局部皮肤温度增高
E. 肿块变软

【答案】C

【解析】成脓的特点应从以下四点辨别。疼痛:阳证脓疡,局部按之灼热痛甚,拒按明显。阴证脓疡,则痛热不甚,而酸胀明显。肿胀:皮肤肿胀,皮薄光亮为有脓。深部脓肿,皮肤变化不明显,但胀感较甚。温度:用手仔细触摸患部,与周围正常皮肤相比,若为阳证脓疡,则局部温度增高。硬度:《外科理例》云:“按之牢硬未有脓,按之半软半硬已成脓,大软方是脓成。”《疡医大全》又谓:“凡肿疡按之软隐者,随手而起者,为有脓;按之坚硬,虽按之有凹,不既随手

起者,为脓尚未成。”肿块已软,为脓已成。

涉及考点 | 辨脓

2.患者,女,50岁。面部出现小结节,红肿热痛,逐渐肿大并隆起,出现脓栓,其诊断是

- A.疔
- B.痈
- C.疽
- D.丹毒
- E.痰核

【答案】A

【解析】疔见皮肤上红色结块,约3cm,灼热疼痛,突起根浅,中心有一脓头,出脓即愈。疔病好发于项后发际、背部、臀部,也可在身体各处散发疔肿,一处将愈,他处续发,或间隔周余、月余再发。患消渴病、习惯性便秘或营养不良者易患本病。选项B、C、D多伴发热等全身症状,选项E多为阴证表现。

涉及考点 | 疔的临床表现

3.阴证疮疡的首选外敷药物是

- A.冲和膏
- B.阳和解凝膏
- C.疯油膏
- D.玉露膏
- E.太乙膏

【答案】B

【解析】选项A冲和膏适用于半阴半阳证。选项B阳和解凝膏温经散寒,化痰通络,用于疮形不红不热,漫肿无头之阴证疮疡未溃者。选项C润燥杀虫止痒、适用于牛皮癣、慢性湿疹、皲裂等。选项D玉露膏清热解毒、消肿止痛、散瘀化痰,适用于疮疡阳证。选项E太乙膏消肿解毒,用于红肿热痛明显之阳证疮疡,为肿疡、溃疡通用方。所以本选B。

涉及考点 | 膏药、油膏的临床应用

4.疮疡破溃后,不宜使用的外用药是

- A.膏药
- B.箍围药
- C.油膏
- D.酊剂
- E.腐蚀药

【答案】D

【解析】选项A适用于一切外科疾病的初起、成脓、溃后各个阶段。选项B适用于外疡不论初起,成脓及溃后,肿势散漫不聚而无集中之硬块者。选项C适用于肿疡、溃疡,皮肤病糜烂结痂渗液不多者及肛门病等。选项D一般用于疮疡未溃及皮肤病等。选项E均可用于凡肿疡在脓未溃时,或痔疮、瘰疬、赘疣、息肉等病;或溃疡破溃以后,疮口太小,引流不畅;或疮口僵硬,或赘肉突出,或腐肉不脱等妨碍收口时。

涉及考点 | 掺药的种类及临床应用

5.治疗体表脓肿,实施切开引流的有利时机是

- A.肿疡初起
- B.肿疡溃后
- C.脓肿肿疡出现透脓点
- D.肿疡肉芽暗红
- E.脓肿周围肿硬

【答案】C

【解析】当肿疡成脓之后,脓肿中央出现透脓点(脓腔中央最软的一点),即为脓已成熟,此时予以切开最为适宜。切口位置应以便于引流为原则,选择脓腔最低点或最薄弱处进刀。

涉及考点 | 切开法的具体应用

6. 下列属于无头疔的特点是

- A. 皮肤上有一红色结块, 范围约 3 cm 左右, 无脓头
- B. 红色结块, 范围约 3 cm 大小, 灼热疼痛, 突起根浅, 中心有一脓头
- C. 多发于儿童头部
- D. 不易成脓易溃、易敛
- E. 不易溃烂、不易收敛

【答案】A

【解析】无头疔: 无脓头。

涉及考点 | 无头疔的特点

7. 蛇头疔溃脓期的治疗应

- A. 甲旁 0.2 cm 挑开引流
- B. 在指掌面一侧作纵行切口, 必要时可对口引流
- C. 在指掌面正中切开, 务必引流通畅
- D. 在手指侧面作纵行切口, 切口长度不得超过上下指关节面
- E. 沿掌横纹切开, 切口应够大, 保持引流通畅

【答案】B

【解析】成脓期脓成应切开排脓, 一般应尽可能循经切开, 根据患病部位不同, 而选择不同的切口。选项 A 适用于蛇眼疔。选项 B 适用于蛇头疔。选项 C 适用于蛇肚疔。选项 E 适用于托盘疔。

涉及考点 | 手足部疔疮成脓期切开引流要求

8. 下列各项, 不属于发的临床特点的是

- A. 初起仅有单个脓头
- B. 红肿蔓延成片
- C. 灼热疼痛
- D. 全身症状明显
- E. 红肿中央明显, 四周较淡

【答案】A

【解析】发的特点是初起无头, 红肿蔓延成片, 灼热疼痛, 红肿以中心最为明显, 而四周较淡, 边界不清, 有的 3~5 天后中央色褐腐溃, 周围湿烂, 伴有明显的全身症状。

涉及考点 | 发的含义与特点

9. 精浊的病机

- A. 肾虚、湿热、瘀滞
- B. 湿热、瘀滞、血热
- C. 肾虚、瘀滞、痰浊
- D. 肾虚、血热、瘀滞
- E. 肝郁、湿热、肾虚

【答案】A

【解析】急性精浊, 多由饮食不节, 恣食醇酒肥甘, 酿生湿热, 注于下焦; 或因外感湿热之邪壅聚于下焦而成。慢性精浊多因性交欲念不遂, 心肾不交, 或房劳过度, 湿热壅滞, 气血瘀滞而成。

涉及考点 | 精浊的病机

10. 患儿, 女, 7 岁。结喉处红肿绕喉, 根盘散漫, 肿势延及颈部两侧, 按之中软, 有应指感, 治疗应首选的方剂是

- A.内服普济消毒饮
C.半流质饮食
E.药线引流

- B.外治以菊花汁调制玉露散箍围束毒
D.切开排脓

【答案】D

【解析】据患者临床症状，可诊为癰疽，肿处按之中软，可知脓已形成，治疗以切开排脓为主。

涉及考点 | 癰疽的外治法

11.患者，男，40岁。结喉两侧各有1个3 cm×2 cm×1 cm，表面光滑，质地韧，无压痛，随吞咽上下活动的肿物。为明确诊断，应首选的方法是

- A.胸颈部X线
B.血常规
C.血气分析
D.T₃、T₄
E.¹³¹I扫描

【答案】E

【解析】位于喉结两侧，随吞咽上下活动的肿物，诊断考虑石瘰可能性大。为明确诊断，可用同位素¹³¹I扫描，或者穿刺加活检。

涉及考点 | 石瘰的特点

12.患者，男，40岁。左肩部可见一肿块，呈扁平团块状，边界清楚，暗红色，触之柔软，推之可动，无明显疼痛。应首先考虑的是

- A.血管瘤
B.失荣
C.肾岩
D.肉瘿
E.肉瘤

【答案】A

【解析】血管瘤是指人体的体表血络扩张，纵横丛集而形成的肿瘤，可发生于身体任何部位，大多数为先天性，其特点是病变局部色泽鲜红或暗紫，或呈局限性柔软肿块，边界不清，触之如海绵状，相当于西医疾病的血管瘤。

涉及考点 | 血管瘤

13.下列各项，不属于精癯常见的临床症状是

- A.夜尿次数增多、排尿困难
B.慢性尿潴留
C.无痛性血尿
D.尿频、尿急、尿痛
E.假性尿失禁

【答案】D

【解析】精癯是指精室肥大以排尿困难和尿潴留为主要表现的泌尿男性生殖器疾病。相当于西医的前列腺增生症或前列腺肥大。当病人持续处于尿潴留状态，由于膀胱过胀，膀胱内尿液超过尿道括约肌阻力时，尿液常可从尿道外口溢出，出现充溢性尿失禁现象。并发泌尿系感染，可出现尿频，尿急，尿痛，发热，腰痛等症。

涉及考点 | 精癯的临床特点

14.患者胸腹部皮肤红肿蔓延，摸之灼手，肿胀疼痛，伴口苦且干，舌红，苔黄腻，脉弦滑数。治疗首选的方剂是

- A.仙方活命饮
B.普济消毒饮
C.银翘解毒丸
D.化斑解毒汤

E.黄连解毒汤

【答案】D

【解析】患者皮肤红肿蔓延,其病为丹毒,因其发于胸腹部,故为内发丹毒;摸之灼手,肿胀疼痛,为火热之象,其口苦且干,舌红,苔黄腻,脉弦滑数,为肝脾湿火证。治法为清肝泻火利湿。方用柴胡清肝汤、龙胆泻肝汤或化斑解毒汤加减。

涉及考点 | 丹毒的内治法

15.患者,男,30岁。两大腿内侧可见3枚钱币形红斑,边界清楚,中心消退,外围扩张,无明显疼痛,痛痒感明显,多在夏季加重。应首先考虑的是

- A.圆癣
- B.紫白癜风
- C.白秃疮
- D.鹅掌风
- E.肥疮

【答案】A

【解析】圆癣初起为丘疹或水疱,逐渐形成边界清楚的钱币形红斑,其上覆盖细薄鳞屑。病灶中央皮疹消退,呈自愈倾向,但向四周蔓延,有丘疹、水疱、脓疱、结痂等损害。

涉及考点 | 圆癣的诊断

16.患者因牙痛服用去痛片。7天后四肢出现豌豆至蚕豆大圆形或椭圆形水肿性红斑,有些部位中央有水疱。其药毒的类型是

- A.多形红斑样型
- B.湿疹皮炎样型
- C.固定红斑型
- D.紫癜型药毒
- E.大疱性表皮松解型药毒

【答案】A

【解析】选项A皮损为豌豆至蚕豆大圆形或椭圆形水肿性红斑、丘疹,红斑中心呈紫红色或有水疱。选项B皮损为湿疹样皮炎。选项C皮损为圆形或椭圆形水肿性紫红斑,边界清楚,重者红斑中央形成水疱或大疱。选项D出现针头至豆大的或更大的紫红色瘀点或瘀斑,散在或密集分布。选项E是最严重的一型,为紫红或暗红色略带铁灰色斑,扩大、增多、融合,红斑上出现松弛性水疱及表皮松解,水疱易破,该处表皮极松,一推即成糜烂面。

涉及考点 | 药毒的诊断

17.患者,男,31岁。颈项部皮肤增厚,干燥,瘙痒较剧,情绪波动时,瘙痒随之加剧,部分皮肤因反复搔抓形成苔藓样变化。其诊断是

- A.接触性皮炎
- B.牛皮癣
- C.白疔
- D.慢性湿疹
- E.紫白癜风

【答案】B

【解析】牛皮癣特点:皮损多呈圆形或多角形的扁平丘疹融合成片,剧烈瘙痒,搔抓后皮损肥厚,皮沟加深,皮嵴隆起,极易形成苔藓样变。

涉及考点 | 牛皮癣特点

18.属皮肤病原发性皮损的是

- A.鳞屑
- B.瘙痒
- C.疼痛
- D.灼热
- E.斑疹

【答案】E

【解析】原发性皮损指皮肤病在其病变过程中直接发生及初次出现的皮损。常见的原发性皮损有斑,丘疹,风团,结节,疱疹等5种。

涉及考点 | 麻疹样型皮损特性

19.患者,男,38岁。患急性子痈2天,恶寒发热,左侧睾丸肿大疼痛,舌红苔黄腻,脉滑数。证属湿热下注,气血壅滞,经络阻隔为患。治宜清热解毒,利湿消肿。应首选的方剂是

- A.透脓散
- B.滋阴除湿汤
- C.萆薢化毒汤
- D.龙胆泻肝汤
- E.枸橼汤加减

【答案】E

【解析】湿热下注,气血壅阻,经络不畅,故见睾丸或附睾肿大疼痛。苔黄腻、脉滑为湿热之象。故辨证属子痈之湿热下注证,治法为清热利湿,解毒消肿。方药为选枸橼汤加减。选项A主治痈疽诸毒,内脓已成,不穿破者。选项B合透脓散主治子痈之阴虚内热证。选项C主治湿热痈疮,气血实者。选项D主治肝胆实火上炎证。

涉及考点 | 子痈的治疗

20.男,43岁。尿道中有白色分泌物滴出3年,劳累后更为明显,伴腰膝酸冷,放射至会阴部,形寒肢冷,精神不振,头晕。首选的方剂是

- A.龙胆泻肝丸
- B.知柏地黄丸
- C.左归丸
- D.济生肾气丸
- E.独活寄生汤

【答案】D

【解析】慢性前列腺炎:肾阳虚损证治法为补肾助阳,方药用济生肾气丸加减。

涉及考点 | 慢性前列腺炎的治法方药

21.下列疔疮,容易损筋伤骨的是

- A.烂疔
- B.红丝疔
- C.颜面疔
- D.疫疔
- E.手足疔

【答案】E

【解析】发于颜面部的疔疮很容易走黄而有生命危险;发于手足部的疔疮则易损筋伤骨。

涉及考点 | 走黄

(22~23题共用备选答案)

- A.失笑散
- B.沉香散
- C.前列腺汤
- D.归脾汤
- E.血府逐瘀汤

22.治疗精浊之气滞血瘀证,应首选的方剂是

【答案】C

23.治疗精癥之气滞血瘀证,应首选的方剂是

【答案】B

【解析】精浊相当于西医学的前列腺炎,气滞血瘀证的治法为活血化瘀,行气止痛,方用前列腺汤加减。精癥相当于西医学的前列腺增生症,气滞血瘀证的治法为行气活血,通窍利尿,

方用沉香散加减。

涉及考点 | 精浊、精癃的辨证论治

(24~25 题共用备选答案)

- | | |
|-------|-------|
| A.红丝疔 | B.蛇头疔 |
| C.蛇眼疔 | D.蛀节疔 |
| E.蛇肚疔 | |

24.生于手指骨节间的疔疮称为

【答案】D

25.生于指腹部的疔疮称为

【答案】E

【解析】选项 A 生于四肢。选项 B 生于指头顶端。选项 C 生于指甲缘。选项 D 生于手指骨节间。选项 E 生于指腹部。

涉及考点 | 疔的种类

(26~27 题共用备选答案)

- | | |
|---------|---------|
| A.五味消毒饮 | B.仙方活命饮 |
| C.黄连解毒汤 | D.犀角地黄汤 |
| E.清骨散 | |

26.疮疡内治,清气分热之常用方剂是

【答案】C

27.疮疡内治,清血分热之常用方剂是

【答案】D

【解析】疮疡内治,清气分热之常用方剂是黄连解毒汤。疮疡内治,清血分热之常用方剂是犀角地黄汤。

涉及考点 | 疮疡内治常用方剂

第七篇 中医妇科学



考情分布图

		2015	2016	2017	2018	2019
中医妇科学	女性生殖器官	1	1	0	0	1
	女性生殖生理	0	0	1	1	1
	妇科疾病的病因病机	1	0	1	1	0
	妇科疾病的诊断与辨证	0	1	1	1	1
	妇科疾病的治疗	0	1	1	1	1
	月经病	4	5	4	6	3
	带下病	3	2	3	2	4
	妊娠病	3	2	3	3	3
	产后病	3	2	3	3	3
	妇科杂病	2	2	2	2	2
	计划生育	1	0	0	0	0
	妇科特殊检查与常用诊断技术	0	0	0	0	0



高频考点必背

1. 新产妇人有三病是指产后**病痉**,**病郁冒**,**大便难**。
2. 新产妇人有三急是指产后**呕吐**,**盗汗**,**泄泻**。
3. 新产妇人有三冲是指产后败血上冲,**冲心**,**冲胃**,**冲肺**。
4. 产后三审为先审**小腹痛与不痛**,以辨有无恶露的停滞;次审**大便通与不通**,以验津液之盛衰,三审**乳汁的行与不行及饮食之多少**,以察胃气的强弱。
5. **阴户**又名四边,是女性外生殖器官的解剖术语,系指女性**外阴**,包括阴蒂、大小阴唇、阴唇系带及前庭部位。
6. 阴户的功能是**防御外邪入侵的第一道门户**;是排月经、泌带下、排恶露之出口;是合阴阳之入口,又是娩出胎儿、胎盘之产门。
7. 阴道的功能是**防御外邪入侵的关口**;是排出月经、分泌带下的通道;是阴阳交合的器官;又是娩出胎儿的路径,故亦称产道。
8. 子宫的功能包括**产生、排出月经,孕育、分娩胎儿**。另外还有排出余血浊液、分泌生理性带下的功能。
9. 子宫的生理特点具有明显的**周期性、节律性**。
10. 非经期、妊娠期,子宫表现为“**藏精气而不泻**”似脏;行经期、分娩时,子宫又表现为“**传化物而不藏**”似腑。《内经》称之为“**奇恒之府**”。
11. 月经出血的第1天为月经周期的开始,两次月经第1天的间隔时间称为一个月经周

期,一般**28~30天**。

12. 月经持续时间,正常经期为**3~7天**,多数为**3~5天**。

13. 月经的量、色、质:月经量的多少难以准确统计,一般以每月经量约**20~60 mL**为适中。经色暗红,经质不稀不稠,不凝固,无血块,无特殊臭气。

14. 绝经妇女一生中最后1次行经后,停经1年以上,称为绝经。一般为**45~55岁**,平均49.5岁。绝经表明即将步入老年期。

15. **并月**为身体无病而月经定期**两个月**来潮一次者。

16. **季经、居经**为身体无病月经**三个月**一潮者。

17. **避年**为身体无病月经**1年**一行者。

18. **暗经**为终生不潮但却能受孕者。

19. **激经**为受孕初期仍能按月经周期有少量出血而无损于胎儿者。

20. **天癸与月经**的关系:“天癸至”,则“月事以时下,故有子”,“天癸竭,地道不通,故形坏而无子也”。

21. **冲、任、督**三脉同起于胞中,一源而三歧。

22. 肾、天癸、冲任、胞宫是产生月经的中心环节,各环节之间互相联系,不可分割,现代中医妇科学家称之为“**肾-天癸-冲任-胞宫生殖轴**”。

23. **早孕40多天**,可扪及子宫增大变软,子宫颈紫蓝色质软。

24. 非孕时子宫容量为**5 mL**,至妊娠足月约**5 000 mL**,增加**1 000倍**。

25. 子宫重量,非孕时**50 g**,至足月妊娠约**1 000 g**,增加**20倍**。

26. 乳房自**孕早期**开始增大、发胀。乳头增大变黑,易勃起。乳晕加大变黑,乳晕外周有散在褐色小结节状隆起。

27. **骍胎**为一孕**二胎**者。

28. **品胎**为一孕**三胎**者。

29. 预产期现代推算的公式是:**从末次月经的第一天算起,月数加9(或减3)日数加7(阴历则加14)**。

30. **弄胎**:《医宗金鉴·妇科心法要诀》云:“若月数已足,腹痛或作或止,腰不痛者”。

31. 产褥期指分娩结束后,产妇逐渐恢复到孕前状态,约需要**6~8周**。

32. 产褥期的生理特点是**多虚多瘀**。

33. 血性恶露为产后自子宫排出的余血浊液,**暗红色**,也称红恶露,约持续**3~4天**干净;如果血性恶露**10天以上仍未干净**,应考虑子宫复旧不良或感染,当予以诊治。

34. **浆液性恶露**为红恶露渐变淡红,量由多渐少,约**7~10天**干净。

35. 白恶露为不含血色的恶露,约**2~3周**干净。

36. 顺产者,**产后30分钟**即可在产床上开始哺乳。

37. 哺乳时间一般以**8个月**为宜。**3个月**后婴儿适当增加辅食。

38. 妇科疾病常用外治法为:**坐浴**;外阴、阴道冲洗;阴道纳药;贴敷法;宫腔注入;直肠导入;中药离子导入;**介入治疗**。

39. 月经病的主要病机是**脏腑功能失常**,血气不和,**冲任二脉损伤**以及肾-天癸-冲任-胞宫轴失调。

40. 月经病的治疗应本着“**急则治其标,缓则治其本**”的原则。

41. 月经先期指月经周期提前**7天**以上,甚至十余日一行,连续**两个周期**以上者。

42. 月经后期指月经周期延后**7天**以上,甚至3~5个月1行者。一般认为需**连续出现两个周期**以上。

43. 月经先后无定期指月经周期或提前时或延后**7天**以上,连续**三个周期**以上者。

44. 月经过多指月经量较正常明显增多,而周期基本正常者。

45. 月经过少指月经周期正常,月经量明显减少,或行经时间**不足2天**,甚或点滴即净者。

46. 经期延长指月经周期基本正常,行经时间**超过7天**以上,甚或淋漓半月方净者。

47. 经间期出血指两次月经中间,即**氤氲之时**,出现周期性的少量阴道出血者。

48. 崩漏指经血**非时暴下不止或淋漓不尽**,前者谓之崩中,后者谓之漏下。

49. 崩漏的治疗原则是“**急则治其标,缓则治其本**”。

50. 闭经指女子年逾**16周岁**,月经尚未来潮,或月经周期已建立后又**中断6个月**以上者。前者称原发性闭经,后者称继发性闭经。

51. 痛经指妇女**正值经期或经行前后**,出现周期性小腹疼痛,或痛引腰骶,甚至剧痛晕厥者,又称“经行腹痛”。

52. 痛经的病位在**子宫、冲任**,以“不通则痛”或“不荣则痛”为主要病机。

53. 经行乳房胀痛指每于行经前后,或正值经期,出现**乳房作胀**,或乳头胀痒疼痛,甚至不能触衣者。

54. 经行头痛指每遇经期或行经前后,出现以**头痛**为主要症状,经后即止者。

55. 经行感冒指每值经行前后或正值经期,出现**感冒**症状,经后逐渐缓解者。

56. 经行浮肿指每逢经行前后,或正值经期,**头面四肢浮肿**者。

57. 经行吐衄指每逢经行前后,或正值经期,出现**周期性的吐血或衄血**者,亦有“倒经”“逆经”之称。

58. 不孕症是指女子婚后未避孕,有正常性生活,**同居1年**,而未受孕者;或曾有过妊娠,而后未避孕,又连续1年未再受孕者。前者为原发性不孕,古称“全不产”;后者为继发性不孕,古称“断绪”。

59. **阴痒**是指妇女外阴及阴道瘙痒,甚则痒痛难忍,坐卧不宁,或伴带下增多等症状。

60. **阴挺**是指子宫从正常位置沿阴道下降,宫颈外口达坐骨棘水平以下,甚至子宫全部脱出于阴道口以外。

61. 经行情志异常指每值行经前后,或正值经期,出现**烦躁易怒**,悲伤啼哭,或**情志抑郁**,喃喃自语,或彻夜不眠,甚或狂躁不安,经后复如常人者。

62. 绝经前后诸证指妇女在绝经期前后,围绕月经紊乱或绝经出现明显不适证候,如**烘热汗出、烦躁易怒**、潮热面红、眩晕耳鸣、**心悸失眠、腰背酸楚**、面浮肢肿、情志不宁等症状。

63. 滑胎指堕胎或小产**连续发生3次或3次以上者**,亦称“数堕胎”“屡孕屡堕”。

64. 带下过多指带下量明显**增多**,色、质、气味异常,或伴有局部及全身症状者。

65. 带下过少指带下量明显**减少**,导致阴中干涩痒痛,甚至阴部萎缩者。

66. 恶阻指妊娠早期出现**恶心呕吐**,头晕倦怠,甚至食入即吐者。

67. 宫腔镜检查的绝对**禁忌证**:急性、亚急性生殖道感染;心、肝、肾衰竭急性期及其他不能耐受手术者。

68. 异位妊娠指孕卵在**子宫体腔以外**着床发育者。以**输卵管**妊娠为最常见,约占90%~95%,可造成急性腹腔内出血,是妇产科常见急腹症之一。

69. 胎漏是指**妊娠期间阴道少量出血,时出时止**,或淋漓不断,而无腰酸、腹痛、小腹下坠

者,亦称“胞漏”或“漏胎”。

70.子肿是妊娠**中晚期**,孕妇出现**肢体面目肿胀**者,亦称“子肿”。

71.妊娠小便淋痛是指妊娠期间出现**尿频、尿急、淋漓涩痛**等症,俗称“子淋”。

72.产后是指从胎盘娩出至产妇全身各器官除乳腺外恢复至孕前状态的一段时期,亦称“产褥期”,**一般约为6周**。

73.产后用药三禁是指**禁大汗以防亡阳;禁峻下以防亡阴;禁通利小便以防亡津液**。

74.产后发热是指在产褥期内,出现**发热持续不退**,或突然高热寒战,并伴有其他症状者。

75.产后腹痛是指产妇在产褥期内,发生**与分娩或产褥有关的小腹疼痛**,称为产后腹痛。其中因瘀血引起者,称“儿枕痛”。

76.产后身痛是指产妇在产褥期内,出现**肢体或关节酸楚、疼痛、麻木、重着**者,称为“产后身痛”,又称“产后遍身疼痛”。

77.产后身痛的发生机理主要是产后营血亏虚,经脉失养或风寒湿邪乘虚而入,稽留关节、经络所致。常见病因有**血虚、风寒、血瘀、肾虚**。

78.产后恶露不止是指产后血性恶露**持续10天以上**,仍淋漓不尽者,称“产后恶露不绝”,又称“恶露不尽”“恶露不止”。

79.产后缺乳是指产后哺乳期内,产妇**乳汁甚少或无乳可下**者,称“缺乳”,又称“产后乳汁不行”。

80.癥瘕是指妇人**下腹结块**,伴有或胀、或痛、或满、或异常出血者。**癥者有形可征**,固定不移,痛有定处;**瘕者假聚成形**,聚散无常,推之可移,痛无定处。

81.**盆腔炎**是女性内生殖器官及其周围结缔组织、盆腔腹膜发生的炎症。

5年 历年真题

1.李某,女,36岁,已婚,孕妇。末次月经的时间为2019年8月29日,其预产期时间为

- A.2020年5月5日
B.2020年5月6日
C.2020年5月7日
D.2020年6月5日
E.2020年6月6日

【答案】D

【解析】现代推算预产期的公式是:按末次月经的第一天算起,月数加9(或减3),日数加7(阴历则加14)。

涉及考点 | 预产期的计算方法

2.妇人产后几天红恶露可干净

- A.1~2天
B.3~4天
C.4~5天
D.5~6天
E.6天

【答案】B

【解析】恶露是产后自子宫排出的余血浊液。先是暗红色的血性恶露,也称红恶露,约持续3~4天干净;后渐变淡红,量由多渐少,称为浆液性恶露,约7~10天干净;继后渐为不含血色的白恶露,约2~3周干净。如果血性恶露10天以上仍未干净,应考虑子宫复旧不良或感染,当予以诊治。



配套名师高清视频

涉及考点 | 产褥期生理

3. 下列各项, 不属于妊娠期生理现象的是

- A. 脉滑
- B. 月经停闭
- C. 头痛
- D. 乳晕加大变黑
- E. 恶心欲呕, 择食

【答案】C

【解析】妊娠初期出现饮食偏嗜、恶心作呕、晨起头晕等现象。早期孕妇可自觉乳房胀大。妊娠2个月, 六脉平和滑利, 按之不绝, 尺脉尤甚。妊娠3个月, 白带稍增多, 乳头、乳晕的颜色加深。妊娠4个月, 孕妇可自觉胎动, 胎体逐渐增大, 小腹部逐渐膨隆。妊娠6个月, 可出现轻度肿胀。妊娠末期, 可见小便频数、大便秘结。

涉及考点 | 妊娠的生理现象

4. 胞宫的主要生理功能是

- A. 主月经
- B. 主带下
- C. 主孕育胎儿
- D. 主月经和孕育胎儿
- E. 主经、带、胎、产

【答案】E

【解析】胞宫即是子宫, 其主要的生理功能是经、带、胎、产。选项E更全面, 所以本题选E。

涉及考点 | 子宫的功能

5. 下列关于妊娠期的说法中, 错误的是

- A. 妊娠足月子宫容量增大至100倍
- B. 子宫增大变软, 子宫颈呈紫蓝色而质软
- C. 妊娠8周时, 子宫增大如非孕时的2倍
- D. 妊娠12周时, 子宫增大如非孕时的3倍
- E. 妊娠12周时, 可在耻骨联合上方触及子宫

【答案】A

【解析】孕后子宫变化最大, 早孕40多天, 可扪及子宫增大变软, 子宫颈呈紫蓝色而质软。妊娠8周, 子宫增大如非孕时的2倍。妊娠12周, 子宫增大如非孕时的3倍, 可在耻骨联合上方触及。非孕时子宫容量为5 mL, 至妊娠足月约为5 000 mL, 增加1 000倍。

涉及考点 | 妊娠的生理现象

6. 与月经产生关系最密切的脏腑是

- A. 心、肝、脾
- B. 肾、肺、脾
- C. 肾、肝、心
- D. 肾、肝、脾
- E. 心、肝、肺

【答案】D

【解析】肾藏精化气, 为天癸之源、冲任之本, 气血阴阳之根, 肾气旺盛, 使天癸泌至; 肝肾同源, 精血同源, 相互化生, 肝血充足, 气机条达, 则经候如期; 脾主运化, 气血生化之源, 脾胃健运, 则血海充盈, 血循常道。

涉及考点 | 脏腑与月经的关系

7. 妊娠月份已足, 腹痛或作或止, 腰不痛者, 称为

- A. 临产
- B. 盛胎
- C. 试胎
- D. 弄胎

E.正产

【答案】D

【解析】弄胎指妇女怀孕足月,腹痛或作或止,腰不痛的一种征兆。《医宗金鉴·妇科心法要诀生育》:“若月腹痛腰不痛,或作或止名弄胎”。

涉及考点 | 临产先兆

8.下列关于阴道功能的叙述,错误的是

- A.排出月经
B.分泌带下
C.种子育胎
D.排出恶露
E.阴阳交合

【答案】C

【解析】阴道,又称产道,意指胎儿分娩时所经之道路,位于子宫与阴户之间。阴道是防御外邪入侵的关口,是排出月经、分泌带下的通道,是阴阳交合的器官,又是娩出胎儿、排出恶露的路径,故亦称产道。种子育胎是胞宫的功能。

涉及考点 | 阴道的功能

9.阴户的功能不包括

- A.生育胎儿的关口
B.孕育胎儿
C.排出月经、带下、恶露的关口
D.“合阴阳”的出入口
E.防止外邪入侵的关口

【答案】B

【解析】阴户,又名“四边”,是指女性阴蒂、大小阴唇、阴唇系带及阴道前庭的部位。阴户是生育胎儿,排出月经、带下、恶露的关口,也是“合阴阳”的出入口。同时,《诸病源候论》云:“四边中于湿,风气从下上入阴里”。又云:“玉门、四边皆解散,子户未安……若居湿席,令人苦寒,洒洒入腹”。以上说明阴户又是防止外邪入侵的关口。孕育胎儿为胞宫的功能。

涉及考点 | 阴户的功能

10.下列各项,属寒邪导致的妇科疾病是

- A.子淋
B.痛经
C.经行吐衄
D.崩漏
E.月经先期

【答案】B

【解析】寒为阴邪,收引凝滞,易伤阳气,影响气血运行。寒邪伤人的具体病因归纳如下:若感受寒邪、冒雨涉水、过食生冷,则血为寒凝;血行不畅,胞脉阻滞,可出现月经后期、痛经、闭经、癥瘕等。若机体阳气不足,寒自内生,脏腑机能失常,影响冲任、胞宫的功能,可出现痛经、带下病、妊娠腹痛、宫寒不孕等。选项 A、C、D、E 为热邪所致,所以本题选 B。

涉及考点 | 寒热湿邪

11.治疗月经后期之实寒证,应首选的方剂是

- A.少腹逐瘀汤
B.温经汤(《妇人大全良方》)
C.乌药汤
D.艾附暖宫丸
E.温经汤(《金匱要略》)

【答案】B

【解析】月经后期之实寒证。治法为温经散寒调经。方剂为温经汤(《妇人大全良方》)。

选项 E 是月经后期之虚寒证。治法为扶阳祛寒调经。方剂为温经汤(《金匱要略》)或艾附暖宫丸。所以答案选择 B。

涉及考点 | 月经后期的辨证论治

12. 月经先后不定期, 经行不畅, 胸胁、乳房、少腹胀痛, 脘闷不舒, 暖气少食, 苔薄白, 脉弦。应首选的方剂是

- A. 固阴煎
- B. 半夏泻心汤
- C. 逍遥丸
- D. 归脾汤
- E. 六味地黄丸

【答案】C

【解析】主症为月经先后不定期, 伴经行不畅, 胸胁、乳房、少腹胀痛, 脘闷不舒, 暖气少食, 苔薄白, 脉弦。辨证为月经先后无定期之肝郁证。治法为疏肝理气调经。方剂为逍遥散。选项 A 固阴煎用于月经先后无定期之肾虚证。

涉及考点 | 月经先后无定期的辨证论治

13. 月经提前, 量多或少, 经色深红, 经行不畅, 有血块, 胸胁胀痛, 乳房胀痛, 口苦, 治疗方法是

- A. 补肾养血调经
- B. 补血益气调经
- C. 疏肝凉血调经
- D. 扶阳祛寒调经
- E. 温经散寒调经

【答案】C

【解析】主症为月经提前, 伴经色深红, 经行不畅, 有血块, 胸胁胀痛, 乳房胀痛, 口苦, 辨证为月经先期之肝郁血热证。治法为疏肝清热, 凉血调经。选项 A 补肾养血调经为月经后期之肾虚证的治法。选项 B 补血益气调经为月经后期之血虚证的治法。选项 D 扶阳祛寒调经为月经后期之血寒虚—寒证的治法。选项 E 温经散寒调经为月经后期之血寒—实寒证的治法。

涉及考点 | 月经先期的辨证论治

14. 疏肝清热利湿法的代表方剂是

- A. 丹栀逍遥散
- B. 柴胡疏肝散
- C. 清肝止淋汤
- D. 宣郁通经汤
- E. 羚羊钩藤汤

【答案】C

【解析】疏肝清热利湿法, 肝热与脾湿相合, 治疗应疏肝清热利湿, 常用药物有黄芩, 夏枯草, 龙胆草, 栀子等, 常用方剂有龙胆泻肝汤, 清热止淋汤等。

涉及考点 | 妇科疾病调理脏腑的用药

15. 下列各项, 属月经先期之阳盛血热证主症的是

- A. 经色暗淡, 质清稀
- B. 经色淡红, 质清稀
- C. 经色深红, 质黏稠
- D. 经色暗红, 有血块
- E. 经色淡红, 质黏稠

【答案】C

【解析】月经先期之阳盛血热证的主症为月经先期, 量多, 色深红或紫红, 质黏稠, 或伴心烦, 面红口干, 小便短黄, 大便燥结, 舌质红, 苔黄, 脉数或滑数。

涉及考点 | 月经先期的辨证论治

16. 患者婚久不孕,形体肥胖,月经推后,带下量多,色白质黏无臭;头晕心悸,胸闷泛恶,面目虚浮;舌淡胖,苔白腻,脉滑。治疗应首选的方剂是

- A. 苍附导痰丸
B. 启宫丸
C. 丹溪治痰湿方
D. 开郁二陈汤
E. 陈夏六君子汤

【答案】A

【解析】肥胖之人痰湿内生,瘀阻包脉,冲任气血不畅,不能摄精成孕,故婚久不孕;痰湿中阻,清阳不升,浊阴不降,故头晕心悸等,舌淡胖,苔白腻,脉滑为痰湿内蕴之象。

涉及考点 | 不孕症的辨证

17. 月经先后无定期的主要发病机理是

- A. 肝郁气滞,疏泄失调
B. 肾气不足,封藏失职
C. 脾气虚弱,统摄无权
D. 湿热下注,任带不固
E. 气血失调,血海蓄溢失常

【答案】E

【解析】月经先后无定期的发病机理,主要是肝肾功能失调,冲任功能紊乱,血海蓄溢失常。其病因多为肝郁、肾虚和脾虚。

涉及考点 | 月经先后无定期的病机

18. 中医妇科内治法中,温补肾阳法的代表方是

- A. 温经汤
B. 左归丸
C. 金匱肾气丸
D. 参附汤
E. 举元煎

【答案】C

【解析】肾阳虚,命门火衰,冲任失于温煦,导致经、带、胎、产、杂诸病,治疗以温肾助阳、温养冲任为主,常用的代表方剂为金匱肾气丸、温胞饮、右归丸之类。

涉及考点 | 调补脏腑

19. 属于产后常脉的是

- A. 滑利平和
B. 弦细而数
C. 沉细涩弱
D. 虚缓和平
E. 浮滑而数

【答案】D

【解析】滑利平和为妊娠常脉;弦细而数为妊娠病脉;沉细涩弱、浮滑而数均为产后病脉。产后冲任气血多虚,故脉多见虚缓和平。

涉及考点 | 切诊

20. 下列除哪项外,均是经期延长血瘀证的主症

- A. 经行 8~10 天始净
B. 月经量少、色暗、有块
C. 小腹疼痛拒按
D. 腰酸腿软
E. 舌紫暗,脉弦涩

【答案】D

【解析】经期延长血瘀证的主要证候为经行时间延长,量或多或少,经色紫暗,有块,经行小腹疼痛,拒按,舌质紫暗或有瘀点,脉弦涩。选项 D 腰酸腿软为肾虚证候。

涉及考点 | 经期延长的辨证

21.适用于直肠导入法治疗的妇科疾病是

- A.宫腔粘连
- B.子宫肌瘤
- C.宫颈炎
- D.子宫脱垂
- E.盆腔淤血综合征

【答案】E

【解析】直肠导入法适应于慢性盆腔炎、癥瘕盆腔淤血综合征以及产后发热、大便秘结等。

涉及考点 | 妇科病的外治法

22.经行头痛以头痛伴随月经周期性发作为辨证要点,其治疗方法为

- A.滋阴潜阳,疏风止痛
- B.调理气血,通络止痛
- C.温经养血,疏络止痛
- D.活血化瘀,温经止痛
- E.益气养血,活络止痛

【答案】B

【解析】经行头痛其发作与月经密切相关,属于内伤性头痛。因头为诸阳之会,五脏六腑之气皆上荣于头,足厥阴肝经会于巅,肝为藏血之脏,经行时气血下注冲任而为月经,阴血相对不足,故凡外感、内伤均可在此时引起脏腑气血失调而为患。其病机变化以气血失调为本,治疗大法为调理气血,通络止痛。

涉及考点 | 经行头痛的治疗原则

23.治疗痛经气滞血瘀证,应首选的方剂是

- A.血府逐瘀汤
- B.膈下逐瘀汤
- C.少腹逐瘀汤
- D.身痛逐瘀汤
- E.通窍活血汤

【答案】B

【解析】痛经之气滞血瘀证。治法为理气行滞,化瘀止痛。方剂为膈下逐瘀汤。选项 A 血府逐瘀汤用于闭经之气滞血瘀证。选项 C 少腹逐瘀汤用于痛经之寒凝血瘀证。选项 D 身痛逐瘀汤用于产后身痛之血瘀证。选项 E 通窍活血汤用于经行头痛之血瘀证。

涉及考点 | 痛经的辨证论治

24.治疗崩漏之实热证,应首选的方剂是

- A.保阴煎
- B.固本止崩汤
- C.清热固经汤
- D.清热调血汤
- E.左归丸

【答案】C

【解析】崩漏实热证治以清热凉血,固冲止血,主方为清热固经汤。选项 A 保阴煎用于月经过多之血热证。选项 B 固本止崩汤用于崩漏之脾虚证。选项 E 左归丸用于崩漏之肾虚证。

涉及考点 | 崩漏的辨证论治

25.痛经之所以随月经周期而发作,与下列哪项有关

- A.寒凝胞中
- B.经期胞中血虚邪盛
- C.经期冲任气血变化急骤
- D.血虚冲任、胞宫失养
- E.湿热蕴结胞中

【答案】C

【解析】痛经之所以伴随月经周期而发,与经期及经期前后特殊生理状态有关。未行经期间,由于冲任气血平和,致病因素尚不足以引起冲任、子宫气血瘀滞或不足,故平时不发生疼痛。经期前后,血海由满盈而泻溢,气血盛实而骤虚,子宫、冲任气血变化较平时急剧,易受致病因素干扰,加之体质因素的影响,导致子宫、冲任气血运行不畅,不通或不荣而痛。

涉及考点 | 痛经的病机

26. 实证闭经的主要发病机理是

- | | |
|---------|---------|
| A. 寒凝气滞 | B. 血海空虚 |
| C. 气血阻滞 | D. 肝肾亏损 |
| E. 湿热瘀阻 | |

【答案】C

【解析】闭经的发病机制有虚实两个方面。虚者多因肾气不足,冲任虚弱;或肝肾亏损,精血不足;或脾胃虚弱,气血乏源;或阴虚血燥等。实者多因气血阻滞,或痰湿流注下焦,使血流不通,冲任受阻,血海阻隔,经血不得下行而成闭经。

涉及考点 | 闭经的病机

27. 经行乳房胀痛肝肾亏虚证的治法是

- | | |
|--------------|--------------|
| A. 舒肝养血,和胃通络 | B. 温肾养阴,和胃通络 |
| C. 疏肝理气,和胃通络 | D. 滋肾养肝,和胃通络 |
| E. 补肾健脾,和胃通络 | |

【答案】D

【解析】经行乳房胀痛肝肾亏虚证症见经行或经后两乳作胀作痛,乳房按之柔软无块,月经量少,色淡,两目干涩,咽干口燥,五心烦热,舌淡或舌红少苔,脉细数。治法为滋肾养肝,和胃通络。

涉及考点 | 经行乳房胀痛的辨证论治



配套名师高清视频

28. 崩漏的治疗原则是

- | | |
|--------------|------------|
| A. 塞流与澄源结合 | B. 澄源与复旧结合 |
| C. 复旧与塞流结合 | D. 固本与澄源结合 |
| E. 急则治标,缓则治本 | |

【答案】E

【解析】崩漏的治则是急则治其标,缓则治其本,具体分为三步,即塞流、澄源、复旧。

涉及考点 | 崩漏的治疗原则

29. 治疗经间期出血之肾阴虚证,应首选的方剂是

- | | |
|------------|------------|
| A. 清肝止淋汤 | B. 左归丸合二至丸 |
| C. 两地汤合二至丸 | D. 逐瘀止血汤 |
| E. 归脾丸 | |

【答案】C

【解析】经间期出血之肾阴虚证。治法为滋肾养阴,固冲止血。方剂为两地汤合二至丸或加减一阴煎。选项 A 清肝止淋汤用于经间期出血之湿热证。选项 B 左归丸合二至丸用于崩漏之肾阴虚证和绝经前后诸证之肾阴虚证。选项 D 逐瘀止血汤用于经间期出血之血瘀证。选项 E 归脾丸用于经间期出血之脾虚证。所以答案选 C。

涉及考点 | 经间期出血的辨证论治

30. 经行头痛血瘀证的主症是

- | | |
|-----------------|-----------------|
| A. 经前头痛, 甚或巅顶掣痛 | B. 经期头痛, 甚或巅顶掣痛 |
| C. 经期头痛, 痛如锥刺 | D. 经后头晕, 绵绵作痛 |
| E. 经后头痛, 痛如锥刺 | |

【答案】C

【解析】经行头痛血瘀证症见每逢经前、经期头痛剧烈, 痛如锥刺, 经色紫暗有块, 伴小腹疼痛拒按, 胸闷不舒, 舌暗或尖边有瘀点, 脉细涩或弦涩。

涉及考点 | 经行头痛血瘀证的辨证论治

31. 下列各项, 不属于绝经前后诸证临床表现的是

- | | |
|---------------|---------------|
| A. 烘热汗出, 烦躁易怒 | B. 潮热面红, 眩晕耳鸣 |
| C. 心悸失眠, 腰背酸楚 | D. 面浮肢肿, 情志不宁 |
| E. 精神萎靡, 面色晦暗 | |

【答案】E

【解析】妇女在绝经期前后, 围绕月经紊乱或绝经出现明显不适证候, 如烘热汗出、烦躁易怒、潮热面红、眩晕耳鸣、心悸失眠、腰背酸楚、面浮肢肿、情志不宁等症状。

涉及考点 | 绝经前后诸证的临床表现

32. 瘀滞胞宫不孕症的治疗应首选的方剂是

- | | |
|----------|----------|
| A. 理冲汤 | B. 失笑散 |
| C. 少腹逐瘀汤 | D. 血府逐瘀汤 |
| E. 膈下逐瘀汤 | |

【答案】C

【解析】不孕症之瘀滞胞宫证证候: 婚久不孕, 月经多推后或周期正常, 经来腹痛, 甚或呈进行性加剧, 经量多少不一, 经色紫黯, 有血块, 块下痛减; 有时经行不畅, 淋漓难净, 或经间出血; 或肛门坠胀不适, 性交痛; 舌质紫黯或舌边有瘀点, 苔薄白, 脉弦或弦细涩。治法: 逐瘀荡胞, 调经助孕。方药: 少腹逐瘀汤。

涉及考点 | 不孕症的辨证论治

33. 患者带下量多, 赤白相兼, 质稠, 有气味, 阴部灼热感, 腰酸腿软, 头晕耳鸣, 五心烦热, 咽干口燥, 烘热汗出, 失眠多梦; 舌质红, 苔少, 脉细数。其证候是

- | | |
|-----------|----------|
| A. 肾阳虚证 | B. 阴虚夹湿证 |
| C. 肝经湿热下注 | D. 脾虚证 |
| E. 热毒蕴结证 | |

【答案】B

【解析】肾阴不足, 复感湿邪, 损伤任带二脉, 致带下量多, 质稠, 有气味, 阴部灼热感。阴虚失养, 则腰酸膝软, 虚热内浊, 则五心烦热咽干口燥。水火失济, 则失眠多梦。舌红苔少, 脉数均为阴虚夹湿。

涉及考点 | 带下病的辨证

34. 治疗经行身痛之血瘀证, 应首选的方剂是

- | | |
|--------|----------|
| A. 失笑散 | B. 桃红四物汤 |
| C. 趁痛散 | D. 通窍活血汤 |

E.血府逐瘀汤

【答案】C

【解析】经行身痛之血瘀证症见经行时腰膝、肢体、关节疼痛，得热痛减，遇寒痛甚，月经推迟，经量少，色暗，或有血块。治法为活血通络，益气散寒止痛。方剂为趁痛散。选项 A 失笑散用于月经过多之血瘀证。选项 B 桃红四物汤用于月经过少之血瘀证。选项 D 通窍活血汤用于经行头痛之血瘀证。选项 E 血府逐瘀汤用于闭经之气滞血瘀证。

涉及考点 | 经行身痛的辨证论治

35.治疗经行吐衄之肺肾阴虚证，应首选的方剂是

- A.清肝汤
B.调肝汤
C.顺经汤
D.清肝引经汤
E.上下相资汤

【答案】C

【解析】经行吐衄肺肾阴虚证的治法为滋阴养肺。方剂为顺经汤或加味麦门冬汤。选项 D 清肝引经汤用于经行吐衄之肝经郁火证。选项 E 上下相资汤用于崩漏之血热证。

涉及考点 | 经行吐衄的辨证论治

36.下列方剂可以用于治疗经行浮肿的是

- A.柴胡疏肝散
B.逍遥丸
C.健脾丸
D.乌药散
E.八物汤

【答案】E

【解析】经前、经行时气血下注于胞宫，若素体脾肾虚损，值经行则脾肾更虚，气化运行失司，水湿生焉，因而出现经行浮肿。也有因肝郁气滞，血行不畅，滞而作胀者。常见脾肾阳虚证，用肾气丸合苓桂术甘汤。气滞血瘀证，用八物汤加泽泻、益母草。

涉及考点 | 经行浮肿的辨证论治

37.绝经前后诸证的治疗原则是

- A.疏肝解郁
B.调节阴阳平衡
C.补益气血
D.健脾补肾
E.活血化瘀

【答案】B

【解析】部分妇女在绝经期前后，围绕月经紊乱或绝经，出现明显不适证候，如烘热汗出、烦躁易怒、潮热面红、眩晕耳鸣、心悸失眠、腰背酸楚、面浮肢肿、情志不宁等症状。肾阴阳失调，常涉及其他脏腑，尤以心、肝、脾为主。若肾阴不足，不能上济心火，则心火偏亢；乙癸同源，肾阴不足，精亏不能化血，导致肝肾阴虚，肝失柔养，肝阳上亢；肾与脾先后天互相充养，脾阳赖肾阳以温煦，肾虚阳衰，火不暖土，又导致脾肾阳虚。常见肾阴虚、肾阳虚、肾阴阳俱虚证。治疗以调整阴阳为主。

涉及考点 | 绝经前后诸证的辨证论治

38.每值经行前后或正值经期出现感冒症状，属于

- A.经行乳房胀痛
B.经行身痛
C.经行发热
D.经行头痛
E.经行感冒

【答案】E

【解析】选项 A 经行乳房胀痛是指每于行经前后,或正值经期,出现乳房作胀,或乳头胀痒疼痛,甚至不能触衣者。选项 B 经行身痛是指每遇经行前后或正值经期,出现以身体疼痛为主症者。选项 C 经行发热是指每值经期或行经前后,出现以发热为主症者。选项 D 经行头痛是指每遇经期或行经前后,出现以头痛为主要症状,经后即止者。选项 E 经行感冒是指每逢经行前后或正值经期,出现感冒症状,经后逐渐缓解者。

涉及考点 | 经行感冒的定义

39.治疗经行头痛血瘀证,应首选的方剂是

- | | |
|---------|---------|
| A.失笑散 | B.桃红四物汤 |
| C.少腹逐瘀汤 | D.通窍活血汤 |
| E.血府逐瘀汤 | |

【答案】D

【解析】经行头痛血瘀证症见每逢经前、经期头痛剧烈,痛如锥刺,经色紫暗有块,伴小腹疼痛拒按,胸闷不舒,舌暗或尖边有瘀点,脉细涩或弦涩。治法为化瘀通络。方剂为通窍活血汤。选项 A 失笑散用于月经过多之血瘀证。选项 B 桃红四物汤用于月经过少之血瘀证。选项 C 少腹逐瘀汤用于痛经之寒凝血瘀证。选项 E 血府逐瘀汤用于闭经之气滞血瘀证。

涉及考点 | 经行头痛的辨证论治

40.下列各项,绝经前后诸证的饮食调护应是

- | | |
|-------------|----------|
| A.高蛋白饮食 | B.低盐饮食 |
| C.限制高脂、高糖饮食 | D.限制蛋白饮食 |
| E.高糖饮食 | |

【答案】C

【解析】绝经前后饮食应适当限制高脂肪、高糖类物质的摄入,注意补充新鲜水果蔬菜及钙、钾等矿物质。

涉及考点 | 绝经前后诸证的预防与调护

41.异位妊娠,未破损期治疗方法是

- | | |
|-------------|-------------|
| A.活血化瘀,消癥杀胚 | B.活血化瘀,消癥散结 |
| C.益气摄血,佐以止痛 | D.行气活血,化瘀止痛 |
| E.凉血养血,佐以止痛 | |

【答案】A

【解析】异位妊娠未破损期的症状为停经后可有早孕反应,或下腹一侧有隐痛,双合诊可触及一侧附件有软性包块,有压痛,尿妊娠试验为阳性,脉弦滑。治法为活血化瘀,消癥杀胚。方剂为宫外孕 II 号方加蜈蚣、全蝎、紫草。

涉及考点 | 异位妊娠的辨证论治

42.患者,女,27岁,已婚。停经46天,妊娠试验阳性,恶心呕吐,食入即吐,神疲思睡,舌淡苔白,脉滑缓。诊为妊娠恶阻,其证候是

- | | |
|--------|--------|
| A.脾虚痰滞 | B.脾胃虚弱 |
| C.气阴两虚 | D.肝胃不和 |
| E.痰湿中阻 | |

【答案】B

【解析】患者停经46天,妊娠试验阳性,应为妊娠早期。此时恶心呕吐,可初诊为恶阻病。同时,食入即吐,神疲思睡,舌淡苔白,脉滑缓,是脾胃虚弱,升降失常,清阳不升的表现。辨证属妊娠恶阻之脾胃虚弱证。肝胃不和证的主要临床表现,呕吐酸水苦水,恶闻油腻,口苦咽干,胸满胁痛。

涉及考点 | 妊娠恶阻的辨证

43. 患者,女,46岁,已婚。近两周带下量多,色赤白相兼,质稠,有气味,阴部痛痒,腰膝酸软,头晕耳鸣,舌红,苔黄腻,脉细数。其治法是

- | | |
|--------------|--------------|
| A. 清热疏肝,利湿止带 | B. 滋肾养阴,清热利湿 |
| C. 清热解毒止带 | D. 健脾祛湿止带 |
| E. 清热凉血止带 | |

【答案】B

【解析】肾阴不足,相火偏旺,损伤血络,或复感湿邪,损伤任带,带脉不固,表现出带下量多。有臭味,腰膝酸软,阴部灼热或瘙痒,舌红少苔,脉细数等,均为湿热之象。辨证属带下过多之阴虚夹湿证。治法为滋肾益阴,清热利湿。

涉及考点 | 带下过多的辨证论治

44. 下列各项,不属于带下过少血枯瘀阻临床表现的是

- | | |
|--------------|---------------|
| A. 阴中干涩,阴痒 | B. 面色无华,头晕眼花 |
| C. 心悸失眠,神疲乏力 | D. 肌肤甲错,下腹有包块 |
| E. 腰膝酸软,烘热汗出 | |

【答案】E

【解析】带下过少血枯瘀阻证症见带下过少,甚或全无,阴中干涩,阴痒,或面色无华,头晕眼花,心悸失眠,神疲乏力,或经行腹痛,经色紫暗,有血块,肌肤甲错,或下腹有包块,舌质暗,边有瘀点瘀斑,脉细涩。

涉及考点 | 带下过少的临床表现

45. 患者,女,29岁,已婚。月经过期半个月,尿妊娠试验(+),左下腹隐痛,双合诊触及左侧附件可触及界线不清的包块,压痛(+),反跳痛(+),B超提示:宫腔未见妊娠囊,腹痛拒按,但逐渐减轻,兼有少量阴道流血,血压平稳,脉细缓。现阶段处理首选的方法是

- | | |
|---------------|-----------|
| A. 寿胎丸 | B. 桂枝茯苓丸 |
| C. 生脉散合宫外孕I号方 | D. 宫外孕I号方 |
| E. 宫外孕II号方 | |

【答案】D

【解析】异位妊娠已破损期不稳定型。不稳定型证候:腹痛拒按,腹部有压痛及反跳痛,但逐渐减轻,可触及界线不清的包块,兼有少量阴道流血,血压平稳,脉细缓。治法:活血祛瘀,佐以益气。方药:宫外孕I号方。

涉及考点 | 异位妊娠的辨证论治

46. 脾胃虚弱型妊娠恶阻,呕吐清涎,应首选的方剂是

- | | |
|-----------|--------|
| A. 二陈丸 | B. 健脾丸 |
| C. 归脾汤 | D. 温胆汤 |
| E. 香砂六君子汤 | |

【答案】E

【解析】妊娠恶阻脾胃虚弱证治宜健脾和胃,降逆止呕,用香砂六君子汤。肝胃不和证治宜清肝和胃,降逆止呕,用橘皮竹茹汤或苏叶黄连汤加姜半夏、枇杷叶、竹茹、乌梅。

涉及考点 | 妊娠恶阻的辨证论治

47.下列各项,不属于胎动不安常见证型的是

- A.肾虚证
- B.湿热证
- C.血热证
- D.血瘀证
- E.气血虚弱证

【答案】B

【解析】胎漏、胎动不安的主要病机是冲任损伤、胎元不固。常见的病因有肾虚、血热、气血虚弱、血瘀。常见证型有肾虚证、血热证、气血虚弱证、血瘀证。

涉及考点 | 胎动不安的辨证论治

48.止带方适用于带下病的哪种证候

- A.肾阳虚证
- B.肾阴虚证
- C.脾虚证
- D.湿热下注证
- E.热毒蕴结证

【答案】D

【解析】止带方清利湿热,适用于湿热下注证。肾阳虚证主方为内补丸。阴虚夹湿证主方为知柏地黄汤。脾虚证主方为完带汤。热毒蕴结证主方为五味消毒饮。

涉及考点 | 带下过多的辨证论治

49.下列关于带下生理现象和作用的论述,错误的是

- A.带下属津液
- B.带下有周期性月节律
- C.带下量随妊娠期增多
- D.带下淖泽胞宫、阴道
- E.带下于经断后断绝

【答案】E

【解析】生理性带下是人体正常的精液,是肾精下润之液,具有濡润、充养前阴后窍的作用。女子到肾气盛天癸至性发育成熟期才有明显的分泌,且其量与性状有周期性变化,一般经前期带下略多而黏稠;经间期带下量增多,妊娠期带下稍有增加而稠厚,绝经后带下明显减少。

涉及考点 | 带下的生理现象

50.下列各项,不属于子肿肾虚证临床表现的是

- A.口淡而腻,脘腹胀满
- B.面浮肢肿,下肢尤甚
- C.腰酸乏力,下肢逆冷
- D.小便不利
- E.舌淡,苔白润,脉沉迟

【答案】A

【解析】子肿肾虚证症见妊娠数月,面浮肢肿,下肢尤甚,按之如泥,头晕耳鸣,腰酸无力,下肢逆冷,小便不利,舌淡,苔白润,脉沉迟。选项 A 口淡而腻,脘腹胀满为子肿之脾虚证的表现。

涉及考点 | 子肿的辨证论治

51.产后小便不通的基本病机是

- A.气虚冲任不固
- B.脾肺气虚,传导无力
- C.膀胱气化不利
- D.膀胱失约

E.脾肾阳虚,水湿不化

【答案】C

【解析】产后小便不通的主要病机是膀胱气化失司所致。若肺脾气虚,肾阳不足,气机阻滞或瘀血阻滞,可导致膀胱气化失常,发为小便不通。常见的病因有气虚、肾虚和血瘀。

涉及考点 | 产后小便不通的病因病机

52.治疗阴痒之肝经湿热证,应首选的方剂是

- A.易黄汤
B.内补丸
C.柴胡疏肝散
D.龙胆泻肝汤
E.清肝利湿汤

【答案】D

【解析】阴痒之肝经湿热证症见阴部瘙痒灼痛,带下量多,色黄如脓,稠黏臭秽,头晕目眩,口苦咽干,心烦不宁,便秘溲赤,舌红,苔黄腻,脉弦滑而数。治法为清热利湿,杀虫止痒。方剂为龙胆泻肝汤或萆薢渗湿汤,外用蛇床子散。

涉及考点 | 阴痒的辨证论治

53.产后缺乳,面色无华,气血虚弱,应首选的方剂是

- A.通乳丹
B.下乳涌泉散
C.苍附导痰丸
D.漏芦散
E.补中益气汤

【答案】A

【解析】缺乳之气血虚弱证。治法为补气养血,佐以通乳,用通乳丹。选项B下乳涌泉散用于缺乳之肝郁气滞证。选项C苍附导痰丸合选项D漏芦散用于产后缺乳之痰浊阻滞证。

涉及考点 | 缺乳的辨证论治

54.产后三冲是指

- A.活血、通便、消导
B.冲心、冲胃、冲肺
C.清热、凉血、滋阴
D.祛寒、开郁、化痰
E.以上均非

【答案】B

【解析】产后的常见病和危重症可概括为三病、三冲、三急。三冲是指冲心、冲胃、冲肺。

涉及考点 | 产后三冲的含义

55.治疗产后身痛之肾虚证,应首选的方剂是

- A.黄芪桂枝五物汤
B.归肾丸
C.养荣壮肾汤
D.独活寄生汤
E.身痛逐瘀汤

【答案】C

【解析】产后身痛肾虚证症见产后腰膝、足跟疼痛,艰于俯仰,头晕耳鸣,夜尿多,舌淡暗,脉沉细弦。治法为补肾养血,强腰壮骨。方剂为养荣壮肾汤加秦艽、熟地黄。选项A黄芪桂枝五物汤用于产后之血虚证。选项D独活寄生汤用于产后之风寒证。选项E身痛逐瘀汤用于产后之血瘀证。

涉及考点 | 产后身痛的辨证论治



配套名师高清视频

56. 产后发热感染邪毒证, 应首选的方剂是

- A. 四物汤加苍附导痰丸
- B. 五味消毒饮
- C. 固阴煎
- D. 银翘散
- E. 丹栀逍遥丸

【答案】B

【解析】感染邪毒所致的产后发热, 是产科危急重症。治法为清热解毒, 凉血化瘀。方剂为五味消毒饮合失笑散或解毒活血汤。

涉及考点 | 产后发热的辨证论治

57. 患者, 女, 27岁, 已婚。妊娠70天, 阴道下血, 色鲜红, 腰腹坠胀作痛, 手足心热, 口干心烦, 小便黄, 大便秘结, 舌红苔黄, 脉滑数。治疗应首选的方剂是

- A. 清经散
- B. 两地汤
- C. 寿胎丸
- D. 保阴煎
- E. 胎元饮

【答案】D

【解析】患者妊娠期间阴道下血, 腰腹坠胀作痛, 可诊为胎动不安病。同时, 血色鲜红, 手足心热, 口干心烦, 小便黄, 大便秘结, 舌红苔黄, 脉滑数, 是邪热内扰所致, 故为血热证。治法为清热凉血, 养血安胎。方剂为保阴煎。选项C寿胎丸主治胎动不安肾虚证。选项E胎元饮主治胎动不安之气血虚弱证。

涉及考点 | 胎动不安的辨证论治

58. 产后三急是指

- A. 呕吐、泄泻、盗汗
- B. 高热、昏迷、自汗
- C. 心悸、气短、抽搐
- D. 尿闭、便难、冷汗
- E. 下血、腹痛、心悸

【答案】A

【解析】产后的常见病和危重症可概括为三病、三冲、三急。三急是指呕吐、盗汗、泄泻。

涉及考点 | 产后三急的含义

59. 产后三病是指

- A. 呕吐、泄泻、盗汗
- B. 尿失禁、缺乳、大便难
- C. 血晕、发热、痉证
- D. 病瘕、病郁冒、大便难
- E. 腹痛、恶露不下、发热

【答案】D

【解析】产后的常见病和危重症可概括为三病、三冲、三急。三病是指产后病瘕、郁冒、大便难。三冲是指冲心、冲胃、冲肺。三急是指呕吐、盗汗、泄泻。

涉及考点 | 产后三病的含义

60. 下列各项, 属于阴痒肝肾阴虚证临床表现的是

- A. 心烦易怒, 小便黄赤
- B. 带下量多, 色黄如脓
- C. 带下灰白如凝乳, 味腥臭
- D. 会阴部肤色变浅
- E. 舌体胖大, 舌质红

【答案】D

【解析】阴痒肝肾阴虚证症见阴部瘙痒难忍, 干湿灼热, 夜间加重, 或会阴部肤色变浅白,

皮肤粗糙,皴裂破溃,眩晕耳鸣,五心烦热,烘热汗出,腰酸腿软,口干不欲饮,舌红少苔,脉细数无力。

涉及考点 | 阴痒的辨证论治

61. 输卵管造影术的适应证是

- A. 异位妊娠引起的内出血
B. 输卵管不通的不孕症
C. 卵泡破裂引起的盆腔炎积液
D. 探测羊水量
E. 外阴部特异性感染

【答案】B

【解析】输卵管造影术指将造影剂注入子宫腔及输卵管使之显影,以了解子宫、输卵管内腔的情况,协助诊断子宫内膜息肉、肿瘤、畸形、宫腔粘连、宫颈内口松弛症、盆腔慢性炎症以及输卵管阻塞的部位。适用于不孕症,习惯性流产,确定生殖器畸形的类别。

涉及考点 | 输卵管不通畅检查

62. 患者,女,22岁,未婚。经期延后,量少、色暗、有血块,腹痛喜热,畏寒,舌暗苔白,脉沉紧。其治法是

- A. 暖宫止痛调经
B. 理气止痛调经
C. 活血行气调经
D. 扶阳祛寒调经
E. 温经散寒调经

【答案】E

【解析】主症为经期延后,量少、色暗、有块,伴腹痛拒按,喜热畏寒,辨证为月经后期血寒之实寒证。治法为温经散寒调经。选项D扶阳祛寒调经为重要干扰项,为月经后期之血寒—虚寒证治法。

63. 患者,女,27岁,已婚。近几个月来带下量多、黏稠、色黄,胸闷心烦,纳少便溏,舌苔黄腻,脉细滑。其治法是

- A. 清热利湿止带
B. 健脾利湿止带
C. 健脾益气止带
D. 清热解毒止带
E. 补肾健脾止带

【答案】A

【解析】由患者症状可诊断为带下过多之湿热下注证。治法为清热利湿止带。

涉及考点 | 带下过多的辨证论治

64. 治疗阴挺之气虚证,应首选的方剂是

- A. 举元煎
B. 大补元煎
C. 补中益气汤
D. 归脾汤
E. 人参归脾汤

【答案】C

【解析】阴挺之气虚证。治法为补中益气,升阳举陷。方剂为补中益气汤加金樱子、杜仲、续断。选项D归脾汤用于阴挺之肾虚证。所以本题选择C。

涉及考点 | 阴挺的辨证论治

65. 患者,女,49岁。月经或前或后,烘热出汗,五心烦热,头晕耳鸣,腰酸乏力,舌红苔薄,脉细数。治疗应首选的方剂是

- A. 左归丸合二至丸
B. 内补丸

- C.肾气丸
E.二仙汤合二至丸
- D.两地汤合二至丸

【答案】A

【解析】七七之年，肾阴不足，天癸渐竭，乙癸同源，肝肾阴虚，遂发绝经前后诸证。烘热汗出，五心烦热，头晕耳鸣，腰酸乏力，舌红，脉细数均为肾阴虚之象。辨证属绝经前后诸证之肾阴虚证。治法为滋阴补肾。方剂为左归丸。选项B内补丸、选项C肾气丸主治肾阳虚证。选项D两地汤合二至丸主治肾阴虚证。选项E二仙汤合二至丸治疗肾阴阳不足证。

涉及考点 | 绝经前后诸证的辨证论治

66.工具避孕指的是

- A.宫内节育器，阴茎套，阴道隔膜
B.宫内节育器，阴茎套，阴道药环
C.宫内节育器，阴茎套，避孕药物
D.宫内节育器，阴茎套，皮下埋植
E.宫内节育器，阴茎套，避孕药膏

【答案】A

【解析】工具避孕是利用器具防止精液泄入阴道，阻止泄入阴道内的精子进入子宫腔，或改变子宫腔内的环境，以实现避孕目的的方法。目前常用的避孕工具有宫内节育器、阴道隔膜、阴茎套。

涉及考点 | 工具避孕

67.患者月经提前，量多，经色深红，质稠，经行不畅，有块；时有少腹胀痛，乳房胀痛，口苦咽干，经期烦躁易怒，舌红，苔薄黄，脉弦数。治疗应首选的方剂是

- A.丹栀逍遥散
B.两地汤
C.保阴煎
D.固阴煎
E.清经散

【答案】A

【解析】肝郁化火，热扰冲任，迫血下行，则经行先期；火热伤津耗液，故经色深红，质稠；肝郁气滞，则胸胁少腹胀痛；肝经郁热，热扰心神，故烦躁易怒；肝郁化热，则口苦咽干，舌红，苔黄，脉弦数。为肝郁血热型，治疗应疏肝解郁，清热调经，代表方剂为丹栀逍遥散。

涉及考点 | 月经先期的辨证

68.下列各项，不属于带脉失约导致的疾病是

- A.滑胎
B.带下病
C.胎动不安
D.子宫脱垂
E.崩漏

【答案】E

【解析】带脉环腰一周，约束诸经，与冲、任、督三脉纵横交错，络胞而过。若带脉失于约束，湿浊下注胞中，就会成为带下病。故带脉失约可导致带下病、滑胎、胎动不安等。

涉及考点 | 带脉的生理功能

69.患者，女，30岁，已婚、孕后因持重而继发腰酸腹痛，胎动下坠，精神倦怠，脉滑无力。治疗应首选的方剂是

- A.举元煎
B.胎元饮
C.固下益气汤
D.加味圣愈汤
E.加味阿胶汤

【答案】B**【解析】**患者胎动下坠,腰酸腹痛,可诊断为胎动不安证。同时,精神倦怠,脉滑无力,是气血虚弱,冲任匮乏而致,应为气血虚弱证。治法为补气养血、固肾安胎。方剂为首选胎元饮。

涉及考点 | 胎动不安的辨证论治

70.患者,女,30岁,已婚。月经先后无定期,质稀、量少,腰痛,头晕,舌淡少苔,脉沉细弱。其证候是

- | | |
|--------|--------|
| A.肝郁 | B.肝血不足 |
| C.脾虚 | D.肾虚 |
| E.气血虚弱 | |

【答案】D**【解析】**肾气虚弱,封藏失司,冲任不调,血海蓄溢失常,以致月经先后无定期,肾气亏损,阴阳两虚,阴不足则经量少,阳不足则经质稀、量少,腰痛、头晕、舌脉均为肾气不足之症。

涉及考点 | 月经先后无定期的辨证

71.患者月经停闭半年,神疲肢倦,头晕眼花,心悸气短,面色萎黄,舌淡,苔薄,脉沉缓。治疗应首选的方剂是

- | | |
|---------|---------|
| A.参苓白术散 | B.归肾丸 |
| C.参芪四物汤 | D.人参养荣汤 |
| E.大补元煎 | |

【答案】D**【解析】**屡伤脾胃,生化之源不足,或久病大病,营血亏虚,血虚气弱,冲任不充,不能按时满溢,故月经周期延迟、量少、色淡红质薄。脏腑气血进一步损伤,血海空虚,无血可下而月经停闭。本题题干均为气血虚弱之症。治法为益气养血调经。方剂为人参养荣汤。

涉及考点 | 闭经的辨证论治

72.患者,女,22岁。月经初潮16岁,痛经6年,每于第1天出现小腹冷痛,喜温喜按,经量少、色暗淡,腰腿酸软,小便清长,舌苔白,脉沉迟。治疗应首选的方剂是

- | | |
|-----------------|---------------|
| A.温经汤(《妇人大全良方》) | B.圣愈汤 |
| C.调肝汤 | D.温经汤(《金匱要略》) |
| E.金匱肾气丸 | |

【答案】D**【解析】**素禀阳虚,阴寒内生,冲任、胞宫失于温养而凝滞,不得畅通而小腹冷痛,喜温喜按。经量少,色暗淡,腰腿酸软,小便清长,舌苔白润,脉沉迟,均为虚寒的表现。故辨证属痛经之阳虚内寒证。治以温经扶阳,暖宫止痛。方剂为温经汤(《金匱要略》)。选项A温经汤(《妇人大全良方》)主治月经过多,有血块。选项B圣愈汤主治失血或血虚。选项C调肝汤主治妇人肾水不足,肝气不疏。选项E金匱肾气丸主治肾阳不足证。

涉及考点 | 痛经的辨证论治

73.患者,女,20岁,未婚。月经淋漓20日不止,色淡红,质清稀,面色晦暗,头晕耳鸣,腰腿酸软,倦怠乏力,舌淡,苔白润,脉沉弱。治疗应首选的方剂是

- | | |
|------------|-------|
| A.八珍汤 | B.归脾汤 |
| C.加减苁蓉菟丝子丸 | D.右归丸 |
| E.加减一阴煎 | |

【答案】C

【解析】先天不足或少女肾气未盛,天癸不充,肾气不壮、而见封藏失司,冲任不固,不能制约月经,发为崩漏。色淡,质稀,面色晦暗,头晕耳鸣,腰膝酸软,倦怠乏力,舌淡,苔白润,脉沉弱,均为肾气虚表现。辨证属崩漏之肾气虚衰证。治法为补肾益气,固冲止血。方剂为加减苁蓉菟丝子丸。选项 A 八珍汤主治气血不足证。选项 B 归脾汤主治心脾两虚证。选项 D 右归丸主治肾阳虚证。选项 E 加减一阴煎主治阴血不足之虚热证。

涉及考点 | 崩漏的辨证论治

74.患者,女,30岁,已婚。经行量多,色淡红,质清稀,伴有神疲肢倦,气短懒言,小腹空坠,面色㿔白,舌淡,苔薄,脉细弱。其证候是

- | | |
|------|------|
| A.血虚 | B.气虚 |
| C.血瘀 | D.血热 |
| E.阴虚 | |

【答案】B

【解析】气虚则冲任不固,经血失于制约,故经行量多;气虚火衰不能化血为赤,故经色淡红,质清稀;气虚中阳不振,故神疲肢倦,气短懒言;气虚失于升提,故小腹空坠;气虚阳气不布,故面色㿔白,舌淡,脉细弱均为气虚之象。

涉及考点 | 月经过多的辨证

75.患者,女,45岁。月经不规律8个月,现阴道出血40天量时多时少,近3天量极多、色淡、质稀,伴气短神疲,面浮肢肿,舌淡苔薄白,脉缓弱。治疗应首选的方剂是

- | | |
|---------|---------|
| A.举元煎 | B.补中益气汤 |
| C.固本止崩汤 | D.清热固经汤 |
| E.保阴煎 | |

【答案】C

【解析】由患者症状可诊断为崩漏之脾虚证。治法为补气摄血,固冲止崩。方剂为固本止崩汤或固冲汤。选项 A 举元煎主治气虚下陷,血崩血脱,亡阳垂危等证。选项 B 补中益气汤主治清阳下陷,中气不足之证。选项 D 清热固经汤主治崩漏之血热实证。选项 E 保阴煎主治阴虚内热动血。

涉及考点 | 崩漏的辨证论治

76.患者,女,38岁,已婚。近半年来,月经23~25天一行,量少、色红、质稠,持续12~14天,咽干,潮热,舌红少苔,脉细数。可诊断为

- | | |
|----------|--------|
| A.经期延长 | B.月经先期 |
| C.月经量少 | D.漏下 |
| E.绝经前后诸证 | |

【答案】A

【解析】月经周期基本正常,行经时间超过7天以上,甚或淋漓半月方净者,称为经期延长。选项 B 月经先期是指以月经周期比正常提前为主要表现的月经病。选项 C 月经量少(月经过少)是指月经周期基本正常,经量明显减少,甚至点滴即净;或经期缩短不足两天,经量亦少者,均称为“月经过少”。选项 D 漏下是指妇女经水停后,又续见下血,淋漓不断者。选项 E 绝经前后诸证是指以妇女在绝经前后,或轻或重、或久或暂出现月经紊乱,烘热汗出,头晕耳鸣,失眠健忘,心悸失眠,烦躁易怒,腰背酸楚等为常见表现的妇科疾病。

涉及考点 | 经期延长的定义

77. 患者,女,38岁,已婚。近几年形体渐胖,胸闷呕恶,倦倦乏力,月经停闭半年,平时带下量多色白,舌淡胖,苔白腻,脉沉滑。尿妊娠试验阴性。治疗应首选的方剂是

- A. 血府逐瘀汤
B. 苍附导痰丸
C. 参苓白术散
D. 人参养荣丸
E. 香砂六君子汤

【答案】B

【解析】患者停经半年,妊娠试验阴性,可判断为闭经。肥胖之人,胸闷呕恶,倦怠乏力,带下量多色白,舌淡胖,苔白腻,脉沉滑,均为痰湿阻滞之象。辨证属闭经之痰湿阻滞证。治法为健脾燥湿化痰,活血调经。方剂为苍附导痰丸。选项A血府逐瘀汤主治上焦瘀血证。选项C参苓白术散主治中气下陷证。选项D人参养荣丸主治闭经之气血虚弱。选项E香砂六君子汤主治脾胃气虚,痰阻气滞证。

涉及考点 | 闭经的辨证论治

78. 患者,女,34岁,已婚。经行先后不定,经量多、色红、质稠,少腹痛,乳房胀痛,舌暗红,苔薄黄,脉弦。治疗应首选的方剂是

- A. 逍遥散
B. 小柴胡汤
C. 加味逍遥散
D. 血府逐瘀汤
E. 当归芍药散

【答案】A

【解析】肝郁疏泄闭藏失职,致冲任气机紊乱,沉思积郁,而肾气日消,则月经或迟或早,量多或少。肝郁气滞,则色红,质稠,少腹、乳房胀痛,舌暗红,苔薄黄,脉弦,均属肝郁。故辨证属月经先后不定期之肝郁证。治法为疏肝理气调经。方剂为逍遥散。选项B小柴胡汤主治妇人伤寒,热入血室。选项C加味逍遥散主治产后发热。选项D血府逐瘀汤主治上焦瘀血证。选项E当归芍药散主治妇人肝气郁滞之腹痛。

涉及考点 | 月经先后无定期的辨证论治

79. 患者,女,31岁,已婚。月经先后无定期,量少,色淡暗,质清,腰骶酸痛,头晕耳鸣,舌淡,苔白,脉细弱。治疗应首选的方剂是

- A. 肾气丸
B. 六味地黄丸
C. 大补元煎
D. 固阴煎
E. 归肾丸

【答案】D

【解析】月经量少,色淡暗,质清,辨证为虚证。腰骶酸痛,头晕耳鸣,腰为肾之府,肾开窍于耳,其脉内通于脑,结合舌脉,可辨证为肾虚证。肾气虚弱,封藏失司,冲任失调,血海蓄溢无常。治法为补肾调经。方剂为固阴煎。

涉及考点 | 月经先后无定期的辨证论治

80. 患者,女,36岁,已婚。经行肢体肿胀,按之随手而起,经色暗红有块,伴腕闷胁胀,善叹息,舌紫暗,苔薄白,脉弦涩。治疗应首选的方剂是

- A. 苓桂术甘汤
B. 参苓白术散
C. 八物汤
D. 肾气丸
E. 丹栀逍遥丸

【答案】C

【解析】气滞情志久郁，经行不畅，气机受阻，升降失司，水道通调不利，水湿不运，水泛为肿，按之随手而起。气滞则血瘀，经色暗红有块，舌紫暗，脉弦涩。腕闷胁胀，善叹息，均属于气滞之象。故辨证属经行浮肿之气滞血瘀证。治法为理气行滞，养血调经。方剂为八物汤。选项D肾气丸合选项A苓桂术甘汤主治经行浮肿之脾肾阳虚证。选项B参苓白术散主治中气下陷证。选项E丹栀逍遥散主治肝脾不和证。

涉及考点 | 经行浮肿的辨证论治

81.患者，女，29岁。已婚2年一直未孕，既往月经周期26~28天，行经期4~6天。现停45天，突然左下腹撕裂样剧痛，并伴头晕恶心，面色苍白。不应采取的措施是

- A.妊娠试验
- B.腹部叩诊
- C.后穹隆穿刺
- D.立即转院
- E.妇科检查

【答案】D

【解析】患者出现停经，突然出现左下腹撕裂样剧痛，应首先考虑异位妊娠。如果妊娠试验阳性，行腹部叩诊，看是否有移动性浊音以确定是否有内出血，也可以做妇科检查、后穹隆穿刺以确定是否发生异位妊娠破裂，所以A、B、C、E均正确。不可立即转院，以免途中发生意外。

涉及考点 | 异位妊娠的急症处理

82.下列各项，不属于妇人癥瘕主要症状的是

- A.下腹部胀满
- B.下腹部疼痛
- C.腰腹部疼痛
- D.下腹部结块
- E.异常出血

【答案】C

【解析】妇人下腹部结块，伴有或胀或痛或满，甚或出血者称为“癥瘕”，故腰腹部疼痛不属于。

涉及考点 | 癥瘕的含义

2年 易错考题

1.患者，女，31岁，已婚。曾孕3次，均自然流产，平日头晕耳鸣，腰膝酸软，精神萎靡，现又妊娠33天，夜尿频多，面色晦暗，舌淡苔白，脉沉弱。治疗应首选的方剂是

- A.加味阿胶汤
- B.补肾安胎饮
- C.泰山磐石散
- D.补肾固冲丸
- E.以上均非

【答案】D

【解析】患者曾堕胎3次，可诊为滑胎病。同时，头晕耳鸣，腰膝酸软，精神萎靡，夜尿频多，属肾气不足证。选方补肾固冲丸。补肾安胎饮用于滑胎之气血两虚证。

涉及考点 | 滑胎的辨证论治

2.患者，女，27岁，已婚。产后腰脊酸痛，腿膝乏力，头晕耳鸣，舌淡红苔薄，脉沉细。治疗应首选的方剂是

- A.身痛逐瘀汤
- B.黄芪桂枝五物汤

C.养荣壮肾汤

D.独活寄生汤

E.防风汤

【答案】C

【解析】主症为产后腰脊酸痛,腿膝乏力,伴头晕耳鸣,辨证为产后身痛之肾虚证。治法为补肾养血,强腰壮骨。方剂为养荣壮肾汤。选项 A 身痛逐瘀汤用于产后身痛之血瘀证。选项 B 黄芪桂枝五物汤用于产后身痛之血虚证。选项 D 独活寄生汤或选项 E 防风汤用于产后身痛之风寒证,亦可用趁痛散。

涉及考点 | 产后身痛的辨证论治

3.患者,女,30岁,已婚。产后乍寒乍热,伴恶露虽下甚少,色紫暗有块,小腹疼痛拒按,舌紫暗,有瘀斑,脉弦涩有力,治疗应首选的方剂是

A.少腹逐瘀汤

B.八珍汤

C.保阴煎

D.生化汤

E.血府逐瘀汤

【答案】D

【解析】主症为产后乍寒乍热,伴恶露虽下甚少,色紫暗有块,小腹疼痛拒按,舌紫暗,有瘀斑,脉弦涩有力,辨证为产后发热之血瘀证。治法为活血化瘀,和营退热。方剂为生化汤加味或桃红消瘀汤。

涉及考点 | 产后发热的辨证论治

4.患者,女,24岁,已婚。妊娠6个半月,面目四肢浮肿,皮薄光亮,按之没指,纳呆便溏,舌胖嫩苔黄腻,脉滑缓无力。治疗应首选的方剂是

A.茯苓导水汤

B.真武汤

C.天仙藤散

D.猪苓汤

E.白术散

【答案】E

【解析】患者妊娠期间面目四肢浮肿,可诊为子肿。浮肿部位皮薄光亮,按之没指,纳呆便溏,是脾虚不运所致,应为脾虚证。治法为健脾利水。方剂为白术散加砂仁或健脾利水汤。选项 B 治疗子肿之肾虚证。选项 C 治疗子肿之气滞证。

涉及考点 | 子肿的辨证论治

5.下列除哪项外均是玉门的别称

A.胞门

B.阴门

C.产门

D.子门

E.龙门

【答案】D

【解析】子门,是指子宫颈口的部位。又名子户。

涉及考点 | 宫颈口的名称

(6~7题共用备选答案)

A.激经

B.暗经

C.季经

D.避年

E.居经

6.妇女终身不来潮而能受孕者,称为

【答案】B

【解析】选项 A 激经为受孕初期仍能按月经周期有少量出血而无损于胎儿者。选项 B 暗经为女性终生不潮而却能受孕者。选项 C 居经或选项 E 季经为月经三个月一潮者。选项 D 避年为月经 1 年一行者。

7.受孕初期仍按月经少量出血而无损胎儿者,称为

【答案】A

【解析】选项 A 激经为受孕初期仍能按月经周期有少量出血而无损于胎儿者。选项 B 暗经为女性终生不潮而却能受孕者。选项 C 居经或选项 E 季经为月经三个月一潮者。选项 D 避年为月经 1 年一行者。

涉及考点 | 特殊生理性月经的定义

8.下列关于生理性带下的描述,错误的是

- A.色白或无色透明
- B.质地黏稠
- C.其量适中
- D.无特殊气味
- E.从阴道内排出的一种阴液

【答案】B

【解析】生理性带下:色白或无色透明,其量适中,质地黏而不稠,滑润如膏,无异臭气味,色白或无色透明。

涉及考点 | 生理性带下的性状

9.围生期是指

- A.孕期 28 周到产后 1 周
- B.孕期 28 周到产后 2 周
- C.孕期 29 周到产后 1 周
- D.孕期 29 周到产后 2 周
- E.孕期 29 周到产后 4 周

【答案】A

涉及考点 | 围生期的定义

10.血虚致冲任血海不能由满而溢,或失于濡养,不会发生下列哪种疾病

- A.痛经
- B.月经后期
- C.月经过少
- D.闭经
- E.月经先期

【答案】E

【解析】血虚致冲任血海匮乏不能由满而溢,或失于濡养,可发生月经后期、月经过少、闭经、痛经、妊娠腹痛、胎动不安、滑胎、胎萎不长、产后缺乳、产后身痛、产后血虚、不孕。

涉及考点 | 血虚致病

11.下列月经病的治疗,错误的是

- A.重在治本调经
- B.分清先病和后病
- C.急则治标,缓则治本
- D.顺应不同年龄阶段论治
- E.多用辛温暖宫之品

【答案】E

【解析】月经病的治疗原则:①治本调经。②分清先病和后病的论治原则。③本着“急则治其标,缓则治其本”的原则。

涉及考点 | 月经病的治疗原则

12. 患者,女,19岁。月经29天一行,量多,色紫红,质稠,心烦,口渴,舌红苔黄,脉滑数有力。其诊断是

- A. 月经过多血热证
B. 月经先期血热证
C. 月经先期虚热证
D. 月经先期肝热证
E. 月经过多气虚证

【答案】A

【解析】月经过多之血热型主要证候:经行量多,色鲜红或深红,质黏,或有血块,口渴饮冷,心烦,尿黄便结,舌红,苔黄,脉滑数。治法:清热凉血,固冲止血。代表方:保阴煎加地榆、茜草。

涉及考点 | 月经过多的辨证论治

13. 患者,女,36岁,已婚。两次月经中间,阴道少量出血,色鲜红,头晕腰酸,夜寐不宁,五心烦热,舌质红,苔薄,脉细数。其治法是

- A. 益气补肾,固冲止血
B. 滋肾养阴,固冲止血
C. 养阴清热,固冲止血
D. 补肾养肝,固冲止血
E. 益气养阴,凉血清热

【答案】B

【解析】两次月经中间,阴道少量出血判断为经间期出血,由色鲜红,头晕腰酸,夜寐不宁,五心烦热,舌质红,苔薄,脉细数,辨证为肾阴虚证。治法为滋肾养阴,固冲止血。

涉及考点 | 经间期出血的辨证论治

14. 下列各项,不属于痛经气血虚弱证主症的是

- A. 月经量少,色淡,质稀
B. 腹痛出现在行经之后
C. 神疲乏力,面色无华
D. 头晕眼花,腰痛如折
E. 头晕心悸,舌质淡,脉细无力

【答案】D

【解析】痛经气血虚弱证候表现为:经期或经后小腹隐痛喜按,小腹及阴部空坠不适,月经量少,色淡质稀,神疲乏力,头晕心悸,面色无华,舌淡,脉细无力。头晕眼花,腰痛如折属于肾虚证。

涉及考点 | 痛经的辨证论治

15. 血虚引起经行头痛的特点是

- A. 头晕,头部绵绵作痛
B. 巅顶掣痛,头晕目眩
C. 头痛剧烈,痛如锥刺
D. 头部胀痛重着
E. 头痛如裹,头晕目眩

【答案】A

【解析】头部绵绵作痛血虚头痛特点。选项B巅顶掣痛,头晕目眩是属于肝火头痛特点。选项C头痛剧烈,痛如锥刺是血瘀特点。选项D头部胀痛重着属于气滞特点。选项E头痛如裹,头晕目眩属于痰湿特点。

涉及考点 | 经行头痛

16. 患者,女,20岁,未婚。每于经期鼻衄,量多,色深红,心烦易怒,口苦咽干,尿黄便结,近3个月来,月经提前7天,量少,色红,舌红苔黄,脉弦数。其诊断是

- A. 逆经肺肾阴虚证
B. 月经先期血热证

- C.逆经肝经郁火证
E.月经过少血虚证

D.月经先期肝郁化热证

【答案】C

【解析】经行吐衄的定义是每逢经行前后,或正值经期,出现周期性的吐血或衄血,亦有倒经、逆经之称。由题干每于经期鼻衄,辨病为逆经,由心烦易怒,口苦咽干,尿黄便结,舌红苔黄,脉弦数,辨证为肝经郁火证。

涉及考点 | 经行吐衄

17.下列各项,不属于绝经前后诸证临床表现的是

- A.烘热汗出,烦躁易怒
B.潮热面红,眩晕耳鸣
C.心悸失眠,腰背酸楚
D.面浮肢肿,情志不宁
E.四肢抽搐,肌肉酸楚

【答案】E

【解析】妇女在绝经前后伴随月经紊乱或绝经出现如阵发型烘热汗出、烦躁易怒、潮热面红、眩晕耳鸣、心悸失眠、皮肤蚁行感;或体倦乏力,面浮肢肿等症状,为绝经前后诸症。

涉及考点 | 绝经前后诸证的含义

18.下列除哪项外,均是妊娠禁药

- A.峻下剂
B.破血剂
C.逐瘀剂
D.和血剂
E.有毒剂

【答案】D

【解析】凡峻下、滑利、祛瘀、破血、耗气、散气及一切有毒药品,都应慎用或禁用。

涉及考点 | 妊娠的禁忌药

19.下列各项,不属于妊娠病常见发病机理的是

- A.冲气上逆
B.瘀血内阻
C.阴血虚
D.气滞
E.脾肾虚

【答案】B

【解析】妊娠病的发病机理有三:一是孕后阴血下聚冲任养胎,机体属于阴血偏虚,阳气偏亢的生理状态。二是胎儿逐渐长大,胎体上升影响气机的升降。三是素体脾胃虚弱,生化之源不足,胎失所养,或先天肾气不足,胞失所系。

涉及考点 | 妊娠病的发病机理

20.下列哪项是产后用药“三禁”

- A.活血、通便、消导
B.大汗、峻下、利小便
C.清热、凉血、滋阴
D.祛寒、开郁、化瘀
E.以上均非

【答案】B

【解析】产后用药“三禁”:①禁大汗以防亡阳。②禁峻下以防亡阴。③禁通利小便以防亡津液。

涉及考点 | 产后三禁

21.下列各项,不属于放置宫内节育器禁忌证的是

- A.滴虫性阴道炎
B.月经过多
C.重度痛经
D.宫颈口松
E.足月产后3月

【答案】E

【解析】放置宫内节育器禁忌证：月经过多过频；生殖道急性炎症；生殖器官肿瘤；子宫畸形；宫颈过松、重度陈旧宫颈裂或子宫脱垂；严重全身性疾病。

涉及考点 | 宫内节育器禁忌症

- 22.下列各项,不属于人工流产并发症的是
A.人流综合征
B.子宫穿孔
C.人流后宫缩不良
D.人流不全
E.人流术后感染

【答案】C

【解析】人工流产综合征、子宫穿孔、人流不全、宫腔或颈管内口粘连、术后感染均属于人工流产并发症。

涉及考点 | 人工流产并发症

(23~24题共用备选答案)

- A.血热证
B.脾肾虚弱证
C.肾阳亏虚证
D.气血虚弱证
E.血瘀证

23.胎动不安可用胎元饮治疗的证候是

【答案】D

24.滑胎可用泰山磐石散治疗的证候是

【答案】D

【解析】胎元饮补气养血,固肾安胎,用于气血虚弱导致的胎动不安。泰山磐石散益气养血,固冲安胎,适用于气血虚弱导致的滑胎。

涉及考点 | 胎动不安、滑胎的辨证论治

(25~26题共用备选答案)

- A.血瘀
B.风寒
C.肾虚
D.血虚
E.气虚

25.产后肢体关节疼痛,屈伸不利,痛无定处。其证候是

【答案】B

26.产后遍身关节酸楚,肢体麻木,头晕心悸。其证候是

【答案】D

【解析】肢体关节疼痛;屈伸不利,痛无定处是风寒证的证候,遍身关节酸楚,肢体麻木,头晕心悸,是血虚证的主要证候。

涉及考点 | 产后身痛的辨证

- 27.下列各项,不属于产后身痛的是
A.产后痛风
B.产后关节痛
C.产后痹证
D.儿枕痛

E.产后风

【答案】C

【解析】妇女在产乳期内出现肢体关节酸痛,麻木重着者,称为“产后身痛”亦称“产后遍身疼痛”,“产后关节痛”,“产后痛风”,俗称“产后风”。

涉及考点 | 产后身痛的含义

28.患者,女,27岁,已婚。产后恶露35天不止,色深红、质稠黏,有臭气,口燥咽干,舌红,脉虚细而数。治疗应首选的方剂是

A.清热固经汤

B.保阴煎

C.清热调血汤

D.清经散

E.牡丹散

【答案】B

【解析】患者产后恶露持续35天不止,可诊为产后恶露不绝病。恶露色深红,质黏稠,有臭气,口燥咽干,舌红,脉虚细数,是血热内扰所致,为血热证。治法为养阴清热止血。方剂为保阴煎。

涉及考点 | 产后恶露不绝的辨证论治

29.患者,女,27岁,已婚。产后恶露1个月未止。量多、色淡、无臭气,小腹空坠,神倦懒言,舌淡,脉缓弱。治疗应首选的方剂是

A.举元煎

B.固本止崩汤

C.生化汤

D.八珍汤

E.补中益气汤

【答案】E

【解析】患者产后恶露持续1月不止,可诊为产后恶露不绝病。恶露量多、色淡、无臭气,小腹空坠,神倦懒言,舌淡,脉缓弱均为气虚之象,故为气虚证。治法为补气摄血固冲。方剂为补中益气汤。生化汤主治产后恶露不绝之血瘀证。

涉及考点 | 产后恶露不绝的辨证论治

30.患者,女,37岁,已婚。下腹部肿块,热痛起伏,触之痛剧,痛连腰骶,经行量多,经期延长,带下量多,色黄如脓,或赤白兼杂。兼见身热口渴,心烦不宁,大便秘结,小便黄赤,舌暗红,有瘀斑,脉弦滑数。治疗应首选的方剂是

A.膈下逐瘀汤

B.少腹逐瘀汤

C.大黄牡丹汤

D.理冲汤

E.止带方

【答案】C

【解析】根据患者症状可诊断为癥瘕之湿热瘀阻证。治法为清热利湿,化瘀消癥。方剂为大黄牡丹汤。选项A治疗慢性盆腔炎之气滞血瘀证。选项B治疗慢性盆腔炎之寒湿凝滞证。选项D治疗慢性盆腔炎之气虚血瘀证。选项E治疗带下量多之湿热下注证。

涉及考点 | 癥瘕的辨证论治

第八篇 中医儿科学



考情分布图

		2015	2016	2017	2018	2019
中医儿科学	儿科学基础	2	1	2	2	2
	儿童保健	0	1	1	1	0
	新生儿疾病	3	2	2	2	2
	肺系病症	4	3	2	2	2
	脾系病症	2	3	3	3	3
	心肝病症	3	3	3	3	2
	肾系病症	2	1	2	2	2
	传染病	3	1	2	1	2
	虫证	0	1	0	0	1
	其他疾病	1	0	0	1	0



高频考点必背

1. **胎儿期**指从男女生殖之精相合而受孕,直至分娩断脐,胎儿出生。
2. **新生儿期**指从出生后脐带结扎到出生后 28 天。
3. **婴儿期**指从出生后至满 1 周岁,其中包括新生儿期。生长发育迅速。
4. **幼儿期**指从 1 周岁至满 3 周岁。
5. **学龄前期**指从 3 周岁后到入小学前(6~7 岁)。
6. **学龄期**指从 6~7 周岁入小学至青春来临(女 12 岁,男 13 岁)。
7. **青春期**指女孩从 11~12 岁到 17~18 岁,男孩从 13~14 岁到 18~20 岁。体格发育出现第二次高峰。
8. 公式推算小儿体重:
<6 个月体重(kg) = 3+0.7×月龄
7~12 个月体重(kg) = 6+0.25×月龄
1 岁以上体重(kg) = 8+2×年龄
9. 出生时身长约为**50 cm**。生后第一年身长增长最快,约**25 cm**,其中前 3 个月约增长**12 cm**。第二年身长增长速度减慢,约增长**10 cm**。
10. 2 岁后至 12 岁儿童的身高:**身高(cm) = 75+7×年龄**
11. 前囟在出生时约**1.5~2 cm**,至**12~18 个月**闭合。
12. 后囟是顶骨和枕骨之间的三角形间隙,部分小儿出生时就已闭合,未闭合者正常情况应在生后**2~4 个月内**闭合。
13. 头小畸形指囟门早闭且头围明显**小于**正常者。
14. 囟门迟闭及头围大于正常者,常见于**解颅(脑积水)**、**佝偻病**、**先天性甲状腺功能减低**

症等。

15. 凶门凹陷多见于阴伤液竭之失水或极度消瘦者,称**凶陷**。

16. 凶门凸出反映颅内压增高,多见于热炽气营之脑炎、脑膜炎等,称**凶填**。

17. 足月儿出生时头围约为**33~34 cm**;出生后前3个月和后9个月各增长**6 cm**;1周岁时约为**46 cm**;2周岁时约为**48 cm**;5周岁时约增长至**50 cm**;15岁时接近成人,为**54~58 cm**。

18. 新生儿胸围约**32 cm**;1岁时约**44 cm**,接近头围;2岁后胸围渐大于头围,其差数(cm)约等于其**岁数减1**。

19. 乳牙约在**2~2.5岁**出齐。

20. **6岁**左右开始萌出**第1颗恒牙**,自**7~8岁**开始,乳牙按萌出先后逐个脱落,代之以恒牙。

21. 2岁以内乳牙颗数公式推算:**乳牙数=月龄-4(或6)**

22. 小儿血压正常值公式推算(注:1kPa=7.5 mmHg):**收缩压(mmHg)=80+2×年龄**; **舒张压(mmHg)=收缩压×2/3**

23. 小儿动作发育遵循一定的规律,发育顺序是**由上向下、由粗到细、由不协调到协调**进展的。

24. 粗动作发育过程可归纳为“**二抬四撑六会坐,七滚八爬周会走**”。

25. 小儿的生理特点是**脏腑娇嫩,形气未充;生机蓬勃,发育迅速**。

26. “**纯阳**”学说中的“纯”指小儿初生,未经太多的外界因素影响,胎元之气尚未耗散;“阳”指以阳为用,即生机。

27. 小儿的病理特点是**发病容易,传变迅速;脏气清灵,易趋康复**。

28. 小儿指纹分三关。自虎口向指端,第1节为**风关**,第2节为**气关**,第3节为**命关**。察指纹适用于**3岁以下**小儿。

29. 小儿指纹的辨证纲要归纳为“**浮沉分表里,红紫辨寒热,淡滞定虚实,三关测轻重**”。

30. 小儿的用药标准为新生儿用成人量的**1/6**;乳婴儿用成人量的**1/3**;幼儿用成人量的**1/2**;学龄期儿童用成人量的**2/3**或**接近成人量**。

31. 新生儿两侧颊部各有一个脂肪垫隆起,称为“**螳螂子**”,有助吮乳,不能挑割。

32. 新生儿上腭中线和齿龈部位有散在黄白色、碎米大小隆起颗粒,称为“**马牙**”,会于数月或数月自行消失,不需挑刮。

33. 女婴生后**3~5天**乳房隆起如蚕豆到鸽蛋大小,可在**2~3周**后消退,不应处理或挤压。

34. 女婴生后5~7天阴道有少量流血,持续1~3天自止者,是为**假月经**,一般不必处理。

35. 断奶时间视母婴情况而定。小儿**4~6个月**起应逐渐添加辅食,**8~12个月**时可以完全断乳。

36. 添加辅助食品的原则:**由少到多,由稀到稠,由细到粗,由一种到多种**,在婴儿健康、消化功能正常时逐步添加。

37. 产后哺乳可**促进母体子宫收缩复原**,推迟月经复潮,不易怀孕,减少乳母患乳腺癌和卵巢肿瘤的可能性。

38. 若母亲患有严重疾病,如急性慢性传染病、活动性肺结核、慢性肾炎、糖尿病、恶性肿瘤、精神病、癫痫或心功能不全等,应**停止哺乳**。

39. 胎黄以婴儿出生后皮肤、面目出现黄疸为特征,因与胎禀因素有关,故称“胎黄”或“胎疸”。胎黄相当于西医学**新生儿黄疸**。

40. 感冒为感受外邪,以**发热、鼻塞流涕、喷嚏、咳嗽**为主要临床特征,是儿科最常见的疾

病。本病一年四季均可发生,以气候骤变及冬春时节发病率较高。

41.急乳蛾可见扁桃体**充血呈鲜红或深红色**,肿大,表面可有脓点,严重者有小脓肿。

42.慢乳蛾可见扁桃体肿大,**充血呈暗红色,或不充血**,表面或有脓点,或挤压后有少许脓液溢出。

43.外感咳嗽的病因是**外邪从口鼻或皮毛而入**,首犯肺卫,肺失宣肃,气机不利,肺气上逆。

44.内伤咳嗽的病因是**小儿脾常不足**,脾虚生痰,上贮于肺,或咳嗽日久不愈,耗伤正气。

45.肺炎喘嗽是以发热、咳嗽、痰壅、气喘,**肺部闻及中细湿啰音**,X线胸片见**炎性阴影**为主要表现,重者可见张口抬肩、呼吸困难、面色苍白、口唇青紫等症。

46.哮指声**响言**,喘指**气息言**,哮必兼喘,故通称哮喘。临床以反复发作,发作时喘促气急、**喉间哮鸣、呼吸困难、张口抬肩**、摇身撷肚为主要特征。

47.哮喘的病机关键在**痰伏于肺**,形成夙根,遇触即发。

48.哮喘发作的机制,在于**外因引动伏痰**,痰气相合。

49.反复呼吸道感染指呼吸道感染(包括上呼吸道感染、下呼吸道感染)**年发病在一定次数以上者**。简称“复感儿”。

50.鹅口疮是以**口腔、舌上蔓生白屑**为主要临床特征的一种口腔疾病。又名“雪口”。

51.小儿口疮以**齿龈、舌体、两颊、上颚等处出现黄白色溃疡**,疼痛流涎,或伴发热为特征。若满口糜烂,色红作痛者,称为口糜;溃疡只发生在口唇两侧,称为燕口疮。

52.泄泻以**大便次数增多,粪质稀薄或如水样**为特征的一种小儿常见病。其主要病变在脾胃。

53.厌食以较长时期厌恶进食、食量减少为特征。长期不愈者,可转化为**疳证**。

54.**积滞**以不思乳食,食而不化,脘腹胀满,嗳气酸腐,大便溏薄或秘结酸臭为特征。

55.疳证以**形体消瘦,面色无华,毛发干枯**,精神萎靡或烦躁,饮食异常为特征。

56.小儿疳证的病因以饮食不节、喂养不当、营养失调、疾病影响、药物过伤以及先天禀赋不足为常见,主要病变脏腑在**脾胃,脾胃受损、气血津液耗伤**为其基本病理改变。

57.轻度贫血可无自觉症状,中度以上的贫血,可出现头晕乏力、纳呆、烦躁等症,并有不同程度的**面色苍白及指甲口唇和睑结膜苍白**。

58.中度贫血:**血红蛋白 60~90 g/L;红细胞(2~3)×10¹²/L**。

59.汗证是小儿在**安静状态下**,正常环境中,全身或局部出汗过多,甚则大汗淋漓的一种病证。多发生于**5岁以内**的小儿。

60.汗证多属虚证。自汗以**气虚、阳虚**为主;盗汗以**阴虚、血虚**为主。肺卫不固证,多汗以头颈胸背为主;营卫失调证,多汗而抚之不温;气阴亏虚证,汗出遍身而伴虚热征象;湿热迫蒸证,则汗出肤热。

61.病毒性心肌炎首先需辨明虚实;凡病程短暂,见胸闷胸痛、鼻塞咽痛、气短多痰,或恶心呕吐、腹痛腹泻、舌红苔黄,属**实证**;病程长达数月,见心悸气短、神疲乏力、面白多汗、舌淡或偏红、舌光少苔,属**虚证**。

62.病毒性心肌炎以**神疲乏力、面色苍白、心悸、气短、肢冷、多汗**为临床特征。本病发病以3~10岁小儿为多。

63.注意力缺陷多动症以注意力不集中,自我控制差,动作过多,情绪不稳,冲动任性,伴有学习困难,但**智力正常**或基本正常为主要临床特征。(**男孩多于女孩,多发于学龄期**)

64.惊风是小儿时期常见的急重病证,临床以**抽搐、神昏**为主要症状。

65. **搐、搦、掣、颤、反、引、窜、视**为惊风八候。
- 66.急惊风为**痰、热、惊、风**四证俱备,临床以高热、抽风、神昏为主要表现,多由外感时邪、内蕴湿热和暴受惊恐而引发。
- 67.慢惊风**来势缓慢,抽搐无力,时作时止**,反复难愈,常伴昏迷、瘫痪等症。
- 68.单纯型肾病具备**四大特征**:①全身水肿。②大量蛋白尿。③低白蛋白血症;④高脂血症。
- 69.小儿水肿以体内水液潴留,泛滥肌肤,引起面目、四肢甚则全身浮肿及小便短少,严重的可伴有**胸水、腹水**为主要表现。
- 70.肾病综合征与急性肾炎均以**浮肿及尿改变**为主要特征,但肾病综合征以大量蛋白尿为主,且伴低白蛋白血症及高脂血症,浮肿多为指陷性。急性肾炎则以血尿为主,浮肿多为非指陷性。
- 71.水肿的风水相搏证以水肿大都先从眼睑开始,继而四肢,甚则全身浮肿,来势迅速,颜面为甚,皮肤光亮,按之凹陷即起为主要表现,方用**麻黄连翘赤小豆汤**。
- 72.尿频的发生,多由于**湿热之邪蕴结下焦**,也可因脾肾气虚,使膀胱气化功能失常所致,或病久不愈,损伤肾阴而致阴虚内热。
- 73.湿热之邪客于**肾与膀胱**,湿阻热郁,气化不利,开阖失司,膀胱失约而致尿频。
- 74.湿热下注湿热来源有两个方面:其一为**外感**,外感湿热或阴部不洁,湿热之邪感受,熏蒸于下;其二为**内伤**,因小儿脾胃不足,运化力差,内伤乳食,积滞内蕴,化为湿热。
- 75.尿频以**小便频数**为特征的疾病。多发于学龄前儿童,尤以婴幼儿发病率最高(**女孩多于男孩**)。
- 76.遗尿又称尿床,是指**5周岁以上**的小儿睡中小便自遗,醒后方觉的一种病证。多见于10岁以下的儿童。
- 77.遗尿多与膀胱和肾的功能失调有关,其中尤以**肾气不足、膀胱虚寒**为多见。
- 78.遗尿的肺脾气虚证以**夜间遗尿**,日间尿频而量多,经常感冒,面色少华,神疲乏力,食欲不振,大便溏薄为主要表现,方用补中益气汤合缩泉丸。
- 79.风痧即风疹,是感受**风痧时邪**,以轻度发热,咳嗽,全身皮肤出现**细沙样玫瑰色斑丘疹,耳后及枕部淋巴结(淋巴结)肿大**为特征的一种急性出疹性传染病。
- 80.丹痧以发热,**咽喉肿痛或伴腐烂,全身布发猩红色皮疹**,疹后脱屑脱皮为特征。西医称为“猩红热”。其舌象特点为“草莓舌”。
- 81.水痘以发热,皮肤黏膜分批出现**瘙痒性皮炎,丘疹、疱疹、结痂**同时存在为主要特征。
- 82.水痘的疱疹内含水液,形态椭圆,**状如豆粒**(一次感染水痘大多可获终生免疫)。
- 83.手足口病是感受手足口病时邪引起的发疹性传染病,临床以**手足肌肤、口咽部发生疱疹**为特征。
- 84.手足口病传染性强,易引起流行。一般预后较好,少数重症患儿可合并**心肌炎、脑炎、脑膜炎**等,甚或危及生命。
- 85.手足口病疱疹一般**7~10天**消退,疹退后**无瘢痕及色素沉着**。
- 86.疔腮以发热、耳下腮部肿胀疼痛为主要特征。西医学称为**流行性腮腺炎**(感染本病后可获终生免疫)。
- 87.疔腮的主要病机为**邪毒壅阻足少阳经脉**,与气血相搏,凝滞于耳下腮部。
- 88.足厥阴肝经循少腹络阴器,邪毒内传,引睾窜腹,可见**睾丸肿胀、疼痛**,或少腹疼痛等

症,此为毒窜辜腹之变证。

89. 疔腮以**清热解毒**、**软坚散结**为基本原则。本病治疗宜采用药物内服与外治相结合,有助于腮部肿胀的消退。

90. 蛔虫病以**脐周疼痛**、**时作时止**、**饮食异常**、大便下虫,或粪便镜检有蛔虫卵为主要特征。

91. 蛔虫病治疗以**驱蛔杀虫**为主,辅以调理脾胃之法。

92. 蛔虫病不仅影响小儿的食欲及肠道功能,而且影响小儿的生长发育。重者可能出现并发症,其中以**蛔厥证**、**虫瘕证**多见。

93. 蛔厥证蛔虫入膈,窜入胆腑,腹痛在剑突下、右上腹,呈阵发性剧烈绞痛,痛时肢冷汗出,多有呕吐,且常见**呕吐胆汁和蛔虫**,证属寒热错杂,病初多偏寒,继之渐化热。

94. 紫癜的病机为**风热之邪与气血相搏**,热伤血络,迫血妄行,溢于脉外,渗于皮下,发为紫癜。

95. 紫癜以血液溢于皮肤、黏膜之下,出现**瘀点瘀斑**、**压之不褪色**为其临床特征,常伴鼻衄、齿衄,甚则呕血、便血、尿血。

96. 紫癜的病位在**心、肝、脾、肾**。

97. 维生素D缺乏性佝偻病是由于儿童体内**维生素D不足**,致使钙磷代谢失常的一种慢性营养性疾病,以正在生长的骨骺端软骨板不能正常钙化,造成骨骼病变为其特征。

98. 维生素D缺乏性佝偻病的**初期**每日口服维生素D **5 000~10 000IU**,**连服1个月**。

99. **激期**每日口服维生素D **1万~2万IU**,连服1个月。不能坚持口服者可肌内注射维生素D₂,每次40万IU(或D₃30万IU),连用1~3次,每次间隔1个月。

100. 在给维生素D的同时应给钙剂每次**0.5~1.0g**,每日2~3次,连服2~3个月。

5年 历年真题

1. 周岁时正常头围是

A. 46 cm

B. 48 cm

C. 50 cm

D. 52 cm

E. 54 cm

【答案】A

【解析】胎儿期脑的发育速度最快,故小儿出生时头围相对较大,平均为34 cm。第1年的前三个月约增长6 cm,与后9个月的增长值相当,即一岁出头围约为46 cm。第2年增长减慢约为2 cm,2岁时头围约为48 cm。

涉及考点 | 小儿生长发育的体格生长

2. 小儿的脏腑娇嫩,尤其突出的是

A. 肝、脾、肾

B. 肺、脾、肾

C. 心、肺、肾

D. 心、肝、肾

E. 肺、肝、肾

【答案】B

【解析】小儿脏腑娇嫩,形气未充,具体表现在肌肤柔嫩,腠理疏松,气血未充,肺脾娇弱,肾气未固,神气怯弱,筋骨未坚等方面。五脏六腑功能皆属不足,尤其以肺、脾、肾三脏更为突出。



配套名师高清视频

涉及考点 | 小儿的生理特点

3.“纯阳”学说是指小儿

- A.有阳无阴
- B.发育迅速
- C.形气未充
- D.阳亢阴亏
- E.脏腑娇嫩

【答案】B

【解析】“纯阳”学说最早见于《颅囟经》，其提出“孩儿三岁以下，呼为纯阳，元气未散”。用“纯阳”一词来表述小儿时期的体质特点，即阳相对偏盛，生机比较旺盛，发育迅速，说明小儿时期机体的阴阳是以阳生为主导趋势。选项 C、E 是小儿的生理特点。选项 A、D 是对“纯阳”的曲解。

涉及考点 | 小儿生理特点

4.由于小儿为“纯阳之体”“稚阴之体”，临床容易表现出的证候是

- A.痰证
- B.实证
- C.寒证
- D.虚证
- E.热证

【答案】E

【解析】由于小儿为稚阴稚阳之体，脏腑娇嫩，卫外功能较成人为弱，又寒温不知自调，因而更易被“六淫”邪气所伤，产生各种肺系疾病；小儿脏腑娇嫩，又易被燥邪、暑邪所伤，形成肺胃阴津不足、气阴两伤等病证；小儿为纯阳之体，六气易从火化，小儿伤于外邪以热性病证为多。

涉及考点 | 小儿生理特点

5.历代儿科医家对于小儿诊法特别重视

- A.四诊合参
- B.望诊
- C.闻诊
- D.问诊
- E.切诊

【答案】B

【解析】历代儿科医家对于小儿诊法，既主张四诊合参，又特别重视望诊，诚如《幼科铁镜·望形色审苗窍从外知内》所说：“而小儿科，则惟以望为主。”所以本题选 B。

涉及考点 | 儿科四诊应用特点

6.小儿望诊最重要的内容是

- A.察指纹
- B.察斑疹
- C.审苗窍
- D.望神色
- E.望形态

【答案】D

【解析】凡精神振作，二目有神，表情活泼，面色红润，呼吸调匀，反应敏捷，为气血调和、神气充沛的表现，是健康或病情轻浅之象；反之，若精神萎顿，二目无神，表情呆滞，面色晦暗，呼吸不匀，反应迟钝，谓之无神，为体弱有病或病情较重之象。因此望神色是小儿望诊最重要的内容。

涉及考点 | 望诊特点

7.小儿发生强烈传染性疾病的病邪很多，其中最重要的是

- A.风邪
C.燥邪
E.风寒
- B.湿热
D.疫疔

【答案】D

【解析】小儿肺常不足,凑理不密,肌肤疏松,病邪从口鼻皮毛而入,易感疫疔之气,而引起时行疾病,感受疫疔之气,病情常较危重,并有相互传染的特点。

涉及考点 | 儿科的病因特点

8.小儿指纹色紫黑,其证候是

- A.内有虚寒
C.外感风热
E.瘀热内结
- B.邪热郁滞
D.血络郁闭

【答案】D

【解析】指纹诊的辨证纲要归纳为“浮沉分表里,红紫辨寒热,淡滞定虚实,三关测轻重”。指纹色紫黑,多为瘀滞络闭,病情深重。

涉及考点 | 儿科望诊特点及临床意义

9.正常小儿脉象平和,与成人比较具有的特点是

- A.软而稍数
C.软而稍细
E.软而稍缓
- B.浮而稍数
D.浮而稍缓

【答案】A

【解析】小儿正常脉象较成人软而稍数,年龄越小,脉搏至数越快。

涉及考点 | 儿科切诊特点及临床意义

10.婴儿,4个月。前囟未闭,后囟已闭。其诊断是

- A.前囟晚闭
C.囟门早闭
E.后囟早闭
- B.闭合正常
D.囟门晚闭

【答案】B

【解析】前囟应在小儿出生后的12~18个月闭合。后囟在部分小儿出生时就已闭合。未闭合者应在生后2~4个月内闭合。

涉及考点 | 囟门的闭合时间

11.母乳喂养的原则是

- A.按时喂给
C.定量喂给
E.昼夜均喂
- B.按需喂给
D.定次喂给

【答案】B

【解析】母乳喂养时,应由乳母细心观察婴儿的个体需要,按其所需哺乳,即“按需喂给”这是我国传统的也是当今世界卫生组织提倡的喂养原则。

涉及考点 | 母乳喂养的方法

12.新生女婴,乳房隆起如蚕豆大小的处理方法

- A.药物外治
B.及早给氧

- C.不予处理
E.针灸疗法
- D.供给足够能量和液体

【答案】C

【解析】女婴生后3~5天乳房出现蚕豆到鸽蛋大小的隆起,可在2~3周后消退,属于新生儿期的特殊生理状态,不需特殊处理。

涉及考点 | 新生儿的特殊生理现象

- 13.小儿细动作的发育,正常会拇指、示指拾东西的年龄是
- A.13~14个月
B.7~个月
C.11~12个月
D.5~6个月
E.9~10个月

【答案】E

【解析】手指精细运动的发育过程为:新生儿时双手握拳;3~4个月时可自行玩手,并企图抓东西;5个月时眼与手的动作取得协调,能有意识地抓取面前的物品;5~7个月时出现换手与捏、敲等探索性的动作;9~10个月时可用拇指、示指拾东西;12~15个月时学会用匙,乱涂画;18个月时能摆放2~3块方积木;2岁时会粗略地翻书页;3岁时会穿简单的衣服。

涉及考点 | 小儿的动作发育

- 14.小儿发生强烈传染性疾病的病邪很多,其中最重要的是
- A.风寒
B.疫疠
C.湿热
D.风邪
E.燥邪

【答案】B

【解析】疫疠是一类具有强烈传染性的病邪,其引发的疾病有起病急骤、病情较重、症状相似、易于流行等特点。

涉及考点 | 传染性疾病的病邪

- 15.下列各项,新生儿生理性黄疸到达高峰期的时间是
- A.16~20天
B.11~15天
C.4~6天
D.2~3天
E.7~10天

【答案】C

【解析】生理性黄疸生后第2~3日出现黄疸,第4~6日达高峰。足月儿在生后2周消退,早产儿可延迟至3~4周消退。

涉及考点 | 胎黄的诊断

- 16.下列除哪项外,均属病理性胎黄
- A.黄疸持续加深
B.黄疸3周后仍不消退
C.黄疸退而复现
D.生后24小时内出现
E.黄疸10~14天左右消退

【答案】E

【解析】生理性胎黄大多在生后2~3天出现,4~6天达高峰,2周消退,早产儿持续时间较长,除有轻微食欲不振外,一般无其他临床症状。病理性胎黄常在生后24小时内出现黄疸,黄疸持续加深,或消退后复现,3周后仍不消退。黄疸10~14天左右消退不属病理性胎黄。

涉及考点 | 胎黄的鉴别诊断

17. 肺炎喘嗽恢复期症见久咳、咳痰无力,痰稀白易咯,纳呆便溏,面白少华,神疲乏力。应首选的方剂是

- A. 人参五味子汤
B. 人参乌梅汤
C. 百合固金汤
D. 养阴清肺汤
E. 生脉饮

【答案】A

【解析】久病不愈,损伤肺脾,肺气虚弱,则咳痰无力,脾虚不运则纳呆便溏。故辨证为肺气虚。方药应为人参五味子汤。

涉及考点 | 肺炎咳嗽的辨证

18. 小儿哮喘反复发作,主要是因为

- A. 肾阳亏虚
B. 脾虚湿盛
C. 肺气不足
D. 感触外邪
E. 宿痰伏肺

【答案】E

【解析】哮喘的病机关键在痰伏于肺,形成夙根,遇触即发。夙痰久伏造成哮喘反复发作。哮喘发作的机制,在于外因引动伏痰,痰气相合。发作之时,痰随气升,气因痰阻,相互搏结,壅塞气道,气息不畅,因而产生呼吸喘促,呼气延长,痰随呼吸气息升降,发出哮鸣之声。

涉及考点 | 哮喘的病因病机

19. 治疗哮喘风寒束肺证,应首选的方剂是

- A. 小青龙汤合三子养亲汤
B. 射干麻黄汤合二陈汤
C. 麻杏石甘汤合苏葶丸
D. 大青龙汤合定喘丸
E. 玉屏风散合都气丸

【答案】A

【解析】哮喘风寒束肺证多由外感风寒而诱发,基本病机为外寒内饮。治法为温肺散寒,涤痰定喘,方用小青龙汤合三子养亲汤。

涉及考点 | 哮喘的辨证论治

20. 患儿10天。啼哭不安,不欲吮乳,口舌满布白屑,唇舌俱红,小便短赤。治疗应首选

- A. 导赤散
B. 泻黄散
C. 竹叶石膏汤
D. 知柏地黄丸
E. 清热泻脾散

【答案】E

【解析】胎热内蕴,或感受秽毒之邪,蕴积心脾,热毒循经上行,熏灼口舌,见口腔满布白屑,心热移于小肠,则小便短赤。

涉及考点 | 鹅口疮的辨证

21. 大便澄澈清冷、完谷不化的病机是

- A. 气阴两伤
B. 脾肾阳虚
C. 感受外邪
D. 脾胃虚弱
E. 伤于饮食

【答案】B

【解析】大便澄澈清冷、完谷不化，为脾肾阳虚泻。感受外邪泄，大便呈水样。伤食泻，大便稀溏，夹有乳凝块或食物残渣。脾胃虚弱泻，大便稀溏，色淡不臭。气阴两伤泻，质稀如水，皮肤干燥等。

涉及考点 | 泄泻的病机

22.泄泻的基本治疗原则是

- A.健脾化湿
- B.运脾化湿
- C.祛风散寒
- D.清肠化湿
- E.消食化积

【答案】B

【解析】泄泻治疗，以运脾化湿为基本法则。实证以祛邪为主，根据不同的证型分别治以清肠化湿、祛风散寒、消食导滞。虚证以扶正为主，分别治以健脾益气，温补脾肾。

涉及考点 | 泄泻的辨证论治

23.参苓白术散治疗小儿泄泻的证候是

- A.脾虚泻
- B.湿热泻
- C.脾肾阳虚泻
- D.风寒泻
- E.伤食泻

【答案】A

【解析】小儿泄泻脾虚证的治法为健脾益气，助运止泻，方用参苓白术散。风寒泻方用藿香正气散；湿热泻方用葛根芩连汤；伤食泻方用保和丸；脾肾阳虚泻方用附子理中汤合四神丸。

涉及考点 | 泄泻的辨证论治

24.小儿湿热泻的首选方剂是

- A.附子理中汤合四神丸
- B.葛根黄芩黄连汤
- C.保和丸
- D.参苓白术散
- E.藿香正气散

【答案】B

【解析】湿热泻的治法为清肠解热，化湿止泻，方用葛根黄芩黄连汤；保和丸为伤食泻的代表方；藿香正气散为风寒泻的代表方；参苓白术散为脾虚泻的代表方；附子理中汤合四神丸为脾肾阳虚泻的代表方。

涉及考点 | 泄泻的辨证论治

25.疳积的主要病机是

- A.脾胃失和，纳化失健
- B.脾胃虚损，积滞内停
- C.肝血不足，筋脉失养
- D.脾胃虚衰，气血两败
- E.肾阳虚衰，精髓不充

【答案】B

【解析】疳症的主要病机是脾胃受损，气液耗伤。病初是以脾胃失和，运化不健的证候为主，病情较浅，正虚不著的疳气阶段；继而脾胃虚损，运化不及，积滞内停，则为虚中夹实的疳积证候。

涉及考点 | 疳积与干疳的区分

26.营养性缺铁性贫血经治疗血红蛋白已达正常水平，仍需服用的疗程是

- A.2个月
- B.4个月



配套名师高清视频

- C.3个月
E.2周
- D.1个月

【答案】A

【解析】治疗贫血一般用硫酸亚铁口服，每次5~10 mg/kg，每日2~3次，同时服维生素C有助吸收。服用至血红蛋白达正常水平后2个月左右再停药。

涉及考点 | 贫血的西医治疗

27. 小儿汗证营卫失调证的汗出特点是

- A. 汗出肤热，汗渍色黄
B. 汗出遍身而不温
C. 大汗淋漓，或汗出如油
D. 头部、手足心汗出明显
E. 头部、肩背部汗出明显

【答案】B

【解析】汗证营卫失调证的临床表现：以自汗为主，或伴盗汗，汗出遍身而抚之不温，畏寒恶风，不发热，或伴有低热，精神疲倦，胃纳不振，舌质淡红，苔薄白，脉缓。

涉及考点 | 汗证的辨证论治

28. 下列各项，不属于病毒性心肌炎特征的是

- A. 恶寒发热
B. 面色苍白
C. 神疲乏力
D. 肢冷多汗
E. 心悸气短

【答案】A

【解析】病毒性心肌炎是由病毒感染引起的以局限性或弥漫性心肌炎性病变为主的疾病。以神疲乏力、面色苍白、心悸、气短、肢冷、多汗为临床特征。

涉及考点 | 病毒性心肌炎的发病特点

29. 注意力缺陷多动障碍好发于

- A. 学龄前期儿童
B. 幼儿
C. 学龄期儿童
D. 新生儿
E. 青少年

【答案】C

【解析】注意力缺陷多动障碍以注意力不集中，自我控制差，动作过多，情绪不稳，冲动任性，伴有学习困难，但智力正常或基本正常为主要临床特征。本病男孩多于女孩，多见于学龄期儿童。

涉及考点 | 注意力缺陷多动障碍的发病特点

30. 小儿“地图舌”是由于

- A. 宿食内停
B. 胃之气阴不足
C. 脾失健运
D. 肺气虚弱
E. 脾阳亏虚

【答案】B

【解析】舌苔花剥，状如地图，时隐时现，经久不愈，多为胃之气阴不足所致。

涉及考点 | “地图舌”出现的机理

31. 急性肾小球肾炎水凌心肺证的治法是

- A. 通腑泄浊，解毒利湿
B. 温阳逐水，泻肺宁心

- C.疏风宣肺,利水消肿
E.清肺化饮,利水消肿

D.平肝泻火,清心利水

【答案】B

【解析】选项 C 为风水相搏证的治法。选项 D 为邪陷心肝证的治法。选项 A、E 为干扰项。水肿水凌心肺证的治法为温阳逐水,泻肺宁心。

涉及考点 | 水肿的辨证论治

32.治疗肾病综合征脾肾阳虚证,应首选的方剂是

- A.防己黄芪汤
C.参苓白术散
E.温胆汤

B.己椒藜黄丸合参附汤
D.真武汤

【答案】D

【解析】水肿脾肾阳虚的治法为温肾健脾,利水消肿,方用真武汤。

涉及考点 | 水肿的辨证论治

33.与遗尿关系最密切的脏腑是

- A.肝、肾
C.膀胱、肾
E.肺、脾

B.三焦、膀胱
D.心、肾

【答案】C

【解析】遗尿是指 5 周岁以上的小儿睡中小便自遗,醒后方觉的一种病证。多与膀胱和肾的功能失调有关,其中尤以肾气不足,膀胱虚寒为多见。

涉及考点 | 遗尿的病因病机

34.不属于儿科中医学治疗用药原则的是

- A.处方轻巧灵活
C.注意顾护脾胃
E.重视先证而治

B.稚阴稚阳之体,重在滋补阴阳
D.治疗要及时,正确和审慎

【答案】B

【解析】不属于儿科中医学治疗用药原则的是稚阴稚阳之体,重在滋补阴阳。

涉及考点 | 小儿用药原则

35.可出现草莓舌的疾病是

- A.丹痧
C.贫血
E.结核

B.慢性萎缩性胃炎
D.维生素 A 缺乏

【答案】A

【解析】舌光无苔,舌生红刺,状如草莓,称为“草莓舌”。选项 B、D、C、E 无草莓舌表现。

涉及考点 | 丹痧的诊断

36.手足口病的主要病位是

- A.脾肾
C.肺卫
E.肺胃

B.肺脾
D.脾胃

【答案】B

【解析】引起手足口病的病因主要为感受手足口病时邪,其病变部位主要在肺脾二经,病机关键为邪侵肺脾,外透肌表。

涉及考点 | 手足口病的病因病机

37. 适宜用清热解毒,软坚散结法治疗的流行性腮腺炎的证候是

- A. 毒窜睾腹证
- B. 热毒壅盛证
- C. 邪陷厥阴证
- D. 邪陷心肝证
- E. 邪犯少阳证

【答案】B

【解析】痄腮热毒壅盛证的治法为清热解毒,软坚散结,方用普济消毒饮。

涉及考点 | 痄腮的辨证论治

38. 蛔厥的病位在

- A. 左上腹
- B. 右上腹
- C. 大腹
- D. 小腹
- E. 脐腹

【答案】B

【解析】蛔厥证:腹痛在剑突下、右上腹,呈阵发性剧烈绞痛,痛时肢冷汗出,多有呕吐,且常见呕吐胆汁和蛔虫。

涉及考点 | 蛔虫病的辨证论治

39. 紫癜阴虚火旺证的治法是

- A. 疏风散邪,清热凉血
- B. 清热解毒,凉血止血
- C. 理气化瘀,活血止血
- D. 滋阴降火,凉血止血
- E. 健脾养心,益气摄血

【答案】D

【解析】紫癜阴虚火旺证的治法为滋阴降火,凉血止血,方用大补阴丸、知柏地黄丸。

涉及考点 | 紫癜的辨证论治

40. 引起佝偻病的原因是

- A. 维生素 D 缺乏
- B. 甲状旁腺功能亢进
- C. 骨质软化
- D. 恶性肿瘤
- E. 阻塞性黄疸

【答案】A

【解析】维生素 D 缺乏性佝偻病简称佝偻病,是由于儿童体内维生素 D 不足,致使钙磷代谢失常的一种慢性营养性疾病,以正在生长的骨骼端软骨板不能正常钙化造成骨骼病变为其特征。

涉及考点 | 维生素 D 缺乏性佝偻病的病因病机

41. 患儿,6岁。有哮喘病史4年,平素反复感冒。气短汗出,咳嗽无力,面色少华,形瘦纳差,大便溏,舌质淡,苔薄白,脉细软,其预防所用外治法是

- A. 擦拭法
- B. 敷贴法
- C. 熏洗法
- D. 热熨法
- E. 涂敷法

【答案】B

【解析】熏洗法多用于小儿出疹性疾病、汗证、皮肤病及局部肿胀疼痛等病证。涂敷法多用于疔腮、疮疡、哮喘、肺炎喘嗽等病证。热熨法多用于寒证、虚证或气滞引起的多种痛证。敷贴法多用于治疗泄泻、哮喘、遗尿等病证。擦拭法多用于小儿口腔、鼻腔及皮肤,有活血止痛、祛风止痒等治疗作用。患儿有哮喘病史,可用敷贴法治疗。

涉及考点 | 儿科常用外治法及其临床应用

42. 小儿咳嗽的主要内因是

- A. 肺脏娇嫩
- B. 肺脾虚弱
- C. 痰浊阻肺
- D. 阴常不足
- E. 阳常有余

【答案】B

【解析】小儿咳嗽的病因,主要外因为感受风邪,主要内因为肺脾虚弱。

涉及考点 | 咳嗽的主要病因

43. 患儿,男。出生后第二天出现黄疸,面目皮肤发黄,颜色鲜明,烦躁啼哭,小便短黄,舌质红,苔黄腻。其证候是

- A. 瘀积发黄
- B. 肝肾亏虚
- C. 肾精薄弱
- D. 湿热熏蒸
- E. 寒湿阻滞

【答案】D

【解析】面目皮肤发黄,颜色鲜明,烦躁哭啼,小便短黄,舌质红,苔黄腻,为湿热熏蒸的表现。

涉及考点 | 胎黄的辨证

44. 患儿,女,5岁。高热不退,喉核赤肿,溃烂化脓,吞咽困难,口干口臭,大便干结,小便短黄,舌红,苔黄,脉数。应首选的方剂是

- A. 牛蒡甘桔汤
- B. 荆防败毒散
- C. 普济消毒饮
- D. 养阴清肺汤
- E. 银翘马勃散

【答案】A

【解析】患儿喉核赤肿,溃烂化脓,吞咽困难,辨病为乳蛾;高热不退,口干口臭,大便干结,小便黄少,舌红,苔黄,脉数,辨证为热毒炽盛证。治法为清热解毒,利咽消肿,方用牛蒡甘桔汤。

涉及考点 | 乳蛾的辨证论治

45. 患儿,女,5岁,发热咳嗽3天,发热烦躁,咳嗽喘促,气急鼻扇,咳痰黄稠,喉间痰鸣,咽红肿,面色红赤,口渴欲饮,大便干结,小便短黄,舌质红,苔黄,脉滑数。应首选的方剂是

- A. 人参五味子汤
- B. 麻杏石甘汤合葶苈大枣泻肺汤
- C. 华盖散
- D. 黄连解毒汤合麻杏石甘汤
- E. 麻杏石甘汤

【答案】B

【解析】患儿发热烦躁,咳嗽喘促,气急鼻扇,咳痰黄稠,喉间痰鸣,辨病为肺炎喘嗽;咽红肿,面色红赤,口渴欲饮,大便干结,小便短黄,舌质红,苔黄,脉滑数,辨证为痰热闭肺证。治法为清热涤痰,开肺定喘,方用麻杏石甘汤合葶苈大枣泻肺汤。

涉及考点 | 肺炎喘嗽的辨证论治

46. 患儿, 10 个月。高热烦躁, 气急鼻扇, 张口抬肩, 喉中痰鸣, 声如拽锯, 口唇紫绀。其治法是

- A. 清热活血, 泻肺化痰
- B. 辛凉开肺, 清热化痰
- C. 清热解毒, 止咳化痰
- D. 清热宣肺, 涤痰定喘
- E. 泻肺镇咳, 清热化痰

【答案】D

【解析】此患者为痰热闭肺型肺炎喘嗽。治以清热宣肺, 涤痰定喘。

涉及考点 | 肺炎喘嗽的辨证论治

47. 患儿, 男, 1 岁。反复外感, 面黄少华, 形体消瘦, 肌肉松软, 少气懒言, 气短, 自汗多汗, 食少纳呆, 大便不调, 舌淡苔白, 脉无力。应首选的方剂是

- A. 补中益气汤合生脉饮
- B. 生脉散合沙参麦冬汤
- C. 金匱肾气丸合理中丸
- D. 玉屏风散合六君子汤
- E. 黄芪桂枝五物汤

【答案】D

【解析】根据患儿症状可诊断为反复呼吸道感染之肺脾气虚证。由于小儿肺脾两虚, 日久生化之源, 宗气不足, 卫外不固, 终成此证。治法为补肺固表, 健脾益气, 方用玉屏风散合六君子汤。

涉及考点 | 反复呼吸道感染的辨证论治

48. 患儿口腔满布白屑, 周围焮红较甚, 面赤, 唇红, 发热, 烦躁, 多啼, 口干, 大便干结, 小便短黄, 舌红, 苔薄白, 脉滑。其证候是

- A. 心脾积热证
- B. 心火上炎证
- C. 湿热内蕴证
- D. 风热乘脾证
- E. 虚火上浮证

【答案】A

【解析】患儿口腔满布白屑辨病为鹅口疮, 心经火热则见口腔周围焮红, 面赤, 唇红, 发热, 烦躁; 脾经有热则见多啼, 口干, 大便干结, 小便黄赤。

涉及考点 | 鹅口疮的辨证论治

49. 患儿, 1 岁。昨起舌上溃破, 色红疼痛, 进食哭闹, 心烦不安, 口干欲饮, 小便短赤。治疗应首选

- A. 六味地黄丸
- B. 泻心导赤散
- C. 泻心汤
- D. 清胃散
- E. 凉膈散

【答案】B

【解析】辨证为口疮之心火上炎证, 治疗当清心凉血, 泻火解毒。方用泻心导赤散加减。选项 A 滋阴补肾。选项 C 清火解毒, 燥湿泄热。选项 D 清肾中之火。E 泻火通便, 清上泻下。

涉及考点 | 口疮的辨证论治

50. 患儿, 11 个月。泄泻 2 周, 起病时每日 10 多次, 经治疗大减, 但近日仍日行 3~4 次, 大便稀溏色淡, 每于食后作泻, 面色萎黄, 神疲倦怠, 舌质淡, 苔薄白。其证候是

- A. 脾肾阳虚
- B. 脾虚
- C. 伤食
- D. 湿热

E. 风寒

【答案】B

【解析】脾肾阳虚泻，大便澄澈清冷，完谷不化。伤食泻，大便稀溏，夹有乳凝块，食物残渣，气味酸臭。风寒泻，大便清稀，伴泡沫。湿热泻，大便水样，或蛋花汤样，泻下急迫，气味秽臭，或见少许黏液，腹痛时作，恶心欲吐，口渴引饮，舌红苔黄腻。脾虚泻，大便稀溏色淡，食后作泻，面色萎黄，神疲倦怠，舌质淡，苔薄白。

涉及考点 | 泄泻的辨证

51. 患儿，2岁。纳差2个月，腹泻1周，平素食欲不振，挑食偏食，近日大便日行3次，食后作泻，面色萎黄，舌淡苔白，指纹淡红。治疗应首选

- A. 擦拭法
- B. 推拿疗法
- C. 割治疗法
- D. 熏洗法
- E. 拔罐疗法

【答案】B

【解析】本题患者为脾虚泻。推拿疗法可助运止泻。

涉及考点 | 泄泻的辨证论治



配套名师高清视频

52. 患儿，1岁。发热，咳嗽，喘憋2天，经治疗后病情未见好转，傍晚突然面色苍白，口唇发紫，四肢厥冷，按之右肋下痞块迅速增大。其证候是

- A. 肝风内动
- B. 心阳虚衰
- C. 邪陷心肝
- D. 气滞血瘀
- E. 热毒内闭

【答案】B

【解析】肺炎喘嗽之心阳虚衰证证候：面色苍白，口唇紫绀，呼吸浅促，四肢厥冷，虚烦不安或神萎淡漠，舌质略紫，苔薄白，脉细弱而数，指纹紫滞，可达命关。

涉及考点 | 肺炎喘嗽的辨证论治

53. 小儿泄泻的变证，辨证重在辨

- A. 虚实
- B. 阴阳
- C. 表里
- D. 轻重
- E. 寒热

【答案】B

【解析】小儿泄泻的变证辨证重在辨阴阳。

涉及考点 | 泄泻的辨证论治

54. 患儿，男3岁。因易汗出1个月前来就诊。症见汗出，以头部、肩背明显，活动后加重，神倦乏力，面色少华。肢端欠温，平时易感冒。舌质淡，舌边齿印，苔薄白，脉弱。治疗应首选的方剂是

- A. 黄芪桂枝五物汤
- B. 四君子汤
- C. 生脉散
- D. 玉屏风散合牡蛎散
- E. 参苓白术散

【答案】D

【解析】根据患儿症状可诊断为汗证之肺卫不固证，治法为益气固表，方用玉屏风散合牡蛎散。

涉及考点 | 汗证的辨证论治

55. 患儿,女,5岁。心悸不宁,胸闷憋气,心前区痛如针刺,胸闷呕恶,面色晦暗,唇甲发绀,舌体胖,舌质紫暗,或舌边尖见有瘀点,舌苔腻,脉滑或结代。治疗应首选的方剂是

- A. 葛根芩连汤
- B. 炙甘草汤合生脉散
- C. 瓜蒌薤白半夏汤合失笑散
- D. 银翘散
- E. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤

【答案】C

【解析】根据患儿症状可诊断为病毒性心肌炎之痰瘀阻络证,治法为豁痰化瘀,宁心通络,方用瓜蒌薤白半夏汤合失笑散。

涉及考点 | 病毒性心肌炎的辨证论治

56. 患儿,男,7岁。多动难静,急躁易怒,冲动任性,难以自控;神思涣散,注意力不集中,难以静坐;或有记忆力欠佳、学习成绩低下,或有遗尿、腰酸乏力或有五心烦热、盗汗、大便秘结,舌质红,舌苔薄,脉细弦。治疗应首选的方剂是

- A. 杞菊地黄丸
- B. 黄连温胆汤
- C. 知柏地黄丸
- D. 六味地黄丸
- E. 左归丸

【答案】A

【解析】根据患儿症状可诊断为注意力缺陷多动障碍之肝肾阴虚证,治法为滋养肝肾,平肝潜阳,方用杞菊地黄丸。

涉及考点 | 注意力缺陷多动障碍的辨证论治

57. 患儿,9岁。水肿从眼睑开始,迅速波及全身,皮肤光亮,按之凹陷即起,尿少色赤,伴咽喉红肿,肢体酸痛,苔薄白,脉浮。其治法是

- A. 温运中阳,行气利水
- B. 滋阴补肾,淡渗利水
- C. 清热解毒,淡渗利湿
- D. 疏风宣肺,利水消肿
- E. 清热利湿,凉血止血

【答案】D

【解析】由患儿症状诊断为水肿之风水相搏证。治以疏风宣肺,利水消肿。B为湿热内侵之水肿治法。其他选项皆非水肿治法。

涉及考点 | 水肿的辨证论治

58. 患儿,3岁。全身明显浮肿,按之凹陷难起,腰腹下肢尤甚,畏寒肢冷,神疲倦卧,小便短少,纳少便溏,舌胖质淡苔白,脉沉细。其治法是

- A. 清热利湿
- B. 温肾健脾
- C. 健脾渗湿
- D. 疏风利水
- E. 滋阴补肾

【答案】B

【解析】浮肿,按之凹陷难起,腰腹下肢尤甚,畏寒肢冷,神疲倦卧,小便短少,纳少便溏,舌胖质淡苔白,脉沉细,为脾肾阳虚之表现。治以温肾健脾。

涉及考点 | 水肿的辨证论治

59. 患儿,6岁。小便频数日久,淋漓不尽,尿液不清,畏寒怕冷,手足不温,大便稀薄,舌苔薄腻。治疗应首选的方剂是

- A.菟丝子散
C.缩泉丸
E.八正散
- B.金匱肾气丸
D.补中益气汤

【答案】C

【解析】辨证属脾肾气虚证，治以温补脾肾、升提固摄，方用缩泉丸。八正散主治湿热下注；菟丝子散主治肾气不足之遗尿；补中益气汤主治肺脾气虚之遗尿；金匱肾气丸温补肾阳，化气行水。

涉及考点 | 尿频的辨证论治

60.下列各项,不属于小儿水肿水毒内闭证的主要症状的是

- A.尿少尿闭
C.头晕头痛
E.烦躁抽搐
- B.恶心呕吐
D.嗜睡昏迷

【答案】E

【解析】此乃浊邪壅塞三焦,气机升降失常,水毒内闭,中焦格局所出现的恶候。水毒内闭,水湿泛滥,则全身浮肿,少尿或尿闭。全身气化不利,中焦格局,上下不通,湿浊壅阻上焦,故恶心呕吐。水毒上蒙清窍,则头痛,甚则昏迷。

涉及考点 | 水肿的辨证论治

61.麻疹邪犯肺卫证的主要证候是

- A.热、咳、涕、泪,麻疹黏膜斑
C.疹没脱屑,低热不退
E.热、咳、喘、痰,疹稠色暗
- B.热、烦、汗出,皮疹透发
D.热、烦、渴、饮,疹稠色暗,神昏抽搐

【答案】A

【解析】麻疹初期,邪犯肺胃,肺气失宣,则见发热,咳嗽,流涕等似感冒症状。邪毒由肺入脾,里热炽盛则见高热口渴等。

涉及考点 | 麻疹初期跟后期的区分

62.患儿,2岁4个月。发热恶风,喷嚏流涕,轻微咳嗽,皮疹分布均匀,疹点稀疏细小,疹色淡红,肌肤轻度瘙痒,耳后及枕部鬢核肿大触痛,舌质偏红,舌苔薄黄,指纹浮紫。治疗应首选的方剂是

- A.银翘散
C.桑杏汤
E.麻杏石甘汤
- B.桑菊饮
D.香苏散

【答案】A

【解析】耳后及枕部鬢核肿大触痛,诊断为风痧;邪蕴肺卫,故见发热,邪毒停于肺卫,故见舌红,苔黄等,为邪犯肺卫证,代表方剂为银翘散。

涉及考点 | 风痧的辨证论治

63.麻疹好发的年龄是

- A.10~12岁
C.6~7岁
E.1个月
- B.6个月~5岁
D.1~5个月

【答案】B

【解析】麻疹好发的年龄是6个月~5岁。

涉及考点 | 麻疹的辨证论治

64. 患儿,男,10岁。皮肤突然出现瘀点瘀斑,色泽鲜红,伴鼻衄,齿衄,血色鲜红,同时见心烦,口渴,便秘,发热,舌红,脉数有力。治疗应首选的方剂是

- A.犀角地黄汤
B.知柏地黄丸
C.连翘败毒散
D.清瘟败毒饮
E.黄连解毒汤

【答案】A

【解析】根据患儿症状可诊断为紫癜之血热妄行证,治法为清热解毒,凉血止血,方用犀角地黄汤。

涉及考点 | 紫癜的辨证论治

(65~66题共用备选答案)

- A.新加香薷饮
B.荆防败毒散
C.银翘散
D.杏苏散
E.桑菊饮

65. 患儿,女,8岁。发热恶风,无汗,头痛,鼻塞,流清涕,喷嚏,咳嗽,口渴咽痛,苔薄黄,脉浮数。治疗应首选的方剂是

【答案】C

66. 患儿,女,8岁。咳嗽较重,痰多而黄,咽红肿痛,舌淡红,苔薄白,脉浮数。治疗应首选的方剂是

【答案】E

【解析】两患儿皆为风热见症,而主症一为发热,一为咳嗽,可知辨证一是风热感冒,治宜辛凉解表,疏风清热,用银翘散;一是风热咳嗽,治宜疏风解热,宣肺止咳,用桑菊饮。故65题选C,66题选E。

涉及考点 | 感冒、咳嗽的辨证论治

(67~68题共用备选答案)

- A.牛蒡甘桔汤
B.荆防败毒散
C.养阴清肺汤
D.银翘马勃散
E.大青龙汤

67. 治疗乳蛾热毒炽盛证,应首选的方剂是

【答案】A

68. 治疗哮喘外寒内热证,应首选的方剂是

【答案】E

【解析】乳蛾热毒炽盛证治法为养阴润肺,利咽消肿,方用牛蒡甘桔汤。哮喘外寒内热证的治法为解表清里,定喘止咳,方用大青龙汤。故67题选A,68题选E。

涉及考点 | 乳蛾、哮喘的辨证论治

(69~70题共用备选答案)

- A.大定风珠
B.缓肝理脾汤
C.十全大补汤
D.银翘散
E.人参五味子汤

69.治疗小儿慢惊风脾虚肝亢证,应首选的方剂是

【答案】B

70.治疗小儿肺炎喘嗽肺脾气虚证,应首选的方剂是

【答案】E

【解析】慢惊风脾虚肝亢证的治法为温中健脾,缓肝理脾,方用缓肝理脾汤。肺炎喘嗽肺脾气虚证的治法为补肺益气,健脾化痰,方用人参五味子汤。故69题选B,70题选E。

涉及考点 | 惊风、肺炎喘嗽的辨证论治

(71~72题共用备选答案)

- | | |
|-------------|-------------|
| A.养阴清热,补益肺肾 | B.温卫和营,益气固表 |
| C.补肺固表,健脾益气 | D.温补肾阳,健脾益气 |
| E.泻肺祛痰,补肾纳气 | |

71.小儿反复呼吸道感染脾肾两虚证的治法为

【答案】D

72.小儿反复呼吸道感染肺脾气虚证的治法为

【答案】C

【解析】反复呼吸道感染脾肾两虚证的治法为温补肾阳,健脾益气,方用金匱肾气丸合理中丸;肺脾气虚证的治法为补肺固表,健脾益气,方用玉屏风散合六君子汤。

涉及考点 | 反复呼吸道感染的辨证论治

(73~74题共用备选答案)

- | | |
|------------------|---------------------|
| A.大便稀溏,色淡不臭,食后作泻 | B.质稀如水,心烦不安,目眶及凶门凹陷 |
| C.大便清稀,澄澈清冷,完谷不化 | D.泻下急迫,量多次频,气味秽臭 |
| E.大便清稀,夹有泡沫,肠鸣腹痛 | |

73.泄泻风寒泻的临床表现是

【答案】E

74.泄泻脾虚泻的临床表现是

【答案】A

【解析】风寒泻的临床表现:大便清稀,夹有泡沫,臭气不甚,肠鸣腹痛,或伴恶寒发热,流清涕,咳嗽,舌质淡,苔薄白,脉浮紧,指纹淡红。脾虚泻的临床表现:大便稀溏,色淡不臭,多于食后作泻,时轻时重,面色萎黄,形体消瘦,神疲倦怠,舌淡苔白,脉缓弱,指纹淡。

涉及考点 | 泄泻的辨证论治

(75~76题共用备选答案)

- | | |
|-------|-------|
| A.脾、胃 | B.脾、肾 |
| C.心、脾 | D.肝、脾 |
| E.心、肝 | |

75.眼疳的病位是

【答案】D

76.骨疳的病位是

【答案】A

【解析】疳证的主要病变部位在脾胃,其基本病理改变为脾胃受损,津液消亡。若脾病及肝,肝失所养,肝阴不足,不能上承于目,而见视物不清,夜盲目翳者,则谓之眼疳。脾病及肾,

肾精不足,骨失所养,久致骨骼畸形者,称为骨痹。

涉及考点 | 痹证的病因病机

77.胎儿期体重增长快的阶段是

- A.妊娠中期 15 周
B.妊娠晚期 13 周
C.妊娠中期 10 周
D.妊娠早期 4 周
E.妊娠早期 12 周

【答案】B

【解析】妊娠早期 12 周的胚胎期,从受精卵细胞至基本形成胎儿,最易受到各种病理因素,如感染、药物、劳累、物理、营养缺乏以及不良心理因素等伤害,造成流产、死胎或先天畸形。妊娠中期 15 周,胎儿各器官迅速增长,功能也渐成熟。妊娠晚期 13 周,胎儿以肌肉发育和脂肪积累为主,体重增长快。后两个阶段若胎儿受到伤害,易发生早产。

涉及考点 | 胎儿的体重增长

2年 易错考题

1.按公式计算,9个月婴儿正常体重是

- A.9.8 kg
B.9.5 kg
C.9 kg
D.8.5 kg
E.8.25 kg

【答案】E

【解析】小儿体重公式: <6 个月,体重(kg) $=3+0.7\times$ 月龄, $7\sim 12$ 个月体重(kg) $=6+0.25\times$ 月龄。 2 岁以上体重(kg) $=8+2\times$ 年龄。 9 个月体重(kg) $=6+0.25\times 9=8.25$

涉及考点 | 体重测量方法

2.按公式计算,1岁小儿正常身高是

- A.105 cm
B.100 cm
C.95 cm
D.90 cm
E.75 cm

【答案】E

【解析】小儿出生时身长约 50 cm,生后一年身长增长最快,约 25 cm。

涉及考点 | 身长(高)测量方法

3.生理性胎黄的特点是

- A.早产儿黄疸轻,消退早
B.黄疸常于生后 1 周内消退
C.早产儿与足月产儿无明显差别
D.早产儿 24 小时内出现黄疸
E.黄疸常于生后 2~3 天出现

【答案】E

【解析】生理性黄疸生后第 2~3 日出现,第 4~6 日达高峰。足月儿在生后 2 周消退,早产儿可延迟至 3~4 周消退。

涉及考点 | 胎黄的诊断

4.足月儿生理性黄疸正常消退的时间是

- A.生后 20~24 天
B.生后 4~6 天

- C. 产后 2~3 天
E. 产后 10~14 天

D. 产后 15~18 天

【答案】E

【解析】生理性黄疸生后第 2~3 日出现黄疸,第 4~6 日达高峰。足月儿在生后 2 周消退,早产儿可延迟至 3~4 周消退。

涉及考点 | 胎黄的诊断

5. 治疗干疳的首选方剂是

- A. 资生健脾丸
C. 泻心导赤汤
E. 肥儿丸

- B. 八珍汤
D. 防己黄芪汤

【答案】B

【解析】干疳证的治法为补益气血,方用八珍汤。资生健脾丸为疳气证的代表方,泻心导赤汤为口疳的代表方,肥儿丸为疳积证的代表方,防己黄芪汤为疳肿胀证的代表方。

涉及考点 | 疳证的辨证论治

6. 患儿,2 岁。持续壮热 5 天,起伏如潮,肤有微汗,烦躁不安,目赤眵多,皮疹布发,疹点由细小稀少而逐渐稠密,疹色先红后暗,皮疹凸起,触之碍手,压之褪色,大便干结,小便短黄,舌质红赤,舌苔黄腻,脉数有力。治疗应首选的方剂是

- A. 羚角钩藤汤
C. 宣毒发表汤
E. 清解透表汤

- B. 沙参麦冬汤
D. 麻杏石甘汤

【答案】E

【解析】此患儿为麻疹出疹期。持续壮热,目赤眵多,疹色先红后暗,大便干结,小便短少,舌质红赤,舌苔黄腻,脉数有力,为邪入肺胃之表现。治以清凉解毒,透疫达邪,方用清解透表汤。宣毒发表汤主治邪犯肺卫,沙参麦冬汤主治阴津耗伤,麻杏石甘汤主治邪毒闭肺,羚角钩藤汤主治邪陷心肝。

涉及考点 | 麻疹的辨证论治

7. 治疗小儿痢证痰痢证,应首选的方剂是

- A. 菖蒲丸
C. 温胆汤
E. 二陈汤

- B. 定痢丸
D. 涤痰汤

【答案】D

【解析】痰痢证的治法为豁痰开窍,方用涤痰汤。

涉及考点 | 痢证的辨证论治

8. 补中益气汤合缩泉丸治疗遗尿的证候是

- A. 肝经郁热证
C. 脾肾气虚证
E. 心肾失交证

- B. 肺脾气虚证
D. 肾气不足证

【答案】B

【解析】遗尿肺脾气虚证的治法为补肺益脾,固涩膀胱,方用补中益气汤合缩泉丸。

涉及考点 | 遗尿的辨证论治

9. 风疹、水痘、奶麻初期, 均可选用的方剂是

- A. 宣毒发表汤
B. 柴胡葛根汤
C. 解肌透痧汤
D. 透疹凉解汤
E. 银翘散

【答案】E

【解析】风疹初期, 邪郁肺卫证的治法为疏风解表清热, 方用银翘散; 水痘初期, 邪伤肺卫证的治法为疏风清热, 利湿解毒, 方用银翘散; 奶麻初期, 邪郁肌表证的治法为解表清热, 方用银翘散。

涉及考点 | 风疹、水痘、奶麻的辨证论治

10. 以下关于手足口病的叙述, 正确的是

- A. 皮疹以口腔、四肢为主, 口腔疱疹破溃后形成溃疡
B. 疹退后局部留有瘢痕
C. 疱疹质地坚硬, 疱浆清亮
D. 皮疹呈向心性分布
E. 疹退后在皮疹部位有色素沉着

【答案】B

【解析】手足口病的临床表现: 发热, 口腔黏膜出现分散状疱疹; 疼痛明显, 破溃后形成溃疡; 手掌或脚掌部出现米粒大小疱疹; 臀部可受累, 疱疹周围有炎性红晕, 疱内液体较少。该病以手、足和口腔黏膜疱疹或破溃后形成溃疡为主要临床症状。

涉及考点 | 手足口病的发病特点

11. 治疗蛔虫病肠虫证, 应首选的方剂是

- A. 驱虫粉
B. 化虫丸
C. 追虫丸
D. 使君子散
E. 乌梅丸

【答案】D

【解析】蛔虫病肠虫证的治法为驱蛔杀虫, 调理脾胃, 方用使君子散。

涉及考点 | 蛔虫病的辨证论治

12. 治疗佝偻病脾虚肝旺证, 应首选的方剂是

- A. 健脾丸
B. 健脾益气汤
C. 补肾地黄丸
D. 益脾镇惊散
E. 人参五味子汤

【答案】D

【解析】佝偻病脾虚肝旺证的治法为健脾助运, 平肝息风, 方用益脾镇惊散。

涉及考点 | 维生素 D 缺乏性佝偻病的辨证论治

13. 患儿, 5 岁。臀部及下肢紫癜 1 天, 呈对称痒, 发热, 舌红, 苔薄黄, 脉浮数。治疗应首选的方剂是

- A. 大补阴丸
B. 化斑汤
C. 归脾汤
D. 连翘败毒散
E. 犀角地黄汤

【答案】D

【解析】紫癜色鲜红,瘙痒,发热,舌红,苔薄黄,脉浮数,为风热伤络之表现。治以疏风散邪、清热凉血,方用连翘败毒散。犀角地黄汤主治血热妄行;归脾汤主治气不摄血;化斑汤非主治紫癜;大补阴丸主治阴虚火旺。

涉及考点 | 紫癜的辨证论治

14. 患儿,男。出生后黄疸日久不退,面目皮肤发黄,颜色晦滞,腹部胀满,右胁下痞块,小便短黄,大便不调或灰白,舌紫暗,有瘀斑,苔苔黄。治疗应首选的方剂是

- A. 茵陈五苓散
- B. 血府逐瘀汤
- C. 茵陈蒿汤
- D. 茵陈理中汤
- E. 茵陈术附汤

【答案】B

【解析】面目皮肤发黄,颜色晦滞,右胁下痞块,舌紫暗,有瘀斑,皆为瘀象。辨证为胎黄常证之气滞血瘀证,治宜行气化瘀消积,用血府逐瘀汤。

涉及考点 | 胎黄的辨证论治

15. 患儿,9个月。发热,微汗,鼻塞流涕,咽红,夜间体温升高,又见惊惕啼叫,夜卧不安,舌质红,苔薄白,指纹浮紫。其诊断是

- A. 夜啼
- B. 感冒夹惊
- C. 急惊风
- D. 感冒夹痰
- E. 小儿暑温

【答案】B

【解析】小儿神气怯弱,感邪之后,易致心神不宁,睡卧不实,惊惕抽风,此为感冒夹惊。小儿感冒还可夹痰、夹滞,一见咳嗽痰盛;一见脘胀纳呆,呕吐泄泻。小儿夜啼是夜啼哭不安,并无外感和惊惕的表现;小儿惊风以高热、抽风、昏迷为主要表现;小儿暑温是暑天发生的季节性疾病。

涉及考点 | 感冒的诊断

16. 患儿,10岁。昨天受凉后,见喷嚏、鼻塞、流清涕,今晨起喘咳,咳痰黄稠,口渴欲饮,大便干燥,查体:鼻扇,口周发绀,咽红,双肺满布哮鸣音,舌质红,苔薄白,脉滑数。其证候是

- A. 外寒内热
- B. 热性哮喘
- C. 肺肾阴虚
- D. 寒性哮喘
- E. 肺实肾虚

【答案】A

【解析】哮喘外寒内热证以外有风寒之表证,内有痰热之里证为要点。受凉后见喷嚏、鼻塞、流涕为外寒之症;口渴引饮,咳痰黏稠色黄,便秘,咽红为内热之症。辨证属哮喘之外寒内热证。

涉及考点 | 哮喘的辨证

17. 患儿,女,2岁。舌边尖溃烂,色赤疼痛,烦躁多啼,口干欲饮,小便短黄,舌尖红,苔薄黄,指纹紫。其证候是

- A. 热毒内盛
- B. 心火上炎
- C. 风热乘脾
- D. 心脾积热
- E. 虚火上炎

【答案】B

【解析】口疮常见风热乘脾、心火上炎、虚火上浮三个证型。其中风热乘脾证与心火上炎

证症状相似,但风热乘脾证可见口臭涎多,大便秘结;心火上炎证可见心烦不安,口干欲饮。虚火上浮证虚象明显,不易与此两证混淆。此患儿见烦躁,口干欲饮,辨证为心火上炎。

涉及考点 | 口疮的辨证

18. 患儿,男,3岁。形体明显消瘦,肚腹膨胀,面色萎黄无华,发结如穗,夜卧不宁,食欲减退,多食多便,舌淡苔腻,脉沉细而滑。其治法是

- A. 导滞和中
- B. 消积理脾
- C. 消食导滞
- D. 理气和胃
- E. 和脾助运

【答案】B

【解析】患儿形体明显消瘦,肚腹膨胀,面色萎黄无华,辨病为疳证;发结如穗,夜卧不宁,食欲减退,多食多便,舌淡苔腻;脉沉细而滑,辨证为疳积证。治法为消积理脾,方用肥儿丸。

涉及考点 | 疳证的辨证论治

19. 患儿,11个月。早产,生后一直人工喂养,经常泄泻,近四个月来食欲不振,面色晄白,唇爪甲苍白,毛发稀黄,精神萎靡,手足欠温,舌淡苔白,指纹淡。检查:血红蛋白60g/L。治疗应首选的方剂是

- A. 右归丸
- B. 小建中汤
- C. 金匮肾气丸
- D. 理中丸
- E. 六味地黄丸

【答案】A

【解析】唇舌爪甲苍白,毛发稀黄,精神萎靡,手足欠温,舌淡苔白,指纹淡,为脾肾阳虚之表现。辨证属脾肾阳虚证,治以温补脾肾、益阴养血,方用右归丸。选项B温中补虚,和里缓急,主治中焦虚寒,肝脾不和证。选项C温补肾阳,化气行水,用于肾虚水肿,腰膝酸软,小便不利,畏寒肢冷。选项E治疗肾阴虚证。选项D温中祛寒,补气健脾,常用于急慢性胃肠炎、胃及十二指肠溃疡、胃痉挛、胃下垂、胃扩张、慢性结肠炎等属脾胃虚寒者。

涉及考点 | 贫血的辨证论治

20. 患儿,男,2岁。精神疲惫,面色萎黄,低热,手足心热,易汗出,大便干结,肢体拘挛,抽搐时轻时重,舌绛少津,苔少,脉细数。治疗应首选的方剂是

- A. 镇肝息风汤
- B. 大定风珠
- C. 左归丸
- D. 大补阴丸
- E. 六味地黄丸

【答案】B

【解析】惊风首要辨别急惊风与慢惊风。急惊风为痰、热、惊、风四证俱备,临床以高热、抽搐、神昏为主要表现。慢惊风来势缓慢,抽搐无力,时作时止,反复难愈,常伴昏迷、瘫痪等症。此患儿主症为抽搐时轻时重,伴低热,可知为慢惊风。手足心热,易汗出,舌绛少津,苔少,脉细数,皆为阴虚之象,辨证为慢惊风阴虚风动证,治宜育阴潜阳,滋肾养肝,用大定风珠。

涉及考点 | 惊风的辨证论治

21. 患儿,女,7岁。癫痫发作时突然仆倒,神清,颈项强直,四肢抽搐,两目上视,牙关紧闭,口吐白沫,口唇及面部色青,舌苔白,脉弦滑。治疗应首选的方剂是

- A. 定痫丸
- B. 六君子汤
- C. 镇惊丸
- D. 通窍活血汤

E.涤痰汤

【答案】A

【解析】痫证发作期以病因辨证为主,常见的病因有惊、风、痰、瘀等。惊痫发病前常有惊吓史,发作时多伴有惊叫、恐惧等精神症状;风痫发作时抽搐明显,易由外感发热诱发,或伴有发热等症;痰痫发作以神识异常为主,常有失神、摔倒、手中持物坠落等;瘀血痫通常有明显的颅脑外伤史,头部疼痛位置较为固定。痫证虚证的辨证,以病位为主,区分脾虚痰盛与脾肾两虚。此患儿辨证为风痫,治宜息风止痉,用定痫丸。镇惊丸用于惊痫;涤痰汤用于痰痫;通窍活血汤用于瘀血痫;六君子汤用于脾虚痰盛。

涉及考点 | 痫证的辨证论治

22.患儿,男,6岁。睡中遗尿,可达数次,小便清长,面白少华,神疲乏力,智力稍差,肢寒畏冷,舌质淡,苔白滑,脉沉无力。其证候是

A.肝经湿热

B.肺脾气虚

C.肾阴亏虚

D.肾气不足

E.心肾失交

【答案】D

【解析】遗尿常见4种证型。肺脾气虚证见夜间遗尿,日间尿频而量多,伴经常感冒,面色少华,神疲乏力,食欲不振,大便溏薄,舌质淡红,苔薄白;肾气不足证见寐中多遗,可达数次,面白少华,神疲乏力,智力较同龄儿稍差,肢冷畏寒,舌质淡,苔白滑;心肾失交证见梦中遗尿,寐不安宁,伴烦躁叫扰,白天多动少静,难以自制,或五心烦热,形体较瘦,舌质红,苔薄少津;肝经湿热证见寐中遗尿,小便量少色黄,伴性情急躁,夜梦纷纭,性情急躁,目睛红赤,舌质红,苔黄腻。

涉及考点 | 遗尿的辨证

(23~24题共用备选答案)

A.四神丸

B.附子理中汤

C.保和丸

D.藿香正气散

E.参苓白术散

23.患儿,男,12岁。大便清稀,夹有泡沫,臭气不甚,肠鸣腹痛,伴有恶寒发热,鼻流清涕,舌质淡,苔薄白,脉浮紧。治疗应首选的方剂是

【答案】D

24.患儿,男,12岁。大便稀溏,臭气不甚,食后作泻,面色萎黄,形体消瘦,神疲倦怠,舌质淡,苔白,脉缓。治疗应首选的方剂是

【答案】E

【解析】大便清稀,夹有泡沫,臭气不甚,肠鸣腹痛,伴有恶寒发热,鼻流清涕,为风寒泻,治宜疏风散寒,化湿和中,用藿香正气散。大便稀溏,臭气不甚,食后作泻,面色萎黄,形体消瘦,神疲倦怠,为脾虚泻,治宜健脾益气,助运止泻,用参苓白术散。故26题选D,27题选E。

涉及考点 | 泄泻的辨证论治

(25~26题共用备选答案)

A.养阴润肺,益气健脾

B.清肝泻火,活血止痛

C.疏风清热,散结消肿

D.清热涤痰,开肺定喘

E.清气凉营,泻火解毒

25.肺炎喘嗽痰热闭肺证的治法是

【答案】D

26.流行性腮腺炎毒窜睾腹证的治法是

【答案】B

【解析】选项 C 疔腮邪犯少阳证的治法。选项 D 为肺炎喘嗽痰热闭肺证的治法。选项 E 为丹痧毒炽气营证的治法。顿咳气阴耗伤证的证候为痉咳缓解,咳嗽逐渐减轻,仍有干咳无痰,或痰少而稠,声音嘶哑,伴低热,午后颧红,烦躁,夜寐不宁,盗汗,口干,舌红,苔少或无苔,脉细数。治法,养阴润肺,健脾益气。流行性腮腺炎毒窜睾腹证的证候为腮部肿胀消退后,一侧或双侧睾丸肿胀疼痛,或腕腹、少腹疼痛,痛时拒按,舌红,苔黄,脉数。治法,清肝泻火,活血止痛。

涉及考点 | 肺炎喘嗽、疔腮的辨证论治

第九篇 针灸学



考情分布图

		2015	2016	2017	2018	2019
针灸学	总论	9	6	7	77	
	各经腧穴	8	8	8	9	9
	毫针刺法	0	0	1	0	1
	灸法	0	0	1	1	1
	拔罐法	0	1	0	1	0
	其他针法	0	0	0	0	1
	头针、耳针	0	0	1	1	0
	治疗总论	0	1	0	0	1
	内科病证的针灸治疗	11	11	9	12	9
	妇儿科病证的针灸治疗	1	2	1	1	1
	皮外骨伤病证的针灸治疗	1	1	0	0	0
	五官科病证的针灸治疗	0	1	0	1	0
	急证及其他病证的针灸治疗	0	0	0	0	0



高频考点必背

1. 经络系统由**经脉和络脉**组成,其中经脉包括十二经脉、奇经八脉,以及附属于十二经脉的十二经别、十二经筋、十二皮部。
2. **奇经八脉**包括:督脉、任脉、冲脉、带脉、阴维脉、阳维脉、阴跷脉、阳跷脉。
3. 手经表示其外行路线分布于**上肢**,足经表示其外行路线分布于**下肢**。
4. 与六脏相配属的**六条阴经**(六阴经),分布于**四肢内侧和胸腹**,上肢内侧为手三阴经,下肢内侧为足三阴经。
5. 手足阳经分布规律为**阳明在前、少阳在中、太阳在后**。
6. 手足阴经分布规律为**太阴在前、厥阴在中、少阴在后**。
7. 其中足三阴经在足内踝上**8寸以下**为厥阴在前、太阴在中、少阴在后,至内踝上**8寸以上**,太阴交出于厥阴之前。
8. 十二经脉的循行走向与交接规律歌诀:**肺大胃脾心小肠,膀胱包焦胆肝藏**。
9. **督脉、任脉、冲脉**皆起于胞中,同出会阴,称为“**同源三歧**”。
10. **带脉**起于胁下,绕行腰间一周。
11. 阴维脉起于小腿内侧,沿腿股内侧上行,至**咽喉与任脉会合**。
12. 阳维脉起于足跗外侧,沿腿膝外侧上行,至**项后与督脉相会**。
13. 阴跷脉起于足跟内侧,随足少阴等经上行,至**目内眦与阳跷脉会合**。

14. 阳跷脉起于足跟外侧,伴足太阳等经上行,至**目内眦与阴跷脉会合**,再沿足太阳经上额,于**项后**会合足少阳经。
15. 任脉:妊养六阴经,调节全身阴经经气,故称“**阴脉之海**”。
16. 督脉:督领六阳经,调节全身阳经经气,故称“**阳脉之海**”。
17. 冲脉具有涵蓄十二经气血的作用,有“**十二经脉之海**”和“**血海**”之称。
18. 带脉起于胁下,环腰一周,状如束带**约束纵行躯干的诸条经脉**。
19. 阳维脉主一身之表,阴维脉主一身之里,阴阳维脉具有**维系一身阴经和阳经**的作用。
20. 阴阳跷脉主肢体两侧的阴阳,**调节下肢运动与寤寐**。
21. 督脉的**大椎穴**为手足三阳经交会之处。
22. 任脉的**关元、中极穴**为足三阴经交会之处。
23. **冲脉**加强了足阳明与足少阴经之间的联系。
24. **带脉**联系着纵行于躯干的各条经脉等。
25. 十二经络脉在四肢**肘膝关节以下**本经络穴分出后,均走向其相表里的经脉,阴经络脉走向阳经,阳经络脉走向阴经,阴阳经的络脉相互交通连接。
26. 呕吐的治法:和胃理气,降逆止呕。取**胃的募穴及足阳明、手厥阴经穴**为主。
27. 十二经筋均起于四肢末端,上行于头面胸腹部。行于体表,不入内脏。具有**结、聚、散、络**的特点。与脏腑无属络关系。
28. 经筋的作用主要是**约束骨骼**,利于关节屈伸活动,以保持人体正常的运动功能。
29. 经络学说广泛应用于临床各科的治疗。主要表现在:对针灸治疗有重要的指导意义;指导药物归经。
30. 经穴是具有固定的名称和位置,分布在十四经循行路线上,有明确的主治病证,是腧穴的主要组成部分。
31. **奇穴**是指未归属于十四经穴范围,但有固定名称和位置的经验效穴,统称“经外奇穴”。
32. **阿是穴**是以压痛点或其他反应点作为刺灸的部位,既不是经穴,又不是奇穴,而是按压痛点取穴,又称天应穴、不定穴。
33. **近治作用**指腧穴都能治疗其所在部位及邻近脏腑、组织、器官的病证。
34. **远治作用**指某些腧穴不仅能治局部病证,而且能治本经循行所到达的远隔部位的脏腑、组织、器官的病证。
35. 具有远治作用的腧穴,主要是十二经脉在四肢肘、膝关节以下的经穴,即“**经脉所过,主治所及**”。
36. **特殊作用**指某些腧穴具有双向的良性调整作用和相对的特异性治疗作用。所谓双向的良性调整作用,指同一腧穴对机体不同的病理状态,可以起到两种相反而有效的治疗作用。
37. 分经主治规律就是某一经脉所属的经穴均可治疗该经循行部位及其相应脏腑的病证。同一经脉的不同经穴,可以治疗本经相同的病证。
38. 分部主治,是指处于身体某一部位的腧穴均可治疗该部位及某类病证。
39. 呕吐的处方主穴:**中脘、足三里、内关**。
40. 井穴多用于**急救**,荣穴多用于治疗**热证**,输穴多用于治疗**关节疼痛**,经穴治疗作用不典型,合穴多用于治疗**相关脏腑病证**。
41. 阴经五脏之原穴,与五输穴中的输穴为同一穴,所谓“**以输为原**”。

42.十二络脉具有加强表里两经联系的作用,络穴能沟通表里二经,故有“**一络通二经**”之说,因此,十二经的络穴除可治疗本经脉的病证、本络脉的虚实病证外,还能治疗其相表里之经的病证。

43.把先病经脉的原穴和后病的相表里经脉的络穴相配合,称为“**原络配穴法**”或“**主客原络配穴法**”,是表里经配穴法的典型用法。

44.背俞穴是脏腑之气输注于**背腰部**的腧穴。募穴是脏腑之气结聚于**胸腹部**的腧穴。

45.背俞穴主治**脏病**,募穴主治**腑病**。

46.八脉交会穴均分布于肘膝以下,包括**公孙、内关、后溪、申脉、足临泣、外关、列缺、照海**。

47.八会穴的组成是:**脏会章门,腑会中脘,气会膻中,血会膈俞,筋会阳陵泉,脉会太渊,骨会大杼,髓会绝骨**。

48.十二经脉和奇经八脉中的阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉之经气深聚的部位称为**郄穴**。

49.郄穴大多分布在四肢肘膝关节以下。十二经脉各有一个郄穴,阴阳跷脉及阴阳维脉也各有一个郄穴,合称为**十六郄穴**。

50.阴经郄穴多治疗**血症**,阳经郄穴多治疗**急性痛证**。

51.**下合穴**是指六腑之气下合于足三阳经的六个腧穴,又称六腑下合穴。

52.胃痛的处方主穴:**中脘、足三里、内关**。

53.交会穴是指两经或数经相交会合的腧穴。交会穴多分布于头面、躯干部位。**交会穴能治本经的疾病,也能兼治所交会经脉的疾病**。

54.**大椎**是督脉的经穴,又与手足三阳经相交会,它既可治督脉之疾,又可治诸阳经的全身性疾病;**三阴交**是足太阴脾经的经穴,又与足少阴肾经和足厥阴肝经相交会,因此既能治脾经病,也能治疗肝、肾两经的疾病。

55.前发际正中至后发际正中**12直寸**,用于确定头部腧穴的纵向距离。

56.脐中至耻骨联合上缘(曲骨)**5直寸**,用于确定下腹部腧穴的纵向距离。

57.臀沟至腘横纹**14直寸**,用于确定大腿后部腧穴的纵向距离。

58.灸火的热力具有扶助阳气、举陷固脱的功能,适合治疗**寒性病证**。

59.艾灸具有行气活血、消瘀散结的作用,临床常用于治疗**气血凝滞**之疾。

60.直接灸是将大小适宜的艾炷,直接放在皮肤上施灸的方法。若施灸时需将皮肤烧伤化脓,愈后留有瘢痕者,称为**瘢痕灸**;若不使皮肤烧伤化脓,不留瘢痕者,称为**无瘢痕灸**。

61.临床上一一般是**先灸上部,后灸下部,先灸阳部,后灸阴部**,壮数是先少而后多,艾炷是先小而后大。

62.针灸的治疗原则可归纳为补虚泻实、清热温寒、标本缓急、三因制宜。**补虚泻实**是针灸治疗的基本原则。

63.**热则疾之**是指热性病证的治疗原则是浅刺疾出或点刺放血,手法宜轻而快,可以不留针或短暂留针,以清泻热毒。

64.**寒则留之**是指寒性病证的治疗原则是深刺而久留针,以达温经散寒的目的。

65.按经配穴是根据经脉理论和经脉之间的联系进行配穴的方法。主要包括**本经配穴法、表里经配穴法、同名经配穴法**等。

66.头痛的处方主穴:**百会、太阳、风池、阿是穴、合谷**。

67.偏头痛的处方主穴:**率谷、阿是穴、风池、外关、足临泣、太冲**。

- 68.腰痛取局部阿是穴及足太阳经穴为主。处方主穴:大肠俞、阿是穴、委中。
- 69.痹证的治法为**通络止痛**。以局部穴位为主,配合循经取穴及辨证选穴。
- 70.坐骨神经痛的治法为通经止痛。循经取**足太阳、足少阳经穴**为主。
- 71.中经络疏通经络,醒脑调神。取**督脉、手厥阴及足太阴经穴**为主。
- 72.中脏腑闭证:**平肝息风,醒脑开窍**。取督脉、手厥阴和十二井穴为主。脱证:**回阳固脱**。以任脉经穴为主。
- 73.中经络处方主穴:**水沟、内关、三阴交、极泉、尺泽、委中**。
- 74.中脏腑闭证处方主穴:**水沟、十二井、太冲、丰隆、劳宫**。
- 75.中脏腑脱证处方主穴:**关元、神阙**。
- 76.眩晕的处方主穴:**百会、风池、太冲、内关**。
- 77.面瘫的处方主穴:**攒竹、阳白、四白、颧髻、颊车、地仓、合谷、太冲**。
- 78.不寐的治法:舒脑宁心,安神利眠。取**督脉、手少阴经穴**为主。
- 79.不寐的处方主穴:**百会、安眠、神门、三阴交、照海、申脉**。
- 80.感冒的治法:祛风解表。取**手太阴、手阳明经穴及督脉穴**为主。
- 81.感冒的处方主穴:**列缺、合谷、风池、大椎、太阳**。
- 82.感冒的治疗操作:主穴以毫针泻法,风寒感冒可加灸法,风热感冒大椎可行**刺络拔罐法**;配穴中足三里用补法,**尺泽、委中、少商、商阳可点刺出血**。
- 83.哮喘的治法:实证宜祛邪肃肺,化痰平喘。取**手太阴经穴及相应背俞穴**为主。
- 84.哮喘的治法:虚证宜补益肺肾,止哮平喘。取**相应背俞穴及手太阴、足少阴经穴**为主。
- 85.哮喘的处方:实证主穴取**列缺、尺泽、肺俞、中府、定喘**。虚证主穴取**肺俞、膏肓、肾俞、太渊、太溪、足三里、定喘**。

5年 历年真题

1.足三阳经的循行规律是

- A.从胸走手
B.从足走头
C.从头走足
D.从足走胸
E.从胸走足

【答案】C

【解析】十二经脉的循行走向规律是:手三阴经从胸走手,手三阳经从手走头,足三阳经从头走足,足三阴经从足走腹胸。

涉及考点 | 十二经脉的循行走向

2.足三阴经从开始部位至内踝上8寸以下的分布是

- A.太阴在前,厥阴在中,少阴在后
B.厥阴在前,少阴在中,太阴在后
C.少阴在前,太阴在中,厥阴在后
D.厥阴在前,太阴在中,少阴在后
E.太阴在前,少阴在中,厥阴在后

【答案】D

【解析】手足三阴经为太阴在前,厥阴在中,少阴在后。其中足三阴经在足内踝上8寸以下为厥阴在前,太阴在中,少阴在后,至内踝8寸以上,太阴交出于厥阴之前。

涉及考点 | 十二经脉的分布规律



配套名师高清视频

3.十二经脉的交接中,阴经与阳经交接的部位是

- A.腹部
- B.胸部
- C.头部
- D.手足末端
- E.下肢部

【答案】D

【解析】十二经脉的交接中,相为表里的阴经与阳经在手足末端交接;同名的阳经与阳经在头面部交接;相互衔接的阴经和阴经在胸中交接。

涉及考点 | 十二经脉循行走向

4.下列穴位中,既是输穴,还是八会穴的是

- A.太冲
- B.太渊
- C.太溪
- D.神门
- E.公孙

【答案】B

【解析】首先太渊为肺经原穴,并且是八会穴中的脉会,可以治疗“无脉症”。

涉及考点 | 八会穴

5.在胸部,距前正中线4寸的经脉是

- A.足少阴肾经
- B.足阳明胃经
- C.手太阴肺经
- D.足太阴脾经
- E.手厥阴心包经

【答案】B

【解析】足阳明胃经在胸部距前正中线4寸,在腹部距前正中线2寸。

涉及考点 | 胃经循行走向

6.股骨大转子至腓横纹的骨度分寸是

- A.14寸
- B.15寸
- C.16寸
- D.18寸
- E.19寸

【答案】E

涉及考点 | 骨度分寸定位法

7.根据骨度分寸定位法,脐中至耻骨联合上缘的长度是

- A.5寸
- B.7寸
- C.8寸
- D.9寸
- E.2寸

【答案】A

涉及考点 | 骨度分寸定位法

8.奇经八脉中,主一身之里的经脉是

- A.任脉
- B.督脉
- C.冲脉
- D.带脉
- E.阴维脉

【答案】E

涉及考点 | 奇经八脉的作用及临床意义

9.患者,女,22岁。月经不调,常提前7天以上,甚至10余日一行。治疗应首选的腧穴是

- A.足三里、脾俞、太冲
B.命门、三阴交、足三里
C.关元、三阴交、血海
D.气海、三阴交、归来
E.关元、三阴交、肝俞

【答案】C

【解析】月经先期主穴:关元、三阴交、血海。关元为任脉与足三阴经的交会穴,八脉隶于肝肾,故本穴是益肝肾、调冲任的要穴;三阴交为足三阴经交会穴,可调理脾、肝、肾三脏,养血调经,与关元皆为治疗月经病要穴;血海清热和血。

涉及考点 | 月经先期的处方

10.体现“经脉所过,主治所及”腧穴治疗规律是

- A.对症选穴
B.辨证选穴
C.远部选穴
D.近部选穴
E.辨病选穴

【答案】C

涉及考点 | 腧穴的主治特点

11.下列哪项属于近部选穴

- A.头痛取膈俞
B.脱肛取百会
C.咳嗽取列缺
D.鼻病选迎香
E.鼻病选合谷

【答案】D

【解析】迎香穴:在鼻翼外缘中点旁开,当鼻唇沟中,治疗鼻病属近治选穴。

涉及考点 | 腧穴的主治特点

12.患者,女,45岁。在针刺中,突然出现头晕目眩,多汗,四肢发冷,脉沉细。应首选的处理方法是

- A.停止针刺,立即起针
B.速饮糖水
C.针刺百会
D.针刺人中
E.灸足三里、关元

【答案】A

涉及考点 | 晕针的处理方法

13.治疗目赤肿痛,肝胆火盛证,除了主穴外,还应选取的腧穴是

- A.鱼腰、球后
B.少商、外关
C.行间、侠溪
D.血海、膈俞
E.列缺、照海

【答案】C

涉及考点 | 目赤肿痛的治疗

14.根据腧穴主治规律,手三阴经腧穴相同的主治病证是

- A.头面部疾病
B.颈项部疾病
C.胸部疾病
D.腹部疾病
E.神志疾病

【答案】C

涉及考点 | 腧穴的主治规律

15. 在腧穴定位法中, 腰阳关的取穴依据是

- A. 简便取穴法
- B. 同身寸法
- C. 固定标志
- D. 活动标志
- E. 骨度分寸法

【答案】C

【解析】常用腧穴定位法有4种: 骨度分寸定位法、体表解剖标志定位法、手指同身寸定位法、简便定位法。其中体表解剖标志定位法依据解剖标志分为固定标志和活动标志, 固定标志是在自然姿势下可见的标志, 活动标志是在活动姿势下才会出现的标志。腰阳关位于后正中线上, 第4腰椎棘突下凹陷中, 约与髂嵴相平。第4腰椎与肌肉所形成的凹陷是在自然姿势下可见的标志, 为固定标志。

涉及考点 | 体表解剖标志定位法

16. 循行“入下齿中”的经脉是

- A. 小肠经
- B. 大肠经
- C. 胃经
- D. 脾经
- E. 肝经

【答案】B

【解析】《灵枢·经脉》原文指出: “大肠手阳明之脉, 起于大指次指之端, 循指上廉, 出合谷两骨(第1、2掌骨)之间, 上入两筋(拇长伸肌腱与拇短伸肌腱)之中, 循臂上廉, 入肘外廉, 上臑外前廉, 上肩, 出髃骨(肩胛骨肩峰部)之前廉, 上出于柱骨(颈椎骨)之会上, 下入缺盆, 络肺, 下膈, 属大肠。其支者, 从缺盆上颈, 贯颊, 入下齿中; 还出夹口, 交人中——左之右、右之左, 上夹鼻孔”。循行“入下齿中”的经脉是足阳明胃经。

涉及考点 | 阳明经的循行特点

17. 手阳明大肠经的募穴是

- A. 中腕
- B. 臄中
- C. 期门
- D. 天枢
- E. 中极

【答案】D

【解析】募穴记忆歌诀: 肺募中府脾章门, 大肠天枢焦石门, 心募巨阙包臄中, 小肠关元肝期门, 胃募中腕胆日月, 膀胱中极肾京门。

涉及考点 | 募穴

18. 治疗咽喉肿痛的首选穴是

- A. 孔最
- B. 尺泽
- C. 列缺
- D. 太渊
- E. 少商

【答案】E

【解析】少商(井穴): 在手指, 拇指末节桡侧, 指甲根角侧上方0.1寸(指寸); 主治: ①咽喉肿痛、鼻衄等肺系实热证。②高热, 昏迷, 癫狂。③指肿, 麻木。

涉及考点 | 少商穴的腧穴主治

19. 太溪穴是定位是

- A.在踝区,外踝尖与跟腱之间的凹陷处 B.在踝区,内踝尖与跟腱之间的凹陷处
C.在踝区,内踝下方的凹陷处 D.在踝区,外踝下方的凹陷处
E.在踝区,内踝与胫骨前肌腱之间的凹陷处

【答案】B

涉及考点 | 太溪穴的定位

20.肩髃穴归属的经脉是

- A.手阳明大肠经 B.手太阴肺经
C.手太阳小肠经 D.手少阳三焦经
E.手厥阴心包经

【答案】A

涉及考点 | 手阳明循行的输穴

21.通里的定位是在

- A.腕掌侧远端横纹上,尺侧腕屈肌腱桡侧缘
B.腕掌侧远端横纹上 0.5 寸,尺侧腕屈肌腱桡侧缘
C.腕掌侧远端横纹上 1 寸,尺侧腕屈肌腱桡侧缘
D.腕掌侧远端横纹上 1.5 寸,尺侧腕屈肌腱桡侧缘
E.腕掌侧远端横纹上 2 寸,尺侧腕屈肌腱桡侧缘



配套名师高清视频

【答案】C

【解析】通里:腕掌侧远端横纹上 1 寸,尺侧腕屈肌腱桡侧缘。神门:腕掌侧远端横纹上,尺侧腕屈肌腱桡侧缘。阴郄:腕掌侧远端横纹上 0.5 寸,尺侧腕屈肌腱桡侧缘。

涉及考点 | 通里穴的定位

22.下列腧穴中,治疗足心热的是

- A.太冲 B.行间
C.大敦 D.侠溪
E.涌泉

【答案】E

涉及考点 | 涌泉穴的主治

23.下列腧穴中,善治头面诸疾的是

- A.商阳 B.二间
C.合谷 D.阳溪
E.曲池

【答案】C

【解析】合谷(原穴):在手背,第 2 掌骨桡侧的中点处。简便取穴法:以一手的拇指指间关节横纹,放在另一手拇、示指之间的指蹼缘上,当拇指尖下是穴;主治:①头痛、目赤肿痛、鼻衄、齿痛、口眼歪斜、耳聋等头面五官诸疾。②发热恶寒等外感病证。③热病无汗或多汗;④经闭、滞产等妇产科病证;⑤上肢疼痛、不遂;⑥牙拔除术、甲状腺手术等口面五官及颈部手术针麻常用穴。

涉及考点 | 合谷穴的主治

24.下列属于胆经腧穴的是

- A.血海 B.阴陵泉

- C.足三里
E.瞳子髎
- D.隐白

【答案】E

【解析】血海为足太阴脾经腧穴，阴陵泉、隐白分别为足太阴脾经合穴、井穴，足三里为足阳明经合穴，瞳子髎为胆经腧穴。

涉及考点 | 足少阳胆经的常用腧穴

25.可治疗小儿惊风的选穴是

- A.悬钟
B.风市
C.阳陵泉
D.环跳
E.足临泣

【答案】C

【解析】可治疗小儿惊风的穴位有尺泽、涌泉、中冲、阳陵泉、太冲、大椎、印堂。

涉及考点 | 阳陵泉的主治

26.手厥阴心包经的原穴是

- A.大陵
B.神门
C.间使
D.内关
E.太渊

【答案】A

【解析】神门为心经原穴、输穴。间使为心包经经穴。大陵为心包经原穴、输穴。内关为心包经络穴、八脉交会穴。太渊为肺经原穴、输穴、八会穴之脉会。

涉及考点 | 手厥阴心包经的常用腧穴

27.既能治疗肠腑病,又能治疗妇科病的腧穴是

- A.归来
B.足三里
C.丰隆
D.天枢
E.内庭

【答案】D

【解析】天枢(大肠之募穴):主治:①腹痛、腹胀、便秘、腹泻、痢疾等胃肠病证。②月经不调、痛经等妇科疾患。

涉及考点 | 天枢穴的主治

28.下关穴所属的经脉是

- A.手太阴肺经
B.手阳明大肠经
C.足阳明胃经
D.足太阴脾经
E.手少阴心经

【答案】C

涉及考点 | 足阳明胃经的腧穴

29.位于第9胸椎棘突下,旁开1.5寸的腧穴是

- A.膀胱俞
B.大肠俞
C.肝俞
D.胃俞
E.肾俞

【答案】C

【解析】肝俞位于第9胸椎棘突下,旁开1.5寸;膀胱俞位于第2骶椎棘突下,旁开1.5寸,约平第2骶后孔;大肠俞位于第4腰椎棘突下,旁开1.5寸;胃俞位于第12胸椎棘突下,旁开1.5寸;肾俞位于第2腰椎棘突下,旁开1.5寸。

涉及考点 | 肝俞的定位

30.手太阳小肠经的郄穴是

- A.会宗
- B.梁丘
- C.养老
- D.阳交
- E.金门

【答案】C

【解析】会宗是三焦经的郄穴,梁丘是胃经的郄穴,养老是小肠经的郄穴,阳交是阳维脉的郄穴,金门是膀胱经的郄穴。

涉及考点 | 手阳明小肠经的腧穴

31.脐下4寸,前正中线旁开2寸的腧穴是

- A.水道
- B.归来
- C.梁门
- D.天枢
- E.大横

【答案】B

【解析】归来:脐下4寸,前正中线旁开2寸。梁门:脐上4寸,前正中线旁开2寸。天枢:横平脐中,前正中线旁开2寸。大横:横平脐中,前正中线旁开4寸。

涉及考点 | 归来的定位

32.经脉循行“其支者,从耳后入耳中,出走耳前,过客主人,前交颊,至目锐眦”者是以下哪条经脉

- A.足少阳胆经
- B.足少阴肾经
- C.手阳明大肠经
- D.手少阳三焦经
- E.手太阳小肠经

【答案】D

【解析】手少阳三焦经循行:“另一支脉,从耳后分出,进入耳中,再浅出到耳前,经上关、面颊到目外眦”。

涉及考点 | 手少阳三焦经的循行规律

33.下列各项,属本经配穴法是

- A.太阳头痛取后溪、昆仑
- B.失眠取神门、太溪
- C.牙痛取颊车、内庭
- D.感冒咽痛取曲池、少商
- E.肝病取太冲、阳陵泉

【答案】C

涉及考点 | 十二经络的腧穴

34.循行分布于胸中,散络于心包的经脉是

- A.足太阳膀胱经
- B.手太阳小肠经
- C.手阳明大肠经
- D.手少阳三焦经
- E.手厥阴心包经

【答案】D

涉及考点 | 手厥阴心包经的循行规律

35. 下列哪组腧穴被称为“四关”穴

- | | |
|-----------|-----------|
| A. 内关、外关 | B. 合谷、太冲 |
| C. 曲池、足三里 | D. 外关、阳陵泉 |
| E. 尺泽、委中 | |

【答案】B

【解析】四关穴即合谷、太冲穴的总称。合谷穴是手阳明大肠经的原穴，四总穴之一。位于第一、二掌骨之间，也就是俗称的“虎口”。太冲穴是足厥阴肝经的输穴和原穴。位于足背第一、二跖骨之间。合谷穴与太冲穴都是人体的重要保健穴位，两穴合称为“四关穴”，是人体生命的关口。

涉及考点 | 四关的定义

36. 面瘫伴麻木、味觉减退，除主穴外，还应选择的配穴是

- | | |
|-------|-------|
| A. 承浆 | B. 水沟 |
| C. 廉泉 | D. 翳风 |
| E. 风池 | |

【答案】C

涉及考点 | 面瘫的治疗

37. 痛在腰脊中部，与之相关的经脉是

- | | |
|-----------|----------|
| A. 足太阳膀胱经 | B. 足少阴肾经 |
| C. 足少阳胆经 | D. 带脉 |
| E. 督脉 | |

【答案】E

【解析】腰痛病位在腰，腰为肾之府，肾经贯脊属肾，膀胱经夹脊络肾，督脉并于脊里，行于后背正中；本病与肾及足太阳膀胱经、督脉关系密切。根据疼痛部位进行经络辨证：疼痛在腰脊中部者为督脉病证，疼痛在腰脊两侧者为足太阳经证。

涉及考点 | 腰痛的辨证论治

38. 十宣穴的定位是

- | |
|--------------------------------|
| A. 在足背侧，第1至第5趾间，趾蹼缘后方赤白肉际处 |
| B. 在手背侧，当第2、3掌骨间，指掌关节后约0.5寸处 |
| C. 在手背侧，微握拳，第1至第5指间，指蹼缘后方赤白肉际处 |
| D. 在第2至第5指掌侧，近端指关节的中央 |
| E. 在手十指尖端，距指甲游离缘0.1寸 |

【答案】E

【解析】十宣穴位于手十指尖端，距指甲游离缘0.1寸。选项A为八风。选项B为外劳宫。选项C为八邪。选项D为四缝。

涉及考点 | 十宣的定位

39. 治疗瘀血停胃型胃痛，除主穴外，应选取的配穴是

- | | |
|----------|-----------|
| A. 内庭、胃俞 | B. 期门、太冲 |
| C. 胃俞、脾俞 | D. 膈俞、三阴交 |
| E. 脾俞、关元 | |

【答案】D

涉及考点 | 胃痛的治疗

40. 患者腰痛遇劳而发,腰部强直僵硬,痛处固定不移,转侧不利,络脉瘀血,舌质暗,脉涩。治疗选取阿是穴、大肠俞、委中穴。其操作方法是

- A. 温和灸
B. 温针灸
C. 耳针法
D. 刺络拔罐法
E. 毫针补法

【答案】D

涉及考点 | 腰痛的治疗

41. 治疗瘾疹可采用拔罐法,常用的腧穴是

- A. 血海
B. 膈俞
C. 神阙
D. 风门
E. 大椎

【答案】C

【解析】瘾疹的处方主穴为曲池、合谷、血海、膈俞、三阴交。风热犯表配大椎、风门。但拔罐法用的是神阙穴。



配套名师高清视频

涉及考点 | 瘾疹的治疗

42. 隔蒜灸多用于治疗

- A. 阳痿早泄
B. 呕吐腹痛
C. 未溃疮疡
D. 腹痛泄泻
E. 疮疡久溃

【答案】C

【解析】隔蒜灸:本法有清热解毒、杀虫等作用,多用于治疗瘰疬、肺癆及肿疡初起等病证。

涉及考点 | 隔蒜灸的作用

43. 治疗疮疡溃后不敛,适宜的灸法是

- A. 灯火灸
B. 隔姜灸
C. 蒜泥灸
D. 隔附子饼灸
E. 白芥子灸

【答案】D

涉及考点 | 隔附子饼灸的作用

44. 治疗丹毒、扭伤常选的拔罐法是

- A. 留罐法
B. 走罐法
C. 闪罐法
D. 刺血拔罐法
E. 留针拔罐法

【答案】D

【解析】刺血拔罐法:多用于热证、实证、瘀血证及某些皮肤病,如神经性皮炎、痤疮、丹毒、扭伤、乳痈等。

涉及考点 | 拔罐的作用

45. 胆囊穴的定位是在小腿外侧上部,当腓骨小头前下方凹陷处直下

- A. 1 寸
B. 1.5 寸

C.2 寸

D.2.5 寸

E.3 寸

【答案】C

【解析】胆囊穴：在小腿外侧，腓骨小头直下 2 寸。主治：①急、慢性胆囊炎，胆石症，胆道蛔虫症等胆腑病证。②下肢痿痹。

涉及考点 | 胆囊穴的定位

46.太冲穴的定位是

A.足背,当第 1、2 趾间的趾蹠缘上方纹头处

B.足背,当第 2、3 趾间的趾蹠缘上方纹头处

C.足背,第 1、2 跖骨结合部之前凹陷中

D.足背,第 2、3 跖骨结合部之前凹陷中

E.内踝前 1 寸,胫骨前肌腱内缘凹陷中

【答案】C

【解析】太冲(输穴;原穴):在足背,第 1、2 跖骨间,跖骨底结合部前方凹陷中,或触及动脉搏动处。

涉及考点 | 太冲穴的定位

47.中风中经络出现语言蹇涩,治疗除主穴外,还应选取的配穴是

A.金津、玉液

B.合谷、太冲

C.悬钟、太冲

D.合谷、颊车

E.通里、哑门

【答案】E

【解析】通里穴、哑门穴及廉泉穴均有主治舌强不语、暴喑的功效。

涉及考点 | 中风的治法

48.晕厥的治疗以何经为主

A.足厥阴经

B.手少阳经

C.手少阴经

D.督脉

E.任脉

【答案】D

【解析】晕厥多由气血不能上充头部,阳气不能达于四末而致,或因经气逆乱,清窍受扰而致。督脉循行入脑上巅,主治神志病,水沟为督脉穴,具有开窍醒神之功,为治疗晕厥的主穴之一。

涉及考点 | 晕厥的治法

49.中风左侧肢体瘫痪的患者应取

A.左侧顶颞前斜线和顶颞后斜线

B.右侧顶颞前斜线和顶颞后斜线

C.右侧顶颞后斜线

D.左侧顶颞后斜线

E.左侧颞后线

【答案】B

【解析】左侧肢体偏瘫,病位在右侧大脑,针刺部位在右侧的顶颞前斜线和顶颞后斜线。

涉及考点 | 标准头穴线的定位和主治

50.某男,33 岁,2 天前受风后出现左侧面部麻木,额纹消失,眼裂变大,鼻唇沟变浅,口角

下垂歪向左侧,舌淡,苔薄白。针刺面部穴位应采用

- A.直刺深刺
- B.多穴重刺
- C.轻刺浅刺
- D.提插泻法
- E.电针强刺激

【答案】C

【解析】面部穴位宜轻刺浅刺。

涉及考点 | 面瘫的治法

51.治疗饮食停滞型胃痛,除主穴外,还应选取的腧穴是

- A.三阴交、内庭
- B.膈俞、胃俞
- C.胃俞、脾俞
- D.下脘、梁门
- E.气海、关元

【答案】D

【解析】胃痛的处方主穴:中脘、足三里、内关。饮食伤胃配梁门、下脘。

涉及考点 | 胃痛的治法

52.患者因受寒而至颈项疼痛,重着,以项背部疼痛为主,有明显压痛,低头加重,伴恶寒,头痛,舌淡红,苔薄白,脉弦紧,治疗除主穴外,还应选取的配穴是

- A.申脉、外关
- B.肩髃、天宗
- C.内关、合谷
- D.风池、肩井
- E.大椎、束骨

【答案】E

【解析】根据患者临床表现可诊断为落枕(病在督脉与太阳经),主穴取外劳宫、天柱、阿是穴、后溪、悬钟。病在督脉、太阳经者配大椎、束骨,病在少阳经配风池、肩井。风寒袭络配风池、合谷。气滞血瘀配内关、合谷。肩痛配肩髃,背痛配天宗。

涉及考点 | 落枕的治疗

53.治疗便秘之气秘证,除主穴外,还应选取的配穴是

- A.合谷、曲池
- B.太冲、中脘
- C.神阙、关元
- D.脾俞、气海
- E.照海、太溪

【答案】B

【解析】治疗便秘的主穴是天枢、大肠俞、上巨虚、支沟。热秘配合谷、曲池;气秘配太冲、中脘;冷秘配神阙、关元;虚秘配足三里、脾俞、气海,兼阴伤津亏者加照海、太溪。

涉及考点 | 便秘的处方

54.治疗痛经虚证,应选取的主穴是

- A.十七椎、关元、三阴交、归来、肝俞
- B.十七椎、气海、三阴交、归来
- C.十七椎、三阴交、中极、次髎
- D.十七椎、三阴交、足三里、关元
- E.十七椎、关元、三阴交、血海

【答案】D

【解析】痛经虚证治疗宜调补气血、温养冲任,以任脉、足太阴、足阳明经穴为主。三阴交为肝脾肾三经之交会穴,可以健脾益气、调补肝肾,肝脾肾精血充盈,胞脉得养,冲任自调;关元穴为任脉穴,又为全身强壮要穴,可补益肝肾,温养冲任;足三里补益气血。

涉及考点 | 痛经的处方

55.患者皮肤突然出现块、片状风团,皮肤常瘙痒,舌淡红,脉浮。治疗除合谷、血海、三阴交外,还应选取的主穴是

- A.外关、风门
- B.膈俞、曲池
- C.曲池、内庭
- D.天枢、足三里
- E.脾俞、足三里

【答案】B

涉及考点 | 瘾疹的治疗

56.患者,女,30岁。3天前因对着空调入睡,次日睡眠醒来时发现一侧面部肌肉板滞、麻木、瘫痪,额纹消失,针刺起远治作用的主穴是

- A.攒竹、丝竹空
- B.合谷、太冲
- C.阳白、四白
- D.颧髎、颊车
- E.丝竹空、阳白

【答案】B

涉及考点 | 面瘫的处方

57.患者,男,49岁。因夜卧受凉,项部疼痛,伴左上肢手指麻木发凉,遇寒即发,肩臂酸楚,舌苔薄白,脉弦紧。其针灸处方除夹脊、风池、阿是穴外,还应选取的主穴是

- A.天柱、曲池、列缺、合谷
- B.天柱、膈俞、三阴交、合谷
- C.肩井、外关、肝俞、肾俞
- D.大椎、后溪、太溪、太冲
- E.风门、肺俞、曲池、内关

【答案】A

涉及考点 | 颈椎病的处方

58.患者,男,32岁。腰痛3个月,冷库工作3年。腰部冷痛,得温痛减,舌淡苔白滑,脉沉迟。治疗除取主穴外,还应加

- A.阿是穴、腰夹脊
- B.后溪、申脉
- C.命门、腰阳关
- D.膈俞、次髎
- E.督俞、太溪

【答案】C

【解析】可由病史及喜温、舌脉可诊断为寒湿腰痛。治疗腰痛的主穴是大肠俞、阿是穴、委中。督脉病证配后溪;足太阳经证配申脉;腰椎病变配腰夹脊。寒湿腰痛配命门、腰阳关,瘀血腰痛配膈俞、次髎;肾虚腰痛配肾俞、太溪。

涉及考点 | 腰痛的处方

59.哮喘实证,治疗除肺俞、中府、定喘外,还应选取的主穴是

- A.列缺、尺泽
- B.风门、合谷
- C.丰隆、曲池
- D.天突、外关
- E.曲池、大椎

【答案】A

【解析】哮喘,病位在肺,与脾肾关系密切。列缺为肺经络穴,尺泽为肺经合穴。

涉及考点 | 哮喘的处方

60.绝经前后诸证肾阳虚者,宜配伍的腧穴是

- A.照海、阴谷
B.中脘、丰隆
C.关元、命门
D.心俞、神门
E.中脘、阴陵泉

【答案】C

【解析】治疗绝经前后诸证之肾阳虚证配关元、命门；肾阴虚配照海、阴谷；痰气郁结配中脘、丰隆；烦躁失眠配心俞、神门；纳少便溏配中脘、阴陵泉。

涉及考点 | 绝经前后诸证的处方

61.患者,女,45岁,失眠2个月,近日来入睡困难,有时睡后易醒,醒后难以入睡,甚至彻夜不眠,舌苔薄,脉沉细。治疗应首选的腧穴是

- A.神门、内关
B.神门、胆俞
C.神门、三阴交
D.心俞、脾俞
E.心俞、足三里

【答案】C

涉及考点 | 不寐的处方

62.治疗肾虚遗尿的腧穴是

- A.肾俞、命门、太溪
B.肺俞、气海、足三里
C.行间、阴陵泉
D.百会、神门
E.肾俞、太溪、照海

【答案】A

【解析】遗尿的治法为调理膀胱,温肾健脾,以任脉、足太阴经穴及相应的背俞穴、募穴为主。主穴为关元、中极、膀胱俞、三阴交。肾虚遗尿配肾俞、命门、太溪。取肾之背俞穴,补养脏腑之气,命门温补肾阳,太溪为肾经输穴、原穴,可温补肾之不足。

涉及考点 | 遗尿的处方

63.患者大便干结,腹胀腹痛,口干口臭,舌红,苔黄燥,脉滑实。治疗应首选的主穴是

- A.天枢、大肠俞、上巨虚、支沟
B.合谷、曲池、天枢、公孙
C.太冲、足三里、中脘、支沟
D.神阙、关元、足三里、中脘
E.公孙、气海、三阴交、内关

【答案】A

【解析】根据患者临床表现,可诊断为热结便秘。主穴选用天枢、上巨虚、支沟、大肠俞,配以合谷、曲池。

涉及考点 | 便秘的处方

64.治疗耳鸣的处方中,属于同名经配穴的是

- A.翳风、中渚
B.听宫、中渚
C.行间、丘墟
D.中渚、侠溪
E.外关、合谷

【答案】D

【解析】首先,两穴同属于少阳经。中渚穴,属手少阳三焦经,输穴,其主治疾病耳聋、耳鸣、头痛、目赤等疾患。侠溪穴,属足少阳胆经,荣穴,其主治病症耳聋、耳鸣、目赤、头痛等疾患。

涉及考点 | 耳鸣的处方



配套名师高清视频

65.患者两眼红肿疼痛,眵多,畏光,流泪,兼见头痛,发热,脉浮数。针灸治疗宜

- A.少商、太阳点刺出血
B.行间、侠溪点刺出血
C.外关、中渚点刺出血
D.少商、上星毫针泻法
E.内庭、曲池毫针泻法

【答案】A

【解析】少商穴,属手太阴肺经,井穴,主治:高热、昏厥。太阳穴,属经外奇穴,主治:头痛、目赤肿痛、目翳、视物不清等症。

涉及考点 | 目赤肿痛的刺灸方法

66.某男,65岁。耳中如蝉鸣,时作时止,按之鸣声减弱,听力亦下降,同时伴神疲乏力,食少腹胀,便溏,脉细弱。治疗宜在听宫、翳风、太溪、肾俞基础上,加用

- A.行间、丘墟
B.外关、合谷
C.丰隆、阴陵泉
D.气海、足三里
E.肾俞、肝俞

【答案】D

【解析】患者耳中如蝉鸣,时作时止,按之鸣声减弱辨病为耳聋耳鸣。伴神疲乏力,食少腹胀,便溏,脉细弱,辨证为脾胃虚弱,应配用气海、足三里。

涉及考点 | 耳鸣的处方

67.治疗晕厥虚证者,宜加用

- A.关元、气海
B.合谷、太冲
C.十宣、气海
D.内关、百会
E.十二井穴

【答案】A

【解析】①关元穴,是小肠经之募穴,小肠之气结聚于此并转输于皮部,为先天气海。②气海穴,行刺穴位做补法,可治疗脏腑气虚等症。

涉及考点 | 晕厥的处方

68.患者,男,22岁。头痛,以前头部为主,疼痛阵作,痛如锥刺,每当受风或劳累时疼痛加重,舌苔薄,脉弦。治疗应首选的腧穴是

- A.后顶、天柱、昆仑、阿是穴
B.百会、通天、行间、阿是穴
C.上星、头维、合谷、阿是穴
D.通天、头维、太冲、阿是穴
E.头临泣、百会、前顶、阿是穴

【答案】C

【解析】患者年轻男性,出现了头痛,以前头部为主,疼痛阵作,痛如锥刺,每当受风或劳累时疼痛加重,治疗应祛风止痛,在穴位选取上,可选择如上星、头维、阿是穴来治疗头痛,合谷穴为人体手阳明大肠经上的重要穴位之一,可治疗头痛等症。

涉及考点 | 头痛的处方

69.患者突然心前区刺痛,心痛彻背,遇寒诱发,唇甲青紫,心痛如刺,舌有紫暗,脉涩。针灸取穴是内关、郄门、阴郄、膻中以及

- A.神阙、关元
B.血海、太冲
C.中脘、丰隆
D.神阙、至阳
E.心俞、脾俞

【答案】D

【解析】心前区刺痛,心痛彻背辨病为心绞痛。遇寒诱发,唇甲青紫,心痛如刺,舌有紫暗,脉涩辨证为寒邪凝滞,应配神阙、至阳。

涉及考点 | 心绞痛的处方

70.患者右上腹痛,阵发性加剧,并向右肩部放射,伴有恶心、呕吐,黄疸,舌苔黄腻,脉滑数,针灸取穴除阳陵泉、胆囊、胆俞、日月外,应对证加用

- A.内庭、阴陵泉
- B.太冲、丘墟
- C.肩井、内关
- D.中脘、天枢
- E.梁丘、太冲

【答案】A

【解析】右上腹痛,阵发性加剧辨病为胆绞痛。向右肩部放射,伴有恶心、呕吐,黄疸,舌苔黄腻,脉滑数辨证肝胆湿热,配用内庭、阴陵泉。

涉及考点 | 胆绞痛的治疗

(71~72 题共用备选答案)

- A.肝俞
- B.心俞
- C.脾俞
- D.肺俞
- E.肾俞

71.在脊柱区,第 11 胸椎棘突下,旁开正中线 1.5 寸的腧穴是

【答案】C

72.在脊柱区,第 2 腰椎棘突下,旁开正中线 1.5 寸的腧穴是

【答案】E

【解析】脾俞定位在脊柱区,第 11 胸椎棘突下,后正中线旁开 1.5 寸。肾俞定位在脊柱区,第 2 腰椎棘突下,后正中线旁开 1.5 寸。

涉及考点 | 脾俞穴、肾俞穴的定位

(73~74 题共用备选答案)

- A.郄门
- B.神门
- C.曲泽
- D.通里
- E.阴郄

73.位于腕横纹尺侧端,尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处的腧穴是

【答案】B

74.位于腕横纹上 5 寸,掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间的腧穴是

【答案】A

涉及考点 | 神门、郄门的定位

(75~76 题共用备选答案)

- A.膈俞、血海
- B.肾俞、关元
- C.阴陵泉、足三里
- D.大椎、曲池
- E.脾俞、胃俞

75.痹症属着痹者,治疗除主穴外,还应选取的腧穴是

【答案】C

76.痹症属热痹者,治疗除主穴外,还应选取的腧穴是

【答案】D

【解析】痹症属着痹者取梁丘、挟鼻、阴陵泉、足三里、商丘。痹症属热痹者取大椎、曲池、梁丘、血海、膝眼、阳陵泉。

涉及考点 | 痹症的治疗

(77~78 题共用备选答案)

- | | |
|----------|----------|
| A.大椎、曲池 | B.风门、肺俞 |
| C.天枢、足三里 | D.脾俞、足三里 |
| E.太溪、太冲 | |

77.治疗瘾疹之血虚风燥证,除主穴外,还应选取的配穴是

【答案】D

78.治疗瘾疹之胃肠积热证,除主穴外,还应选取的配穴是

【答案】C

涉及考点 | 瘾疹的治疗

(79~80 题共用备选答案)

- | | |
|-------|------|
| A.隐白 | B.公孙 |
| C.内庭 | D.丰隆 |
| E.阴陵泉 | |

79.治疗痰邪所致病症,应选取的腧穴是

【答案】D

80.治疗月经过多、崩漏等妇科疾病应选取的腧穴是

【答案】A

【解析】丰隆主治:①头痛、眩晕、癫狂。②咳嗽、痰多等痰饮病证。③下肢痿痹;④腹胀,便秘。隐白(井穴)主治:①月经过多、崩漏等妇科病。②便血、尿血等出血证。③癫狂,多梦;④惊风;⑤腹满,暴泄。

涉及考点 | 丰隆穴、隐白穴的主治

2年 易错考题

1.循行“起于中焦,下络大肠”的经络是

- | | |
|----------|----------|
| A.手厥阴心包经 | B.手太阴肺经 |
| C.足阳明胃经 | D.手阳明大肠经 |
| E.手太阳小肠经 | |

【答案】B

【解析】《灵枢·经脉》原文指出:“肺手太阴之脉,起于中焦,下络大肠,还循胃口,上膈属肺”。

涉及考点 | 手太阴肺经的循行

2.手厥阴经腧穴除主治心、心包、胸、神志病外,还主要用于治疗

- | | |
|------|------|
| A.胃病 | B.肾病 |
| C.肝病 | D.胆病 |
| E.脾病 | |

【答案】A

【解析】主治概要：①心胸、神志病，如心痛，心悸，心烦，胸闷，癫狂痫等。②胃腑病证，如胃痛，呕吐等。③经脉循行部位的其他病证，如上臂内侧痛，肘臂挛麻，腕痛，掌中热等。

涉及考点 | 手厥阴经腧穴主治病证

3. 根据“子母补泻法”，肾经实证应取

- | | |
|-------|-------|
| A. 复溜 | B. 阴谷 |
| C. 然谷 | D. 涌泉 |
| E. 太溪 | |

【答案】D

【解析】根据“子母补泻法”，肾经实证的取穴原则是实则泻其子，所以肾经实证应选取涌泉穴来进行治疗。

涉及考点 | 子母补泻法

4. 足阳明胃经与足太阴脾经在何处交接

- | | |
|----------|----------|
| A. 示指端 | B. 胸中 |
| C. 目内眦 | D. 足大趾内端 |
| E. 足小趾内端 | |

【答案】D

【解析】相表里的阴经和阳经在手足末端交接，肺经和大肠经交接于示指端，胃经和脾经交接于足大趾内端，膀胱经和肾经交接于足小趾内端；同名的阳经与阴经在头面部交接，小肠经和膀胱经交接于目内眦；相互衔接的阴经和阴经在胸中交接，肾经与心包经交接于胸中。

涉及考点 | 经脉交接

5. 按照腧穴分经论治规律，足太阳经腧穴的主治特点是

- | | |
|---------------|--------------|
| A. 后头、肩胛、耳病 | B. 前头、口齿、胃肠病 |
| C. 前头、鼻、口、齿病 | D. 侧头、耳病、肋肋病 |
| E. 后头、背腰痛、脏腑病 | |

【答案】E

涉及考点 | 足太阳经腧穴的主治特点

6. 出于腋下大包穴，散布于胸肋部的络脉是

- | | |
|----------|----------|
| A. 心包络 | B. 督脉的别络 |
| C. 任脉的别络 | D. 脾之大络 |
| E. 胃之别络 | |

【答案】D

【解析】脾之大络是大包穴，位于腋下散布于胸肋部。

涉及考点 | 特定穴

7. 悬钟穴位于

- | | |
|-------------------|-----------------|
| A. 外踝后缘中点上3寸，腓骨前缘 | B. 外踝高点上3寸，腓骨后缘 |
| C. 外踝下缘中点上3寸，腓骨前缘 | D. 外踝高点上3寸，腓骨前缘 |
| E. 外踝后缘中点上3寸，腓骨后缘 | |

【答案】D

【解析】悬钟穴位于外踝高点上3寸，腓骨前缘。

涉及考点 | 悬钟穴的定位

8.位于外踝高点上5寸,腓骨前缘的腧穴是

- | | |
|-------|-------|
| A.足窍阴 | B.足临泣 |
| C.条口 | D.光明 |
| E.悬钟 | |

【答案】D

【解析】足窍阴位于第4趾外侧趾甲根角旁0.1寸。足临泣位于第4跖趾关节的后方,足小趾伸肌腱的外侧。条口位于小腿前外侧,当犊鼻穴下8寸,距胫骨前缘1横指。光明位于外踝高点上5寸,腓骨前缘。悬钟位于外踝高点上3寸,腓骨前缘。

涉及考点 | 光明穴的定位

9.治疗咽喉肿痛,宜点刺出血的穴位是

- | | |
|------|------|
| A.少商 | B.鱼际 |
| C.侠白 | D.天府 |
| E.列缺 | |

【答案】A

【解析】少商主治咽喉肿痛、鼻衄、高热等肺系实热证,癫狂、昏迷。宜浅刺,或点刺出血。鱼际主治咳嗽、咯血、咽干、咽喉肿痛失音等肺系病证,以及小儿疳积。宜直刺,小儿疳积可用割治法。侠白主治咳嗽、气短等肺系病证,以及干呕,上臂痛。宜直刺。天府主治咳嗽、气喘、鼻衄等肺系病证,以及癯气,上臂痛。宜直刺。列缺主治咳嗽、气喘、咽喉肿痛等肺系病证以及头痛、齿痛等头部疾患。宜向上斜刺。

涉及考点 | 少商穴的操作方法

10.在三角肌区,肩峰外侧缘前端与肱骨大结节两骨间凹陷中的穴位是

- | | |
|-------|-------|
| A.肩髃 | B.肩贞 |
| C.肩髃 | D.肩中俞 |
| E.肩外俞 | |

【答案】C

【解析】肩髃:在三角肌区,肩峰外侧缘前端与肱骨大结节两骨间凹陷中。主治:①肩臂挛痛、上肢不遂等肩、上肢病证。②瘾疹,瘰疬。

涉及考点 | 肩髃穴的定位

11.中府穴与前正中线的距离是

- | | |
|------|--------|
| A.1寸 | B.1.5寸 |
| C.4寸 | D.6寸 |
| E.8寸 | |

【答案】D

【解析】中府为肺之募穴,位于胸部,横平第1肋间隙处,锁骨下窝外侧,前正中线旁开6寸,主治咳嗽、气喘、胸满痛等肺部病证以及肩背痛。

涉及考点 | 中府穴的定位

12.听会穴归属于

- | | |
|----------|---------|
| A.足太阳脾经 | B.足阳明胃经 |
| C.足太阳膀胱经 | D.足厥阴肝经 |

E.足少阳胆经

【答案】E

【解析】听会穴是足少阳胆经的常用腧穴之一,位于耳屏间切迹前,下颌骨髁状突的后缘,张口有凹陷处。主治耳鸣、耳聋等耳疾;齿痛,口眼歪斜,面痛。

涉及考点 | 听会穴的经络归属

13.位于腕背横纹桡侧,当拇短伸肌腱与拇长伸肌腱之间的凹陷中的穴位是

- A.太渊
- B.神门
- C.阳池
- D.阳溪
- E.养老

【答案】D

【解析】阳溪位于腕背横纹桡侧,当拇短伸肌腱与拇长伸肌腱之间的凹陷中;太渊位于腕掌侧横纹桡侧端,桡动脉搏动处;神门位于腕部,腕掌侧远端横纹尺侧端,尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处;阳池位于腕背部横纹中,指伸肌腱的尺侧凹陷处;养老位于前臂背面尺侧,腕背横纹上1寸,尺骨头桡侧凹缘中。

涉及考点 | 阳溪穴的定位

14.患者,女,32岁。行经后小腹部绵绵作痛,喜按,月经色淡,量少。治疗应首选的腧穴是

- A.三阴交、中极、次髎
- B.足三里、太冲、中极
- C.丰隆、天枢、气穴
- D.阴陵泉、中极、阳陵泉
- E.三阴交、足三里、关元

【答案】E

【解析】患者为痛经虚证,治疗应调补气血,温养冲任,取穴应以足太阴、足阳明经为主,主要选取三阴交、足三里、关元。关元为任脉穴,强身健体要穴,可补益肝肾,温养冲任;足三里补益气血;三阴交为肝脾肾三经之交会穴,可以健脾益气,调补肝肾。肝脾肾精血充盈,胞脉得养,冲任自调。若为实证,则选用三阴交、中极、次髎。

涉及考点 | 痛经的处方主穴

15.章门穴位于

- A.腹侧,腋中线第8肋骨端稍下处
- B.腹侧,腋中线第9肋骨端稍下处
- C.腹侧,腋中线第10肋骨端稍下处
- D.腹侧,腋中线第11肋骨端稍下处
- E.腹侧,腋中线第12肋骨端稍下处

【答案】D

【解析】章门穴属足厥阴肝经,在侧腹部,第11肋游离端的下际。速记口诀:6、7是肝(期门)胆(日月),11、12是脾(章门)肾(京门)。

涉及考点 | 章门穴的定位

16.外劳宫位于手背,第二、三掌骨间的

- A.指掌关节后0.5寸
- B.指掌关节后1寸
- C.指掌关节后1.5寸
- D.指掌关节后2寸
- E.指掌关节后2.5寸

【答案】A

【解析】指掌关节后0.5寸为外劳宫穴的定位,本穴治疗落枕病证有特效,又名落枕穴。

涉及考点 | 外劳宫的定位

17.化脓灸所属的灸法是

- A.直接灸
B.间接灸
C.悬起灸
D.实按灸
E.天灸

【答案】A

【解析】化脓灸属于瘢痕灸,直接灸包括瘢痕灸和无瘢痕灸。

涉及考点 | 艾炷灸

18.后头部痛连项部的病位是

- A.太阳经
B.少阳经
C.阳明经
D.少阴经
E.厥阴经

【答案】A

【解析】太阳经头痛主要见于前额、巅顶、枕部疼痛连及项、背,或由项连肩。文献《冷庐医话·头痛》“头痛属太阳者,自脑后上至巅顶,其痛连项……项强腰脊痛。”

涉及考点 | 头痛部位所属经络

19.治疗眩晕实证的主穴是

- A.百会、太阳、风池、合谷
B.百会、风池、太冲、内关
C.百会、风池、肝俞、肾俞、足三里
D.百会、神门、三明交、照海、申脉
E.颈夹脊、天柱、风池、曲池、悬钟

【答案】B

【解析】首先眩晕实证应当平肝潜阳,化痰定眩。以督脉、足少阳经、手足厥阴经为主。百会位于巅顶,可清利脑窍而定眩。风池位于头部,局部取穴,调理头部气机。太冲为肝之原穴,可平肝潜阳。内关为八脉交会穴,通阴维脉,与太冲配伍,属同名经配穴,加强平肝之功。

涉及考点 | 眩晕的处方

20.位于耳甲艇的后下部,即耳甲12区的耳穴是

- A.盆腔
B.内生殖器
C.神门
D.胰胆
E.肝

【答案】E

【解析】肝位于耳甲艇的后下部,即耳甲12区。盆腔位于三角窝后1/3的下部,即三角窝5区。内生殖器位于三角窝前1/3的下部,即三角窝2区。神门位于三角窝后1/3的下部,即三角窝4区。胰胆位于耳甲艇的后上部,即耳甲11区。

涉及考点 | 常用耳穴的部位

21.患者牙痛隐隐,时作时止,牙齿浮动,舌红,少苔,脉细数。治疗除主穴外,还应选取的腧穴是

- A.外关、风池
B.二间、曲池
C.太冲、劳宫
D.内庭、二间
E.太溪、行间

【答案】E

【解析】辨病是牙痛,牙痛隐隐,牙齿浮动,舌红,少苔,脉细数,诊断为阴虚牙痛,阴虚应选

用滋阴清热的腧穴,太溪滋阴,行间清热。

涉及考点 | 牙痛的处方主穴

22. 治疗便秘虚证,在取主穴的基础上,还应选取的腧穴是

- A. 合谷、曲池
- B. 太冲、中脘
- C. 神阙、关元
- D. 足三里、脾俞、气海
- E. 照海、气海

【答案】D

【解析】治疗便秘的主穴是天枢、大肠俞、上巨虚、支沟。热秘配合谷、曲池;气秘配太冲、中脘;冷秘配神阙、关元;虚秘配足三里、脾俞、气海,兼阴伤津亏者加照海、太溪。

涉及考点 | 便秘的处方配穴

23. 崩漏的发生主要与哪些经脉有关

- A. 肝经、肾经
- B. 肝经、脾经
- C. 任脉、带脉
- D. 任脉、冲脉
- E. 任脉、督脉

【答案】D

【解析】崩漏多与素体阳盛或劳倦思虑、饮食不节、房劳多产、七情内伤等产生的湿、热、瘀有关。病位在胞宫,与冲、任二脉及肝、脾、肾关系密切。

涉及考点 | 崩漏的辨证论治

24. 针刺治疗太阳头痛应选取的腧穴是

- A. 天柱、后溪、昆仑
- B. 印堂、合谷、内庭
- C. 率谷、外关、足临泣
- D. 四神聪、太冲、内关
- E. 风门、列缺、足三里

【答案】A

【解析】头痛治疗宜疏调经脉、通络止痛,按局部穴位和远端循经取穴为主,太阳经头痛为后枕部疼痛,天柱位于后枕部,属局部取穴,疏导头部经气,后溪,昆仑为远端循经取穴。

涉及考点 | 头痛的处方主穴

25. 治疗中风中脏腑闭证,除十二井穴外,应选取的是

- A. 督脉、手厥阴经穴
- B. 任脉、手厥阴经穴
- C. 督脉、足厥阴经穴
- D. 任脉、足厥阴经穴
- E. 任脉、手足厥阴经穴

【答案】A

【解析】中风中脏腑闭证,治疗宜平肝息风,醒脑开窍,取督脉、手厥阴及足太阴经穴为主。主穴为水沟、十二井、太冲、丰隆、劳宫。

涉及考点 | 中风的治法

(26~27 题共用备选答案)

- A. 手太阴肺经
- B. 手少阴心经
- C. 足太阴脾经
- D. 足少阴肾经
- E. 足厥阴肝经

26. 太冲穴归属的经脉是

【答案】E

27.太渊穴归属的经脉是

【答案】A

【解析】太冲是肝经的原穴、输穴,太渊是肺经的原穴、输穴。

涉及考点 | 太冲穴、太渊穴的经脉归属

(28~29 题共用备选答案)

A.商丘

B.丘墟

C.照海

D.申脉

E.然谷

28.在踝区,外踝尖直下,外踝下缘与跟骨之间凹陷中的腧穴是

【答案】D

29.在踝区,内踝尖下 1 寸,内踝下缘边切迹凹陷中腧穴是

【答案】C

【解析】商丘:位于内踝前下方凹陷中,当舟骨结节与内踝尖连线的中点处。丘墟:足外踝前下方,趾长伸肌腱的外侧凹陷中。照海:内踝尖下 1 寸,内踝下缘边切迹凹陷中。申脉:外踝直下方凹陷中。然谷:内踝前下方,足舟骨粗隆下缘凹陷中。

涉及考点 | 照海、申脉的定位

第十篇 诊断学基础



考情分布图

		2015	2016	2017	2018	2019
诊断学基础	症状学	10	10	10	11	10
	问诊	1	1	1	0	2
	检体诊断	9	8	8	8	8
	实验室诊断	2	2	1	1	2
	心电图诊断	1	0	1	0	1
	影像诊断	1	0	1	1	1



高频考点必背

- 1. 感染性发热** 临床**最常见**,各种病原体所引起的急、慢性感染均能引起感染性发热。
- 2. 稽留热** 体温持续于 39~40℃ 以上,24 小时波动范围不超过 1℃,达数日或数周。见于肺炎链球菌性肺炎、伤寒、斑疹伤寒等的发热极期。
- 3. 弛张热** 体温在 39℃ 以上,但波动幅度大,24 小时内体温差达 2℃ 以上,最低时仍高于正常水平。常见于败血症、风湿热、重症肺结核、化脓性炎症等。
- 4. 回归热** 体温骤然升至 39℃ 以上,持续数日后又骤然下降至正常水平,高热期与无热期各持续若干日后即有规律地交替一次。见于回归热、霍奇金病、周期热等。
- 5. 波状热** 体温逐渐升高达 39℃ 或以上,数天后逐渐下降至正常水平,数天后再逐渐升高,如此反复多次。见于布氏杆菌病。
- 呼吸幅度加深见于严重代谢性酸中毒时,病人可以出现节律匀齐,呼吸深而大,不感呼吸困难的呼吸,称为**库斯莫尔呼吸**(酸中毒大呼吸),见于尿毒症、糖尿病酮症酸中毒等。
- 7. 潮式呼吸**:特点是呼吸由浅慢逐渐变为深快,由深快逐渐变为浅慢,直至呼吸停止片刻,再开始上述周期性呼吸,形成如潮水涨落的节律,见于脑炎、脑膜炎、颅内压增高等。
- 非化脓性肋软骨炎,多侵犯**第 1、2 肋软骨**;心绞痛与急性心肌梗死的疼痛常位于**胸骨后或心前区**,常牵涉至左肩背、左臂内侧;食管、膈和纵隔肿瘤常为**胸骨后疼痛**。
- 胸痛的性质:带状疱疹呈阵发性的灼痛或刺痛;食管炎常呈灼痛或**灼热感**;心绞痛常呈**压榨样痛**,可伴有窒息感;心肌梗死则疼痛更为剧烈,并有**恐惧、濒死感**。
- 干性胸膜炎常呈尖锐刺痛或撕裂痛,**呼吸时加重,屏气时消失**。
- 心绞痛常因劳力后诱发,**含服硝酸甘油可迅速缓解**;心肌梗死的胸痛含服硝酸甘油**不能缓解**。
- 急性腹膜炎由**胃、肠穿孔**引起者最常见,伴有腹部压痛、反跳痛与腹肌紧张,肠蠕动音减弱或消失。
- 胃、十二指肠疾病、急性胰腺炎疼痛多在**中上腹部**;肝、胆疾患疼痛位于**右上腹**;急性阑尾炎早期疼痛在**脐周或上腹部**,数小时后转移至右下腹。

14.小肠绞痛位于**脐周**;结肠疾病疼痛多位于**下腹或左下腹**;膀胱炎、盆腔炎症及异位妊娠破裂引起的疼痛在**下腹部**;空腔脏器穿孔后引起弥漫性腹膜炎则为**全腹痛**。

15.消化性溃疡常有**慢性、周期性、节律性中上腹隐痛或灼痛**,如突然呈剧烈的刀割样、烧灼样持续性疼痛,可能并发急性穿孔;并发幽门梗阻者为胀痛,于呕吐后减轻或缓解。

16.咯粉红色泡沫痰为**急性左心衰竭**的表现。咯血量大而骤然停止可见于支气管扩张症。痰中带血多见于浸润型肺结核。多次少量反复咯血要注意除外支气管肺癌。

17.吸气性呼吸困难表现为**胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙**在吸气时明显凹陷,称为“三凹征”,常伴有频繁干咳及高调的吸气性喘鸣音。

18.心源性呼吸困难主要由左心衰竭引起,具有以下特点:**劳累性呼吸困难、端坐呼吸、夜间阵发性呼吸困难**。

19.代谢性酸中毒**呼吸深大而规则**,可伴有鼾声,称 Kussmaul 呼吸。见于尿毒症、糖尿病酮症酸中毒。

20.吗啡、巴比妥类、有机磷农药中毒时,致呼吸减慢,也可呈**潮式呼吸**。一氧化碳、氰化物中毒时均可引起**呼吸加快**。

21.心源性水肿特点:是**下垂性水肿**,严重者可出现胸水、腹水等,常伴有呼吸困难、心脏扩大、心率加快、颈静脉怒张、**肝颈静脉回流征阳性**等表现。

22.肾源性水肿特点:为**早期晨起时眼睑或颜面水肿**,以后发展为全身水肿,伴有血尿、少尿、蛋白尿、管型尿、高血压、贫血等表现。

23.肝源性水肿:常有**腹水**,也可出现**下肢踝部水肿并向上蔓延**,头、面部及上肢常无水肿。常伴有肝功能受损及门静脉高压等表现,可见**肝掌、蜘蛛痣**等。

24.内分泌源性水肿:见于甲状腺功能减退症等黏液性水肿,特点是**非凹陷性**,颜面及下肢较明显,病人常伴有精神萎靡、食欲不振。

25.水肿伴颈静脉怒张、肝脏肿大和压痛、肝颈静脉反流征阳性,见于**心源性水肿**;伴高血压、蛋白尿、血尿、管型,见于**肾源性水肿**。

26.贫血面容:**面色苍白,口唇色淡,表情疲惫**见于各种原因所致的贫血。

27.胸膜的任何部位均可出现胸膜摩擦感,但以**腋中线第5~7肋间隙**最易感觉到,临床意义同胸膜摩擦音。

28.**支气管呼吸音**正常人在喉部、胸骨上窝、背部第6颈椎至第2胸椎附近均可听到,如在肺部其他部位听到支气管呼吸音则为病理现象。

29.左心室肥大、甲亢、重症贫血、发热等疾病时**心尖搏动增强**;心包积液、左侧气胸或胸腔积液、肺气肿等,**心尖搏动减弱甚或消失**。

30.心尖区粗糙的吹风样收缩期杂音,常提示**二尖瓣关闭不全**。

31.**呕血和黑便**是上消化道出血的主要症状;而**暗红或鲜红的便血**则多提示下消化道出血。

32.胃及十二指肠疾病最常见的原因是**消化性溃疡**。

33.**肝硬化、门静脉高压引起的食管与胃底静脉曲张破裂**是引起上消化道出血的常见病因。

34.上消化道大出血前三位的病因是:**消化性溃疡、食管与胃底静脉曲张破裂、急性胃黏膜病变**。

35.**呕血大出血**者常见于食管与胃底静脉曲张破裂及食管异物刺穿主动脉。

36. 呕血伴慢性、周期性、节律性上腹痛,见于**消化性溃疡**。
37. 呕血伴蜘蛛痣、肝掌、黄疸、腹壁静脉曲张、腹水、脾肿大,见于**肝硬化门静脉高压**。
38. 急性溶血时,起病**急骤**,出现**寒战、高热、头痛、腰痛、呕吐**,尿呈**酱油色或茶色**。严重者出现周围循环衰竭及急性肾功能衰竭。
39. 慢性溶血常有**贫血、黄疸、脾肿大**三大特征。
40. 肝细胞性黄疸临床表现为**黄疸呈浅黄至深黄**,有乏力、食欲下降、恶心呕吐、甚至出血等肝功能受损的症状及**肝脾肿大**等体征。
41. 胆汁淤积性黄疸临床表现为**黄疸深而色泽暗,甚至呈黄绿色或褐绿色**。胆酸盐反流入血,刺激皮肤可引起瘙痒,刺激迷走神经可引起心动过缓。粪便颜色变浅或呈**白陶土色**。
42. 黄疸伴有右上腹绞痛的多见于胆石症;伴有**上腹部钻顶样疼痛**的见于**胆道蛔虫症**;伴有乏力、食欲不振、厌油腻、肝区疼痛的见于传染性肝炎。
43. **嗜睡**是最轻的意识障碍,表现为持续性的睡眠。轻刺激如推动或呼唤患者,可被唤醒,醒后能回答简单的问题或做一些简单的活动,但反应迟钝,刺激停止后,又迅速入睡。
44. **昏迷指意识丧失**,任何强大的刺激都不能被唤醒,是最严重的意识障碍。
45. **既往史**包括患者既往的健康状况和过去曾经患过的疾病(包括各种传染病)、外伤手术、预防接种、过敏史等,尤其是与现病有密切关系的疾病的历史。
46. 痰液血腥味,见于大咯血的患者;**痰液恶臭**,提示**支气管扩张症或肺脓肿**。
47. 呕吐物:**粪臭味见于肠梗阻**,酒味见于饮酒和醉酒等,**浓烈的酸味见于幽门梗阻或狭窄等**。
48. 呼气味:浓烈的酒味见于酒后或醉酒,**刺激性蒜味见于有机磷农药中毒**,烂苹果味见于糖尿病酮症酸中毒,氨味见于尿毒症,腥臭味见于肝性脑病。
49. 在发育成熟前,脑垂体前叶功能亢进时,体格异常高大,称为**巨人症**;反之,垂体功能减退时,体格异常矮小,称**脑垂体性侏儒症**。
50. 肝病面容可见面部瘦削,面色灰褐,额部、鼻背、双颊有褐色色素沉着,见于**慢性肝炎、肝硬化**等。
51. 甲亢面容可见**眼裂增大,眼球突出**,目光闪烁,呈惊恐貌,兴奋不安,烦躁易怒,见于甲状腺功能亢进症。
52. 黏液性水肿面容表现为**面色苍白,睑厚面宽,颜面浮肿**,目光呆滞,反应迟钝,眉毛、头发稀疏,舌色淡、胖大。见于甲状腺功能减退症。
53. 二尖瓣面容可见**面色晦暗,双颊紫红,口唇轻度发绀**。见于风湿性心瓣膜病、二尖瓣狭窄。
54. 苦笑面容发作时牙关紧闭,面肌痉挛,呈苦笑状。见于**破伤风**。
55. 满月面容面圆如满月,皮肤发红,常伴痤疮和小须。见于**库欣综合征及长期应用肾上腺皮质激素的患者**。
56. 肢端肥大症面容头颅增大,脸面变长,下颌增大并向前突出,眉弓及两颧隆起,唇舌肥厚,耳鼻增大。见于**肢端肥大症**。
57. 面具面容面部呆板、无表情,似面具样,见于**帕金森病、脑炎**等。
58. 强迫仰卧位患者仰卧,双腿蜷曲,借以减轻腹部肌肉紧张。见于**急性腹膜炎**等。
59. 强迫侧卧位通过侧卧于患侧,以减轻疼痛,且有利于健侧代偿呼吸。见于**一侧胸膜炎及大量胸腔积液**。

- 60.强迫坐位患者坐于床沿,以两手置于膝盖上或扶持床边。见于**心、肺功能不全者**。
- 61.角弓反张位患者颈及脊背肌肉强直,头向后仰,胸腹前凸,背过伸,躯干呈反弓形。见于**破伤风、小儿脑膜炎**等。
- 62.辗转体位患者坐卧不安,辗转反侧。见于**胆绞痛、肾绞痛、肠绞痛**等。
- 63.慌张步态步行时头及躯干前倾,步距较小,起步动作慢,但行走后越走越快,有难以止步之势,见于**震颤麻痹**。
- 64.**蹒跚步态**(鸭步)走路时身体左右摇摆似鸭行,见于佝偻病、大骨节病、进行性肌营养不良、先天性双髋关节脱位等。
- 65.共济失调步态起步时一脚高抬,骤然垂落,且双目向下注视,两脚间距很宽,以防身体倾斜,闭目时不能保持平衡。见于**小脑或脊髓后索病变**,如脊髓痨。
- 66.剪刀步态双下肢肌张力过高,行走时两腿交叉呈剪刀状,见于**脑瘫或截瘫患者**。
- 67.间歇性跛行行走时,因下肢突发疼痛而停止前行,休息后继续前行,见于**闭塞性动脉硬化、高血压动脉硬化**等。
- 68.一氧化碳中毒患者的皮肤、**黏膜呈樱桃红色**。皮肤持久性发红可见于库欣综合征及真性红细胞增多症。
- 69.玫瑰疹是一种**鲜红色的圆形斑疹**,直径**2~3 mm**,由病灶周围的血管扩张所形成,压之褪色,松开时又复现,多出现于胸腹部。
- 70.丘疹直径**小于1 cm**,除局部颜色改变外还隆起皮面,为局限、充实的浅表损害,见于药物疹、麻疹、猩红热及湿疹等。
- 71.荨麻疹又称风团块,表现为边缘清楚的红色或苍白色的瘙痒性皮肤损害,**出现快,消退快,消退后不留痕迹**。见于各种异性蛋白性食物或药物过敏。
- 72.**蜘蛛痣**出现部位多在上腔静脉分布区,如面、颈、手背、上臂、前胸和肩部等处。
- 73.**浅表淋巴结**分布在耳前、耳后、乳突区、枕骨下区、颌下、颌下、颈后三角、颈前三角、锁骨上窝、腋窝、滑车上、腹股沟和腠窝等部位,检查表浅淋巴结时,应按以上顺序进行。
- 74.**结膜苍白见于贫血;结膜发黄见于黄疸**;睑结膜有滤泡或乳头见于沙眼;结膜有散在出血点,见于亚急性感染性心内膜炎。
- 75.病理情况下,瞳孔缩小(<2 mm)常见于**虹膜炎、有机磷农药中毒、毒蕈中毒**,以及吗啡、氯丙嗪、毛果芸香碱等药物影响。
- 76.瞳孔扩大(>5 mm)见于**外伤、青光眼绝对期、视神经萎缩、完全失明、濒死状态、颈交感神经刺激和阿托品、可卡因等药物影响**。
- 77.外耳道有**黄色液体流出伴痒痛者**为**外耳道炎**。外耳道有局限性红肿,触痛明显,牵拉耳郭或压迫耳屏时疼痛加剧,见于外耳道疖肿。
- 78.外耳道有脓性分泌物、耳痛及全身症状,见于中耳炎。外耳道有**血液或脑脊液流出**,多为**颅底骨折**。
- 79.急性鼻炎时,鼻腔黏膜因充血而肿胀,伴有**鼻塞、流鼻涕**等症状;慢性鼻炎时鼻黏膜可因黏膜组织肥厚而肿胀。
- 80.在相当于**第二磨牙处的颊黏膜出现直径约1 mm的灰白色小点**,外有红色晕圈,为麻疹黏膜斑,是麻疹的早期(发疹前24~48小时)特征。
- 81.乳白色薄膜覆盖于**口腔黏膜、口角**等处,为鹅口疮(白色念珠菌感染),多见于体弱重症的病儿或老年患者,或长期使用广谱抗生素的患者。

82. 牙齿呈黄褐色为斑釉牙,见于长期饮用含氟量高的水或服用四环素等药物后。切牙切缘凹陷呈月牙形伴牙间隙过宽,见于**先天性梅毒**。单纯性牙间隙过宽,见于肢端肥大症。

83. 草莓舌:舌乳头肿胀、发红如同草莓,见于**猩红热或长期发热的患者**。

84. 镜面舌:亦称光滑舌,舌体小,舌面光滑,呈粉红色或红色,无苔。见于**恶性贫血(内因子缺乏)、缺铁性贫血或慢性萎缩性胃炎**。

85. 咽部及扁桃体咽部充血红肿,多见于急性咽炎;咽部充血,表面粗糙,并有淋巴滤泡呈簇状增生,见于慢性咽炎;扁桃体红肿增大,可伴有**黄白色分泌物或苔片状易剥离假膜**,是扁桃体炎。

86. 扁桃体肿大分为三度:**I度**肿大时扁桃体不超过咽腭弓;**II度**肿大时扁桃体超过咽腭弓,介于I度与III度之间;**III度**肿大时扁桃体达到或超过咽后壁中线。

87. 扁桃体充血红肿,并有不易剥离的假膜(强行剥离时出血),见于**白喉**。

88. 颈静脉怒张,提示体循环静脉血回流受阻或上腔静脉压增高,见于右心衰竭、缩窄性心包炎、心包积液及上腔静脉梗阻等。**颈静脉搏动见于三尖瓣关闭不全**。

89. 甲状腺肿大的临床意义甲状腺肿大分为三度:不能看出肿大但能触及者为**I度**;能看见肿大又能触及,但在胸锁乳突肌以内者为**II度**;超过胸锁乳突肌者为**III度**。

90. 正常人的气管位于颈前正中部。大量胸腔积液、气胸或纵隔肿瘤及单侧甲状腺肿大,可将气管推向健侧;**肺不张、肺硬化、胸膜粘连等,可将气管拉向患侧**。

91. 胸骨角两侧胸骨角分别与左、右第2肋软骨相连接,通常以此作为标记来计数前胸壁上的肋骨和肋间隙。

92. 鸡胸(佝偻病胸)此为佝偻病所致的胸部病变,**多见于儿童**。外观胸骨特别是胸骨下部显著前凸,两侧肋骨凹陷,胸廓前后径增大而横径缩小,胸廓上下径较短,形似鸡胸。

93. 乳房皮肤表皮水肿隆起,毛囊及毛囊孔明显下陷,皮肤呈“**橘皮样**”,多为浅表淋巴管被乳腺癌细胞堵塞后局部皮肤出现淋巴性水肿所致。

94. 恶性肿瘤以乳腺癌最为常见,多见于中年以上的妇女,早期恶性肿瘤可活动,但晚期可与皮肤及深部组织粘连而固定,**易向腋窝等处淋巴结转移**。

5年 历年真题

1. 下列疾病,表现为弛张热的是

- | | |
|------------|-----------|
| A. 布氏杆菌病 | B. 风湿热 |
| C. 肺炎链球菌肺炎 | D. 渗出性胸膜炎 |
| E. 疟疾 | |

【答案】B

【解析】选项A表现为波状热。选项C表现为稽留热。选项D表现为不规则热。选项E表现为间歇热。弛张热体温常在39℃以上,波动幅度大,24小时内波动范围超过2℃,但都在正常水平以内,常见于败血症、风湿热、肺结核及化脓性炎症等。

涉及考点 | 发热的临床表现

2. 属于无菌性坏死物质吸收导致发热的是

- | | |
|------------|-------------|
| A. 风湿热 | B. 急性溶血 |
| C. 脑出血 | D. 甲状腺功能亢进症 |
| E. 慢性心功能不全 | |



配套名师高清视频

【答案】B

【解析】选项 A 属于非感染性发热中的抗原-抗体反应。选项 C 属于非感染性发热中的体温调节中枢功能失常。选项 D 属于非感染性发热中的内分泌与代谢障碍。选项 E 属于非感染性发热中的皮肤散热减少。选项 B 属于非感染性发热中的无菌性坏死物质吸收,除此之外还有大手术、内出血、大面积烧伤、恶性肿瘤、白血病、心肌梗死等属于非感染性发热中的无菌性坏死物质吸收。

涉及考点 | 发热的病因

3.胸痛常表现为呼吸时加重,屏气时消失的疾病是

- | | |
|---------|----------|
| A.食管癌 | B.急性心肌梗死 |
| C.干性胸膜炎 | D.支气管肺癌 |
| E.肋间神经痛 | |

【答案】C

【解析】选项 A 表现为胸骨后疼痛。选项 B 表现为剧烈疼痛,常有恐惧、濒死感。选项 D 表现为胸部闷痛,常伴有咯血。选项 E 表现为刺痛或灼痛,有沿肋间神经放射的特点。干性胸膜炎常呈尖锐刺痛或撕裂痛,伴呼吸时加重,屏气时消失。

涉及考点 | 胸痛的问诊要点

4.血尿伴剧烈腹痛最常见于

- | | |
|---------|--------|
| A.过敏性紫癜 | B.膀胱结核 |
| C.泌尿系结石 | D.肾炎 |
| E.肾肿瘤 | |

【答案】C

【解析】选项 A 常出现血尿、皮肤紫癜和关节肿痛,排除 A。选项 B 常出现血尿伴尿频、尿急和尿困难,排除 B。选项 D 常出现血尿伴有水肿、高血压、蛋白尿,排除 D。选项 E 常出现血尿伴肾肿块,排除 E。血尿伴肾绞痛是肾或输尿管结石的特征,所以本题选 C。

涉及考点 | 腹痛的问诊要点

5.犬吠样咳嗽,可见于

- | | |
|----------|---------|
| A.急性支气管炎 | B.肺结核 |
| C.肺癌 | D.支气管哮喘 |
| E.急性喉炎 | |

【答案】E

【解析】咳嗽的音色指咳嗽声音的特点。①咳嗽声音嘶哑,多为声带的炎症或肿瘤压迫喉返神经所致。②犬吠样咳嗽,表现为连续阵发性剧咳伴有高调吸气回声,多见于喉头炎症、水肿或气管异物,若带有鸡鸣样吼声常见于百日咳。③金属音咳嗽,常见于因纵隔肿瘤、主动脉瘤或支气管癌直接压迫气管所致的咳嗽;④咳嗽声音低微或无力,见于严重肺气肿、声带麻痹及极度衰弱者。

涉及考点 | 咳嗽与咳痰的问诊要点

6.可见干性咳嗽的疾病是

- | | |
|----------|-------|
| A.慢性咽喉炎 | B.胸膜炎 |
| C.慢性支气管炎 | D.肺脓肿 |
| E.肺炎 | |

【答案】B

【解析】湿性咳嗽见于慢性咽喉炎、慢性支气管炎、支气管扩张症、肺炎、肺脓肿、空洞型肺结核等,排除选项 A、C、D、E。干性咳嗽见于急性咽喉炎、急性支气管炎初期、胸膜炎、轻症肺结核、肺癌等。

涉及考点 | 咳嗽与咳痰的问诊要点

7.潮式呼吸不出现在下列各项中哪一项

- A.脑炎
- B.脑膜炎
- C.脑干损伤
- D.颅内压增高
- E.代谢性酸中毒

【答案】E

【解析】潮式呼吸多见于脑炎、脑膜炎、颅内压增高及某些中毒,也见于脑干损伤,因此排除选项 A、B、C、D。代谢性酸中毒出现库斯莫尔呼吸。

涉及考点 | 呼吸困难的临床表现

8.引起吸气性呼吸困难的疾病是

- A.气胸
- B.慢性阻塞性肺气肿
- C.大块肺不张
- D.气管肿瘤
- E.支气管哮喘

【答案】D

【解析】吸气性呼吸困难:主要特点为吸气显著费力,严重者吸气时可见“三凹征”,表现为胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙明显凹陷,此时亦可伴有干咳及高调吸气性喉鸣。常见于喉部、气管、大支气管的狭窄与阻塞。气管肿瘤可造成气管或大支气管的狭窄与阻塞。故选项 D 正确。呼气性呼吸困难:主要特点为呼气费力、呼气缓慢、呼吸时间明显延长,常伴有呼气期哮鸣音。主要是由于肺泡弹性减弱和(或)小支气管的痉挛或炎症所致。常见于慢性支气管炎(喘息型)、慢性阻塞性肺气肿、支气管哮喘、弥漫性泛细支气管炎等,因此排除选项 B、E。混合性呼吸困难:吸气与呼气均感费力,呼吸频率浅而快。见于重症肺炎、重症肺结核、大面积肺不张、大块肺梗死、大量胸腔积液和气胸等。因此排除选项 A、C。

涉及考点 | 呼吸困难的临床表现

9.大量胸腔积液的呼吸形式是

- A.腹式呼吸
- B.长吸式呼吸
- C.呼吸浅快
- D.呼吸深快
- E.呼吸深慢

【答案】C

【解析】大量胸腔积液的吸气与呼气均感费力,呼吸频率浅而快。

涉及考点 | 呼吸困难的临床表现

10.小儿突发性气道阻塞的原因是

- A.支气管肿瘤
- B.气管异物
- C.喉癌
- D.气胸
- E.慢性阻塞性肺炎

【答案】B

【解析】突发性呼吸困难可见于气管异物和气胸,而小儿突发性气道阻塞的病因多为气管

异物。选项 D 多因肺部疾病或外力影响使肺组织和脏层胸膜破裂,或靠近肺表面的细微气肿泡破裂,肺和支气管内空气逸入胸膜腔引起。气管肿瘤无论良性、恶性,症状产生的主要原因是管腔受阻、通气障碍,在气管管腔被阻塞 1/2~2/3 时,才出现严重的通气障碍。但不是突然发生的,因此排除选项 A。选项 C 表现为吸气性呼吸困难,但不是突然发生的,因此排除选项 C。气胸表现为吸气与呼气均感费力,呼吸频率浅而快。选项 E 不是突然发生的,因此排除选项 E。

涉及考点 | 气道阻塞的病因

11. 下列疾病,多表现为下垂性水肿的是

- | | |
|-------------|------------|
| A. 肝硬化 | B. 肾小球肾炎 |
| C. 右心衰竭 | D. 血管神经性水肿 |
| E. 甲状腺功能减退症 | |

【答案】C

【解析】心源性水肿特点是下垂性水肿,心源性水肿见于右心衰竭、慢性缩窄性心肌炎等。选项 A 腹水为最常见表现。选项 B 多见眼睑及颜面先水肿。选项 D 为局部性水肿。选项 E 为粘液性水肿。

涉及考点 | 水肿的临床表现

12. 血小板减少常见于

- | | |
|-----------|----------|
| A. 急性白血病 | B. 急性溶血后 |
| C. 急性胃出血后 | D. 脾切除术后 |
| E. 以上都对 | |

【答案】A

【解析】血小板减少见于血小板减少性紫癜、脾功能亢进、再生障碍性贫血和白血病等。选项 D 对血小板影响不大,选项 B、C 以血红蛋白减少为常见。

涉及考点 | 血小板计数

13. 下列各项,对急性胰腺炎有诊断价值的是

- | | |
|----------------------|----------------------|
| A. 血清淀粉酶 > 800 U/L | B. 血清淀粉酶 < 800 U/L |
| C. 血清淀粉酶 > 5 000 U/L | D. 血清淀粉酶 > 3 000 U/L |
| E. 血清淀粉酶 > 1 800 U/L | |

【答案】C

【解析】急性胰腺炎大多数患者于发病后 6~12 h 血清淀粉酶开始升高,12~24 h 达高峰,3~5 天后恢复正常,达 3 500 U/L 应怀疑此病,超过 5 000 U/L 即有诊断价值。

涉及考点 | 血、尿淀粉酶测定

14. 引起上消化道出血最常见的原因是

- | | |
|-------------|---------|
| A. 肝硬化 | B. 胃癌 |
| C. 血小板减少性紫癜 | D. 胆道感染 |
| E. 消化性溃疡 | |

【答案】E

【解析】选项 A 是引起上消化道出血的常见病因,但不是最常见原因。选项 B 可引起上消化道出血,但不是最常见原因。选项 C 可引起上消化道出血,但不是最常见原因。选项 D 可引起胆道出血。引起上消化道出血的疾病,临床上前三位病因分别为:消化性溃疡、食管与胃

底静脉曲张破裂、急性胃黏膜病变。

涉及考点 | 呕血与黑便的病因

15. 出血量达何值以上可出现黑便

- A. 5 mL
B. 10 mL
C. 20 mL
D. 40 mL
E. 60 mL

【答案】E

【解析】出血量达 5 mL 以上出现大便隐血试验阳性, 达 60 mL 出现黑便。

涉及考点 | 呕血与黑便的问诊要点

16. 正常人血中胆红素主要来自

- A. 骨髓内血红蛋白分解
B. 骨髓内红细胞成熟前血红素分解
C. 骨髓内新生红细胞分解
D. 由肝、肾内铁卟啉蛋白产生
E. 周围血中红细胞被破裂

【答案】E

【解析】血中的胆红素来源是血红蛋白。正常的情况下, 衰老的红细胞是被单核巨噬细胞破坏, 释放出来的血红蛋白就分解为胆红素、铁还原珠蛋白。

涉及考点 | 胆红素代谢检查

17. 可引起黄疸持续性加重的疾病是

- A. 急性胰腺炎
B. 肝炎
C. 胆石症
D. 肝癌
E. 胆道蛔虫症

【答案】D

【解析】黄疸持续时间短并且反复出现的, 要考虑胆石症、胆道蛔虫症、壶腹癌等; 持续一段时间而逐渐消退者, 要考虑肝炎; 持续存在而进行性加重者, 要考虑肝癌; 病程长并持续不退者, 要考虑胆汁淤积性肝硬化。

涉及考点 | 黄疸的问诊要点

18. 表现为持续性睡眠, 可被唤醒, 醒后能正确回答问题, 刺激停止后迅速入睡的是

- A. 昏睡
B. 昏迷
C. 谵妄
D. 嗜睡
E. 意识模糊

【答案】D

【解析】选项 A 表现为患者处于熟睡状态, 不易唤醒。选项 B 表现为意识丧失, 任何强大刺激都不能唤醒。选项 C 表现为意识模糊, 定向力障碍, 伴错觉、幻觉等。选项 D 表现为持续性睡眠, 可被唤醒, 醒后能正确回答问题, 刺激停止后迅速入睡。选项 E 意识障碍程度较嗜睡重, 有简单精神活动, 但定向力有障碍。

涉及考点 | 意识障碍的临床表现

19. 属于意识大部分丧失, 强刺激也不能唤醒, 但对疼痛刺激有反应的是

- A. 深昏迷
B. 意识模糊
C. 中度昏迷
D. 昏睡
E. 浅昏迷



配套名师高清视频

【答案】E

【解析】选项 A 表现为意识全部丧失,对疼痛等各种刺激均无反应。选项 B 表现为具有简单精神活动,但定向力有障碍。选项 C 表现为意识全部丧失,对强刺激的反应减弱,角膜反射、瞳孔对光反射迟钝,眼球活动消失。选项 D 表现为患者处于熟睡状态,不易唤醒。选项 E 表现为意识大部分丧失,强刺激也不能唤醒,但对疼痛刺激有反应。

涉及考点 | 意识障碍的临床表现

20.下列除哪项外,均符合问诊的要求

- A.态度和蔼,言语亲切
- B.对危重病人只扼要询问,待病情缓和后再补充
- C.医生要多提出诱导性的问题
- D.交谈时避免使用特定意义的医学术语
- E.要将病人陈述的内容去粗取精,去伪存真

【答案】C

【解析】问诊的基本方法与技巧:①消除病人的紧张情绪。②尽可能让患者充分地陈述和强调他认为重要的情况和感受。③追溯首发症状开始的确切时间,直至目前的演变过程;④在问诊的两个项目之间使用过渡语言;⑤根据具体情况采用不同类型的提问,不正确的提问可能得到错误的信息或遗漏有关的资料,诱导性提问或暗示性提问应予以避免;⑥提问时要注意系统性和目的性;⑦询问病史的每一部分结束时进行归纳小结;⑧避免医学术语;⑨为了收集到尽可能准确的病史,有时医师要引证核实病人提供的信息;⑩注意仪表、礼节和友善的举止,恰当地运用一些评价、赞扬与鼓励的语言等。

涉及考点 | 问诊的要求

21.主诉应包括的内容是

- A.对治疗的反应
- B.发病时间
- C.治疗过程
- D.就诊过程
- E.此次发病的全过程

【答案】B

【解析】主诉就是患者就诊的最主要、最明显的症状或体征及持续时间。而此次发病的全过程、就诊过程、治疗过程和对治疗的反应均是现病史的内容。因此排除 A、C、D、E。

涉及考点 | 问诊的内容

22.下列属于“个人史”的内容是

- A.过敏史
- B.习惯与嗜好
- C.预防接种
- D.生育史
- E.手术史

【答案】B

【解析】习惯与嗜好不属于个人史。

涉及考点 | 问诊的内容

23.急性有机磷杀虫药中毒患者呼出气的气味是

- A.腥臭味
- B.刺激性蒜味
- C.烂苹果味
- D.氨味
- E.酒味

【答案】B

【解析】选项 A 见于肝性脑病。选项 B 见于急性有机磷杀虫药中毒。选项 C 见于糖尿病酮症酸中毒。选项 D 见于尿毒症。选项 E 见于酒后或醉酒。

涉及考点 | 嗅诊常见异常气味及临床意义

24. 吗啡中毒引起呼吸性困难的主要原因是

- | | |
|------------|-----------|
| A. 兴奋呼吸中枢 | B. 是支气管痉挛 |
| C. 使肺淤血 | D. 肺泡弹性减弱 |
| E. 呼吸中枢受抑制 | |

【答案】E

【解析】呼吸中枢存在阿片受体,吗啡与呼吸中枢的阿片受体结合,抑制呼吸中枢。

涉及考点 | 呼吸性困难的主要原因

25. 两侧瞳孔大小不等,多见于

- | | |
|-------------|------------|
| A. 阿托品类药物影响 | B. 有机磷农药中毒 |
| C. 脑肿瘤 | D. 濒死状态 |
| E. 吗啡药物影响 | |

【答案】C

【解析】双侧瞳孔大小不等,常提示有颅内病变,如脑外伤、脑肿瘤、中枢神经梅毒、脑疝等。双侧瞳孔不等,且变化不定,可能是中枢神经和虹膜的神经支配障碍。如双侧瞳孔不等且伴有对光反射减弱或消失以及神志不清,往往是中脑功能损害的表现。选项 A、D 表现为瞳孔扩大。选项 B、E 表现为瞳孔缩小。

涉及考点 | 眼部检查

26. 蜘蛛痣不应出现的部位是

- | | |
|-------|-------|
| A. 颈部 | B. 腹部 |
| C. 面部 | D. 前胸 |
| E. 手背 | |

【答案】B

【解析】皮肤小动脉末端分支性扩张所形成的血管痣,形似蜘蛛,称为蜘蛛痣,多出现于上腔静脉分布的区域内,如面、颈、手背、上臂、前胸和肩部等处,大小不等,因此排除选项 A、C、D、E。

涉及考点 | 蜘蛛痣检查

27. 方颅可见于

- | | |
|-----------|--------|
| A. 先天性梅毒 | B. 呆小症 |
| C. 小儿营养不良 | D. 脑积水 |
| E. 脑膜炎 | |

【答案】A

【解析】选项 B 表现为小颅。选项 D 表现为巨颅。选项 C、E 为干扰项。方颅,前额左右突出,头顶平坦呈方形,颈部静脉充盈,对比之下颜面很小,由于颅内压增高,压迫眼球,形成双目下视、巩膜外露的特殊表情,常见于先天性梅毒。

涉及考点 | 方颅形状检查

28. 下列各项,能引起 U 波增高的是

- A.低血钙
B.低血钾
C.高血压
D.冠心病
E.高血钠

【答案】B

【解析】U波,是T波后面的一个低平的小波,在体表导联中V₃最清晰。U波增高既有生理性的也有病理性的。临床上U波显著增高多见于低血钾。

涉及考点 | 心电图检查

29.腹部叩诊鼓音范围缩小见于

- A.肝、脾极度肿大
B.胃肠穿孔
C.肠梗阻
D.胃肠高度胀气
E.人工气腹

【答案】A

【解析】正常情况下,腹部叩诊大部分区域为鼓音,只有肝脾所在部位,增大的膀胱和子宫占据的部位,以及两侧腹部近腰肌处叩诊为浊音。明显的鼓音可见于胃肠高度胀气、人工气腹和胃肠穿孔等

涉及考点 | 腹部叩诊

30.由于维生素B₁₂缺乏所引起的贫血是

- A.缺铁性贫血
B.巨幼细胞贫血
C.再生障碍性贫血
D.溶血性贫血
E.失血性贫血

【答案】B

【解析】如果体内缺少叶酸和(或)维生素B₁₂,就会导致到红细胞的生成减慢,细胞核的生长落后于细胞质,生成的红细胞,细胞核小,体积大,即巨幼红细胞。由于红细胞生成速度慢,加之巨幼红细胞在骨髓内易被破坏,进入血循环的成熟红细胞寿命也较短,这些原因共同造成巨幼细胞性贫血。

涉及考点 | 血液的一般检查

31.下列各项,不引起高钾血症的疾病是

- A.急性肾功能衰竭
B.严重溶血
C.缺铁性贫血
D.挤压综合征
E.代谢性酸中毒

【答案】C

【解析】急性肾功能衰竭会有肾功能紊乱,肾小球过滤率下降导致水钠潴留,体内的钠离子浓度会下降影响肾小管的钠钾交换,不能有效进行钠钾交换而让钾排出体外,使血钾增高引起高钾血症。严重溶血时红细胞破裂,红细胞内的钾离子外漏。身体大量挤压时,细胞破裂细胞内的钾离子外流。代谢性酸中毒的时候,氢钾交换加强细胞内的钾离子进入血浆,血浆中的氢离子进入细胞内。上述原因都是导致高钾血症的原因。

涉及考点 | 电解质检查

32.肾源性水肿者,其水肿常出现的部位是

- A.下肢
B.上肢
C.眼睑
D.胸腔

E.腹腔

【答案】C

【解析】肾源性水肿发病机制的中心环节低蛋白血症及引起的血浆胶体渗透压下降,它是造成组织间液积聚的主要原因。

涉及考点 | 肾源性水肿

33.肝颈静脉回流征阳性主要见于

A.左心衰

B.肝硬化

C.心包积液

D.急性心肌梗死

E.肾功能不全

【答案】C

【解析】心包积液时,右心室舒张受限,不能完全接受回流量,而致颈静脉充盈更为明显。

涉及考点 | 血管检查及周围血管征



配套名师高清视频

34.具有胸膜摩擦音体征的疾病是

A.结核性脓胸

B.结核性渗出性胸膜炎

C.肺结核

D.结核性干性胸膜炎

E.肺结核并发气胸

【答案】D

【解析】胸膜摩擦音是干性胸膜炎的重要体征,主要见于:①胸膜炎症,如结核性胸膜炎、化脓性胸膜炎早期以及其他原因引起的胸膜炎症。②原发性或继发性胸膜肿瘤。③肺部病变累及胸膜,如肺炎、肺梗死等;④胸膜高度干燥,如严重脱水等;⑤其他如尿毒症等。

涉及考点 | 胸膜摩擦音听诊

35.下列各项,心浊音界向健侧移位,患侧心脏浊音界叩诊不清楚的是

A.肺大泡

B.肺实变

C.胸膜肥厚

D.肺不张

E.胸腔积液

【答案】E

【解析】选项 A 心脏浊音界变小或叩不清。选项 B 若与心脏浊音界连在一起,真正的心脏浊音区则无法叩出。选项 C 粘连使心界移向患侧。选项 D 使心界移向患侧。大量胸腔积液、积气时,心浊音界向健侧移位。

涉及考点 | 心脏叩诊

36.不属于第一心音特点的是

A.心尖搏动之后出现

B.音调低,强度较响

C.声音时限较长

D.第一心音与第二心音间隔较短

E.心尖部最响

【答案】A

【解析】第一心音音强,调低,时限较长,与心尖搏动和颈动脉搏动同时出现,心尖部最响亮,S1与S2之间的间隔较短。

涉及考点 | 心音听诊

37.高血压性心脏病左心室增大,其心脏浊音界呈

- A.心腰部凸出
B.梨形
C.靴形
D.烧瓶形
E.普大型

【答案】C

【解析】选项 A 为左房与肺动脉段均增大，心腰更为丰满或膨出。选项 B 为二尖瓣狭窄。选项 C 为高血压、主动脉瓣关闭不全。选项 D 见于心包积液。选项 E 见于扩心病。

涉及考点 | 心脏叩诊

38.第二心音听诊的特点是

- A.不如第一心音清脆
B.音调较高
C.音调较低
D.历时较长
E.强度较响

【答案】B

【解析】选项 A 错误，第二心音比第一心音清脆。选项 C、D、E 为第一心音特点。第二心音听诊的声音特点是音调较高，强度较低，时限较短，性质较清脆，在心尖搏动后出现，心底部听诊最清楚。

涉及考点 | 心音听诊

39.下列各项，最常出现心尖部舒张早期奔马律的是

- A.左心衰竭
B.肺动脉瓣狭窄
C.心包炎
D.感染性心内膜炎
E.肺源性心脏病

【答案】A

【解析】心尖部舒张早期奔马律提示心脏有严重的器质性病变，见于各种原因的心力衰竭、急性心肌梗死、重症心肌炎。

涉及考点 | 心音听诊

40.心脏杂音较局限不传导的器质性病变是

- A.主动脉瓣关闭不全
B.二尖瓣关闭不全
C.主动脉瓣狭窄
D.二尖瓣狭窄
E.肺动脉瓣关闭不全

【答案】D

【解析】选项 B 表现为收缩期杂音在心尖部最响，并向腋下及左肩胛下角处传导；选项 C 表现为收缩期杂音以主动脉瓣区最响，可上传至胸骨上窝及颈部；选项 E 表现为舒张期杂音在肺动脉瓣区最响，可传至胸骨左缘第 3 肋间；选项 A 不全表现为舒张期杂音在主动脉瓣第二听诊区最响，并向胸骨下端或心尖部传导。二尖瓣狭窄杂音多见于二尖瓣区舒张期隆隆样杂音，多不传导。

涉及考点 | 各瓣膜区常见杂音听诊

41.下列各项，不会出现枪击音的疾病是

- A.发热
B.严重贫血
C.甲状腺功能亢进症
D.主动脉瓣关闭不全
E.主动脉瓣狭窄

【答案】E

【解析】因脉压增大使脉波冲击动脉壁所致枪击音,主动脉瓣关闭不全、发热、严重贫血、甲亢等可出现脉压增大,因此排除 A、B、C、D。

涉及考点 | 血管检查及周围血管征

42. 可出现上腹部明显胃蠕动波的是

- | | |
|---------|---------|
| A. 幽门梗阻 | B. 胰头癌 |
| C. 急性胃炎 | D. 慢性胃炎 |
| E. 贲门癌 | |

【答案】A

【解析】正常人腹部一般看不到蠕动波及胃型或肠型,有时腹壁松弛菲薄的老年人、极度消瘦或经产妇可见。幽门梗阻时,因胃蠕动增强,可见较大的胃蠕动波自左肋缘下向右缓慢推进(正蠕动波),有时可见到逆蠕动波及胃型。

涉及考点 | 腹部视诊

43. 腹部触诊出现反跳痛,提示的病变是

- | | |
|------------|------------|
| A. 肠梗阻 | B. 腹膜壁层有炎症 |
| C. 腹部脏器有炎症 | D. 胃肠痉挛 |
| E. 肠系膜动脉栓塞 | |

【答案】B

【解析】项 A 表现为阵发性腹痛,伴恶心、呕吐、腹胀及停止排气排便等。选项 C 表现为局部压痛。选项 D 表现为上腹痛、呕吐。选项 E 表现为起病急骤,早期表现为突然发生剧烈腹部绞痛、恶心、频繁呕吐、腹泻。选所以本题选 B。

涉及考点 | 腹部触诊

44. 下列病变中,可见肝脏肿大、压痛明显的是

- | | |
|--------|---------|
| A. 肝淤血 | B. 慢性肝炎 |
| C. 肝硬化 | D. 脂肪肝 |
| E. 肝囊肿 | |

【答案】A

【解析】肝囊肿可见局限性肝肿大;脂肪肝所致的肝肿大,质软或稍韧,表面光滑,无压痛;肝硬化早期肝常肿大,晚期则缩小变硬,表面呈结节状或巨块状,高低不平,边缘不整,压痛明显。慢性肝炎时肝脏肿大较明显,质韧或稍硬,压痛较轻;肝淤血时肝脏明显肿大,质韧,表面光滑,边缘圆钝,有压痛。

涉及考点 | 腹内脏器触诊

45. 上输尿管压痛点位于

- | | |
|------------------------|----------------|
| A. 第 12 肋与腰肌外缘交角的顶点 | B. 脐水平线上腹直肌外缘 |
| C. 脐与髂前上棘连线的中外 1/3 交界处 | D. 髂前上棘水平腹直肌外缘 |
| E. 右锁骨中线与肋缘交界处 | |

【答案】C

【解析】A 为肋腰点。B 为上输尿管点。C 为麦氏点。D 为中输尿管解剖位置。E 为胆囊点。

涉及考点 | 腹内脏器触诊

46. 自肺开始叩诊肝脏相对浊音界时其叩诊音应是

- A.由清音转为鼓音
B.由清音转为浊音
C.由清音转为实音
D.由过清音转为实音
E.由浊音变为实音

【答案】B

【解析】自肺开始叩诊肝脏浊音界,当由清音转为浊音时,即为肝上界。此处相当于被遮盖的肝顶部,故又称肝相对浊音界。而再向下叩1~2肋间,则浊音变为实音,此处的肝脏不再被肺所遮盖而直接贴近胸壁,称肝绝对浊音界。

涉及考点 | 腹部叩诊

47.可见匙状甲的疾病是

- A.支气管扩张症
B.发绀型先天性心脏病
C.肝硬化
D.支气管扩张
E.缺铁性贫血

【答案】E

【解析】匙状甲多见于缺铁性贫血,偶见于风湿热、甲癣等。发绀型先天性心脏病、支气管扩张、肝硬化、支气管扩张症可见杵状指。

涉及考点 | 四肢、关节检查

48.下列各项,符合中枢性瘫痪表现特点的是

- A.肌张力增高
B.肌萎缩明显
C.无病理反射
D.深反射减弱或消失
E.瘫痪范围较局限,以肌群为主

【答案】A

【解析】中枢性瘫痪范围较广,肌张力过高,有病理反射,肌萎缩不明显,深反射亢进;周围性瘫痪范围较局限,以肌群为主,肌张力过低或缺失,无病理反射,肌萎缩明显,深反射减弱或消失。

涉及考点 | 中枢性与周围性瘫痪的鉴别

2年 易错考题

1.可引起全身性水肿的疾病是

- A.静脉炎
B.丝虫病
C.甲状腺功能减退症
D.淋巴管炎
E.肿瘤压迫

【答案】C

【解析】全身性水肿:①心源性水肿,见于右心衰竭、慢性缩窄性心包炎等。②肾源性水肿,多由各种肾炎、肾病综合征等引起。③肝源性水肿,见于肝硬化、重症肝炎等;④营养不良性水肿,见于低蛋白血症和维生素A缺乏;⑤内分泌源性水肿,见于甲状腺功能减退症、垂体前叶功能减退症等黏液性水肿。A、B、D、E均可见局限性水肿。

涉及考点 | 水肿的病因

2.出现泪滴形红细胞的疾病是

- A.乙醇中毒
B.骨髓纤维化

- C. 血红蛋白 S 病
D. 自身免疫性溶血性贫血
E. 缺铁性贫血

【答案】B

【解析】选项 A 可见口形红细胞。选项 B 可见泪滴形红细胞。选项 C 可见镰形红细胞。选项 D 可见球形红细胞。选项 E 可见靶形红细胞。

涉及考点 | 红细胞形态异常

3. 患者, 男性, 35 岁。40 分钟前因情绪激动突发胸骨后闷痛, 疼痛可向左臂放射, 舌下含服硝酸甘油未见缓解。心电图检查存在室性心律失常。既往有冠心病病史。首先考虑

- A. 心绞痛
B. 心肌梗死
C. 急性心功能不全
D. 干性胸膜炎
E. 肺梗死

【答案】B

【解析】本题考查的重点在于心绞痛及心肌梗死的鉴别, 心绞痛与心肌梗死疼痛区域均位于胸骨后及心前区, 均可由于情绪激动诱发, 都能表现出疼痛放射。但心绞痛症状轻、时间短(3~5 min)、含服硝酸甘油有效; 心肌梗死症状重, 时间长(>30 min), 硝酸甘油无效。而选项 C、D、E 其发作与情绪无明显关联, 且症状均不相符。

涉及考点 | 心绞痛及心肌梗死

4. 下列不属于代谢性酸中毒原因的是

- A. 肾衰竭
B. 糖尿病酮症
C. 肺通气功能障碍
D. 摄入大量阿司匹林
E. 腹泻

【答案】C

【解析】代谢性酸中毒的原因包括: ①酸性物质产生过多, 如糖尿病酮症等。②肾脏排酸保碱功能障碍, 如肾功能障碍、肾小管性酸中毒、肾上腺皮质功能低下(阿狄森病)等。③肾外失碱, 如腹泻、肠漏等; ④酸性药物摄入过多, 如阿司匹林等; ⑤稀释性酸中毒, 如大量输入生理盐水。肺通气功能障碍属于呼吸性酸中毒。

涉及考点 | 代谢性酸中毒的病因

5. 下列各项, 可出现脉压减小的是

- A. 主动脉瓣关闭不全
B. 甲状腺功能亢进症
C. 动脉导管未闭
D. 缩窄性心包炎
E. 严重贫血

【答案】D

【解析】脉压<30 mmHg 称为脉压减小, 见于主动脉瓣狭窄、心力衰竭、休克、心包积液、缩窄性心包炎等。A、B、C、E 均见于脉压增大。

涉及考点 | 血压变异的临床意义

6. 下列各项, 出现开瓣音的是

- A. 二尖瓣脱垂
B. 二尖瓣狭窄
C. 主动脉瓣狭窄
D. 二尖瓣关闭不全
E. 主动脉瓣关闭不全

【答案】B

【解析】开瓣音(二尖瓣开放拍击音)见于二尖瓣狭窄而瓣膜弹性尚好时,是二尖瓣分离术适应证的重要参考条件,故开瓣音为二尖瓣狭窄病变时出现的病理性杂音,所以本题选B。

涉及考点 | 心音听诊

7. 主动脉瓣关闭不全的杂音是

- A. 舒张期隆隆样杂音
- B. 舒张期叹气样杂音
- C. 收缩期吹风样杂音
- D. 乐音样杂音
- E. 连续性机器样杂音

【答案】B

【解析】选项A可见于二尖瓣狭窄。选项B可见于主动脉瓣关闭不全。选项C可见于二尖瓣关闭不全。选项D可见于感染性心内膜炎及梅毒性主动脉瓣关闭不全。选项E可见于先天性心脏病动脉导管未闭。

涉及考点 | 心脏杂音的特征

8. 库瓦济埃征阳性可见于

- A. 胰头癌
- B. 急性阑尾炎
- C. 急性肠炎
- D. 腹膜炎
- E. 急性胆囊炎

【答案】A

【解析】胰头癌压迫胆总管导致阻塞,出现黄疸进行性加深,胆囊显著肿大,但无压痛,称为库瓦济埃征阳性。

涉及考点 | 腹内脏器触诊

9. 肌力分几级

- A. 7级
- B. 6级
- C. 5级
- D. 4级
- E. 3级

【答案】B

【解析】肌力分为6级,其中0级为全瘫,1~4级为不完全瘫痪(轻瘫),5级为正常肌力。

涉及考点 | 运动功能检查

10. 糖尿病病人糖化血红蛋白的控制范围是

- A. 10%~12%
- B. 8%~10%
- C. 5%~8%
- D. 4%~6%
- E. 2%~3%

【答案】D

【解析】血清糖化血红蛋白不受血糖浓度暂时波动的影响,是糖尿病诊断和监控的重要指标。其正常值为4%~6%。

涉及考点 | 糖类检查

11. 尿沉渣镜检每高倍视野多少个白细胞即视为异常

- A. >10个
- B. >8个
- C. >5个
- D. >3个
- E. >1个

【答案】C

【解析】尿沉渣镜检白细胞或脓细胞计数>5个/HP,称镜下脓尿多为泌尿系统感染,见于肾盂肾炎、膀胱炎、尿道炎及肾结核等。

涉及考点 | 尿液显微镜检查

12.心电图检查中代表心室除极、复极时间的是

- A.S-T段
- B.T-P段
- C.QRS波群
- D.Q-T间期
- E.P-R间期

【答案】C

【解析】选项A反映心室早期缓慢复极的电位和时间变化。选项B反映心室晚期快速复极到下一个心电活动开始的电位和时间变化。选项C反映左、右心室除极过程中的电位和时间变化。选项D反映左、右心室除极与复极全过程的时间。选项E反映电激动过程在房室交界区及其后的希氏束、室内传导系统所产生的微弱变化。

涉及考点 | 心电图各波段的意义

(13~14题共用备选答案)

- A.十二指肠溃疡
- B.急性胰腺炎
- C.穿孔
- D.输尿管结石
- E.急性肠炎

13.暴饮暴食后上腹疼痛,向左腰背放散,多见于

【答案】B

14.腹痛,伴有腹泻,多见于

【答案】E

【解析】腹痛伴有腹泻多见于急性肠炎。胃穿孔腹痛剧烈难忍,多有慢性胃炎病史。输尿管结石出现剧烈下腹痛。急性胰腺炎多于暴饮暴食后出现上腹疼痛,向左腰背放散。十二指肠溃疡腹痛长期有规律。

涉及考点 | 腹痛的问诊要点

(15~16题共用备选答案)

- A.肺结核
- B.支气管扩张症
- C.胸膜炎
- D.喉头水肿
- E.上呼吸道感染

15.上述各项,常出现咳嗽、咯血伴低热、盗汗的是

【答案】A

16.上述各项,常出现咳嗽、咯血伴大量脓痰的是

【答案】B

【解析】上呼吸道感染无咯血;胸膜炎咳嗽伴胸痛,无咯血;喉头水肿可见咳嗽伴呼吸困难,无咯血;支气管扩张症可见咳嗽、咯血伴大量脓痰;肺结核可见咳嗽、咯血伴低热、盗汗。

涉及考点 | 咳嗽与咳痰的问诊要点

(17~18题共用备选答案)

- A.咳大量脓痰
- B.干咳无痰
- C.咳铁锈色痰
- D.咯吐大量鲜血
- E.咳粉红色泡沫痰

17.急性左心功能不全,常伴有

【答案】E

18.肺炎链球菌肺炎,常伴有

【答案】C

【解析】急性左心功能不全表现为突发严重呼吸困难,强迫坐位,面色灰白,发绀,大汗,烦躁,同时频繁咳嗽,咳粉红色泡沫痰。肺炎链球菌肺炎起病多急骤,高热寒战,全身肌肉酸痛,患侧胸痛,痰少,可带血或呈铁锈色。所以17题选E,18题选C。

涉及考点 | 咳嗽与咳痰的问诊要点

(19~20题共用备选答案)

- | | |
|-------|-------|
| A.深昏迷 | B.浅昏迷 |
| C.嗜睡 | D.昏睡 |
| E.谵妄 | |

19.意识大部分丧失,强刺激也不能唤醒,角膜反射存在的是

【答案】B

20.意识障碍伴错觉、幻觉、躁动不安、谵语的是

【答案】E

【解析】深昏迷表现为意识全部丧失,对疼痛等各种刺激均无反应,角膜反射消失。浅昏迷表现为意识大部分丧失,强刺激也不能唤醒,角膜反射存在。嗜睡表现为持续性睡眠,轻刺激可被唤醒,醒后能回答简单问题或做简单动作,刺激停止后迅速入睡。昏睡表现为熟睡状态,不易唤醒。谵妄表现为意识障碍伴错觉、幻觉、躁动不安、谵语。

涉及考点 | 意识障碍的临床表现

(21~22题共用备选答案)

- | | |
|---------|---------|
| A.慢性病面容 | B.二尖瓣面容 |
| C.伤寒面容 | D.甲亢面容 |
| E.苦笑面容 | |

21.消瘦,两眼球突出,兴奋不安,呈惊恐貌,多见于

【答案】D

22.两颧紫红,口唇发绀,多见于

【答案】B

【解析】苦笑面容见于破伤风;伤寒面容表情淡漠,反应迟钝,呈无欲状态,见于肠伤寒、脑脊髓膜炎、脑炎等高热衰竭患者;慢性病面容面容憔悴,面色晦暗或苍白无华,目光暗淡,见于慢性消耗性疾病,如恶性肿瘤、肝硬化、严重结核病等。

涉及考点 | 异常面容的特点

(23~24题共用备选答案)

- | | |
|----------|------------|
| A.颈部淋巴结 | B.右锁骨上窝淋巴结 |
| C.腋下淋巴结 | D.左锁骨上窝淋巴结 |
| E.腹股沟淋巴结 | |

23.胃癌出现淋巴结转移常见的部位是

【答案】D

24.肺癌出现淋巴结转移常见的部位是

【答案】B

【解析】胃癌常见左锁骨上窝淋巴结转移；肺癌常见右锁骨上窝淋巴结转移；肠癌、卵巢癌可见腹股沟淋巴结转移；头颈部肿瘤可见颈部淋巴结转移；乳腺癌可见腋下淋巴结转移。

涉及考点 | 局部和全身浅表淋巴结肿大

25. 主动脉瓣关闭不全, 多表现为

- A. 奇脉
- B. 颈静脉搏动
- C. 交替脉
- D. 水冲脉
- E. 脉搏短绌

【答案】D

【解析】奇脉是指吸气时脉搏明显减弱或消失, 系左心室搏血量减少所致, 见于心脏压塞或心包缩窄。缩窄性心包炎一般心律正常, 脉搏细速, 有奇脉。颈静脉搏动可见于三尖瓣关闭不全等。交替脉是节律规则而强弱交替的脉搏, 必要时嘱患者在呼气中期屏住呼吸, 以排除呼吸变化所影响的可能性。常见于高血压性心脏病、急性心肌梗死和主动脉瓣关闭不全等。水冲脉表现为脉搏骤起骤落, 犹如潮水涨落, 是由于周围血管扩张或存在分流、反流所致。前者常见于甲状腺功能亢进、严重贫血、脚气病等, 后者常见于主动脉瓣关闭不全、先天性心脏病动脉导管未闭、动静脉瘘等。主动脉瓣关闭不全时由于出现舒张压下降, 脉压加大可出现水冲脉。脉搏短绌见于房颤。

涉及考点 | 血管检查

第十一篇 内科学



考情分布图

		2015	2016	2017	2018	2019
内科学	呼吸系统疾病	2	4	3	2	3
	循环系统疾病	3	3	2	6	2
	消化系统疾病	4	2	4	3	6
	泌尿系统疾病	2	3	2	1	3
	血液系统疾病	1	2	1	3	2
	内分泌与代谢疾病	3	1	2	1	2
	结缔组织病	1	0	1	1	0
	神经系统疾病	2	3	3	2	2
	常见急危重症	1	0	0	3	0



高频考点必背

- 1.慢性阻塞性肺疾病(COPD)的最主要的病因是**吸烟**。
- 2.COPD 是我国导致**慢性肺心病及慢性呼吸衰竭**的最常见病因。
- 3.**感染因素**是 COPD 发病与病情发展的重要因素。
- 4.**气短及呼吸困难**为 COPD 的典型症状。
- 5.COPD 的体征为早期可无异常,随疾病进展出现,出现**桶状胸**,**呼吸变浅**、**频率增快**,双肺**语颤减弱**,叩诊呈**过清音**,心浊音界**缩小**。
- 6.**慢性肺源性心脏病**是 COPD 的最终结局。
- 7.**不完全可逆的气流受限**是 COPD 诊断的必备条件,吸入支气管扩张剂后 $FEV_1/FVC < 70\%$ 最有助于诊断。
- 8.**细菌感染**是导致 COPD 急性加重最重要的原因,故选用敏感抗生素是极为重要的治疗措施。
- 9.**肺性脑病**是慢性肺心病首要死亡原因。
- 10.**控制感染**为治疗慢性肺心病的关键措施。
- 11.支气管哮喘的主要表现为**发作性带有哮鸣音的呼气性呼吸困难**。
- 12.支气管哮喘痰液检查涂片镜检可见较多**嗜酸性粒细胞**。
- 13.左心衰竭临床表现为呼吸困难、发绀、咳嗽、**咳白色或粉红色泡沫痰**。
- 14.立即使患者**脱离变应原**的接触是防治哮喘最有效的方法。
- 15.**糖皮质激素**是控制哮喘最有效的药物。
- 16.**钙拮抗剂**可用于治疗运动性哮喘,**酮替芬**对过敏性哮喘有效,**曲尼司特**、**色甘酸钠**主要用于哮喘的预防。

17.肺炎链球菌肺炎初期为**刺激性干咳**,继而咳白色黏液痰或带血丝痰,经1~2天后,可咳出黏液血性或**铁锈色痰**。

18.痰直接涂片检查发现典型的**革兰染色阳性、带荚膜的球菌**,即可初步作出肺炎链球菌肺炎病原学诊断。

19.肺炎链球菌肺炎早期仅见肺纹理增粗、紊乱。肺实变期呈肺叶、肺段分布的密度均匀阴影,并在实变阴影中可见支气管气道征,肋膈角可有少量胸腔积液征。**消散期**显示实变阴影密度逐渐减低,呈**散在的、大小不等的片状阴影**。

20.肺炎链球菌肺炎一经确诊即应予**抗生素治疗**,不必等待细菌培养结果。首选**青霉素G**,对青霉素过敏者,可用红霉素或阿奇霉素、林可霉素等;重症患者可用氟喹诺酮类、头孢菌素类等。

21.**干咳**为肺炎支原体肺炎最突出的症状,咳嗽多为阵发性剧咳,咳少量黏液痰。

22.**吸烟**是原发性支气管肺癌最重要原因。

23.中央型肺癌生长在**段支气管以上位于肺门附近者**,约占肺癌的3/4,以**鳞状上皮细胞癌和小细胞肺癌**较常见。

24.小细胞肺癌在原发性肺癌中恶性程度最高,较早发生**淋巴及血行转移**。

25.**胸部X线检查**是原发性肺癌常规检查方法。

26.**痰脱落细胞检查**是简单而有效的早期诊断方法,并能进行组织学检查。非小细胞肺癌的阳性率比小细胞肺癌者高,可高达70%~80%。

27.**纤维支气管镜检查**是确诊肺癌的重要检查方法。中央型肺癌确诊率可达95%左右,周围型肺癌确诊率可达55%。

28.**放射性核素扫描检查**可进行原发性支气管肺癌的定位、定性诊断。

29.**手术治疗**为非小细胞肺癌的主要治疗方法,主要适用于I期、II期患者。**根治性手术切除**是首选的治疗措施,除I期患者,II~III期的患者实施根治手术后需辅助化疗。

30.小细胞肺癌对**化疗**最敏感,鳞癌次之,腺癌最差。

31.**心力衰竭**为大多数器质性心脏病的常见并发症及最终结局。

32.**冠心病**是缺血性心肌损害最常见的病因之一。

33.**肺部感染**是心力衰竭最主要、最常见的诱因。

34.左心衰竭以**肺淤血及心排血量降低**的表现为主,症状明显但体征不具特征性。

35.**劳力性呼吸困难**是左心衰竭最早出现的症状。

36.右心衰竭以**体循环淤血**的表现为主,临床体征显著但症状不具特异性。

37.**胸部X线检查**是确诊左心衰竭肺水肿的主要依据。

38.**超声心动图**检查是诊断心力衰竭最有价值的方法。

39.**洋地黄**可抑制房室结传导,用于合并有心力衰竭的室上性心动过速及心房颤动的治疗。

40.慢性房颤的治疗经复律无效者,以控制心室率为主,首选药物为**地高辛**。

41.二尖瓣狭窄的最常见病因为**风湿热**,2/3的患者为女性。

42.二尖瓣狭窄叩诊心浊音界向左扩大,心腰消失而呈**梨形心**;听诊心尖区局限性舒张中晚期隆隆样杂音。

43.**右心衰竭**为二尖瓣狭窄主要的死亡原因,多见于晚期患者。

44.**介入和手术**为治疗二尖瓣狭窄的有效方法。

- 45.二尖瓣关闭不全最早出现的突出症状是乏力,可伴有心悸,晚期发生肺淤血时出现呼吸困难。
- 46.心尖区响亮、粗糙、音调较高的全收缩期吹风样杂音伴左房、左室增大,可诊断为二尖瓣关闭不全,超声心动图检查有助于确诊。
- 47.主动脉瓣狭窄常见的典型三联征为呼吸困难、心绞痛和晕厥。
- 48.主动脉瓣狭窄慢性患者最早出现的症状为心悸、心前区不适,常有头部搏动感。多数患者晚期出现左心衰竭的表现。
- 49.脑出血和脑梗死是高血压最主要的并发症。
- 50.利尿剂可作为无并发症高血压患者的首选药物,适用于轻、中度高血压,尤其是老年高血压、肥胖及并发心力衰竭者。
- 51.β受体阻滞剂用于轻、中度高血压,尤其是静息心率较快(>80次/分)或合并心绞痛及心肌梗死后患者。
- 52.老年人高血压或合并稳定型心绞痛时选用钙通道阻滞剂(CCB)。
- 53.高胆固醇血症是冠状动脉粥样硬化性心脏病最重要的危险因素。
- 54.疼痛为心肌梗死最早出现和最突出的症状。
- 55.急性心肌梗死(MI)表现为心律失常,以室性心律失常最多见。
- 56.肌钙蛋白升高是诊断MI的敏感指标。
- 57.幽门螺杆菌(Hp)感染是慢性胃炎最主要的病因。
- 58.幽门螺杆菌检测有助于慢性胃炎的分类诊断和选择治疗措施。
- 59.胃镜检查是诊断慢性胃炎最可靠的方法。
- 60.幽门螺杆菌感染是引起消化性溃疡的主要病因。
- 61.消化性溃疡引起的腹痛呈节律性并与进食相关,十二指肠溃疡(DU)饥饿时疼痛,多在餐后3小时左右出现,进食后缓解,部分患者可有午夜痛;胃溃疡(GU)疼痛常在餐后1小时内发生,至下次餐前自行消失。
- 62.消化性溃疡是上消化道出血最常见的病因。
- 63.穿孔发生率DU多于GU。腹部X线透视见膈下游离气体影,是诊断急性穿孔的重要依据。
- 64.呕吐是幽门梗阻的主要症状,吐后症状减轻,呕吐物含有发酵宿食,查体有胃型、胃蠕动波及震水音。
- 65.胃镜检查和黏膜活检是诊断消化性溃疡最有价值的检查方法。
- 66.淋巴转移是胃癌最早且最常见的转移方式。
- 67.上腹疼痛是胃癌最常见症状;食欲减退可为胃癌的首发症状。腹部肿块是胃癌的主要体征。
- 68.粪便隐血试验常持续阳性,可作为胃癌筛选的首选方法。
- 69.结肠镜检查是溃疡性结肠炎诊断与鉴别诊断的最重要手段。
- 70.引起肝硬化的原因很多,在我国由病毒性肝炎所致的肝硬化最常见。
- 71.急性上消化道出血是肝硬化最主要的死亡原因。
- 72.肝性脑病是晚期肝硬化最严重的并发症,也是最常见死亡原因之一。
- 73.肝硬化腹水检查一般为漏出液。
- 74.肝穿刺活检是确诊代偿期肝硬化的唯一方法。

75. **甲胎蛋白**(AFP)是当前诊断肝细胞癌最特异的标志物。
76. 慢性肾小球肾炎以**血尿、蛋白尿、高血压和水肿**为基本临床表现。
77. **上行感染**是尿路感染最主要感染途径。
78. **心血管系统**为慢性肾衰竭最常见死亡原因。**食欲不振、恶心、呕吐**常为首发症状。
79. **缺铁性贫血**是贫血中最常见的类型。以育龄妇女及婴幼儿多见。
80. 缺铁性贫血典型表现为**小细胞低色素性贫血**。
81. **口服铁剂**是治疗缺铁性贫血的首选方法。
82. **药物及化学物质**是继发性再障的首位病因。
83. 再生障碍性贫血主要临床表现为**进行性贫血、出血及感染**。
84. **雄激素**为治疗非重型再障的首选药物。
85. **骨髓象**是确诊白血病的依据。
86. **免疫因素**是特发性血小板减少性紫癜(ITP)发病的主要原因。
87. 急性型ITP以**儿童**为多见;慢性型较为常见,多见于**青年女性**。
88. 特发性血小板减少性紫癜首选治疗药物为**糖皮质激素**,适用于急性型和慢性型发作期。
89. 甲状腺危象的治疗首选**丙硫氧嘧啶**。
90. **尿糖**为诊断糖尿病的重要线索,但非诊断依据。
91. **血糖**是诊断的主要依据,也是长期监控病情和判断疗效的主要指标。
92. 类风湿关节炎(RA)是一种异质性、系统性,以**侵蚀性、对称性多关节炎**为主要表现的自身免疫性疾病;多发生于中年女性,男女之比为1:3。
93. 类风湿关节炎的基本病理改变为**滑膜炎**。
94. 类风湿关节炎出现最早的表现是**疼痛**。
95. **炎性标记物**可判断类风湿关节炎活动程度。**活动期血沉增快,C反应蛋白升高**。

5年 历年真题

1. COPD 最主要的原因是

- A. 吸烟
B. 职业粉尘
C. 空气污染
D. 感染
E. 氧化应激

【答案】A

【解析】COPD 最常见的病因就是长期吸烟,因为吸烟可以导致支气管的痉挛、气管壁的损害,增加气道阻力,使肺功能下降导致肺气肿、慢阻肺的形成。

涉及考点 | 慢性阻塞性肺疾病的病因与发病机制

2. “沉默肺”指的是

- A. 轻度哮喘发作之哮鸣音
B. 危重哮喘发作,哮鸣音消失
C. 肺气肿呼吸音减弱
D. 气胸患者呼吸音消失
E. 肺炎患者呼吸音减弱

【答案】B

【解析】沉默肺:哮喘发作时典型的体征是双肺可闻及广泛的哮鸣音,呼气音延长。但非常严重的哮喘发作,由于气道阻塞,哮鸣音反而减弱,甚至完全消失,表现为“沉默肺”,是病情



配套名师高清视频

危重的表现。

涉及考点 | 哮喘的典型体征

- 3.慢性肺源性心脏病最多见的并发症是下列哪一项
- A.肺性脑病
B.心律失常
C.消化道出血
D.酸碱平衡失调
E.肾衰竭

【答案】D

【解析】酸碱平衡失调和电解质紊乱是因为二氧化碳潴留可导致呼吸性酸中毒,严重缺氧可导致代谢性酸中毒,低钾、低氯血症可导致代谢性碱中毒。这是本病最常见并发症。本病最严重并发症为肺性脑病,其他并发症如心律失常、休克、消化道出血等,都不如酸碱平衡失调常见。

涉及考点 | 慢性肺源性心脏病的并发症

4.患者,男,73岁。患有肺心病5年,近日因受凉,咳、痰、喘加重,下肢浮肿,其关键性的治疗措施是

- A.利尿
B.解痉
C.吸氧
D.使用洋地黄
E.控制呼吸道感染

【答案】E

【解析】控制感染为慢性肺心病急性加重期治疗的关键治疗措施。

涉及考点 | 慢性肺源性心脏病的治疗

- 5.内源性哮喘的临床表现是
- A.多见于儿童与青少年
B.常于春、秋季发病
C.可有前驱症状
D.发病急,症状缓解
E.快起病慢,较多见哮喘持续状态

【答案】E

【解析】内源性哮喘指非过敏原因引起的哮喘,绝大多数是因呼吸道感染诱发,以冬季气候变化时多见。以女性居多。病人常先有呼吸道感染或支气管的咳嗽咳痰史及发热等全身症状,逐渐出现哮喘。发作时虽与外源性哮喘相似,但起病慢、持续较久,且逐渐加重,顽固性哮喘者夜间发作较为多见,待感染控制后才能平息。间歇期长短不一,无规律性,治疗时加用抗菌药物可使症状及早缓解。

涉及考点 | 支气管哮喘的临床表现

- 6.下列关于哮喘持续状态的紧急处理的叙述哪项是不正确的
- A.吸氧
B.口服氨茶碱
C.纠正酸中毒
D.静滴地塞米松
E.补充水、电解质

【答案】B

【解析】哮喘持续状态的治疗:①吸氧。②迅速缓解气道痉挛,常用琥珀酸氢化可的松、甲基强的松龙或地塞米松静脉滴注或注射。③及时进行人工通气;④注意并发症,包括预防和控制感染;补充足够液体量,避免痰液黏稠;纠正严重酸中毒和调整水电解质平衡等。

涉及考点 | 支气管哮喘的治疗

7.肺癌发病的最重要因素是下列哪一项

- A.吸烟
- B.电离辐射
- C.室外空气污染
- D.室内空气污染
- E.长期接触石棉

【答案】A

【解析】吸烟是已被公认为肺癌的最重要危险因素。而职业、致癌因子、空气污染、电离辐射及饮食与营养因素虽和肺癌的发生有关系,但并不是最重要的因素。

涉及考点 | 原发性支气管肺癌的病因

8.肺癌由原发癌肿引起的症状是下列哪一项

- A.胸痛
- B.吞咽困难
- C.厌食,肝区疼痛,黄疸
- D.头痛,呕吐,共济失调
- E.咳嗽,咯血,胸闷,气急

【答案】E

【解析】咳嗽是原发癌肿引起的肺癌最常见的早期症状,另外,咯血、喘鸣、胸闷、气急、体重下降、发热也是原发癌肿引起的主要症状。而胸痛、吞咽困难等是肿瘤局部扩展引起的症状;头痛、呕吐、厌食、肝区疼痛等是肝外转移引起的症状。

涉及考点 | 原发性支气管肺癌的临床表现

9.对化疗最敏感的肺癌组织学类型是

- A.腺癌
- B.类癌
- C.小细胞肺癌
- D.鳞状上皮癌
- E.大细胞肺癌

【答案】C

【解析】小细胞肺癌对化疗最敏感,鳞癌次之,腺癌最差。化疗是治疗小细胞肺癌的主要方法。化学药物应根据癌肿细胞类型选择。如依托泊苷、替尼泊苷、卡铂及异环磷酰胺等对小细胞肺癌有较好的效果。

涉及考点 | 原发性支气管肺癌的治疗原则

10.左心衰竭时,最早出现和最重要的症状是

- A.乏力
- B.咳痰
- C.咯血
- D.咳嗽
- E.呼吸困难

【答案】E

【解析】左心衰竭以肺瘀血及心排量降低表现为主,其中呼吸困难是左心衰竭最早出现和最重要的症状。

涉及考点 | 慢性心力衰竭的临床表现

11.支气管哮喘的主要特征为

- A.吸气性呼吸困难
- B.哮喘持续状态
- C.混合性呼吸困难
- D.反复发作性的呼气性呼吸困难
- E.非发作性的呼气性呼吸困难

【答案】D

【解析】主要表现为发作性带有哮鸣音的呼气性呼吸困难,其发作常与吸入外源性变应原

有关,大多呈季节性,春秋季节易发且日轻夜重。

涉及考点 | 支气管哮喘的诊断与鉴别诊断

12.洋地黄中毒引起的频发室性早搏,治疗应首选的药物是

- A.苯妥英钠
- B.利多卡因
- C.阿托品
- D.美托洛尔
- E.奎尼丁

【答案】E

【解析】洋地黄中毒引起的频发室性早搏,应立即停用洋地黄,给予苯妥英钠或氯化钾等治疗。

涉及考点 | 过早搏动的治疗

13.主动脉瓣狭窄的典型三联征表现是

- A.呼吸困难-心绞痛-晕厥
- B.心力衰竭-心绞痛-晕厥
- C.呼吸困难-心律失常-晕厥
- D.心力衰竭-心律失常-晕厥
- E.心绞痛-心律失常-晕厥

【答案】A

【解析】主动脉瓣狭窄出现的症状较晚,轻度和中度主动脉瓣狭窄者可多年无症状,严重者典型表现为呼吸困难-心绞痛-晕厥,称为主动脉瓣狭窄三联征,个别患者可能会发生猝死。

涉及考点 | 主动脉瓣狭窄的临床表现

14.高血压伴糖尿病肾病,治疗应选用的药物是

- A.利尿剂
- B.β受体阻滞剂
- C.CCB
- D.ACEI
- E.ARB

【答案】D

【解析】抗高血压药 ACEI 作为血管扩张药,可降低外周阻力。它在血管紧张素转化酶参与的血管紧张素 I 转化为血管紧张素 II 过程起作用。目前 ACEI 主要用于各种类型高血压及各种程度的高血压,对伴有心力衰竭、左心室肥大、心肌梗死、糖耐量降低或糖尿病肾病蛋白尿等尤为适宜。

涉及考点 | 原发性高血压的治疗

15.血管紧张素转换酶抑制剂的适应证是

- A.轻、中度高血压
- B.高血压伴心力衰竭
- C.高血压合并心绞痛
- D.老年高血压
- E.糖尿病

【答案】B

【解析】血管紧张素转换酶抑制剂可改善胰岛素抵抗、逆转左心室肥厚,改善肾小球滤过率和肾脏血流量、减少蛋白尿,对肥胖、糖尿病和心、肾靶器官受损的高血压患者有较好的疗效,故特别适用于伴有心力衰竭、心肌梗死后、糖耐量异常或糖尿病肾病的高血压患者。

涉及考点 | 原发性高血压的治疗

16.心功能可分为几级

- A.3级
- B.4级
- C.5级
- D.6级

E.7 级

【答案】B

【解析】心功能可分4级。I级:有心脏病但活动不受限制,为心功能代偿期。II级:休息时无自觉症状,但日常活动即出现疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛发作等。III级:体力活动明显受限,低于日常活动即出现上述症状。IV级:不能从事任何体力活动,休息时即有心力衰竭的症状。

涉及考点 | 心功能分级

17. 典型心绞痛胸部疼痛的部位是在

- A. 心尖部
- B. 左肩背部
- C. 胸部左侧
- D. 胸部右侧
- E. 胸骨体上段或中段的后方

【答案】E

【解析】心绞痛以发作性胸痛为主要临床表现,疼痛部位主要在胸骨体上段或中段之后,可波及心前区,有手掌大小范围。

涉及考点 | 心绞痛的临床表现

18. 典型心绞痛患者,含服硝酸甘油片后,缓解的时间一般是

- A. 1分钟之内
- B. 1~3分钟
- C. 5~10分钟
- D. 11~20分钟
- E. 21~30分钟

【答案】B

【解析】典型心绞痛发作时舌下含服硝酸甘油片,疼痛通常在1~3分钟内(偶至5分钟)缓解。

涉及考点 | 心绞痛的临床表现

19. 对急性心肌梗死早期诊断最灵敏,且具有高度特异性的指标是下列哪一项

- A. 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)
- B. 肌酸激酶(CK)
- C. 乳酸脱氢酶(LDH)
- D. 肌酸激酶同工酶(CK-MB)
- E. 心肌肌钙蛋白T(cTnT)

【答案】D

【解析】AST起病后6~12h开始升高。LDH起病后8~10h开始升高。CK是AMI早期诊断的敏感指标之一,但CK-MB起病后4h内升高,16~24h达高峰,对AMI早期诊断的灵敏度明显高于CK,且具有高度的特异性,阳性检出率100%。心肌肌钙蛋白T(cTnT)在心肌损伤或坏死后出现时间较早(3~4h),持续时间最长,是诊断AMI的确定性标志物。

涉及考点 | 心肌梗死的实验室检查

20. 急性心肌梗死引起急性左心衰竭,主要的治疗措施是

- A. 扩充血容量
- B. 强心
- C. 升血压
- D. 抗感染
- E. 应用吗啡和利尿剂

【答案】E

【解析】急性心肌梗死引起急性左心衰竭,以应用吗啡(或哌替啶)和利尿剂为主,亦可选用血管扩张剂减轻左心室的负荷,或用短效血管紧张素转换酶抑制剂从小剂量开始等治疗。

梗死发生后 24 小时内应避免使用洋地黄制剂。

涉及考点 | 心肌梗死的治疗

21. 关于慢性左心衰竭临床表现错误的是

- A. 劳力性呼吸困难
- B. 夜间阵发性呼吸困难
- C. 反复咯血
- D. 心源性哮喘
- E. 肝-颈静脉反流征阳性

【答案】E

【解析】慢性左心衰竭主要表现为不同程度的呼吸困难。患者可以出现劳力性呼吸困难，这是左心衰竭最早出现的症状，因为运动可以使回心血量增加，左心房的压力增高，加重肺淤血，引起呼吸困难的运动量随着心衰程度加重而减少；还可以引起端坐呼吸，在肺淤血达到一定程度时，患者不能平卧，因为平卧时回心血量会增多，而且横膈上抬，呼吸更为困难，在高枕卧位、半卧位，甚至端坐位时才可好转；患者还会出现夜间阵发性呼吸困难，患者入睡之后可以突然因为憋气而惊醒，被迫采取坐位，伴有重度的哮鸣音，另外患者还会出现咳嗽、咳痰咯血等。

涉及考点 | 慢性左心衰竭临床表现

22. 消化性溃疡的典型表现是

- A. 反复呕血，黑便
- B. 慢性、周期性、节律性上腹痛
- C. 反复上腹饱胀不适
- D. 周期性发作的无节律性上腹痛
- E. 反复、节律性的消化不良

【答案】B

【解析】消化性溃疡典型的临床特点是慢性过程；周期性发作；节律性疼痛；可被抑酸或抗酸剂缓解。根据慢性病程、周期性发作点的中上腹痛、疼痛与进食有关、多为灼痛，可作出初步诊断。

涉及考点 | 消化性溃疡的临床表现

23. 消化性溃疡最常见的并发症是下列哪一项

- A. 上消化道出血
- B. 胃肠穿孔
- C. 幽门梗阻
- D. 癌变
- E. 休克

【答案】A

【解析】消化性溃疡主要指发生在胃和十二指肠的慢性溃疡。出血是消化性溃疡最常见的并发症，也是上消化道大出血最常见的病因。

涉及考点 | 消化性溃疡的并发症

24. 溃疡性结肠炎病变最常发生的部位是

- A. 降结肠
- B. 横结肠
- C. 全结肠
- D. 直肠及乙状结肠
- E. 回肠末段及升结肠

【答案】D

【解析】本病病变位于大肠，呈连续性弥漫性分布，病变多在直肠和乙状结肠，可发展至降结肠、横结肠，甚至累及全结肠或末段回肠。

涉及考点 | 溃疡性结肠炎的病理



配套名师高清视频

25. 甲状腺功能亢进症常见的心律失常表现是

- A. 室性早搏
- B. 房性早搏
- C. 右心房肥大
- D. 左心房肥大
- E. 心肌梗死

【答案】B

【解析】甲状腺功能亢进症对心血管系统影响主要是轻者心悸、胸闷、气促,重者伴有明显心律失常、心脏扩大和心力衰竭等。心律失常以期前收缩较为常见,房性、室性、交界性都可发生,尤以房性者多见。

涉及考点 | 甲状腺功能亢进症的临床表现

26. 肝癌常见的淋巴结转移部位是

- A. 颈前淋巴结
- B. 肝门淋巴结
- C. 腋窝淋巴结
- D. 颌下淋巴结
- E. 颏下淋巴结

【答案】B

【解析】肝癌的转移途径:①血行转移:分肝内转移和肝外转移,肝内血行转移发生最早、最常见。②淋巴转移:转移至肝门淋巴结最多,也可转移到主动脉旁、脾、胰及锁骨上淋巴结。③种植转移:较少见,如果种植在腹膜,可形成血性腹水。

涉及考点 | 原发性肝癌的病理

27. 肝癌的组织学类型,最多见的是

- A. 胆管细胞型
- B. 肝细胞型
- C. 结节型
- D. 弥漫型
- E. 混合型

【答案】B

【解析】肝癌中原发性肝癌常见,原发性肝癌的组织学类型有肝细胞型、胆管细胞型及混合型,其中肝细胞型最多见。选项 C、D、E 均为肝癌的大体分型

涉及考点 | 原发性肝癌的病理

28. 下列哪项是慢性肾小球肾炎普通型的临床表现

- A. 血脂升高
- B. 高度水肿
- C. 大量蛋白尿
- D. 中等程度蛋白尿
- E. 血浆白蛋白降低

【答案】D

【解析】慢性肾炎是病因多样、病理形态不同而临床表现相似的一组肾小球疾病,它们共同的表观是水肿、高血压和尿异常改变。普通型较为常见。病程迁延,病情相对稳定,多表现为轻度至中度的水肿、高血压和肾功能损害。尿蛋白(+)~(+++),离心尿红细胞>10/HP 和管型尿等。常见的病理类型为系膜增生性肾小球肾炎、膜性肾病及局灶性节段性肾小球硬化等。

涉及考点 | 慢性肾小球肾炎的临床表现

29. 引起尿路感染的病原体最多见的是

- A. 葡萄球菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 副大肠埃希菌
- D. 变形杆菌

E.链球菌

【答案】B

【解析】尿路感染最常见的病原体是大肠埃希菌,占70%,其他依次为变形杆菌、克雷伯杆菌、产气杆菌。

涉及考点 | 尿路感染的病因

30.左心衰竭时,最早出现和最重要的症状是

A.咳嗽

B.乏力

C.咯血

D.端坐呼吸

E.劳力性呼吸困难

【答案】E

【解析】劳力性呼吸困难是左心衰竭最早出现的症状。呼吸困难发生在重体力活动时,休息后可缓解。

涉及考点 | 左心衰竭的临床表现

31.缺铁性贫血治疗后首先升高的是

A.全血细胞

B.中性粒细胞

C.白细胞

D.嗜酸性粒细胞

E.网织红细胞

【答案】E

【解析】缺铁性贫血在服用铁剂治疗后最早发生的治疗反应是自觉症状的迅速改善,短时期网织红细胞计数明显升高,常于用药后5~10天达高峰。

涉及考点 | 缺铁性贫血的治疗

32.治疗急性肺水肿的主要措施是

A.卧床休息

B.静脉补液

C.快速利尿

D.控制感染

E.限制钠盐摄入

【答案】

【解析】急性肺水肿常见于左心衰竭引起的,主要的治疗原则是强心、利尿、扩管。确诊后需要及时的吸氧,吸氧可以改变呼吸困难及缺氧,降低肺毛细血管的渗透性。尽量取端坐卧位,两下肢下垂,减少心静脉回流量。适当的用一些利尿剂,常用速尿。结合强心药物如西地兰,对于合并有哮喘症状,可以使用氨茶碱等解痉平喘。严重则需要结合肾上腺皮质激素抗休克,解毒等对症治疗。

涉及考点 | 急性心力衰竭的临床表现。

33.雄激素最适合治疗

A.再生障碍性贫血

B.海洋性贫血

C.慢性感染性贫血

D.铁粒幼红细胞贫血

E.缺铁性贫血

【答案】A

涉及考点 | 再生障碍性贫血的治疗

34.诱发心衰的感染多见于

A.呼吸道感染

B.泌尿道感染

- C.肠道感染
D.皮肤感染
E.病毒性肝炎

【答案】A

【解析】呼吸道感染是发生呼吸衰竭和心力衰竭的最常见诱因。

涉及考点 | 心衰的病因

35. 溃疡性结肠炎活动期的重要表现是

- A.发热
B.腹痛
C.贫血
D.黏液血便
E.腹部压痛

【答案】D

【解析】腹泻为本病的主要症状,腹泻主要与炎症导致大肠黏膜对水钠吸收障碍以及结肠运动功能失常有关,粪便性状为稀便、水样便、黏液便、血便、黏液脓血便等。黏液脓血便是本病活动期的重要表现,大便次数及便血的程度反映病情轻重。

涉及考点 | 溃疡性结肠炎的临床表现

36. 诊断桥本甲状腺炎的主要指标是

- A.胰岛素细胞抗体(ICA)
B.胰岛素抗体(IAA)
C.甲状腺球蛋白抗体(TGAb)
D.甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)
E.促甲状腺激素受体(TRAb)

【答案】D

【解析】桥本甲状腺炎的特征是存在高滴度的甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)。早期仅表现为TPOAb阳性,没有临床症状。血清TGA、TMA滴度明显升高(>50%),可基本确诊。升高可持续数年或十余年。

涉及考点 | 桥本甲状腺炎的诊断

37. 患者,女,43岁。确诊为甲亢,给予他巴唑20mg,一日3次,在家中治疗。半月后应到医院复查下列哪一项

- A.心率、心律
B.白细胞计数
C.甲状腺大小
D.心电图
E.突眼程度

【答案】B

【解析】他巴唑治疗甲亢的重要副作用为粒细胞减少,往往突然发生且为致命性。可见于初始用药2~3个月之内或减量过程中。

涉及考点 | 甲状腺功能亢进症的治疗

38. 对1型与2型糖尿病的鉴别最有意义的是

- A.年龄
B.体重
C.有无自发性酮症倾向
D.并发症的多少与严重程度
E.有无明显“三多一少”症状

【答案】C

【解析】糖尿病酮症酸中毒(DKA)是由于胰岛素不足以及升血糖激素不适当升高,引起的临床综合征,是最为常见的糖尿病急症,一旦发生应积极治疗。1型糖尿病患者有自发DKA倾向,2型糖尿病患者在一定诱因下也可发生DKA,如感染、胰岛素治疗中断或不适当减量、饮

食不当、各种应激等,有时也可无明显诱因。

涉及考点 | 糖尿病的概念与分类

39.下列不属于诊断类风湿关节炎诊断标准中必备关节表现的是

- A.晨僵
- B.关节畸形
- C.关节肿痛>6周
- D.对称性关节肿
- E.腕、掌指、指间关节肿

【答案】B

【解析】类风湿关节炎的诊断标准:①晨僵持续至少1小时(≥6周)。②3个或3个以上关节肿。③腕关节或掌指关节或近端指间关节肿(≥6周);④对称性关节肿(≥6周);⑤类风湿皮下结节;⑥手和腕关节的X线摄片有关节端骨质疏松和关节间隙狭窄;⑦类风湿因子阳性。以上7项中,符合4项即可诊断类风湿关节炎。

涉及考点 | 类风湿关节炎的诊断

40.尿路感染最主要的感染途径是

- A.直接感染
- B.上行感染
- C.淋巴道感染
- D.血行感染
- E.局部浸润

【答案】B

【解析】上行感染约占尿路感染的95%,是由细菌经尿道上行至膀胱,甚至肾盂引起感染。血行感染约占3%以下,直接感染较少见,淋巴道感染罕见。局部浸润不属于感染途径。

涉及考点 | 尿路感染的发病机制

41.患者,男,25岁。上腹部灼痛1年,饥饿时加重,进食后可缓解,伴泛酸。查体:上腹部稍偏右有压痛。应首先考虑的是

- A.慢性胃炎
- B.慢性胆囊炎
- C.胃癌
- D.胰腺炎
- E.十二指肠溃疡

【答案】E

【解析】十二指肠溃疡的临床表现主要为上腹部钝痛、灼痛等,疼痛多在饥饿或夜间出现,服制酸剂或进食可缓解。该患者症状比较典型,应为十二指肠溃疡。选项A、B、C、D疼痛都无明显节律性。

涉及考点 | 消化性溃疡的诊断

42.脑梗死患者出现典型的“三偏征”,其闭塞的脑动脉是

- A.大脑前动脉
- B.大脑中动脉
- C.大脑后动脉
- D.椎-基底动脉
- E.小脑后下动脉

【答案】B

【解析】颈内动脉系统闭塞,以大脑中动脉的闭塞最为常见。主干闭塞时有三偏征,主侧半球病变时有失语,可伴有双眼向病灶侧凝视。梗死面积大者可出现意识障碍和颅内压增高。皮质支闭塞引起的偏瘫及偏身感觉障碍,以面部和上肢为重;深穿支闭塞更常见,表现为对侧上下肢同等程度的偏瘫、偏身感觉障碍。

涉及考点 | 脑梗死的临床表现

43. 患者,男,43岁。高血压病史一年。近日来头痛加重,恶心,呕吐,心悸,气短。检查:血压 190/135 mmHg,眼底视网膜出血。心电图示左室肥厚,心肌劳损。其诊断是

- A. 高血压脑病
B. 缓进型高血压病
C. 脑血管痉挛
D. 急进型高血压病
E. 急性心力衰竭

【答案】D

【解析】急进型高血压是指病情一开始即为急剧进展,或经数年的缓慢过程后突然迅速发展。常见于40岁以下的青年人和老年人,早期可没有自觉症状,或仅有头痛,以清晨为重,并常因极度疲劳、精神过度紧张、寒冷刺激、更年期内分泌失调等诱因,血压突然升高,舒张压超过 130 mmHg,检查眼底可见视网膜出血、渗出或视乳头水肿,还可能出现心功能不全的表现。

涉及考点 | 原发性高血压的诊断

44. 血小板减少可出现的临床表现是

- A. 进行性贫血
B. 胸骨压痛
C. 皮肤、黏膜出血
D. 频繁性呕吐
E. 皮肤、鼻腔等处发生坏死性溃疡

【答案】C

【解析】急性型特发性血小板减少性紫癜的主要表现为:①急起畏寒、发热。②出血部位广泛,皮肤黏膜出血广泛且严重。③脾肿大;④预后良好;⑤血小板计数 $<50 \times 10^9/L$ 。慢性型的主要表现为:①起病缓慢,病程长。②出血轻,一般为皮肤、鼻、齿龈出血和月经过多。③可以有轻度脾肿大;④少部分可痊愈;⑤血小板多在 $50 \times 10^9/L$ 以上。选项 A 为慢性出血、白血病的表现;选项 B 为粒细胞缺乏症表现;选项 D 见于胃肠道疾病和颅高压;选项 E 见于白血病。

涉及考点 | 特发性血小板减少性紫癜的临床表现

45. 瞳孔缩小,呼出气为蒜臭味,全血胆碱酯酶活力不同程度降低的诊断是

- A. 溶血反应
B. 休克
C. 中暑
D. 急性一氧化碳中毒
E. 急性有机磷杀虫药中毒

【答案】E

【解析】急性有机磷杀虫药中毒时瞳孔针尖样缩小,呼出气为蒜臭味,大汗淋漓,腺体分泌增加,肌纤维颤动和意识障碍等。全血胆碱酯酶活力不同程度降低为确诊依据。

涉及考点 | 急性有机磷杀虫药中毒

46. 患者心悸、气短2年,劳累后加重。检查:脉搏 85 次/分,节律不规则,心率约 105 次/分,心律完全不规则,心音强弱绝对不一致。此患者心律失常的类型是

- A. 窦性心律不齐
B. 窦性心动过速
C. 过早搏动
D. 心房颤动
E. 室上性心动过速

【答案】D

【解析】选项 A 表现为吸气时心律增快,呼气时心率减慢;选项 B 表现为生理情况下常见于体力劳动、兴奋或情绪激动后,病理情况下常见于发热、贫血、心功能不全、心律不齐时;C 表现为每个正常心搏后都有一个过早搏动或每两个正常心搏后有一个过早搏动或一个正常性心

搏后有一个过早搏动;选项 D 表现为心律绝对不规则,强弱不等且无规律,心律快于脉率即脉搏短绌;选项 E 表现为心脏听诊心率快而大致规则,发作间歇可闻及早搏。

涉及考点 | 心房颤动的临床表现

47.患者,65岁。查体:心尖搏动出现在剑突下,且深吸气时增强,肺动脉瓣第二心音增强。应首先考虑的是

- A.冠心病
- B.高血压性心脏病
- C.风心病
- D.肺心病
- E.心肌炎

【答案】D

【解析】选项 A 多有心绞痛,胸闷心慌,心电图检查有心肌缺血改变;选项 B 有高血压病;选项 C 有风湿病史,出现关节游走性疼痛,且风心病常不累及肺动脉瓣;选项 D 有肺部基础疾病,深吸气时增强,肺动脉瓣第二心音增强,有肺高压表现,且心脏增大明显,有心肺功能不全表现;E 多由病毒感染引起,可有发热、疲乏、多汗、心慌、气急、心前区闷痛等。体格检查可见期前收缩、传导阻滞等心律失常。谷草氨基转移酶、肌酸磷酸激酶增高,血沉增快。心电图、X线检查有助于诊断。

涉及考点 | 慢性肺源性心脏病的诊断

48.患者,男,62岁,慢性支气管炎病史20余年,肺心病病史5年。近1周以来感冒后咳嗽,吐黄痰,心悸气短加重。下列治疗原则最重要的是

- A.吸氧
- B.止咳
- C.祛痰
- D.抗感染治疗
- E.强心、利尿治疗

【答案】D

【解析】肺心病的治疗原则:①控制呼吸道感染,呼吸道感染是发生呼吸衰竭和心力衰竭的最常见诱因,故需积极应用药物予以控制。②改善呼吸功能。③控制心力衰竭,强心利尿;④控制心律失常;⑤应用肾上腺皮质激素;⑥并发症的处理。

涉及考点 | 慢性肺源性心脏病的治疗

49.患者,男,28岁。突发胸闷,气急,咳嗽,听诊:两肺布满哮鸣音,应首先考虑的是

- A.慢性支气管炎喘息型
- B.急性支气管炎
- C.心源性哮喘
- D.支气管哮喘
- E.气胸

【答案】D

【解析】患者为青壮年,突发胸闷、气急、咳嗽,听诊两肺布满哮鸣音,考虑支气管哮喘可能性大。选项 A 有慢性咳嗽喘息;选项 B 一般有急性上呼吸道感染症状,听诊呼吸音正常,或有散在干湿啰音;选项 C 多见于左心衰竭,一般有心血管病史,常有阵发性咳嗽,并咳出粉红色泡沫痰;选项 E 听诊呼吸音减弱。

涉及考点 | 支气管哮喘的诊断

50.患者,男,27岁。发热、咳嗽3天。检查:气管位置居中,右胸呼吸动度减弱,右中肺语颤增强,叩诊呈浊音,听诊可闻及湿啰音及支气管肺泡呼吸音。应首先考虑的是

- A.胸膜炎
- B.肺炎
- C.气胸
- D.肺不张

E.肺结核

【答案】B

【解析】选项 A 还有胸痛表现,检查:气管位置向患侧偏移;选项 C 突发的胸痛、胸闷、呼吸困难,患者常高瘦体型,检查:气管位置向患侧偏移,叩诊鼓音,听诊患侧呼吸音减弱或消失;选项 D 常因肺炎、肺癌等引起,伴有胸闷、呼吸困难,检查:气管位置向患侧偏移,听诊呼吸音减弱;选项 E 多有低热、盗汗、消瘦等结核中毒表现,PPD(+).

涉及考点 | 肺炎的诊断

51.患者,男,30岁。高热、寒战3天、胸痛,伴咳嗽,痰中带血。听诊:右肺中部可闻及湿啰音。应首先考虑的是

- A.急性支气管炎
B.支气管扩张
C.胸膜炎
D.肺癌
E.肺炎

【答案】E

【解析】选项 A 先有急性上呼吸道感染的症状,少有胸痛、痰中带血;选项 B 反复咳嗽咳痰、咯血;选项 C 不会出现痰中带血,听诊为胸膜摩擦音;选项 D 多有吸烟史,无明显感染表现。

涉及考点 | 肺炎的诊断

(52~54题共用题干)

患者,男,68岁。有慢性咳嗽,咯痰反复发作病史20余年,冬春季节多发,劳力性呼吸困难3年。查体:桶状胸,两肺呼吸音低,语颤减弱,叩诊呈过清音,两肺散在少量湿啰音及哮鸣音,心音遥远,双下肢无水肿。有吸烟病史20余年,吸入沙丁胺醇后 FEV_1/FVC 为48%, FEV_1 为预计值的56%。

52.应首先考虑的诊断是

- A.慢性阻塞性肺疾病
B.慢性肺心病
C.支气管哮喘
D.支气管扩张
E.慢性左心衰竭

【答案】A

【解析】COPD的主要诊断依据有长期吸烟等高危因素史,结合患者临床症状、体征:桶状胸,两肺呼吸音低,语颤减弱,叩诊呈过清音,两肺散在少量湿啰音及哮鸣音,心音遥远及肺功能检查结果等综合确定。不完全可逆的气流受限是COPD诊断的必备条件,吸入支气管扩张剂后 $FEV_1/FVC < 70%$ 最有助于诊断。

涉及考点 | COPD的诊断

53.进一步检查,胸部X线最可能出现的是

- A.双肺透亮度增加,外带肺纹理减少
B.以肺门为中心的蝴蝶状阴影
C.片状密度均匀的阴影,可见支气管气道阻塞
D.肺纹理增多,排列紊乱,可见双轨征
E.双肺弥漫网格状浸润影,双下肺及外周明显

【答案】A

【解析】胸部X线检查早期可无变化,病情进展可出现肺纹理增粗、紊乱等非特异性改变。肺气肿时出现双肺透光度增加、肋间隙增宽、心影狭长、外带肺纹理减少或消失等改变。胸片检查可作为确定肺部并发症及排除其他肺部疾病的检查。



配套名师高清视频

涉及考点 | COPD 的实验室检查及其他检查

54. 患者稳定期最主要的治疗是

- A. 低流量面罩吸氧
- B. 应用免疫调节剂
- C. 应用糖皮质激素
- D. 应用利尿剂
- E. 应用抗生素

【答案】A

【解析】患者稳定期最主要的治疗是长期家庭氧疗,低流量吸氧。

涉及考点 | COPD 的稳定期治疗

55. 患者因反复出现皮肤出血,感染,贫血而就诊,检查后被确诊为慢性再障,最不可能出现的检查结果是

- A. 出血时间延长
- B. 凝血时间延长
- C. 网织红细胞百分比正常
- D. 毛细血管脆性试验阳性
- E. 红细胞形态大小均正常

【答案】C

【解析】慢性再生障碍性贫血的实验室检查:①白细胞多数在 $(2\sim3)\times 10^9/L$,中性粒细胞多在 $10\times 10^9/L$ 左右,分类计数淋巴细胞的比例增高。②血红蛋白及红细胞为正色素正细胞性贫血,血红蛋白多在 50 g/L 左右。③网织红细胞 $<1\%$;④血小板多数在 $30\times 10^9/L$ 左右;⑤凝血功能障碍:出血时间延长、凝血时间延长、毛细血管脆性试验阳性。

涉及考点 | 再生障碍性贫血的实验室检查

56. 属于急性有机磷杀虫药中毒烟碱样症状的是

- A. 流泪、流涎
- B. 瞳孔扩大
- C. 呼吸浅缓
- D. 心动过速
- E. 四肢强直性痉挛

【答案】E

【解析】烟碱样作用由于乙酰胆碱蓄积引起。表现为横纹肌兴奋使面、眼睑、舌、四肢和全身的横纹肌发生肌纤维颤动,甚至引起全身肌肉强直性痉挛,而后出现肌力减退和瘫痪。呼吸肌麻痹导致呼吸衰竭甚至停止。

涉及考点 | 急性有机磷杀虫药中毒

57. 患者,女,48岁。15年前曾患风湿热。检查:心尖部听到舒张期隆隆样杂音,X线检查显示左心房增大,应首先考虑的疾病是

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 主动脉瓣关闭不全
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 肺动脉瓣狭窄

【答案】A

【解析】患者有风湿热病史,并出现心脏杂音,考虑风湿性心脏瓣膜病。心尖部听到舒张期隆隆样杂音为二尖瓣狭窄特有的杂音,且二尖瓣狭窄导致左房血液淤滞,增大。选项B应为心尖部收缩期杂音;选项C应为胸骨右缘第2~3肋间舒张期杂音;选项D应为胸骨右缘第2~3肋间收缩期杂音;选项E应为胸骨左缘第2~3肋间收缩期杂音。

涉及考点 | 二尖瓣狭窄的诊断

58. 患者,女,31岁。四肢大关节游走性疼痛3年,近半年心慌气短,双下肢浮肿。检查:颈

静脉怒张,双下肢凹陷性水肿,肝肋缘下 3.5 cm,心尖部可闻及舒张期杂音。其诊断是

- A.心力衰竭
- B.风湿性左房室瓣关闭不全
- C.左房室瓣狭窄及关闭不全
- D.风湿性主动脉瓣关闭不全
- E.风湿性左房室瓣狭窄合并右心衰竭

【答案】E

【解析】患者的临床表现及体检为体循环淤血、右心衰的表现。结合患者关节疼痛 3 年的病史,以及心尖部闻及舒张期杂音,可能为二尖瓣有赘生物,故首先考虑为风湿性心脏病导致左房室瓣新生赘生物,左心房血液流出受阻而致右心衰。

涉及考点 | 二尖瓣狭窄的并发症

59.患者,男,39岁。确诊高血压病 5 年,无自觉症状。检查:血压 160/95 mmHg,尿常规无异常,心电图及 X 线检查显示左心室的肥大。应首先考虑的是

- A.高血压病一期
- B.高血压病二期
- C.高血压病三期
- D.急进型高血压
- E.高血压脑病

【答案】B

【解析】我国高血压分期标准为:一期无心、脑、肾并发症;二期有轻度心、脑、肾损害之一者;三期有严重心、脑、肾损害之一者。该患者已有左心室肥大应考虑是高血压病二期。本例患者高血压病史 5 年,排除选项 D;无自觉症状,排除选项 E

涉及考点 | 原发性高血压的诊断

60.胃溃疡节律性疼痛的特点是

- A.空腹痛
- B.进餐时痛
- C.夜间痛
- D.餐后 1 h 内痛
- E.餐后 3~4 h 小时痛

【答案】D

【解析】胃溃疡节律性疼痛,经常表现在进食、进食后疼痛,而口服相应药物可缓解,俗称为餐后痛。胃溃疡除规律性疼痛外,还伴随有其他的症状,如反酸嗝气、恶心、呕吐、口苦、腹胀等。具体胃溃疡,要结合患者胃镜检查做出明确诊断,同时应口服抑制胃酸分泌、胃黏膜保护药,或抗幽门螺杆菌治疗,等进一步处置。

涉及考点 | 消化性溃疡的临床症状

61.患者,男,55岁。半年来经常突发胸骨后疼痛,有窒息感,持续约 1~5 分钟,休息后迅速缓解。心电图检查示 S-T 段下

移及 T 波倒置。应首先考虑的是

- A.初发劳累性心绞痛
- B.稳定型劳累性心绞痛
- C.恶化型劳累性心绞痛
- D.自发性心绞痛
- E.急性心肌梗死

【答案】B

【解析】稳定型心绞痛指劳力型心绞痛,每次发作频率和诱因相同,疼痛性质和部位改变,疼痛时限相仿(3~5 分钟),休息或自服硝酸甘油后相同时间内产生疗效。发作时心电图可见 S-T 段下移及 T 波倒置。选项 A 为最近 1 个月内初次发生劳力型心绞痛;选项 C 指 3 个月内疼痛的频率、程度、时限、诱因经常变动,进行性恶化;选项 D 可发作于安静或熟睡时,S-T 段

可压低或抬高;选项 E 发作时疼痛时间常超过 30 分钟,且休息或服硝酸甘油不缓解,心电图检查亦不符合。

涉及考点 | 心绞痛的诊断

62.患者,男,75 岁。近日胸痛发作频繁,2 小时前胸痛再次发作,含化硝酸甘油不能缓解。检查:血压 90/60 mmHg,心律不齐。心电图检查 II、III、aVF 导联 S-T 段抬高呈弓背向上的单向曲线。应首先考虑的是

- A.心绞痛
- B.急性心包炎
- C.急性前间壁心肌梗死
- D.急性下壁心肌梗死
- E.急性广泛前壁心肌梗死

【答案】D

【解析】心电图检查对应心肌梗死部位如下:V₁、V₂、V₃定位在前间壁;V₃、V₄、V₅定位在前壁;V₅、V₆定位在前侧壁;I、aVL定位在高侧壁;V₁~V₆定位在广泛前壁;II、III、aVF定位在下壁;V₇、V₈、V₉定位在后壁。

涉及考点 | 心肌梗死的定位诊断

63.患者,男,45 岁。突发胸骨后疼痛 2 小时,伴胸闷,面色苍白,大汗。测血压 90/60 mmHg,心率 102 次/分。应首先考虑的是

- A.急性心肌梗死
- B.大叶性肺炎
- C.心绞痛
- D.心包炎
- E.气胸

【答案】A

【解析】患者为典型的急性心梗临床表现。选项 B 可有胸痛,但以发热,咳嗽咳痰为主要表现;选项 C 胸骨后疼痛持续的时间短,常发生于劳动或情绪激动时,每次发作 3~5 分钟;选项 D 有感染症状;选项 E 为突发性的一侧胸痛,可伴胸闷,面色苍白,大汗,心率增快,血压下降。多见于瘦长体型的年轻人。

涉及考点 | 心肌梗死的诊断

64.患者,男,62 岁。乙肝病史 6 年,呕血 1 天。检查:腹壁静脉曲张,肝肋下未触及,脾肋下 3 cm,腹水征(+). HBsAg(+),白蛋白降低,A/G<1,丙氨酸氨基转移酶升高。其诊断为

- A.慢性肝炎
- B.肝硬化合并上消化道出血
- C.消化性溃疡合并上消化道出血
- D.白血病
- E.原发性肝癌

【答案】B

【解析】患者有乙肝病史 6 年,HBsAg(+);检查已有侧支通路的建立如腹壁静脉曲张;门脉高压表现如脾肋下 3 cm,腹水征(+),且肝功能明显受损,白蛋白降低,A/G<1,丙氨酸氨基转移酶升高。所以诊断肝硬化晚期。现在出现呕血,最有可能的是食管胃底静脉网压力过高,破裂出血。

涉及考点 | 肝硬化的并发症

65.患者,女,41 岁。有风心病史 5 年,近半月来胃纳差,恶心,呕吐,肝区疼痛,尿少。查体:颈静脉怒张,心尖区可闻及舒张期杂音,三尖瓣区可闻及收缩期杂音,肝肋下 2 cm。应首先考虑的疾病是

- A.肝炎
- B.右心衰竭

- C.左心衰竭
D.肝硬化
E.全心衰竭

【答案】B

【解析】心尖区可闻及舒张期杂音为二尖瓣狭窄的特征。颈静脉怒张、肝肋下 2 cm 为体循环淤血、右心衰竭的表现。同时还有因体循环淤血导致的胃肠道功能紊乱。选项 A、D 无心脏杂音表现；选项 C 为肺循环淤血，表现应为端坐呼吸、咳嗽咳痰、粉红色泡沫痰、胸闷心慌、呼吸困难等。

涉及考点 | 慢性心力衰竭的临床表现

66.患者,女,32岁。近两年来间断发生尿路刺激症状,不发热,尿液检查可见白细胞与颗粒管型。应首先考虑的是

- A.急性肾炎
B.慢性肾炎
C.慢性肾盂肾炎
D.急性肾盂肾炎
E.急性膀胱炎

【答案】C

【解析】肾盂肾炎常见于女性,致病菌可经短而直的尿道口逆行性感染,临床表现为尿路刺激征,尿检见炎症细胞与颗粒管型。

涉及考点 | 尿路感染的诊断

(67~68题共用备选答案)

- A.瞳孔扩大
B.瞳孔缩小
C.瞳孔呈白色
D.两瞳孔大小不等
E.瞳孔形状不规则

67.有机磷农药中毒的瞳孔变化是

【答案】B

涉及考点 | 急性有机磷杀虫药中毒

68.阿托品中毒的瞳孔变化是

【答案】A

【解析】病理情况下,瞳孔缩小,见于虹膜炎症、中毒(有机磷类农药)、药物反应(毛果芸香碱、吗啡、氯丙嗪)等。瞳孔扩大见于外伤、颈交感神经刺激、青光眼绝对期、视神经萎缩、药物影响(阿托品、可卡因)等。双侧瞳孔大小不等:常提示有颅内病变,如脑外伤、脑肿瘤、中枢神经梅毒、脑疝等。

涉及考点 | 阿托品和有机磷农药中毒

2年 易错考题

1.患者,男,25岁。发作性干咳3个月,伴有夜间胸闷,无发热、咯血,查体双肺未闻及干湿啰音。为明确诊断应首选的检查是

- A.胃镜
B.X线胸片
C.肺功能
D.心电图
E.心脏彩超

【答案】B

【解析】原发性肺癌常以阵发性刺激性干咳为首发症状,其预后取决于能否做到“三早”,即早发现,早诊断,早治疗。影像学、细胞学和病理学检查是诊断肺癌的重要方法。其中X线胸片为常规检查方法。

涉及考点 | 原发性支气管肺癌的实验室检查及其他检查

2.患者,男,55岁。慢性支气管炎病史5年,近2~3个月咳嗽加重,痰中持续带血,伴胸闷、气急、胸线检查见肺门阴影增大。应首先考虑的是

- A.肺炎
- B.原发性支气管肺癌
- C.肺脓肿
- D.肺结核
- E.慢性支气管炎

【答案】B

【解析】该患者中老年男性,有慢性支气管炎病史,近期有咳嗽、痰中带血,并有胸闷、气急、胸痛等,X线见肺门阴影增大,考虑原发性支气管肺癌可能性大。选项A为肺纹理增粗、紊乱;选项C、D、E应有发热。

涉及考点 | 原发性支气管肺癌的诊断

3.患者,男,59岁。近1个月来,因上腹部不适,食欲减退,体重减轻而疑诊为胃癌。为确诊,首选的检查方法是

- A.癌胚抗原测定
- B.大便隐血试验
- C.X线钡餐检查
- D.胃液分析
- E.胃镜检查

【答案】E

【解析】胃癌不一定见癌胚抗原测定、胃液分析、大便隐血试验、X线钡餐异常,胃镜为诊断早期胃癌的特异性检查。

涉及考点 | 胃癌的实验室检查及其他检查

4.各类原因引起的休克的共同点是

- A.血压下降
- B.有效循环血量的急剧减少
- C.皮肤苍白
- D.四肢湿冷
- E.脉搏加速

【答案】B

【解析】休克是机体遭受强烈的致病因素侵袭后,由于有效循环血量锐减,组织和重要器官血液灌注不足,导致身体内细胞受损、代谢紊乱、器官功能障碍的一种病理状态。

涉及考点 | 休克的临床表现

5.我国肝硬化最主要的病因是

- A.病毒性肝炎
- B.营养不良
- C.慢性酒精中毒
- D.心力衰竭
- E.慢性细菌性痢疾

【答案】A

【解析】肝硬化的病因:①病毒性肝炎,在我国最为常见,慢性乙型、慢性丙型肝炎均可发展成肝硬化,乙肝合并丙肝则可加速肝硬化的进程。②慢性酒精中毒,主要发生在欧美国家。③非酒精性脂肪性肝炎。④化学药物或毒物。⑤长期胆汁淤积。⑥遗传和代谢性疾病⑦肝淤血,主要由慢性充血。⑧免疫紊乱。

涉及考点 | 肝硬化的病因病机

6. 患者,男,60岁。高血压病史15年,突发剧烈头痛,眩晕,恶心,呕吐,失语。查体:无肢体活动障碍,血压200/120 mmHg,神经反射正常。应首先考虑的是

- A. 急进型高血压
- B. 缓进型高血压
- C. 高血压脑病
- D. 高血压性脑出血
- E. 高血压性心脏病

【答案】C

【解析】患者发病时血压力200/120 mmHg,结合发作时眩晕、失语的表现,可诊断为高血压脑病。肢体活动无障碍,神经反射正常,排除选项D;无心脏损伤的直接证据,排除选项E。

涉及考点 | 原发性高血压的并发症

7. 患者,男,65岁。慢性支气管炎及高血压病史10年,近半年活动后自觉气短。检查:血压160/95 mmHg,心脏听诊未闻及器质性杂音,两肺听诊无异常,心电图及X线显示左心室增大,应首先考虑的是

- A. 冠心病
- B. 高血压性心脏病
- C. 风心病
- D. 肺心病
- E. 病毒性心肌炎

【答案】B

【解析】患者有长期高血压病史,左心室增大,为长期后负荷增加所致。本患者亦有长期慢性支气管炎史,但肺心病常导致右心室肥大、右心衰,排除D;A、C、E与本题关系不大。

涉及考点 | 原发性高血压的并发症

8. 患者,男,50岁。高血压病史10年,今日剧烈头痛,眩晕,恶心,呕吐。查体:无肢体活动障碍,血压200/120 mmHg。为快速降压,应选择下列哪种药物治疗

- A. 硝普钠
- B. 心得安
- C. 硝苯吡啶
- D. 降压灵
- E. 复方降压片

【答案】A

【解析】患者长期高血压病史,此次发病时血压200/120 mmHg,结合发作时临床表现,可诊断为高血压危重症。此时为快速降压首选能直接扩张动静脉的硝普钠,降压迅速、效果显著。

涉及考点 | 原发性高血压的治疗

9. 患者,男,40岁。十二指肠溃疡病史15年,近2个月来自感头痛、眩晕而就诊。检查:血压160/100 mmHg,诊断为高血压,下列降压药应慎用的是

- A. 利血平
- B. 硝苯地平
- C. 氢氯噻嗪
- D. 胍苯酞嗪
- E. 卡托普利

【答案】A

【解析】利血平为一种吲哚型生物碱,根据其药理学特性,有精神抑郁性疾病或病史者、有溃疡病病史者、急性局限性肠炎、溃疡性结肠炎、帕金森综合征者禁用。

涉及考点 | 原发性高血压的治疗

10. 下列各项,不属于慢性肾炎基本的表现是

- A. 蛋白尿
B. 血尿
C. 高血压
D. 水肿
E. 管型尿

【答案】E

【解析】慢性肾炎表现为血尿、蛋白尿、高血压、水肿、肾功能不全。具体情况如下：①血尿：以阶段性肉眼血尿，持续性镜下血尿为主要特点，相差镜检畸形红细胞比例较高。②蛋白尿：以球性蛋白尿为主，可见中大分子蛋白尿。重者表现为明显水肿，合并肾功能不全、感染等并发症，称为肾病综合征。③水肿：以面部水肿为主的肾炎性水肿，也可以下肢至全身的肾病性水肿为主。④肾性高血压。⑤肾功能不全：病程迁延，最终导致尿毒症。

涉及考点 | 慢性肾炎的临床表现

(11~12 题共用题干)

患者，女，45 岁。确诊为 2 型糖尿病。平时口服二甲双胍治疗，空腹血糖 6.8 mmol/L 左右，昨日下午运动后出现上腹部隐痛，无腹泻，伴有乏力、发热、腋测法体温 38.0℃，自行服用百服宁 1 片。今晨出现右下腹部疼痛，并逐渐加重，伴有口干，多饮。查体：急性病容，肺部未闻及啰音，右下腹部压痛及反跳痛(+)，伴腹肌紧张，肠鸣音正常。血常规：白细胞 $13 \times 10^9/L$ ，血糖 19.3 mmol/L，血酮体(-)，血 pH 值 7.36。

11. 该患者目前血糖明显升高的原因是

- A. 降糖药物用量不足
B. 饮食不当
C. 体温升高
D. 合并感染
E. 服用百服宁

【答案】D

涉及考点 | 糖尿病并发症常见的诱因

12. 该患者目前应联合使用的降糖药物是

- A. 格列吉特
B. 阿卡波糖
C. 吡格列酮
D. 瑞格列奈
E. 短效胰岛素

【答案】E

【解析】胰岛素治疗各种严重的糖尿病急性或慢性并发症。

涉及考点 | 口服降糖药物治疗

13. 患者，女，40 岁。3 年前发现患有风湿性心脏病，近半年体力活动明显受限，轻度活动即出现心悸，气短。其心功能为

- A. I 级
B. II 级
C. III 级
D. IV 级
E. 以上均非

【答案】C

【解析】心功能分级：I 级：患者患有心脏病但活动不受限制，平时一般活动不引起疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛。II 级：心脏病患者的体力活动受到轻度的限制，休息时无自觉症状，但平时一般活动下可出现疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛。III 级：心脏病患者体力活动明显受限，小于平时一般活动即可引起上述的症状。IV 级：心脏病患者不能从事任何体力活动，休息状态下也出现心衰的症状，体力活动后加重。

涉及考点 | 心功能分级

14. 患者,男,45岁。近日发现大便色黑,伴不规则上腹痛。检查:左锁骨上窝触及1个1 cm×1.2 cm大小的淋巴结,质硬,大便隐血试验(+++)。首先考虑的是

- A. 消化性溃疡病
- B. 胆道感染合并出血
- C. 胃癌
- D. 血小板减少性紫癜
- E. 肝硬化

【答案】C

【解析】患者大便色黑、大便隐血试验(+++),为量较多的上消化道出血,同时伴有不规则上腹痛,左锁骨上窝触及肿大的淋巴结,胃癌常见的淋巴结转移就是左锁骨上淋巴结。

涉及考点 | 胃癌的诊断

15. 患者,女,30岁。有风湿性关节炎病史。检查:心尖部可听到4级收缩期杂音,X线显示左心房、左心室增大。应首先考虑的心瓣膜病变是

- A. 二尖瓣关闭不全
- B. 二尖瓣狭窄
- C. 主动脉瓣关闭不全
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 肺动脉瓣狭窄

【答案】A

【解析】心尖部可听到4级收缩期杂音,为左心室收缩时血液通过二尖瓣反流至左心房,故左心房增大。长期反流将导致左心室有效泵血量不够而发生左心室代偿性肥大,所以本题考虑为风心病导致二尖瓣关闭不全。

涉及考点 | 二尖瓣关闭不全的诊断

(16~17题共用备选答案)

- A. 急性粒细胞白血病
 - B. 急性淋巴细胞白血病
 - C. 慢性粒细胞白血病
 - D. 慢性淋巴细胞白血病
 - E. 慢性再生障碍性贫血
16. VP方案常用于治疗

【答案】B

17. HOAP方案常用于治疗

【答案】A

【解析】VP方案即长春新碱+泼尼松,主要用于急性淋巴细胞性白血病的诱导化疗。HOAP方案包括三尖杉酯碱、阿霉素及泼尼松,主要用于急性粒细胞白血病的化疗。慢性粒细胞白血病常用治疗药物是马利兰、靛玉红等;慢性淋巴细胞白血病常用瘤可宁治疗;慢性再障常用雄激素等治疗。

涉及考点 | 急性白血病的治疗

18. 患者,男,42岁。既往脾大,HBsAg阳性。今晨排柏油样便约200 mL。应首先考虑的是

- A. 急性糜烂性胃炎
- B. 消化性溃疡
- C. 肝硬化
- D. 白血病
- E. 胃癌

【答案】C

【解析】患者有乙肝病史,且已出现肝硬化门脉高压的临床表现——脾大。柏油样便应考虑食管-胃底侧支循环内压力过高破裂出血的结果。A、B胃肠道出血量少,很少出现柏油样

便;D可有脾大,但无上述其他症状;E不会出现脾大,且与乙肝无关。

涉及考点 | 肝硬化的诊断

19.患者巨大脾脏,白细胞计数显著增高,可达 $500 \times 10^9/L$,并见少许各种幼稚粒细胞,血小板计数极度增多。治疗应首选

- A.VP 方案
- B.HOAP 方案
- C.雄性激素
- D.马利兰
- E.强的松

【答案】D

【解析】从病例描述可知该患者为慢性粒细胞性白血病,治疗可采用HOAP方案及马利兰,但本例中患者血小板计数极度增多,马利兰尤其可用于血小板极度增多的病例。

涉及考点 | 急性白血病的治疗

20.患者,男,45岁。因突然呕血入院。10年前患乙肝,因肝功能损害曾多次住院治疗。近感腹胀,乏力。查体:脾肿大,腹水,应首先考虑的是

- A.肺结核慢性空洞咯血
- B.胃溃疡出血
- C.急性支气管炎出血
- D.十二指肠溃疡出血
- E.肝硬化,食管下端静脉丛破裂出血

【答案】E

【解析】该患者为中老年男性,曾有肝脏疾病,近期呕血、腹胀、乏力、脾大、腹水,考虑肝硬化并发上消化道出血可能性大。选项A、B、C、D无腹水体征。

涉及考点 | 肝硬化的并发症

21.与Graves病无关的因素是

- A.体液免疫
- B.遗传因素
- C.细胞免疫
- D.高功能性甲状腺腺瘤
- E.慢性淋巴细胞甲状腺炎

【答案】E

【解析】Graves病也就是弥漫性甲状腺肿伴甲亢,是器官特异性自身免疫反应性疾病。Graves病的典型表现是高代谢症候群、甲状腺肿大和突眼,发病原因包括:①遗传,Graves病具有遗传易感性,家族中常合并有其他自身免疫反应性甲状腺疾病。②免疫反应,Graves病可在某些细菌感染的情况下发生免疫反应,出现促甲状腺激素受体抗体,也就是TRAb阳性,刺激甲状腺滤泡细胞增生、肥大,分泌甲状腺激素增多。③雌激素,Graves病患者以女性多见,尤其是育龄期女性,其发病原因可能与雌激素水平增高有关。④精神创伤,严重应激,精神过度兴奋、抑郁均可导致甲状腺激素分泌异常,可能会诱发Graves病。

涉及考点 | 弥漫性甲状腺肿伴甲亢的病因

22.患者,男,42岁。乙肝病史10年,近2个月右上腹压痛加重。检查:面部有蜘蛛痣,右上腹压痛,肝肋缘下3cm,质硬,ALT 40 U,HBsAg(+),AFP 500 $\mu\text{g/L}$ 。应首先考虑的是

- A.慢性乙肝活动期
- B.乙肝合并肝硬化
- C.乙肝合并胆囊炎
- D.原发性肝癌
- E.继发性肝癌

【答案】D

【解析】患者有10年乙肝病史,且HBsAg(+);体检发现蜘蛛痣、右上腹压痛、肝大、质硬,

为肝硬化表现;查 AFP 升高,故首先考虑为乙肝-肝硬化-原发性肝癌这三阶梯,目前已达第三阶段。排除选项 A、B。HBV 是我国原发性肝癌的重要致病因素之一。需要指出的是,AFP 诊断肝细胞癌的标准应为:AFP>500 μg/L,持续 4 周,或>200 μg/L 持续 8 周。选项 C、E 与该病例无关。

涉及考点 | 原发性肝癌的诊断

23. 患者,女,26 岁,已婚。突发尿痛、尿频、尿急,腹痛半天。检查:肾区无叩痛,尿中白细胞(++),菌培养为大肠埃希菌。其诊断是

- A. 急性肾盂肾炎
- B. 肾结核
- C. 急性膀胱炎
- D. 肾结石
- E. 慢性肾炎

【答案】C

【解析】急性膀胱炎发病急骤,常在过于劳累、受凉、长时间憋尿、性生活后发病,病程一般持续 1~2 周自行消退或治疗后消退。其特点是发病“急”、炎症反应“重”、病变部位“浅”。常见的症状有尿频、尿急、尿痛、脓尿和终末血尿,甚至全程肉眼血尿。患者肾区无叩击痛,排除选项 A、B、D、E;尿中白细胞(++),菌培养为大肠埃希菌,排除选项 B、E;急性起病,排除选项 B、D、E。

涉及考点 | 尿路感染的诊断

24. 患者,女,30 岁。尿频、尿痛 2 天。检查:体温 38℃,右肾区叩击痛,尿蛋白(±),尿中红细胞 2~4/HP,白细胞 20~30/HP。应首先考虑的是

- A. 急性膀胱炎
- B. 急性肾炎
- C. 急性肾盂肾炎
- D. 尿道综合征
- E. 右肾结石

【答案】C

【解析】选项 A 无肾区叩击痛。选项 B 临床上表现为急性起病,以血尿、蛋白尿、水肿、高血压和肾小球滤过率下降为特点的肾小球疾病。选项 D 反复发作尿频、尿急、尿痛、排尿困难等症状,而尿常规化验正常,中段尿培养无细菌生长,其发病快、消失也快,呈周期性发作,发作周期不定。选项 E 为突然发作的阵发性刀割样疼痛,疼痛剧烈难忍,有时有大汗、恶心呕吐。可有肉眼血尿,结石并发感染时,尿中出现脓细胞,有尿频、尿痛症状。

涉及考点 | 尿路感染的诊断

25. 抑制尿酸合成的药物是

- A. 别嘌醇
- B. 苯溴马龙
- C. 秋水仙碱
- D. 吡罗美辛
- E. 泼尼松

【答案】A

【解析】别嘌醇主要通过抑制黄嘌呤氧化酶,使尿酸的生成减少,从而降低尿酸浓度,适用于尿酸生成过多或不适合使用排尿酸药物者。

涉及考点 | 抑制尿酸的药物

26. 不属于贫血常见的体征是

- A. 皮肤黏膜苍白
- B. 心率增快
- C. 心尖部收缩期杂音
- D. 匙状指

E.出血倾向

【答案】E

【解析】贫血主要指的是血红蛋白低于正常范围下限的一种常见的临床症状。贫血的症状主要和贫血发生的速度,以及呼吸、循环等系统的代偿能力和耐受能力有关系。临床上常见的症状有头晕、头痛、失眠、多梦、全身乏力等症状。有时可以发现皮肤粘膜明显的苍白,主要表现在甲床、眼睑等部位。另外还有心悸、心率加快,特别是活动后明显,休息后症状可以稍微减轻。有时可以影响到消化系统引起消化不良,出现腹胀、食欲减退等症状。

涉及考点 | 贫血的体征

(27~29 题共用题干)

患者,男,35岁。确诊甲状腺功能亢进症2年余,按医嘱服用抗甲状腺药物治疗,病情缓解,后来因自觉症状缓解自行停用抗甲状腺药物,随后出现心悸、气短、多汗,恶心等症状。查体见双侧眼球外凸明显,巩膜无黄染,甲状腺弥漫性Ⅱ度肿大,心率120次/分。实验室检查:FT₃、FT₄中度升高,TSH明显降低,血WBC $2.9 \times 10^9/L$ 。

27.该患者血WBC明显降低应首先考虑的病因是

- A.再生障碍性贫血
- B.急性白血病
- C.甲状腺毒症表现
- D.抗甲状腺药的不良反应
- E.营养不良

【答案】D

【解析】治疗期每4周复查一次血清甲状腺激素水平,维持期每2个月复查一次血清甲状腺激素。不良反应有粒细胞减少、药疹和中毒性肝病。

涉及考点 | 甲状腺功能亢进的治疗

28.该患者目前最适宜的治疗是

- A.抗甲状腺药物治疗
- B.复方碘溶液
- C.甲状腺手术治疗
- D.糖皮质激素
- E.放射性¹³¹I

【答案】E

【解析】放射性¹³¹I治疗,安全简便,临床治愈率高,复发率低。适应证:成人GD伴甲状腺肿大Ⅱ度以上。②ATD治疗失败或过敏。③甲亢手术后复发;④甲状腺毒症心脏病或甲亢伴其他病因的心脏病;⑤甲亢合并白细胞和(或)血小板减少或全血细胞减少;⑥甲亢合并肝、肾等脏器损害;⑦拒绝手术治疗或有手术禁忌证者;⑧浸润性突眼者。

涉及考点 | 甲状腺功能亢进的治疗

29.该患者目前重要的对症治疗是

- A.加强支持治疗
- B.预防感染
- C.应用β受体阻滞剂
- D.应用镇静剂
- E.输血治疗

【答案】C

【解析】β受体阻滞剂适用于各类甲亢,但主要在药物治疗的初治期使用,可控制心动过速等临床症状。也用于甲状腺危象、¹³¹I治疗前后及手术前准备。

涉及考点 | 甲状腺功能亢进的治疗

第十二篇 传染病学

考情分布图

		2015	2016	2017	2018	2019
传染病学	传染病学总论	5	5	1	2	2
	病毒感染	7	7	7	6	6
	细菌感染	4	5	6	3	3
	消毒与隔离	1	1	0	0	0

高频考点必背

1. 在感染过程中出现的各种不同表现称为感染谱,有五种表现形式:**病原体被清除**; **隐性感染**; **显性感染**; **病原携带状态**; **潜伏性感染**。

2. **变态反应**,是机体对某些抗原初次应答后,再次接受相同抗原刺激时,发生的一种以机体生理功能紊乱或组织细胞损伤为主的**特异性免疫应答**。

3. **人群易感性增高的因素**:①新生儿增加、非流行区人口迁入、免疫人群减少等。②许多传染病(包括隐性感染)流行或人工免疫后经一段时间,其免疫力逐渐降低。③新的传染病出现或传入。

4. 流行病学特征主要指传染病的**流行性**、**季节性和地方性**,还包括在不同人群(年龄、性别、职业等)中的分布特点。

5. 发热热型是传染病的重要特征之一,具有鉴别诊断意义。常见热型有:**稽留热**、**弛张热**、**间歇热**、**回归热**、**波浪热**、**不规则热**等。

6. 发疹许多传染病在病程中有皮疹出现,称为发疹性传染病。皮疹的类型有**斑疹**、**丘疹**、**斑丘疹**、**出血疹**、**疱疹**、**脓疱疹**、**荨麻疹**等。

7. **麻疹**先见于耳后、面部,然后由躯干、四肢蔓延到手足心。**水痘**集中于躯干,呈向心性分布。**伤寒玫瑰疹**数量少,主要见于胸腹部。水痘、风疹多在病程的第1日出疹,猩红热于第2日,天花于第3日,麻疹于第4日,斑疹伤寒于第5日,伤寒于第6日出疹。

8. **白细胞总数正常或减少主要见于**:①革兰阴性杆菌感染,如布鲁菌病、结核病、伤寒与副伤寒。②多数病毒感染性疾病,如流行性感、传染性非典型肺炎、高致病性禽流感病毒感染、登革热等。③原虫感染,如疟疾、黑热病等。

9. **病原体的直接检出或分离培养**是传染病病原学诊断的“金指标”。

10.《中华人民共和国传染病防治法》把传染病分为**甲类**、**乙类**和**丙类**,实行分类管理。甲类为强制管理传染病,包括**鼠疫**和**霍乱**,乙类为严格管理传染病,丙类属监测管理传染病。

11. **切断传播途径**通常是起主导作用的预防措施。

12. 肝炎病毒是指侵入机体后主要感染肝脏并以引发肝脏炎性损害为主的病毒。目前已知的肝炎病毒有**甲**、**乙**、**丙**、**丁**、**戊**五型。

13. 肝细胞是**HCV 复制**的主要场所,但也可在外周血单个核细胞内复制及存储。

14.甲、戊型肝炎的传染源主要是急性期患者和亚临床感染者。病毒主要通过粪便排出体外,发病前2周至发病后2~3周内具有传染性,而以发病前后各1周的传染性最强。

15.乙、丙、丁型肝炎的传染源是相应的急、慢性患者及病毒携带者。

16.甲、戊型肝炎主要经粪-口途径传播。粪便中排出的病毒通过污染手、水、食物等经口感染。

17.急性肝炎肝脏肿大,表面光滑。镜下可见:肝细胞变性和坏死,以气球样变最常见,伴局部以淋巴细胞为主的炎性细胞浸润。

18.淤胆型肝炎有轻度急性肝炎的组织学改变,伴以明显的肝内淤胆现象:毛细胆管及小胆管内有胆栓形成,肝细胞浆内亦可见到胆色素游滞。

19.急性重型肝炎肉眼见肝脏体积明显缩小,边缘锐薄,质地柔软,包膜皱缩。

20.肝硬化的影像学表现:B超检查可见肝脏缩小,肝表面明显凹凸不平,呈锯齿状或波浪状,肝边缘变钝,肝实质回声不均、增强,门静脉和脾静脉内径增宽,腹腔内可见液性暗区。

21.肝病时氨基转移酶测定实际上是反映肝细胞损伤情况,且较敏感,ALT为目前诊断肝炎最有价值的酶活力测定。

22.抗-HD抗-HD IgM阳性是HDV现症感染的标志,急性HDV感染者抗-HD IgM一过性升高;慢性HDV感染者抗-HD IgM升高多为持续性,并有高滴度的抗-HD IgG阳性。

23.干扰素:目前常用的是IFN,具有抗病毒及免疫调节作用,包括普通干扰素和聚乙二醇干扰素。

24.利巴韦林(病毒唑)与IFN合用可明显增加丙型肝炎的疗效,但单用利巴韦林治疗无清除病毒的作用。

25.Peg-IFN与利巴韦林联合应用是目前治疗慢性丙型肝炎的最佳方案。

26.流感病毒不耐热,100℃1分钟或56℃30分钟灭活,对常用消毒剂及紫外线敏感,耐低温和干燥,真空干燥或-20℃以下仍可存活。

27.甲型流感常引起暴发流行,乙型流感呈局部流行或散发,亦可大流行,丙型以散发为主。

28.流感在流行病学上最显著的特点为:突然暴发,迅速蔓延,波及面广,具有一定的季节性,一般流行3~4周后会自然停止。

29.布鲁菌病又称波状热,是布鲁菌感染引起的自然疫源性疾病,临床上以长期发热、多汗、乏力、肌肉和关节疼痛、肝、脾及淋巴结肿大为主要特点。

30.流感高危人群包括:年龄超过65岁;有慢性肺或心血管系统疾病(包括哮喘)的成人和6个月以上的儿童;肾功能障碍者;免疫功能抑制(包括药物性)者;妊娠中期以上孕妇等。

31.人感染高致病性禽流感病理改变以肺部最明显,可见到肺泡和支气管黏膜损伤严重,肺实质出血和坏死,肺泡内大量淋巴细胞浸润,有严重的弥漫性损伤,并伴有间隔纤维形成。

32.接触人禽流感患者应戴口罩、戴手套、穿隔离衣。接触后应洗手。要加强检测标本和实验室禽流感病毒毒株的管理,严格执行操作规范,防止医院感染和实验室的感染及传播。

33.开放性肺结核患者的排菌是结核传播的主要来源。

34.艾滋病期为感染HIV后的最终阶段。患者CD⁴⁺T淋巴细胞计数明显下降,HIV血浆病毒载量明显升高。

35.流行性出血热发热期常有典型的“三痛”:头痛、腰痛、眼眶痛,常伴较突出的胃肠道症状。

36. 艾滋病期可并发各系统的各种机会性感染及恶性肿瘤。呼吸系统**卡氏肺孢子菌肺炎**(PCP)最为常见。

37. 流行性出血热典型患者的临床经过可分为**发热期、低血压休克期、少尿期、多尿期及恢复期**等五期。

38. 流行性出血热的基本病理变化为全身小血管和毛细血管内皮细胞变性、坏死。以**肾脏**病变最明显,其次是**心、肝、脑**等脏器。

39. 流行性出血热应用**RT-PCR检测汉坦病毒RNA**,敏感性高,有早期诊断价值。

40. 流行性出血热早发现,早休息,早治疗和少搬动(“**三早一少**”)是关键。治疗以综合疗法为主,早期可应用抗病毒治疗。治疗中要注意防治休克、出血、肾衰竭和继发感染。

41. 流行性出血热低血压休克期主要是**抗休克**,力争稳定血压,预防重要脏器衰竭。

42. 流行性出血热病程中应**积极防治腔道大出血、心衰、肺水肿、急性呼吸窘迫综合征及各种继发感染**等。

43. **带狂犬病毒的动物**是主要传染源,我国由病犬传播的狂犬病占80%~90%,其次为猫和狼。

44. 狂犬病主要通过**被患病动物咬伤**传播。**黏膜**也是病毒的重要侵入门户,如眼结膜被病兽唾液玷污、肛门黏膜被狗舐等。

45. 狂犬病潜伏期长短不一,短的5日,最长可达10年以上,一般**1~3个月**。儿童、头面部咬伤、伤口深者潜伏期短。此外,与入侵病毒的数量、毒力及宿主的免疫力也有关。

46. 狂犬病兴奋期表现为**极度恐惧、恐水、恐风**。恐水是本病的特殊症状,但不一定每例都出现,典型表现在饮水、见水、听流水声或谈及饮水时,可引起严重咽喉肌痉挛。

47. 狂犬病是所有传染病中最凶险的疾病,一旦发病,预后极差。目前无特效治疗方法,强调在咬伤后及时预防性治疗,对发病者以对症综合治疗为主。

48. **狂犬病伤口的处理**:被咬伤者要及时处理伤口。在咬伤的当时,先局部挤压、针刺使其尽量出血,再用20%肥皂水充分冲洗创口,后用5%碘酊反复涂拭。

49. 我国是狂犬病流行地区,凡是被犬咬伤或被其他动物咬伤、抓伤者或医务人员的皮肤破损处被狂犬病患者唾液污染时,均需作**暴露后预防接种**。

50. 流行性乙型脑炎是**人畜共患**的自然疫源性疾,人和动物感染乙脑病毒后可发生病毒血症,成为传染源。

51. 流行性乙型脑炎——**人不是主要的传染源,猪是本病主要的传染源**。蝙蝠可作为本病的长期储存宿主和传染源。

52. 乙脑主要通过**蚊虫叮咬**而传播。在我国三带喙库蚊是主要的传播媒介,其次是东方伊蚊和中华按蚊。

53. 乙脑发病人群以**10岁以下**儿童为主,尤以**2~6岁**儿童发病率为高。近年由于儿童和青少年广泛接种疫苗,发病率已明显下降,成人和老年人的发病率相对增加。

54. 乙脑为全身性感染,但主要病变在中枢神经系统,脑组织病变范围广,以**大脑皮质、间脑和中脑病变**最为严重,可累及脊髓。

55. **呼吸衰竭**为乙脑最严重的表现之一,也是最主要的死亡原因,多见于深度昏迷的患者。主要为中枢性呼吸衰竭。

56. **高热、抽搐和呼吸衰竭**是乙脑极期的严重表现,三者常相互影响,互为因果。

57. 中毒型菌痢与乙脑均多发生于**夏秋季**,10岁以下儿童多见,但起病较乙脑更急,常在发

病**24小时内**迅速出现高热、抽搐、意识障碍和循环衰竭。

58.化脓性脑膜炎患者脑膜刺激征显著,脑脊液外观混浊,细胞数常在 $1\ 000\times 10^9/L$ 以上,中性粒细胞占90%以上,蛋白明显升高,糖明显降低,**脑脊液及血液细菌学检查**可找到相应的病原菌。

59.乙脑患者应住院隔离于有防蚊设施的病室,控制室温在**30℃以下**。昏迷患者应注意口腔及皮肤清洁,定时翻身、拍背、吸痰,防止继发肺部感染和褥疮发生。

60.乙脑中枢性呼吸衰竭可用呼吸兴奋剂,首选**山梗菜碱**,成人每次3~9 mg,小儿每次0.5~0.2 mg/kg,静脉注射或滴注。

61.脑膜炎奈瑟菌属**奈瑟菌属**,革兰染色阴性双球菌,呈肾形或卵圆形,有荚膜,无芽孢。

62.流行性脑脊髓膜炎人群普遍易感,但新生儿有来自母体的特异性抗体,成人则从多次流行过程中隐性感染获得免疫,故发病以15岁以下少年儿童多见,**尤以6个月至2岁的婴幼儿高发**。

63.流行性脑脊髓膜炎遍及全世界,我国各地区均有病例发生。全年散发,但以**冬春季**高发,一般发病集中在**11月至来年5月,3、4月份为高峰**。

64.流行性脑脊髓膜炎败血症期,主要病变为**血管内皮损害、血管壁炎症、坏死和血栓形成及血管周围出血**。

65.脑膜炎期的病变以**软脑膜**为主。早期主要以血管充血、少量浆液性渗出及局灶性小出血多见,进一步发展则见大量纤维蛋白、中性粒细胞及血浆外渗,脑脊液混浊,呈化脓性改变。

66.流脑败血症期患者**突发寒战、高热、头痛、呕吐、全身乏力、肌肉酸痛及精神萎靡**等症状。

67.流脑脑膜炎期**高热及毒血症持续**,出现中枢神经系统表现,患者头痛欲裂,呕吐频繁,血压增高,脉搏减慢,烦躁或谵妄,脑膜刺激征阳性,严重者可出现**呼吸或循环衰竭**。

68.流脑暴发型中休克型急骤起病,寒战高热,头痛,精神萎靡,**常于短期(12小时)内出现遍及全身的淤点、淤斑**,且迅速扩大融合成片,并伴中央坏死。

69.流脑暴发型中脑膜脑炎型主要以**中枢神经系统**表现为主。患者除高热、剧烈头痛、喷射样呕吐外,意识障碍加深,且迅速陷入昏迷,频繁惊厥,锥体束征阳性,血压可持续升高。

70.普通型流脑的治疗**青霉素**为首选药,较大剂量青霉素能使脑脊液内药物达到有效浓度。

71.**头孢菌素类第三代头孢菌素**对脑膜炎奈瑟菌抗菌活性高,易通过血脑屏障。C群菌株可作为首选。常用**头孢噻肟或头孢曲松**等静脉滴注。

72.暴发型流脑的治疗:**休克型抗休克治疗**:①补充血容量,改善微循环。②纠正酸中毒。③充分供氧;④经过上述处理,如休克仍未纠正,可应用血管活性药物:山莨菪碱(654-2)。

73.流脑的预防:**早发现、早隔离、早治疗**。患者一般隔离至症状消失后**3日**,密切接触者应医学观察**7日**。

74.**伤寒患者和带菌者**是本病传染源。患者自潜伏期开始即有传染性,病后2~4周传染性最强。少数患者病后可成为长期带菌者,持续带菌超过3个月者称为慢性带菌者。

75.伤寒主要经**粪-口**途径传播。

76.伤寒初期缓慢起病,**发热**是最早出现的症状,体温呈**弛张热**型,逐渐上升,于3~7日内达39℃或以上。常伴有头痛、全身不适、乏力、食欲减退、腹部不适等症。

77.伤寒极期神经系统表现为**特殊的中毒面容**,表情淡漠、反应迟钝、听力减退,重者可有

谵妄、抓空、昏迷或出现脑膜刺激征(虚性脑膜炎)。

78. 伤寒暴发型**起病急,进展迅速,病情重**。表现为突发超高热或体温不升,中毒症状重,血压下降,常并发中毒性脑病、中毒性心肌炎、中毒性肝炎、休克、DIC、肠麻痹等,皮疹多显著。预后凶险。

79. 伤寒治疗:隔离与休息给予消化道隔离,临床症状消失后每周1次、连续2次粪便培养阴性方可解除隔离,一年内应定期随访。**发热期患者必须卧床休息**。

80. 伤寒病原治疗**氟喹诺酮类**是首选。

81. **头孢菌素类第三代头孢菌素**在体外对伤寒杆菌有强大抗菌活性,体内分布广,胆汁浓度高,不良反应少,尤其适用于孕妇、儿童、哺乳期妇女等患者。

82. **切断传播途径**是预防伤寒的关键措施。搞好“三管一灭”(管理饮食、水源、粪便,消灭苍蝇),养成良好的个人卫生习惯。

83. 细菌性痢疾主要经**粪-口**途径传播。

84. 菌痢的主要病变部位是**乙状结肠和直肠**,严重者可以波及整个结肠甚至回肠末端。

85. 典型菌痢起病急,**发热(39℃或更高)、腹痛、腹泻、里急后重、黏液或脓血便**,并有头痛、乏力、食欲减退等全身中毒症状。

86. 中毒型菌痢多见于**2~7岁儿童**。起病急骤、发展快、病势凶险。**突起畏寒、高热,全身中毒症状重**,可有烦躁或嗜睡、昏迷及抽搐等,数小时内可迅速发生循环衰竭或呼吸衰竭。

87. 急性菌痢反复发作或迁延不愈达**2个月以上**者为慢性菌痢。

88. 细菌培养粪便培养出**志贺菌**是确诊的主要依据。应在使用抗菌药物前采集新鲜标本,取脓血部分及时送检,早期多次送检可提高阳性率。

89. 急性菌痢病因治疗:**氟喹诺酮类**为首选,儿童、孕妇及哺乳期患者应慎用。常用的有环丙沙星、左氧氟沙星、加替沙星等,不能口服者可静脉滴注。

90. 目前我国流行的霍乱弧菌以**埃尔托生物型、异型**为主。

91. 霍乱主要经**粪-口**途径传播。患者吐泻物和带菌者粪便污染水源及食物,特别是水源被污染后易引起局部暴发。日常生活接触和苍蝇等媒介传播也是重要的传播途径。

92. 霍乱全年均有发病,**夏秋季**高发。以沿海地带为主。流行方式有**暴发及迁延散发**两种,前者常为经水或食物传播引起,多见于新疫区,而后者多发生在老疫区。

93. 霍乱病理特点主要是**严重脱水导致的一系列功能性改变**,而组织器官器质性损害轻微。

94. **肾衰竭**是霍乱最常见的严重并发症,也是常见的死因。表现为尿量减少和氮质血症,严重者可因尿毒症而死亡。

95. 霍乱的处理原则是**严格隔离,迅速补充水及电解质**,以纠正脱水、电解质平衡紊乱和酸中毒,辅以抗菌治疗及对症治疗。

96. 霍乱治疗的补液的原则是**早期、快速、足量,先盐后糖,先快后慢,纠酸补钙,见尿补钾**。

97. 根据消毒杀灭微生物的种类和强弱,将各种物理和化学消毒方法分为**灭菌法和高、中、低效消毒法**四大类。

98. 高效消毒法能杀灭**一切**细菌繁殖体(包括分枝杆菌)、病毒、真菌及其孢子,并对细菌芽孢有显著杀灭作用。主要有紫外线消毒法和臭氧、含氯消毒剂、过氧化氢等。

99. **严密隔离**适用于经飞沫、分泌物、排泄物直接或间接传播的烈性传染病及传播途径不明的传染病,如鼠疫(肺鼠疫)、肺炭疽、传染性非典型肺炎、霍乱等的隔离。

100. **保护性隔离**适用于抵抗力低或极易感染的患者,如严重烧伤、早产儿、白血病、脏器移植及免疫缺陷患者等的隔离。

5年 历年真题



配套名师高清视频

1. 下列有关感染的叙述,错误的是
- A. 机体的免疫应答对感染过程的表现起重要作用
 - B. 感染过程要有病原体、人体和外环境
 - C. 病原体侵入人体,只要发病就是感染过程的开始
 - D. 感染是病原体对人体的一种寄生过程
 - E. 病原体的致病力包括毒力、侵袭力、病原体数量和变异性

【答案】C

【解析】病原体通过各种途径进入人体后就开始了感染的过程。

涉及考点 | 感染过程的表现

2. 病原体侵入人体后,仅诱导机体产生特异性免疫应答,而不引起或只引起轻微的组织损伤,因而在临床上不显示任何症状、体征甚至生化改变,只能通过免疫检查才能发现。此种表现属于

- A. 机会性感染
- B. 隐性感染
- C. 显性感染
- D. 病原携带状态
- E. 潜伏性感染

【答案】B

【解析】隐性感染又称亚临床感染,是指病原体侵入人体后,仅诱导机体产生特异性免疫应答,而不引起或只引起轻微的组织损伤,因而在临床上不显示任何症状、体征甚至生化改变,只能通过免疫检查才能发现。

涉及考点 | 感染过程的表现

3. 隐性感染病例增加的临床主要意义是

- A. 轻症病例增加
- B. 免疫人群增加
- C. 病原携带病例增加
- D. 典型病例增加
- E. 潜在感染病例增加

【答案】B

【解析】隐性感染病例增加的主要临床意义是在传染病流行期间,对防止流行的扩散有积极意义,因为隐性感染者增多,人群对某一种传染病的易感性就降低,该种传染病的发病率下降。

涉及考点 | 感染过程的表现

4. 下列各项,不属于传染病基本特征的是

- A. 有发热
- B. 有传染性
- C. 有流行病学特征
- D. 有病原体
- E. 有感染后免疫性

【答案】A

【解析】传染病与其他疾病相区别的基本特征有病原体、有传染性、有流行病学特征和有

感染后免疫是传染病与其他疾病相区别的基本特征。发热可以由感染性原因也可以由非感染性原因引起,并不是传染病的基本特征。

涉及考点 | 传染病的基本特征

5.病原携带者的特点是

- A.病原体侵入机体后发生了免疫反应但未引起明显的组织损伤
- B.病原体引起了明显的免疫反应和组织损伤
- C.病原体寄生在机体组织内,不引起组织损伤,但在机体免疫功能下降时可引起损伤,出现症状和体征
- D.机体无明显症状但病原体可长期存在并可排出体外
- E.病原体被特异性免疫反应清除

【答案】D

【解析】病原携带状态是指病原体侵入人体后,可以停留在入侵部位或侵入较远的脏器继续生长、繁殖,而人体不出现任何的疾病状态,但能携带并排出病原体,成为传染病流行的传染源。

涉及考点 | 感染过程的表现

6.大流行是指

- A.某传染病流行范围广,甚至超过国界或洲界
- B.某种传染病在某地区近几年发病率的一般水平
- C.某种传染病在某地区的发病率高于一般水平
- D.某种传染病病例的发病时间分布高度集中于一个短时间之内
- E.某种传染病在某一地区的发病率明显增加

【答案】A

【解析】大流行(pandemic)指某疾病的发病蔓延迅速,涉及地域广,人口比例大,在短时间内可以越过省界国界甚至洲界形成世界性流行。

涉及考点 | 传染病的流行病学特征

7.可经母婴途径传播的疾病是

- A.乙型肝炎
- B.流行性脑脊髓膜炎
- C.霍乱
- D.细菌性痢疾
- E.伤寒

【答案】A

【解析】乙型肝炎的传播途径包括:①输血及血制品以及使用污染的注射器或针刺器具等传播。②母婴传播。③性接触传播;④其他,如日常生活密切接触传播。B经呼吸道传播,C、D、E经消化道传播。

涉及考点 | 病毒性肝炎的流行病学

8.下列属于乙类传染病的是

- A.鼠疫
- B.流行性腮腺炎
- C.麻风病
- D.布鲁菌病
- E.霍乱

【答案】D

【解析】传染病分为甲,乙,丙三类传染病。乙类传染病共有26种,主要的是包括病毒性

的肝炎,细菌性和阿米巴性痢疾,艾滋病,淋病,梅毒,麻疹,百日咳,白喉,狂犬病,流行性出血热,猩红热,黑热病,登革热,脊髓灰质炎,流行性和地方性斑疹伤寒,流行性脑脊髓膜炎,流行性乙型脑炎,疟疾,钩端螺旋体病,伤寒和副伤寒,炭疽,布鲁菌病、人感染高致病性禽流感、人感染 H7N9 禽流感等。

涉及考点 | 传染病分类

9.丁型肝炎的潜伏期是

- | | |
|---------|---------|
| A.2~6周 | B.2~9周 |
| C.2~26周 | D.4~20周 |
| E.4~24周 | |

【答案】D

【解析】不同类型病毒引起的肝炎潜伏期不同,甲肝 2~6 周;乙肝 1~6 个月;丙肝 2 周~6 个月;丁肝 4~20 周;戊肝 2~9 周。

涉及考点 | 病毒性肝炎的临床表现

10.黄疸伴胆囊增大不会见于

- | | |
|---------|--------|
| A.胆总管结石 | B.胰头癌 |
| C.胆囊结石 | D.急性肝炎 |
| E.壶腹癌 | |

【答案】D

【解析】急性肝炎大多有轻中度肝肿大,质地软,常有触痛或叩击痛,脾可轻度肿大,部分有黄疸,没有胆囊增大。

涉及考点 | 病毒性肝炎的临床表现

11.亚急重型肝炎血清胆红素的升高特点是

- | | |
|-----------------|----------------|
| A.大于正常值上限的 10 倍 | B.大于正常值上限的 9 倍 |
| C.大于正常值上限的 8 倍 | D.大于正常值上限的 7 倍 |
| E.大于正常值上限的 6 倍 | |

【答案】A

【解析】亚急性重型肝炎时凝血酶原时间明显延长,PTA \leq 40%,黄疸迅速加深。

涉及考点 | 病毒性肝炎的临床表现

12.下列不属急性重型肝炎典型表现的是

- | | |
|------------------|----------|
| A.急性肾功能不全 | B.出血倾向明显 |
| C.黄疸迅速加深 | D.肝肿大 |
| E.出现烦躁、谵妄等神经系统症状 | |

【答案】D

【解析】急性重型肝炎病情发展迅速,2 周内出现极度乏力,严重消化道症状,出现神经、精神症状,表现为嗜睡、烦躁和谵妄等,排除 E;黄疸急剧加深,胆酶分离,排除 C;有出血倾向,排除 B;出现急性肾衰竭,排除 A;肝浊音界进行性缩小,所以本题选 D。

涉及考点 | 病毒性肝炎的临床表现

13.下列各项不符合淤胆型肝炎临床表现的是

- | | |
|--------|-----------|
| A.黄疸深 | B.血清胆固醇升高 |
| C.皮肤瘙痒 | D.大便颜色变浅 |

E.自觉症状重

【答案】E

【解析】淤胆型肝炎主要表现为较长时期的肝内梗阻性黄疸,临床自觉症状轻微,常表现为皮肤瘙痒、粪便颜色变浅,肝功能检查血清胆红素明显升高,以直接胆红素为主。A、B、C、D等均符合淤胆型肝炎的临床表现。

涉及考点 | 病毒性肝炎的临床表现

14.提示病毒复制,传染性强,持续阳性,表明肝细胞损害较重,且可转为慢性乙型肝炎的指标是

A.HBcAg

B.抗-HBs

C.HBsAg

D.HBeAg

E.抗-HBc

【答案】D

【解析】HBsAg表示体内是否存在乙肝病毒,无症状携带者和慢性患者体内可持续存在多年,甚至终身;抗-HBs阳性表示对HBV有免疫力,见于乙肝恢复期、既往感染及乙肝疫苗接种后;HBeAg表示患者处于高感染低应答期,说明病毒是否复制及具有传染性;HBcAg较少用于临床常规检测;抗HBc提示急性期或慢性肝炎急性发作。

涉及考点 | 病毒性肝炎的实验室检查及其他检查



配套名师高清视频

15.下列各项,既是重型肝炎的诊断依据,也是判断其预后的敏感指标的是

A.天冬氨酸氨基转移酶

B.胆碱酯酶

C.凝血酶原活动度

D.血氨

E.丙氨酸氨基转移酶

【答案】C

【解析】凝血酶原活动度下降与肝损害严重程度密切相关。凝血酶原活动度 $\leq 40\%$ 是诊断重型肝炎或肝衰竭的重要依据,凝血酶原活动度数值越小出血倾向越严重,可据其判断预后。

涉及考点 | 病毒性肝炎的实验室检查及其他检查

16.抗-HBs阳性的临床意义是

A.提示有强传染性

B.HBV大部分已被清除或抑制

C.患有乙型肝炎且HBV正在复制

D.见于HBV携带者或乙肝患者

E.HBV已被清除,处于恢复期

【答案】E

【解析】抗HBs是一种保护性抗体,抗HBs阳性表示对HBV有免疫力,见于乙型肝炎恢复期、既往感染及乙肝疫苗接种后。

涉及考点 | 病毒性肝炎的实验室检查及其他检查

17.下列慢性乙型肝炎治疗措施,最主要的是

A.抗肝纤维化治疗

B.保肝治疗

C.对症治疗

D.抗病毒治疗

E.一般治疗

【答案】D

【解析】慢性肝炎治疗包括一般治疗和药物治疗,其中药物治疗包括保肝治疗、抗肝纤维

化治疗、抗病毒治疗等。抗病毒治疗是慢性乙型肝炎和丙型肝炎的关键治疗,只要有适应证,且条件允许,就应进行规范的抗病毒治疗。

涉及考点 | 病毒性肝炎的治疗

18.丙氨酸氨基转移酶(ALT)增高最明显的疾病

- A.肝癌
- B.急性重症肝炎
- C.急性心肌梗死
- D.急性病毒性肝炎
- E.肝硬化

【答案】D

【解析】ALT是目前临床上反映肝细胞功能的最常用指标,急性肝炎时ALT明显升高,重型肝炎患者可出现ALT快速下降。

涉及考点 | 病毒性肝炎的实验室检查及其他检查

19.黄疸深,恶心呕吐重,肝脏小,伴昏迷、抽搐,有明显“胆酶分离”现象。应考虑的疾病是

- A.急性病毒性肝炎
- B.急性重型肝炎
- C.胰头癌
- D.肝硬化
- E.肝癌

【答案】B

【解析】重型肝炎患者可出现ALT,快速下降,胆红素不断升高的“胆酶分离”现象,提示肝细胞大量坏死。

涉及考点 | 病毒性肝炎的诊断

20.治疗慢性丙型肝炎的最佳方案是

- A.聚乙二醇干扰素合恩替卡韦
- B.聚乙二醇干扰素合拉米夫定
- C.聚乙二醇干扰素合利巴韦林
- D.普通干扰素合拉米夫定
- E.普通干扰素合利巴韦林

【答案】C

【解析】聚乙二醇干扰素与利巴韦林联合应用是目前治疗慢性丙型肝炎的最佳方案,其次是普通干扰素与利巴韦林联合应用,它们均优于单用IFN。

涉及考点 | 病毒性肝炎的治疗

21.引起人感染高致病性禽流感的主要病毒亚型是

- A.H9N2
- B.H7N7
- C.H5N1
- D.H5N2
- E.H1N1

【答案】C

【解析】禽流感病毒的H5和H7亚型毒株能引起严重的禽类疾病,称为高致病性禽流感,目前感染人类的禽流感病毒亚型主要有H5N1、H9N2、H7N7,其中感染H5N1亚型者病情最重,死亡率高。

涉及考点 | 人感染高致病性禽流感的病原学

22.抗流感病毒药奥司他韦作用机制是

- A.抑制RNA聚合酶
- B.阻滞离子通道M2
- C.抑制血凝素
- D.抑制神经氨酸酶
- E.激活神经氨酸酶

【答案】D

【解析】奥司他韦是一种作用于神经氨酸酶的特异性抑制剂,其抑制神经氨酸酶的作用,可以抑制成熟的流感病毒脱离宿主细胞,从而抑制流感病毒在人体内的传播以起到治疗流行性感冒的作用。

涉及考点 | 流行性感冒的治疗

23. 下列各项检查,属人感染高致病性禽流感确诊依据的是

- A. 肝功能
- B. 血常规
- C. 胸部 X 线检查
- D. 病毒分离
- E. 骨髓穿刺

【答案】D

【解析】患者呼吸道分泌物中分离出特定病毒,且双份血清抗禽流感病毒抗体滴度恢复期较发病初期有 4 倍或以上升高是本病确诊的重要依据。

涉及考点 | 人感染高致病性禽流感的诊断

24. 细菌性痢疾的好发部位是

- A. 回肠
- B. 横结肠
- C. 直肠和乙状结肠
- D. 回盲部和升结肠
- E. 空肠

【答案】C

【解析】细菌性痢疾的病理变化主要发生于大肠,以乙状结肠与直肠为主,严重者可波及整个结肠及回肠末端。

涉及考点 | 细菌性痢疾的病理

25. 鉴别人感染高致病性禽流感与传染性非典型肺炎的主要依据是

- A. X 线胸片
- B. 病原学检查
- C. 血常规检查
- D. 流行病学史
- E. 高热、咳嗽等临床表现

【答案】B

【解析】流行病学史、高热咳嗽、血常规、X 线胸片无特异性,故不可作为高致病性禽流感与传染性非典型肺炎鉴别诊断依据;高致病性禽流感患者可检查出禽流感病毒,传染性非典型肺炎患者可检查出 SARS 病毒。

涉及考点 | 人感染高致病性禽流感的鉴别诊断

26. 下列关于确诊霍乱的选项中,正确的是

- A. 疫源检查中,首次粪便检出 O1 或 O139 群霍乱弧菌
- B. 剧烈腹泻
- C. 呕吐,迅速出现脱水
- D. 循环衰竭及肌肉痉挛
- E. 水样便

【答案】A

【解析】霍乱的临床表现为剧烈腹泻、水样便、呕吐,迅速出现脱水和循环衰竭及肌肉痉挛,而疫源检查中,首次粪便检出 O1 或 O139 群霍乱弧菌才可确诊霍乱。

涉及考点 | 霍乱的诊断

27. 下列霍乱的治疗措施, 最重要的是

- A. 止泻
- B. 降温
- C. 镇静
- D. 止痛
- E. 补液

【答案】E

【解析】霍乱治疗原则是严格隔离, 及时补液, 辅以抗菌和对症治疗, 其中补充液体和电解质是治疗霍乱的关键。

涉及考点 | 霍乱的治疗

28. HIV 主要感染的细胞是

- A. CD4⁺T 淋巴细胞
- B. B 淋巴细胞
- C. 单核细胞
- D. 神经胶质细胞
- E. 直肠黏膜上皮细胞

【答案】A

【解析】艾滋病是由 HIV 病毒感染所导致的淋巴细胞急剧减少。HIV 主要侵犯人体免疫系统里的 CD4⁺T 淋巴细胞, 这是免疫系统中最重要细胞。

涉及考点 | 艾滋病的病原学

29. 一般认为不能传播 AIDS 的是

- A. 性传播
- B. 蚊虫叮咬
- C. 器官移植
- D. 输血
- E. 母婴传播

【答案】B

【解析】艾滋病主要传播途径是性接触、血液接触和母婴传播, 目前无证据表明可经食物、水、昆虫或生活接触传播。

涉及考点 | 艾滋病的流行病学

30. 诊断艾滋病最简单的检测是

- A. HIV 抗原检测
- B. 病毒核酸检测
- C. p24 抗原检测
- D. 细胞培养(病毒分离)
- E. 血清学试验检测 HIV 抗体

【答案】E

【解析】HIV 抗体阳性为艾滋病诊断的最重要指标, 该检测也是最基本的检测。

涉及考点 | 艾滋病的诊断

31. 下列关于流行性出血热的叙述, 错误的是

- A. 由汉坦病毒引起
- B. 具季节性和周期性
- C. 鼠类是主要传染源
- D. 皮疹多为出血性
- E. 均有典型的五期经过

【答案】E

【解析】流行性出血热又称肾综合征出血热, 是由汉坦病毒病毒引起的自然疫源性传染病是危害人类健康的重要传染病, 是由流行性出血热病毒(汉坦病毒)引起的, 以鼠类为主要传染源的自然疫源性疾病。以发热、出血、充血、低血压休克及肾脏损害为主要临床表现。

涉及考点 | 流行性出血热临床表现

32. 流行性出血热少尿期治疗原则, 正确的是
- A. 补充营养, 定期复查肾功能、血压和垂体功能
 - B. 补充血容量、纠正酸中毒、改善微循环
 - C. 抗病毒、减轻外渗、改善中毒症状和预防 DIC
 - D. 稳定内环境、促进利尿、导泻和透析治疗
 - E. 维持电解质稳定, 防治继发感染

【答案】D

【解析】流行性出血热少尿期治疗原则为“稳、促、导、透”, 即稳定内环境、促进利尿、导泻和透析治疗。

涉及考点 | 流行性出血热的治疗

33. 流行性出血热伤害最严重的部位是
- A. 脑
 - B. 脾
 - C. 肝
 - D. 肾
 - E. 心

【答案】D

【解析】流行性出血热的基本病理变化为全身小血管和毛细血管内皮细胞变性、坏死。以肾脏病变最明显, 其次是心、肝、脑等脏器。

涉及考点 | 流行性出血热的基本病理变化



配套名师高清视频

34. 下列各项, 属于流行性出血热低血压休克期治疗的是
- A. 稳定内环境、促进利尿、导泻和透析治疗
 - B. 补充营养, 定期复查肾功能、血压和垂体功能
 - C. 维持电解质稳定, 防治继发感染
 - D. 补充血容量、纠正酸中毒、改善微循环
 - E. 抗病毒、减轻外渗、改善中毒症状和预防 DIC

【答案】D

【解析】流行性出血热低血压休克期治疗原则: 积极补充血容量、注意纠正酸中毒和改善微循环。

涉及考点 | 流行性出血热的治疗

35. 发生霍乱时, 对疫区接触者的检疫期是
- A. 12 天
 - B. 9 天
 - C. 7 天
 - D. 5 天
 - E. 3 天

【答案】D

【解析】对霍乱接触者需留观 5 天, 待连续 3 次大便阴性方可解除隔离。

涉及考点 | 霍乱的预防

36. 下列不属于消毒方法的是
- A. 辐射消毒法
 - B. 化学消毒法
 - C. 物理消毒法
 - D. 生物消毒法
 - E. 快速消毒法

【答案】E

【解析】消毒指通过物理、化学或生物学方法,消除或杀灭体外环境中病原微生物的一系列方法,其中物理消毒法包括辐射消毒法。

涉及考点 | 消毒方法

37.确诊流行性脑脊髓膜炎最重要的实验室检查是

- A.咽拭子培养阳性
- B.脑脊液培养阳性
- C.脑脊液呈化脓性改变
- D.脑脊液涂片阳性
- E.血白细胞总数增高

【答案】B

【解析】流行性脑脊髓膜炎的实验室检查可发现白细胞及中性粒细胞明显升高,脑脊液呈化脓性改变,尤其是细菌培养阳性及流脑特异性血清免疫检测阳性为确诊的主要依据。

涉及考点 | 流行性脑脊髓膜炎的实验室检查

38.流行性乙型脑炎的主要死因是

- A.高热抽搐
- B.呼吸衰竭
- C.循环衰竭
- D.意识障碍
- E.脑水肿

【答案】B

【解析】流行性乙型脑炎极期的主要表现为高热、意识障碍、惊厥或抽搐、呼吸衰竭,其中高热、抽搐、呼吸衰竭是乙脑极期的严重表现,呼吸衰竭为引起死亡的主要原因。

涉及考点 | 流行性乙型脑炎的临床表现

39.不符合流行性乙型脑炎脑脊液表现的是

- A.糖正常或偏高
- B.糖蛋白下降
- C.早期以中性粒细胞为主
- D.白细胞多在 $(50\sim 500)\times 10^9/L$
- E.蛋白轻度增高

【答案】B

【解析】流行性乙型脑炎脑脊液外观无色透明或微浑浊,白细胞多在 $(50\sim 500)\times 10^9/L$,早期以中性粒细胞为主,蛋白轻度增高,糖正常或偏高,氯化物正常。

涉及考点 | 流行性乙型脑炎的实验室检查

40.乙脑预防的关键措施是

- A.管理患者
- B.防蚊和灭蚊
- C.管理猪等家畜
- D.注射丙种球蛋白
- E.防蚊、灭蚊和预防注射

【答案】E

【解析】灭蚊、防蚊要注意杀灭越冬的蚊子和早春的蚊子。预防接种及时注射乙脑疫苗,能提高易感者的免疫力,是预防这种病的最重要措施之一。

涉及考点 | 流行性乙型脑炎的预防

41.普通型流脑的临床表现是

- A.低热、头痛、瘀点
- B.高热、循环衰竭、大片瘀斑
- C.高热、瘀斑、昏迷、呼吸衰竭
- D.高热、头痛、瘀斑、脑膜刺激征
- E.间歇性发热、反复皮肤瘀点、血培养可阳性

【答案】D

【解析】脑膜炎球菌性脑膜炎是由脑膜炎球菌引起的中枢神经系统传染病。流行性疾病，多发生在当年11月至次年5月。感染源是人类病人。传播的方式是飞沫，易感者一般易感。脑膜脑病发作后，会出现持续发热、头痛、呕吐、恶心、精神抑郁、昏迷、抽搐甚至瘫痪等症状。

涉及考点 | 流行性脑脊髓膜炎的临床表现

42. 下列有关流行性脑脊髓膜炎临床分型的叙述，正确的是

- A. 轻型、中型、重型
- B. 轻型、普通型、危重型
- C. 不典型、典型、重型
- D. 不典型、典型、暴发型
- E. 普通型、暴发型、轻型、慢性型

【答案】E

【解析】流行性脑脊髓膜炎潜伏期一般为2~3天，最短1天，最长7天，按病情可分为以下各型：普通型、暴发型、轻型、慢性型。

涉及考点 | 流行性脑脊髓膜炎的临床表现

43. 流行性脑脊髓膜炎的主要致病因子是

- A. 肠毒素
- B. 类毒素
- C. 内毒素
- D. 神经毒素
- E. 细胞毒素

【答案】C

【解析】流行性脑脊髓膜炎：脑膜炎球菌释放的内毒素是本病致病的重要因素，内毒素可引起脑膜和脊髓膜化脓性炎症及颅内压升高。

涉及考点 | 流行性脑脊髓膜炎的发病机制

44. 伤寒杆菌菌体裂解产生的毒素是

- A. 肠毒素
- B. 外毒素
- C. 细胞毒素
- D. 神经毒素
- E. 内毒素

【答案】E

【解析】伤寒沙门菌不产生外毒素，其菌体裂解所释放的内毒素在发病机制中起重要作用。

涉及考点 | 伤寒的病原学

45. 下列属于伤寒特征性表现的是

- A. 草莓舌
- B. 玫瑰疹
- C. 发热
- D. 眼结膜充血
- E. 肝脾肿大

【答案】B

【解析】伤寒是由伤寒杆菌感染所造成的急性肠道传染性疾病，主要通过粪-口途径进行传播。大概在病程的第7~14天左右可以出现淡红色的斑丘疹，称之为玫瑰疹。

涉及考点 | 伤寒的临床表现

46. 伤寒患者，起病急，症状典型，于1周左右迅速痊愈，其临床分型是

- A. 迁延型
- B. 普通型
- C. 顿挫型
- D. 逍遥型
- E. 轻型

【答案】C

【解析】选项 A 临床症状与典型伤寒相似,但热程可达 5 周以上。选项 B 病程较长,约 5 周左右恢复正常。选项 C 起病较急,开始症状典型,但病程极短,约 1 周左右发热等症状迅速消退而痊愈。选项 D 起病初期症状不明显。选项 E 临床特征不典型;所以本题选 C。

涉及考点 | 伤寒的临床表现

47. 伤寒第二次菌血症的时间发生在

- A. 第 5~6 周
- B. 第 4~5 周
- C. 第 3~4 周
- D. 第 2~3 周
- E. 第 1 周

【答案】D

【解析】伤寒沙门菌被单核-巨噬细胞系统吞噬、繁殖后再次进入血液循环,形成第二次菌血症。伤寒杆菌向肝、脾、胆、骨髓、肾和皮肤等器官组织播散,肠壁淋巴结出现髓样肿胀、增生、坏死,临床上处于初期和极期(相当于病程第 1~3 周)。

涉及考点 | 伤寒的临床表现

48. 下列各项,属于伤寒早期诊断的是

- A. 仅有“H”抗体效价增高,而“O”抗体效价不高
- B. 只有“O”抗体效价的升高
- C. 嗜酸性粒细胞增高
- D. 白细胞计数增高或正常
- E. 中性粒细胞增高

【答案】B

【解析】单独出现 H 抗体升高,对伤寒诊断帮助不大;伤寒外周血白细胞数减少,中性粒细胞减少,嗜酸性粒细胞减少或消失;“O”抗体升高支持伤寒沙门菌感染,不能区分伤寒或副伤寒。

涉及考点 | 伤寒的诊断

49. 治疗伤寒应首选的药物是

- A. 环丙沙星
- B. 庆大霉素
- C. 链霉素
- D. 头孢唑啉
- E. 氯霉素

【答案】A

【解析】伤寒的抗菌治疗,喹诺酮类药物为首选。主要因为该类物质抗菌谱广,尤其对革兰阴性杆菌活性高,细菌对其产生突发耐药的发生率低,体内分布广,组织体液中药物浓度高,可达有效抑菌或杀菌水平,大多品种系口服制剂。目前常用的该类物质有氟喹沙星、环丙沙星和依诺沙星等。

涉及考点 | 伤寒的治疗

50. 细菌性痢疾的主要预防措施是

- A. 隔离及治疗现症患者
- B. 流行季节预防服药
- C. 及时发现、治疗带菌者
- D. 口服痢疾活菌苗
- E. 切断传播途径

【答案】E

【解析】切断传播途径是控制细菌性疾病的重要措施。从事餐饮、维修、水务等工作的人员,需要长期跟踪,必要时临时离职。注意饮水、粪便和饮食,排除苍蝇,养成饭前和大便后洗手的习惯。

涉及考点 | 细菌性痢疾的预防

2年 易错考题

1.潜伏期是指

- A.自病原体侵入机体至典型症状出现 B.自病原体侵入机体至排出体外
C.自病原体侵入机体至临床症状开始出现 D.自接触传染源至患者开始出现症状
E.自接触传染源至典型症状出现

【答案】C

【解析】指从病原体侵入机体至出现临床症状前的一段时间。各种传染病的潜伏期不同,数小时、数天、数月甚至数年不等。

涉及考点 | 潜伏期的概念

2.下列关于慢性重型肝炎临床表现的叙述,不正确的是

- A.蜘蛛痣 B.颅内出血
C.腹水 D.脾脏肿大
E.肝掌

【答案】B

【解析】慢性重型肝炎有明显或持续的肝炎症状,伴肝病面容、肝掌、蜘蛛痣、脾大,ALT和(或)AST反复或持续升高,白蛋白降低、丙种球蛋白明显升高。

涉及考点 | 病毒性肝炎的临床表现

3.HIV 中要侵犯的靶细胞是

- A.CD38 细胞 B.CD4 细胞
C.CD8 细胞 D.CD3 细胞
E.CD27 细胞

【答案】B

【解析】HIV 主要侵犯人体免疫系统,包括 CD4 细胞、巨噬细胞和树突状细胞,主要表现为 CD4 淋巴细胞数量不断减少,导致免疫功能缺陷。

涉及考点 | 艾滋病的发病机制

4.下列各项,艾滋病早期诊断的临床表现中不包含

- A.腹泻 B.体重减轻
C.盗汗 D.便血
E.发热

【答案】D

【解析】艾滋病临床表现以发热最为常见,可伴盗汗、腹泻和体重减轻,无便血。

涉及考点 | 艾滋病的临床表现

5.艾滋病可出现持续全身淋巴结肿大的时期是

- A.任何病期 B.艾滋病期

- C.无症状感染期
D.恢复期
E.急性 HIV 感染期

【答案】B

【解析】艾滋病期临床表现为持续 1 个月以上的发热、盗汗、腹泻、体重减轻 10% 以上，部分患者表现精神症状，还可出现持续性全身淋巴结肿大。

涉及考点 | 艾滋病的临床表现

6. 可经母婴途径传播的疾病是
A. 伤寒
B. 艾滋病
C. 霍乱
D. 流行性脑脊髓膜炎
E. 细菌性痢疾

【答案】B

【解析】细菌性痢疾主要通过“粪-口”传播，传播途径包括：接触传播、食物媒介传播、水媒传播、蝇媒传播；流行性脑脊髓膜炎主要传播途径为病原菌借咳嗽、喷嚏、说话等飞沫直接从空气中传播；霍乱、伤寒主要传播途径是通过水、食物、日常生活接触和苍蝇传播；艾滋病传播方式主要有性触摸传播，血液传播，母婴传播。

涉及考点 | 细菌性痢疾、流行性脑脊髓膜炎、霍乱、艾滋病、伤寒的传播途径

7. 乙型脑炎(简称乙脑)的主要传染源是
A. 蚊虫
B. 乙脑病毒携带者
C. 乙脑患者
D. 猪
E. 野鼠

【答案】D

【解析】流行性乙型脑炎主要分布在亚洲远东和东南亚地区，经蚊传播，多见于夏秋季，临床上急起发病，有高热、意识障碍、惊厥、强直性痉挛和脑膜刺激征等，重型患者病后往往留有后遗症。猪是本病主要传染源，蚊虫叮咬是主要传播途径。野鼠是流行性出血热的传染源。

涉及考点 | 流行性乙型脑炎的流行病学

8. 中毒型菌痢区别于流行性乙型脑炎最主要的是
A. 起病急
B. 粪便镜检可见大量脓、白细胞
C. 10 岁以下儿童发病率高
D. 高热、抽搐、昏迷
E. 多见于春、夏季

【答案】B

【解析】乙脑与中毒型菌痢均多见于夏、秋季，且 10 岁以下儿童发病率较高。中毒型菌痢起病较乙脑更急，常于发病 24 h 内出现高热、抽搐、昏迷等，一般无脑膜刺激征，脑脊液多正常，粪便镜检可见大量脓、白细胞，中毒型菌痢与流行性乙型脑炎最主要区别为粪便镜检可见大量脓、白细胞。

涉及考点 | 流行性乙型脑炎的鉴别诊断

9. 流行性脑脊髓膜炎的病原菌是
A. 抗酸杆菌
B. 革兰阴性杆菌
C. 革兰阴性弧菌
D. 革兰阳性球菌
E. 革兰阴性球菌

【答案】E

【解析】流行性脑脊髓膜炎是由脑膜炎双球菌引起的化脓性脑膜炎。病原学为脑膜炎双球菌,属奈瑟菌属,革兰染色阴性。临床表现为发热,头痛,呕吐,皮肤黏膜淤点、淤斑及颈项强直等脑膜刺激征。

涉及考点 | 流行性脑脊髓膜炎的病原学

10. 流行性脑脊髓膜炎常见的皮疹是

- A. 单纯疱疹
- B. 玫瑰色斑丘疹
- C. 坏疽
- D. 脓疱疹
- E. 淤点、淤斑

【答案】E

【解析】流行性脑脊髓膜炎败血症期出现皮肤黏膜淤点、淤斑,初呈鲜红色,迅速增多,扩大。

涉及考点 | 流行性脑脊髓膜炎的临床表现

11. 下列各项,不支持流行性脑脊髓膜炎诊断的脑脊液检查是

- A. 氯化物含量减少
- B. 蛋白质含量高
- C. 糖含量明显减少
- D. 细胞数 $<0.5 \times 10^9/L$,以单个核细胞为主
- E. 外观混浊呈脓性

【答案】D

【解析】蛋白质含量增高,糖及氯化物含量均减少,排除A、B、C。脑脊液检查是流脑明确诊断的重要依据。发病过程中,脑脊液压力升高,外观浑浊呈脓性,排除E。白细胞计数常高达 $20 \times 10^9/L$,以中性粒细胞为主。

涉及考点 | 流行性脑脊髓膜炎的实验室检查

12. 下列关于人感染高致病性禽流感的叙述,不正确的是

- A. 传染源主要为病禽
- B. 暴发流行多在秋季
- C. 夏季发病少
- D. 人类普遍缺乏免疫力
- E. 传播途径主要经呼吸道

【答案】B

【解析】禽流感一年四季均可发生,冬、春季节多暴发流行,夏季发病较少,多呈散发,症状也较轻。

涉及考点 | 高致病性禽流感流行病学

13. 伤寒的主要病变部位在

- A. 乙状结肠
- B. 小肠上段
- C. 直肠
- D. 小肠下段
- E. 十二指肠

【答案】D

【解析】伤寒的主要病理特征是全身网状内皮系统的增生反应,以回肠(小肠分为空肠与回肠,空肠位于小肠上半段,回肠位于小肠下半段)下段淋巴组织的病变最为显著。

涉及考点 | 伤寒的病理

14. 伤寒最严重的并发症是

- A. 急性胆囊炎
- B. 中毒性心肌炎
- C. 肠出血
- D. 中毒性肝炎

E.肠穿孔

【答案】E

【解析】肠穿孔是伤寒最严重的并发症，多见于病程第2~3周。多发生于回肠末端，表现为右下腹剧痛，伴有恶心、呕吐、冷汗、呼吸急促、体温与血压下降，经1~2小时腹痛及其他症状暂时缓解，不久体温又迅速上升并出现腹膜炎征象，表现为腹胀、腹痛、腹壁紧张，压痛和反跳痛，肠鸣音减弱，白细胞计数增高伴核左移。

涉及考点 | 伤寒的临床表现

15.肠穿孔是伤寒最严重的并发症，多发于

- | | |
|----------|---------|
| A.空肠末端 | B.直肠末端 |
| C.回肠末端 | D.横结肠末端 |
| E.乙状结肠末端 | |

【答案】C

【解析】肠穿孔为伤寒最严重并发症，常发生于病程第2~3周，穿孔部位多发生在回肠末端，成人比小儿多见。

涉及考点 | 伤寒的临床表现

16.伤寒最具诊断价值的是

- | | |
|---|----------------|
| A.肥达反应阴性 | B.白细胞计数减少或正常 |
| C.仅有“H”抗体效价增高，而“O”抗体效价不高 | D.仅有“O”抗体效价的升高 |
| E.“O”效价 $\geq 1:80$ ，“H”效价 $\geq 1:160$ | |

【答案】E

【解析】肥达试验阳性有辅助诊断意义；“O”效价 $\geq 1:80$ ，“H”效价 $\geq 1:160$ ，或“O”抗体效价有4倍以上的升高，才有辅助诊断意义；“O”抗体升高只能支持沙门菌感染，不能区分伤寒或副伤寒；单独出现“H”抗体升高，对伤寒的诊断帮助不大；白细胞计数不可诊断伤寒。

涉及考点 | 伤寒的诊断

17.细菌性痢疾慢性期 X 线钡灌肠可见的肠道变

- | | |
|--------------|--------------|
| A.肠道动力增强 | B.肠道痉挛，结肠袋出现 |
| C.肠道痉挛，结肠袋消失 | D.肠黏膜变薄 |
| E.肠腔增宽 | |

【答案】C

【解析】慢性菌痢 X 线钡剂可见肠道痉挛，动力改变，结肠袋消失，肠腔狭窄，肠黏膜增厚，肠动力减弱。

涉及考点 | 细菌性痢疾的临床表现

18.根据禽流感病毒的致病性，禽流感病毒可分为

- | | |
|------------------|-----------------------|
| A.高致病性、中致病性、低致病性 | B.高致病性、中致病性、低致病性、非致病性 |
| C.高致病性、低致病性、非致病性 | D.高致病性、低致病性、 |
| E.有致病性、无致病性 | |

【答案】C

【解析】根据禽流感病毒的致病性，禽流感病毒可分为高致病性、低致病性、非致病性三大类。

涉及考点 | 禽流感病毒的分型

19.霍乱重型患者补液量为

- A.>15 000 mL/d
B.8 000~12 000 mL/d
C.4 000~8 000 mL/d
D.3 000~4 000 mL/d
E.<3 000 mL/d

【答案】B

【解析】补液量应根据失水程度决定,轻型脱水者3 000~4 000 mL/d,中型脱水者4 000~8 000 mL/d,重型脱水者8 000~12 000 mL/d。

涉及考点 | 霍乱的治疗

20.下列关于流行性乙型脑炎临床分型的叙述,正确的是

- A.不典型、典型、暴发型
B.轻型、普通型、危重型
C.轻型、中型、重型
D.轻型、普通型、重型、极重型
E.不典型、典型、重型

【答案】D

【解析】流行性乙型脑炎临床分型:轻型、普通型、重型、极重型,流行期间以轻型和普通型患者多见。

涉及考点 | 流行性乙型脑炎的临床表现

(21~22 题共用备选答案)

- A.出血性炎
B.增生性炎
C.化脓性炎
D.变质性炎
E.假膜性炎

21.流行性脑脊髓膜炎,病理变化为

【答案】C

22.流行性乙型脑炎,其病理变化为

【答案】D

【解析】选项 A 是渗出性炎症的一个类型,因炎症灶的血管损伤严重,致使渗出物中含大量红细胞,常见于流行性出血热、钩端螺旋体病和鼠疫等易发生于黏膜、浆膜和肺组织。发生于黏膜者渗出的纤维蛋白原形成的纤维素、坏死组织和嗜中性粒细胞共同形成假膜,又称假膜性炎,见于白喉。选项 B 的病变特点:①浸润的细胞主要是淋巴细胞、浆细胞和单核细胞。②局部组织破坏主要是由炎细胞引起。③常有较明显的结缔组织、血管和上皮细胞、腺体等实质细胞的增生,在黏膜可形成息肉,在肺常形成炎性假瘤,在管道性脏器可引起狭窄和梗阻。选项 C 为流行性脑脊髓膜炎的病理变化。选项 D 为流行性乙型脑炎的病理改变。所以 21 题选 C,22 题选 D。

涉及考点 | 流行性乙型脑炎、流行性脑脊髓膜炎的病理

23.感染 HIV 后,临床无明显症状,但血中可检出病毒及抗体,此期的持续时间一般是

- A.12~15 年
B.6~8 年
C.4~5 年
D.1~2 年
E.3~4 年

【答案】B

【解析】艾滋病无症状感染期:所有的 HIV 感染者均有这一期。此期病毒处于低水平复制状态,患者无任何临床症状,但血清中可检出病毒及抗体,有传染性,可持续 2~10 年或更久。

涉及考点 | 艾滋病无症状感染期

24.肺结核患者的哪种标本传染性最强

- A.痰液
- B.血液
- C.尿液
- D.汗液
- E.泪液

【答案】A

【解析】肺结核患者,即常说的痰菌阳性的肺结核。它主要是经过飞沫传播的,即痰菌阳性的肺结核患者在说话、咳嗽、打喷嚏的时候,其空气飞沫中会含有大量的结核杆菌,被正常人群所吸入导致的感染。

涉及考点 | 肺结核的传播途径

25.下列有关狂犬病毒的叙述,正确的是

- A.属弹状病毒科
- B.DNA 病毒
- C.野毒株毒力弱
- D.固定株毒力强
- E.60 ℃ 10 分钟可灭活

【答案】A

【解析】狂犬病毒属于弹状病毒科、狂犬病毒属,外形呈弹状,呈螺旋对称,表面具有包膜。

涉及考点 | 狂犬病的病原学

第十三篇 医学伦理学



考情分布图



	2015	2016	2017	2018	2019	
医学伦理学	概述	0	1	0	0	0
	中国医学的道德传统	0	0	0	0	0
	医学伦理学的理论基础	0	0	1	1	0
	医学伦理学的规范体系	0	1	0	1	1
	医患关系道德	1	0	1	0	0
	正确处理医务人员之间关系的道德原则	0	0	0	0	0
	临床诊疗工作中的道德	0	1	0	1	1
	医学科研工作的道德	1	1	1	1	0
	医学道德的评价、教育和修养	1	1	1	1	1
	生命伦理学	1	0	0	0	0



高频考点必背



1. 医学伦理学是研究**医学道德**的一门科学,是运用伦理学的理论、方法研究医学领域中人与人、人与社会、人与自然关系的道德问题的一门学科。
2. 医学伦理学的研究对象是医学领域中的**医学道德现象和医学道德关系**。
3. 医学模式反映人们对医学的总体认识,它是医学临床实践活动和医学科学研究的指导思想 and 理论框架,它**反映医学科学总的特征**。
4. 医务人员的情感有三个特点:医学职业的**特殊性、理智性、纯洁性**。
5. 医德良心的作用:医疗行为前的**选择**作用,医备标为中的**监督**作用,医疗行为的**评价**作用。
6. **诊治急症病人的道德要求**:随机性强,时间性强,协作性强;争分夺秒,全力抢救;及时与家属沟通,敢于承担风险;与相关科室医务人员密切配合。
7. **心理治疗的道德要求**:掌握和运用心理治疗的知识、技巧,给病人以心理支持;以健康、稳定的心理状态去影响和帮助病人;为病人的隐私保密。给患者以心理支持;给患者家属以安慰。
9. 医学人道主义的核心内容是**尊重病人的生命;尊重病人的人格;尊重病人的权利**。
10. 医德品质的内容:**仁爱、严谨、诚挚、公正、奉献**。
11. **行善原则**是医学道德的根本原则,也是医学道德的最高原则,当医学道德原则之间发生矛盾和冲突时,医务人员的医学道德行为选择以不违背行善原则为基准。
12. **尊重原则**的内容是尊重患者的人格;尊重患者的**自主决定权**;尊重患者的**隐私权**。

13. **公正原则**的内容是公正对待服务对象,一视同仁;公正分配卫生资源。
14. **无伤原则**是善待服务对象的起码要求。它为医学界规定了一条道德底线,那就是如果医务人员的医学行为不能有利于病人,至少不要伤害病人。
15. **医学道德规范**是医务人员在各种医学活动中应遵守的行为准则,是医学道德基本原则的具体体现,是医务人员道德行为和道德关系普遍规律的反映。
16. **医学道德情感**对医务人员的医学道德行为起着调节作用。
17. **医学道德良心**是指医务人员在履行义务的过程中,对自己行为应负道德责任的自觉认识和自我评价能力。
18. **医学道德保密**的含义是指医务人员在医护活动中应当具有对医疗和护理保守秘密的职业道德品质。体现了患者对医务人员的无比信任;体现了医务人员对病人人格和权利的尊重。
19. **医患关系**是医疗活动中最大量、首要的关系,是医学伦理学的核心问题和主要研究对象。
20. **病人的基本权利**归纳为以下几个方面:①基本医疗权。②疾病认知权。③知情同意权;④保护隐私权;⑤社会免责权;⑥经济索赔权。
21. 服务态度问题大量调查表明,**医疗服务态度**是导致医患冲突的主要原因。
22. **最优化原则**是指在临床诊疗中诊疗方案要以最小的代价获得最大效益的决策原则,也叫最佳方案原则。其内容为:疗效最佳,安全无害,痛苦最小,耗费最少。最优化原则是最普通、最基本的治疗原则。
23. **知情同意**是指患者或者家属有权知晓患者的病情,并对医务人员采取的防治措施决定取舍的自主权。知情同意原则是临床诊疗工作中处理医患关系的基本伦理准则之一。
24. **保密原则**是指医务人员在防病治病中应当保守医疗秘密,不得随意泄露病人的疾病情况等个人隐私,以防对病人造成不必要的伤害。
25. **生命价值原则**是医疗行为选择的重要伦理依据。
26. 天然实验是**不受研究者控制**的,是没有道德代价的。
27. 知情同意原则的基本精神是绝对需要**受试者**的知情同意。
28. 人体实验必须以**维护病人利益为前提**,不能只顾及医学科研而牺牲病人的根本利益。
29. 只允许使用**自愿捐献**的生殖细胞或辅助生殖多余的胚胎,供者必须是自愿捐献,贯彻知情同意原则。
30. 对人体进行的基因检测和基因治疗,都必须遵守**知情同意**的原则。

5年 历年真题

(1~2 题共用备选答案)

- | | |
|-----------------|---------------|
| A. 医患交往的经济化趋势 | B. 医患关系的法制化趋势 |
| C. 医患关系的多元化趋势 | D. 医患关系的物化趋势 |
| E. 医患关系结构的人机化趋势 | |

1. 随着社会的发展,患者对医疗卫生保健的要求出现层次上、档次上的差别,指的是

【答案】C

2. 医学高新技术的应用,使诊疗方式发生了巨大的变化,加重了医生对高新技术设备的依赖,指的是



配套名师高清视频

【答案】E

【解析】医患要求的“多元化”趋势随着社会的发展,人们的价值观念的多元化倾向也反映在医患关系上,患者对医疗卫生保健的要求也有层次上、档次上的差别,呈现出多元化倾向。医患关系结构的“人机化”趋势是指医学高新技术的应用,使诊疗方式发生了巨大变化。医生可以通过高新技术、设备获得患者的生理指标、生化指标等数据,并为自己诊疗提供依据,这样就使医患之间的人(医生)—人(患者)关系向人(医生)—机(仪器)—人(患者)的结构演变,因而医患之间直接交往减少,加重了医生对高新技术设备的依赖。所以1题选C,2题选E。

涉及考点 | 医患关系的发展趋势

3.属于医德活动现象的是

- A.医德情感
- B.医德意志
- C.医德理论
- D.医德修养
- E.医德原则

【答案】D

【解析】医德修养是医务人员在医德方面勤奋学习和涵养锻炼的功夫及进行过长期医疗实践和自我锻炼所达到的一种能力和思想品质。属于医德活动现象的一种。

涉及考点 | 医德道德修养

4.撰写“医家五戒十要”的医家是

- A.华佗
- B.张仲景
- C.孙思邈
- D.李时珍
- E.陈实功

【答案】E

【解析】东汉名医张仲景的《伤寒杂病论·自序》,是一篇具有很高价值的医德文献。隋唐时期的医德继承发展了医学人道主义传统,孙思邈堪称我国传统医德的集大成者。主张医家必须具备“精”和“诚”的精神,所谓“精”就是要具有精湛的医术,所谓“诚”就是指医生应具备高尚的医德,只有具备“精”和“诚”的医生才是“大医”,即高尚而优秀的医家。明代医家、中医外科大家陈实功所著《外科正宗》,其中包括“医家五戒”和“医家十要”。

涉及考点 | 中国古代医学道德思想的发展过程

5.下列各项,不属于中国古代医德思想内容的是

- A.不畏权贵、忠于医业的献身精神
- B.认真负责、一丝不苟的服务态度
- C.仁爱救人、赤诚济世的事业准则
- D.救死扶伤、一视同仁的道德准则
- E.清廉正直、不图钱财的道德品质

【答案】B

【解析】救死扶伤、一视同仁的道德准则,仁爱救人、赤诚济世的事业准则,清廉正直、不图钱财的道德品质,不畏权贵、忠于医业的献身精神属中国古代医德思想内容。

涉及考点 | 中国医学道德的优良传统

6.医生义务和权利中不包括

- A.保证治疗效果
- B.保证患者平等的医疗权
- C.保证患者医疗权的实现
- D.促进和维护患者身心健康
- E.履行自己的义务

【答案】A

【解析】医生的权利有:诊断的权利;了解患者隐私的权利;对患者进行各种检查的权利;对患者进行医学治疗的权利;死亡判定权;参与医学司法活动的权利;从事医学研究和参与医学学术交流的权利;获得劳动报酬的权利。医生的义务有:人道主义的义务;告知义务;为患者保密的义务;健康教育的义务;为患者提供其他医学资源的义务。所以不包括保证治疗效果。

涉及考点 | 医生的权利和义务的内容

7.被尊称为“万婴之母”的中国近代医家是

- A.林巧稚
- B.岳美中
- C.张孝骞
- D.王绍棠
- E.施今墨

【答案】A

【解析】林巧稚是著名妇产科专家,亲自接生了 50 000 多个婴儿,被尊称为“万婴之母”。

涉及考点 | 中国现代医学家的道德境界

8.“上以疗君亲之疾,下以救贫贱之厄,中可保身长全”体现的医疗活动的原则是

- A.尊重原则
- B.公益原则
- C.审慎原则
- D.公正原则
- E.保密原则

【答案】D

【解析】《伤寒杂病论》指出:“上以疗君亲之疾,下以救贫贱之厄,中可保身长全。”公正原则是指以形式公正与内容公正的有机统一为依据分配和实现医疗和健康利益的伦理原则,即具有同样医疗需要以及同等社会贡献和条件的患者应得到同样的医疗待遇。医学道德原则包括行善原则、尊重原则、公正原则、无伤原则。公正原则主要体现在两个方面,即医疗卫生资源分配公正和医学人际交往公正。患者虽有千差万别,但人人享有平等的生命健康权和医疗保健权。

涉及考点 | 公正原则的含义、内容

9.下列各项,不属于医患冲突原因的是

- A.医疗事故
- B.患者不愿支付医疗费用
- C.医疗管理方面因素
- D.医疗服务态度
- E.无法满足患者需求

【答案】B

【解析】影响医患关系的主要因素:①管理、社会方面:医疗卫生管理制度不到位,国家财政对医疗卫生投入不足;医疗保险制度不健全;医疗损害赔偿诉讼实行“举证责任倒置”的负面影响;医药流通领域的问题,媒体宣传的主观性影响。②医生方面:医方自身的缺如,医院管理的缺陷;医务人员自身素质问题;“防御性医疗”的负面效应。③患者方面:患方自身的缺如,患者期望值过高与医疗实际不符;个别患者不履行义务;个别患者利用现有体制的纰漏及社会同情,夸大事实,毫无理由地索赔。

涉及考点 | 影响医患关系的主要因素

(10~11 题共用备选答案)

- A.医生的特殊干涉权
- B.医生对自己的保护权
- C.医生的健康教育权
- D.医生接受继续教育权
- E.医生的诊疗权

10. 医生参加专业培训,学习新知识、新技能,行使的权利是

【答案】D

11. 医生根据患者情况对其所患疾病做出诊断、治疗,行使的权利是

【答案】E

【解析】现代社会和科学技术的不断发展,要求医师及时更新知识,调整知识结构,不断提高道德修养和业务水平,属于医师的继续教育权。这是医师的权利,也是医师的义务。在注册的执业范围内,医师有权根据患者的情况进行必要的医学诊疗检查,选择恰当的医疗方案、预防措施、保健方法帮助患者恢复健康;有权依据病情、疫情的需要进行疾病确查或流行病学调查,采取预防措施和必要的医学处置;同时医师有权根据患者的需要和医疗结果出具相应的医学证明,属于医疗诊治权。这是医师从事执业活动享有的基本权利。所以10题选D,11题选E。

涉及考点 | 医生的权利内容

12. 尊重患者知情同意权,其正确的做法是

- A. 无须做到患者完全知情
- B. 家属无承诺,即使患者本人知情同意也不得给予手术
- C. 对特殊急诊患者的抢救都同样对待
- D. 婴幼儿患儿可以由监护人决定其诊疗方案
- E. 只经患者同意即可手术

【答案】D

【解析】患者的知情同意权是国际上公认的患者的基本权利之一,是患者与医生在临床医疗过程中权利和义务的体现。婴幼儿缺乏自主意识,可由监护人决定其诊疗方案。患者本人同意的情况下,即使无家属承诺,也可以进行手术。在特殊急诊抢救患者时,为了最大限度地争取时间,可以特殊对待。患者同意手术,在全面考虑手术适应证和患者实际状况的情况下,可以手术。

涉及考点 | 患者的权利内容

13. 在选择诊断方法、治疗药物时,应考虑患者的经济负担和社会医疗资源,这反映的是

- A. 效益最大化原则
- B. 医疗最优化原则
- C. 医疗公正原则
- D. 知情同意原则
- E. 保护隐私原则

【答案】B

【解析】择优准则反映出医务人员对患者全面负责、周到服务的高尚品质,可以有效地保证最大限度地维护患者的利益。医务人员要依据患者所患疾病的性质、患者的意愿、医院和医务人员的自身条件、患者的经济状况和可利用的医疗卫生资源等因素进行综合考虑,确定治疗目标,从而找到相对最佳的治疗方法。

涉及考点 | 临床诊疗的道德原则

14. 下列各项,属中医学四诊的道德要求的是

- A. 认真细致
- B. 切忌片面
- C. 全面系统
- D. 安神定志
- E. 加强联系

【答案】D

【解析】中医学四诊的道德要求:①安神定志。《素问·征四失论》中就指出:“精神不专,志意不理”是医生失误的重要原因之一。孙思邈在《千金要方·大医精诚》中明确提出:“凡大医治病,必当安神定志,无欲无求”。②实事求是。

涉及考点 | 中医学四诊的道德要求

15.下列各项,符合体格检查道德要求的是

- A.安全保密,谨慎行事
- B.综合分析,合理运用
- C.全神贯注,语言得当
- D.尊重患者,心正无私
- E.客观求实,科学探索

【答案】C

【解析】体格检查的道德要求:①全面系统,认真细致。②关心体贴,减少痛苦。③尊重患者,心正无私。

涉及考点 | 体格检查的道德要求



配套名师高清视频

16.医学伦理学的特征之一是

- A.随机性
- B.组织性
- C.灵活性
- D.实践性
- E.集体性

【答案】D

【解析】医学伦理学是运用一般伦理学的原则和道德原则来研究、解决和调整医疗实践与医学科学发展中人们的道德关系和行为准则的科学。它具有三个显著的特征:实践性、继承性和时代性,而灵活性、集体性、组织性和随机性均不是医学伦理学的特征。

涉及考点 | 医学伦理学的概念

17.下列各项,不符合道德要求的是

- A.钻研药理知识,防止粗疏和盲目用药
- B.对嬰幼患儿、老年患者的用药应该谨慎,防止肾功能损害
- C.在医疗过程中要为患者保守秘密
- D.要严格遵守各种抗生素的用药规则,尽可能开患者要求的好药,贵重药物
- E.尽量为患者选择安全有效的药物

【答案】D

【解析】临床应用抗生素时必须考虑以下几个基本原则:①严格掌握适应证,凡属可用可不用的尽量不用,而且除考虑抗生素抗菌作用的针对性外,还必须掌握药物的不良反应和体内过程与疗效的关系。②发热原因不明者不宜使用抗生素。③病毒性或估计为病毒性感染的疾病不用抗生素,除能肯定为细菌感染者外,一般不使用抗生素;④皮肤、黏膜局部尽量避免反复应用抗生素;⑤严格控制预防用抗生素的范围;⑥强调综合治疗的重要性。所以不能片面满足患者所要求的好药和贵重药品。

涉及考点 | 药物治疗中的道德要求

18.下列人体实验类型中,不需要付出道德代价的是

- A.天然实验
- B.自愿实验
- C.欺骗实验
- D.强迫实验
- E.自体实验

【答案】A

【解析】人体试验的类型包括天然实验、自愿实验、强迫实验、欺骗实验。人体实验是以健康人或患者作为受试对象,用人为的实验手段有控制地对受试者进行观察和研究,以判断假说真理性的行为过程,上述各种实验,仅天然实验可不用付出道德代价。

涉及考点 | 人体实验的类型

19. 医德评价的方式是

- A. 社会舆论
- B. 自我评价
- C. 疗效标准、社会标准、科学标准
- D. 社会舆论、内心信念、传统习俗
- E. 内心信念

【答案】D

【解析】社会舆论、内心信念、传统习俗是医德评价的方式;医德评价的标准是疗效标准、社会标准和科学标准。

涉及考点 | 医学道德评价的方式

20. 在我国实施人类辅助生殖技术,下列各项中违背卫生部制定的伦理原则的是

- A. 实施亲属代孕
- B. 使用捐赠的胚胎
- C. 使用捐赠的精子
- D. 实施卵胞浆内单精注射
- E. 使用捐赠的卵子

【答案】A

【解析】我国实施人工辅助生殖技术的伦理原则包括自愿原则、知情同意原则、互盲和保密原则、严格控制实施范围及确保生殖质量原则。实施亲属代孕与严格控制实施范围、确保生殖质量原则相矛盾。

涉及考点 | 实施人类辅助生殖技术的伦理原则

21. 根据美国哈佛医学院提出的“脑死亡”概念,不能确诊“脑死亡”的条件是

- A. 体温低于 32.2 °C 或服用中枢抑制药物者
- B. 诱导反射消失
- C. 对外部刺激和内部需求毫无知觉和反应
- D. 脑电波平直或等电位
- E. 自主运动和自主呼吸消失

【答案】A

【解析】脑死亡是包括脑干在内的全脑功能丧失的不可逆转的状态。先决条件包括:昏迷原因明确,排除各种原因的可逆性昏迷。诊断标准:深昏迷,脑干反射全部消失,无自主呼吸。以上必须全部具备。确认试验:脑电图平直,经颅脑多普勒超声呈脑死亡图形,体感诱发电位以上波形消失。此三项中必须有一项阳性。故 B、C、D、E 正确,而 A 属暂时性中枢抑制,是可逆的状况,不能以此诊断为脑死亡。

涉及考点 | 死亡标准

(22~23 题共用备选答案)

- A. 互相尊重
- B. 互相爱护
- C. 互相支持
- D. 互相监督
- E. 互相学习

22. 医务人员之间虽然在职务上有上级和下级之别,在专业分工上有差异,但为患者服务的目标是一致的,体现的道德原则是

【答案】A

23. 分工明确、相互依赖是现代医疗活动的鲜明特点,体现的道德原则是

【答案】C

【解析】医务人员之间虽然在职务上有上级和下级之别,在专业分工上有差异,但为患者服务的目标是一致的,在政治地位、民主权利、人格尊严上是平等的,体现互相尊重的原则。分工明确、相互依赖是现代医疗活动的鲜明特点。医务人员只有互相支持,形成合力,才能实现正确诊断、有效治疗。

涉及考点 | 正确处理医务人员之间关系的道德原则

(24~25 题共用备选答案)

- A.医学关系中的主体在道义上应履行的职责和使命
 - B.医学关系的主体对应尽义务的自我认识 and 自我评价的能力
 - C.医学关系中的主体在道义上应享有的权利和利益
 - D.医学关系中的主体在医疗活动中对自己和他人关系的内心体验和感受
 - E.医学关系中的主体因履行道德职责受到褒奖而产生的自我赞赏
- 24.作为医学伦理学基本范畴的良心是指

【答案】B

25.作为医学伦理学基本范畴的情感是指

【答案】D

【解析】医学道德的基本范畴有权利与义务、情感与良心、审慎与保密、荣誉与幸福等。情感是人们对周围的人和事物、对自身活动态度的内心体验和自然流露。医学道德情感是建立在医务人员对患者的生命价值、人格和权利尊重的基础上,表现出对患者、对医学事业的真挚热爱,是一种高尚的情感。医学道德良心是指医务人员在履行对患者、集体和社会义务的过程中,对自己行为应负道德责任的自觉认识 and 自我评价能力。所以 24 题选 B,25 题选 D。

涉及考点 | 医学道德情感、良心的含义

(26~27 题共用备选答案)

- A.医患关系是患者与治疗者在诊疗和保健中所建立的联系
 - B.医患关系是包括非技术性和技术性方面的关系
 - C.医患关系是一种商家与消费者的关系
 - D.医患关系是具有道德意义较强的社会关系
 - E.医患关系是一种民事法律关系
- 26.反映医患关系本质的是

【答案】D

27.概括医患关系内容的是

【答案】A

【解析】医患关系的本质是指在医疗活动中医务人员同患者的关系,是一种契约关系,又是一种信托关系。随着社会发展,现在已经逐渐形成了一种复杂的社会关系。医患关系的内容是患者与治疗者在诊治过程中所建立的联系。所以 26 题选 A,27 题选 D。

涉及考点 | 医患关系的基本内容

28.在使用辅助检查手段时,不适宜的是

- A.应从患者的利益出发决定该做的项目
- B.必要检查能尽早确定诊断 and 进行治疗
- C.认真严格地掌握适应证
- D.有利于提高医生诊治疾病的能力
- E.可以广泛积极地依赖各种辅助检查

【答案】E

【解析】医学辅助检查是运用现代物理化学方法、手段进行医学诊断的一门学科,主要研究如何通过实验室技术、医疗仪器设备为临床诊断、治疗提供依据。但所有的方法都有其适用范围,并非是诊断所必需的主要的依赖条件,对疾病的诊断还是需要结合疾病的特点。

涉及考点 | 辅助检查的道德要求

2年 易错考题

1.对无伤原则的解释,正确的是

- A.对肿瘤患者进行化疗意味着绝对伤害
- B.无伤原则就是要求医生对患者丝毫不能伤害
- C.无伤原则要求对医学行为进行受益与伤害的权衡,把可控伤害控制在最低限度之内
- D.因绝大多数医疗行为都存在着不同程度的伤害,所以无伤原则是做不到的
- E.无伤原则就是消除任何医疗伤害

【答案】C

【解析】无伤原则是指在医疗活动中,应该避免对患者的任何身心伤害。从严格意义上讲,无伤害是相对而言的,医疗过程也是一把双刃剑,几乎所有的诊疗措施或治疗手段都有两面性,都难以避免对患者的身心造成不同程度的损伤。这里所说的无伤是医务人员面对患者的治疗要时刻谨记的是考虑以最小的损伤为代价去获取最好的治疗效果。

涉及考点 | 无伤原则

2.生命价值论指的是

- A.生命神圣与人道论的统一
- B.生命神圣与生命质量的统一
- C.美德论与义务论的统一
- D.生命质量与生命价值论的统一
- E.义务论与公益论的统一

【答案】B

【解析】生命价值论最突出的一点就在于它能将生命的内在价值(生命神圣论)和外在于价值(生命质量论)统一起来。并以此来评价生命的价值。

涉及考点 | 生命价值论

第十四篇 卫生法规

考情分布图

		2015	2016	2017	2018	2019
卫生法规	卫生法概述	0	1	0	0	0
	卫生法律责任	1	0	0	0	0
	执业医师法	1	1	1	1	1
	药品管理法	0	0	0	0	1
	传染病防治法	1	1	0	1	0
	突发公共卫生事件应急条例	0	1	0	1	1
	医疗纠纷预防和处理条例	1	1	0	0	0
	中医药法	0	0	1	0	0
	医疗机构从业人员行为规范	0	0	0	0	0

高频考点必背

1.《宪法》是国家的**根本大法**,是法律的母法。是国家最高权力机关——全国人民代表大会依照法定程序制定的具有最高法律效力的规范性法律文件,是各部门法的**立法依据和基准**。

2.现行的由全国人民代表大会常务委员会制定的**卫生非基本法律**有十部:《食品安全法》《药品管理法》《执业医师法》《国境卫生检疫法》《传染病防治法》《红十字会法》《母婴保健法》《献血法》《职业病防治法》《人口与计划生育法》。

3.**预防为主**是我国卫生工作的基本方针和政策,也是卫生法必须遵循的**基本原则**。

4.患者自主原则是指患者经过深思熟虑就有关自己疾病的医疗问题作出合理的、理智的并负责的**自我决定权**。维护患者权利、尊重患者自主意识也是卫生法的**基本原则之一**。

5.卫生法中的法律责任可分为**卫生民事责任、卫生行政责任和卫生刑事责任**3种。

6.卫生民事责任的特征,主要是**财产责任**。

7.卫生法所涉及的民事责任以“**赔偿损失**”为主要形式。

8.**行政处分**的种类主要有警告、记过、记大过、降级、降职、撤职、留用察看、开除等形式。

9.根据我国《刑法》规定,**实现刑事责任的方式是刑罚**。刑罚包括主刑和附加刑。主刑有管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑。它们只能单独适用。附加刑有罚金、剥夺政治权利、没收财产。

10.具有高等学校医学专业**本科以上学历**,在执业医师指导下,在医疗、预防、保健机构中试用期满**一年**的,可以参加执业医师资格考试。

11.**取得执业助理医师执业证书后**,具有高等学校医学**专科学历**,在医疗、预防、保健机构中工作满**二年**的,可以参加执业医师资格考试。

12.具有**中等专业学校医学专业学历**,在医疗、预防、保健机构中工作满**五年**的,可以参加执业医师资格考试。

13.以**师承**方式学习传统医学满**三年**或者经多年实践医术确有专长的,经县级以上人民政府卫生行政部门确定的传统医学专业组织或者医疗、预防、保健机构考核合格并推荐,可以参加执业医师资格考试。

14.受理执业医师注册申请的卫生行政部门应当自收到申请之日起**三十日内**准予注册,并发给由国务院卫生行政部门统一印制的医师执业证书。

15.药品所含成分与国家药品标准规定的**成分不符**的;以非药品**冒充**药品或者以他种药品冒充此种药品的,为**假药**。

16.**第二类精神药品**零售企业应当凭执业医师出具的处方,按规定剂量销售第二类精神药品,并将处方保存**2年**备查。

17.为门(急)诊患者开具的**麻醉药品注射剂**,每张处方为**一次**常用量;**控缓释制剂**,每张处方不得超过**7日**常用量;其他剂型,每张处方不得超过**3日**常用量。

18.**哌甲酯**用于治疗儿童多动症时,每张处方不得超过**15日**常用量。

19.普通处方、急诊处方、儿科处方保存期限为**1年**,医疗用毒性药品、第二类精神药品处方保存期限为**2年**,麻醉药品和第一类精神药品处方保存期限为**3年**。

20.处方一般不得超过**7日**用量;急诊处方一般不得超过**3日**用量。

21.生产、销售假药的,没收违法生产、销售的药品和违法所得,并处违法生产、销售药品**货值金额两倍以上五倍以下的罚款**;有药品批准证明文件的予以撤销,并责令停产、停业整顿;情节严重的,吊销有关许可证。

22.国家对传染病防治实行预防为主的方针,防治结合、分类管理、依靠科学、依靠群众。

23.医疗机构应当按照国务院卫生行政部门规定的要求,书写并妥善保管病历资料。因抢救急危患者,未能及时书写病历的,有关医务人员应当在抢救结束后**6小时内**据实补记,并加以注明。

24.突发事件的报告情形和报告时限要求:突发事件监测机构、医疗卫生机构和有关单位应当在**2小时内**向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告。

25.接到报告的卫生行政主管部门应当在**2小时内**向本级人民政府报告,并同时向上级人民政府卫生行政主管部门和国务院卫生行政主管部门报告。

26.患者死亡,医患双方对死因有争议的,应当在患者死亡后**48小时内**进行尸检;具备尸体冻存条件的,可以延长至**7日**。

27.医疗纠纷人民调解委员会应当自受理之日起**30个工作日内**完成调解。

28.医疗机构篡改、伪造、隐匿、毁灭病历资料的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,由县级以上人民政府卫生主管部门给予或者责令给予降低岗位等级或者撤职的处分,对有关医务人员责令**暂停6个月以上1年以下执业活动**。

29.《中医药法》制定目的:继承和弘扬中医药,保障和促进中医药事业发展,保护人民健康。适用的时间范围:**自2017年7月1日起施行**。

30.违反《中医药法》规定,经考核取得医师资格的中医医师超出注册的执业范围从事医疗活动的,由县级以上人民政府中医药主管部门责令**暂停六个月以上一年以下执业活动**,并处一万元以上三万元以下罚款;情节严重的,吊销执业证书。

5年 历年真题

- 1.我国卫生法规中所涉及的民事责任的主要承担方式是
- A.恢复原状
B.支付违约金
C.停止侵害
D.赔偿损失
E.消除危险

【答案】D

【解析】卫生法规中民事责任是指医疗机构和卫生工作人员或从事与卫生事业有关的机构违反法律规定侵害公民的健康权时,应向受害人承担损失赔偿的责任。承担民事责任的方式有:①停止侵害;②排除妨碍;③消除危险;④返还财产;⑤恢复原状;⑥修理、重做、更换;⑦赔偿损失;⑧支付违约金;⑨消除影响、恢复名誉;⑩赔礼道歉。卫生法所涉及的民事责任以赔偿损失为主要形式。

涉及考点 | 卫生法规中民事责任的承担方式

2.李某,自费学医后自行开业,因违反诊疗护理常规,致使患者死亡,追究其刑事责任的机关是

- A.医疗事故鉴定委员会
B.管辖地人民法院
C.卫生行政部门
D.管辖地人民政府
E.工商行政部门

【答案】B

【解析】不具有医师资格的人员,不得以任何形式开展诊疗活动(即开展医师执业活动),否则即为非法行医。李某,自费学医后自行开业,为非法行医。根据《医疗事故处理条例》第六十一条:非法行医造成患者人身损害,不属于医疗事故,触犯刑律的,依法追究刑事责任;有关赔偿,由受害人直接向人民法院提起诉讼。

涉及考点 | 医疗事故的法律 responsibility

- 3.不属于卫生法基本原则的是
- A.兼顾经济与社会效益
B.卫生工作社会化
C.中医学与现代医学相结合
D.预防为主
E.保护公民身体健康

【答案】C

【解析】卫生法的基本原则是卫生保护原则、预防为主原则、公平原则、保护社会健康原则、患者自主原则(此处大纲变化较大)。

涉及考点 | 卫生法的基本原则

4.受理申请医师注册的卫生行政部门除执业医师法第15条规定的情形外,应当自收到申请之日起多少日内准予注册,并发给由国务院卫生行政部门统一印制的医师执业证书

- A.45日
B.20日
C.15日
D.40日



配套名师高清视频

E.30 日

【答案】E

【解析】《执业医师法》第十三条规定,取得医师资格的,可以向所在地县级以上人民政府卫生行政部门申请注册。除有本法第十五条规定的情形外,受理申请的卫生行政部门应当自收到申请之日起三十日内准予注册,并发给由国务院卫生行政部门统一印制的医师执业证书。

涉及考点 | 执业医师注册的条件及办理

5.我国依法制定卫生行政法规的国家机构是

- A.最高人民法院
- B.全国人大及其常委会
- C.卫生行政部门
- D.国务院
- E.地方人民政府

【答案】D

【解析】卫生行政法规是国务院发布的关于卫生行政管理方面的规范性文件,如《医疗机构管理条例》《中医药条例》《麻醉药品管理办法》《医疗事故处理条例》等。

涉及考点 | 卫生法的渊源

6.某医科大学医学专业研究生 1999 年 7 月毕业后分配到三级医院从事临床工作,同年 12 月擅自另行开设诊所独立行医。依《中华人民共和国执业医师法》,其行为属于

- A.个体行医
- B.未办理手续非法行医
- C.执业助理医师行医
- D.未取得医师资格非法行医
- E.执业医师行医

【答案】D

【解析】《执业医师法》第十二条规定,医师资格考试成绩合格,取得执业医师资格或者执业助理医师资格。医师资格考的目的是检验、评价申请医师资格者是否具备从事医学实践所必需的基本专业知识与能力。经医师资格考试合格的人员即可依法取得相应的医师资格(执业医师资格或执业助理医师资格)。取得医师资格即具有法律规定的医师行业的准入资格,按照法律及有关规定,经注册取得医师执业证书等法定证件者,可从事医师工作。不具有医师资格的人员,不得以任何形式开展诊疗活动(即开展医师执业活动),否则即为非法行医。《执业医师法》第十九条规定,申请个体行医的执业医师,须经注册后在医疗、预防、保健机构中执业满五年,并按照国家有关规定办理审批手续,未经批准,不得行医。该医生在未取得医师资格的情况下,个体行医,属于非法行医。

涉及考点 | 执业医师注册的条件及办理

7.李某 2016 年于中医药大学毕业分配到市级中医院工作,并于 2017 年取得了中医师执业资格,《中华人民共和国执业医师法》施行当年,其依照有关开办医疗机构的规定申请个体开业。依据我国执业医师法的规定,卫生行政部门应

- A.要求其能保证个体行医质量,才能予以受理申请
- B.要求其应具备主治医师资格
- C.要求其经执业医师注册后在医疗机构中执业满 5 年
- D.批准其个体行医资格申请
- E.要求其参加国家临床中医专业技术资格考试

【答案】C

【解析】《中华人民共和国执业医师法(2009修正)》第十九条规定,申请个体行医的执业医师,须经注册后在医疗、预防、保健机构中执业满五年,并按照国家有关规定办理审批手续;未经批准,不得行医。县级以上地方人民政府卫生行政部门对个体行医的医师,应当按照国务院卫生行政部门的规定,经常监督检查,凡发现有本法第十六条规定的情形的,应当及时注销注册,收回医师执业证书。

涉及考点 | 执业医师注册的条件及办理

- 8.某药业公司将其他药品冒充感冒药销售,该药属于
- A.特殊管理药品
 - B.失效药品
 - C.劣药
 - D.假药
 - E.非处方药

【答案】D

【解析】《中华人民共和国药品管理法》第四十八条规定,禁止生产(包括配制,下同)、销售假药。有下列情形之一的,为假药:(一)药品所含成份与国家药品标准规定的成分不符的;(二)以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品的。有下列情形之一的药品,按假药论处:(一)国务院药品监督管理部门规定禁止使用的;(二)依照本法必须批准而未经批准生产、进口,或者依照本法必须检验而未经检验即销售的;(三)变质的;(四)被污染的;(五)使用依照本法必须取得批准文号而未取得批准文号的原料药生产的;(六)所标明的适应证或者功能主治超出规定范围的。《中华人民共和国药品管理法》第四十九条规定,禁止生产、销售劣药。药品成份的含量不符合国家药品标准的,为劣药。有下列情形之一的药品,按劣药论处:(一)未标明有效期或者更改有效期的;(二)不注明或者更改生产批号的;(三)超过有效期的;(四)直接接触药品的包装材料和容器未经批准的;(五)擅自添加着色剂、防腐剂、香料、矫味剂及辅料的;(六)其他不符合药品标准规定的。有下列情形之一的为假药:①药品所含成分与国家药品标准规定的成分不符的。②以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品的。

涉及考点 | 禁止生产、销售假药

- 9.医疗机构药剂人员调配处方的错误行为是
- A.对有配伍禁忌的处方,应当拒绝调配
 - B.必要时,经处方医师更正或重新签字,方可调配
 - C.处方必须经过核对,对方所列药品不得擅自更改
 - D.处方所列药品缺货时用同类药品代用
 - E.对有超剂量的处方,应当拒绝调配

【答案】D

【解析】《药品管理法》第二十七条规定,医疗机构的药剂人员调配处方,必须经过核对,对方所列药品不得擅自更改或者代用。对有配伍禁忌或者超剂量的处方,应当拒绝调配;必要时,经处方医师更正或者重新签字,方可调配。

涉及考点 | 药品必须符合法定要求

- 10.管理本行政区域医师工作的机构是
- A.各级医师协会
 - B.各级政府
 - C.县级以上人民政府劳动人事部门
 - D.县级以上人民政府卫生行政部门
 - E.县级以上人民政府工商行政部门

【答案】D

【解析】《执业医师法》第四条规定,国务院卫生行政部门主管全国的医师工作。县级以上地方人民政府卫生行政部门负责管理本行政区域内的医师工作。

涉及考点 | 执业医师注册的条件及办理

11.《药品管理法》规定对四类药品实行特殊管理,下列药品中,不属于法定特殊管理药品的是药品

- A.放射性药品
- B.医疗用毒性药品
- C.精神药品
- D.生化药品
- E.麻醉药品

【答案】D

【解析】《药品管理法》第三十九条规定,国家对麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品,实行特殊的管理。管理办法由国务院制定。

涉及考点 | 特殊药品的分类

12.某药店经营者为贪图利益而违法销售超过有效期的药品,依据《药品管理法》第75条的规定,其所在地的药品监督管理行政执法机构应给予的处罚是没收违法销售药品和违法所得,并

- A.处以违法所得一倍以上三倍以下的罚款
- B.处以违法销售药品货值金额两倍以上五倍以下的罚款
- C.处以违法销售药品货值金额一倍以上三倍以下的罚款
- D.处以违法所得二倍以上五倍以下罚款
- E.处以二千元以上五千元以下的罚款

【答案】A

【解析】《药品管理法》第七十五条规定,生产、销售劣药的,没收违法生产、销售的药品和违法所得,并处违法生产、销售药品货值金额一倍以上三倍以下的罚款;情节严重的,责令停产、停业整顿或者撤销药品批准证明文件、吊销《药品生产许可证》《药品经营许可证》或者《医疗机构制剂许可证》;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

涉及考点 | 《药品管理法》规定的行政责任

13.我国的《传染病防治法》规定的甲类传染病是

- A.鼠疫、霍乱、艾滋病、伤寒和副伤寒
- B.鼠疫、霍乱、艾滋病
- C.鼠疫、霍乱
- D.鼠疫、霍乱、伤寒和副伤寒
- E.鼠疫、艾滋病

【答案】C

【解析】传染病分为甲类、乙类和丙类。甲类传染病是指鼠疫、霍乱。乙类传染病是指传染性非典型肺炎、艾滋病、病毒性肝炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、麻疹、流行性出血热、狂犬病、流行性乙型脑炎、登革热、炭疽、细菌性和阿米巴性痢疾、肺结核、伤寒和副伤寒、流行性脑脊髓膜炎、百日咳、白喉、新生儿破伤风、猩红热、布鲁氏菌病、淋病、梅毒、钩端螺旋体病、血吸虫病、疟疾。丙类传染病是指流行性感冒、流行性腮腺炎、风疹、急性出血性结膜炎、麻风病、流行性和地方性斑疹伤寒、黑热病、包虫病、丝虫病,除霍乱、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒以外的感染性腹泻病。

涉及考点 | 法定传染病的分类



配套名师高清视频

14. 下列属于丙类传染病的病种是

- A. 艾滋病
- B. 流行性腮腺炎
- C. 结核
- D. 人感染高致病性禽流感
- E. 传染性非典型肺炎

【答案】B

【解析】《中华人民共和国传染病防治法》第三条规定,本法规定的传染病分为甲类、乙类和丙类。甲类传染病是指:鼠疫、霍乱。乙类传染病是指:传染性非典型肺炎、艾滋病、病毒性肝炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、麻疹、流行性出血热、狂犬病、流行性乙型脑炎、登革热、炭疽、细菌性和阿米巴性痢疾、肺结核、伤寒和副伤寒、流行性脑脊髓膜炎、百日咳、白喉、新生儿破伤风、猩红热、布鲁氏菌病、淋病、梅毒、钩端螺旋体病、血吸虫病、疟疾。丙类传染病是指:流行性感、流行性腮腺炎、风疹、急性出血性结膜炎、麻风病、流行性和地方性斑疹伤寒、黑热病、包虫病、丝虫病,除霍乱、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒以外的感染性腹泻病。国务院卫生行政部门根据传染病暴发、流行情况和危害程度,可以决定增加、减少或者调整乙类、丙类传染病病种并予以公布。

涉及考点 | 法定传染病的分类

15. 发现不明原因的群体性疾病的,医疗机构向所在地县级人民政府卫生行政部门报告的时限要求在

- A. 12 小时内
- B. 2 小时内
- C. 1 小时内
- D. 10 小时内
- E. 6 小时内

【答案】B

【解析】突发事性监测机构、医疗卫生机构和有关单位发现突发公共卫生事件,应当在 2 小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告;接到报告的卫生行政主管部门应当在 2 小时内向本级人民政府报告,并同时向上级人民政府卫生行政主管部门和国务院卫生行政主管部门报告。

涉及考点 | 突发公共卫生事件报告情形

16. 根据对患者人身造成的损害程度,医疗事故分为四级,医疗事故是指

- A. 造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍
- B. 造成患者明显人身损害的其他后果
- C. 抢救重危患者生命而采取紧急医疗措施造成不良后果
- D. 造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍
- E. 造成患者死亡、重度残疾

【答案】B

【解析】医疗事故分为四级:①一级医疗事故:造成患者死亡、重度残疾的。②二级医疗事故:造成患者中度残废、器官组织损伤导致严重功能障碍的。③三级医疗事故:造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的;④四级医疗事故:造成患者明显人身损害的其他后果的。

涉及考点 | 医疗事故的分级

17. 下列不属于乙类传染病的是

- A. 流行性感冒
- B. 病毒性肝炎

- C.艾滋病
E.狂犬病
- D.麻疹

【答案】A

【解析】乙类传染病是指：传染性非典型肺炎、艾滋病、病毒性肝炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、麻疹、流行性出血热、狂犬病、流行性乙型脑炎、登革热、炭疽、细菌性和阿米巴性痢疾、肺结核、伤寒和副伤寒、流行性脑脊髓膜炎、百日咳、白喉、新生儿破伤风、猩红热、布鲁氏菌病、淋病、梅毒、钩端螺旋体病、血吸虫病、疟疾。

涉及考点 | 法定传染病的分类

18. 医务人员在医疗活动中发生或者发现医疗事故,可能引起医疗事故的医疗过失行为或者生医疗事故争议的,应当立即向何者汇报

- A.院长
B.医务处
C.科室负责人
D.医疗事故鉴定委员会
E.当地卫生行政部门

【答案】C

【解析】医务人员在医疗活动中发生或者发现医疗事故、可能引起医疗事故的医疗过失行为或者发生医疗事故争议的,应当立即向所在科室负责人报告,科室负责人应当及时向本医疗机构负责医疗服务质量监控的部门或者专(兼)职人员报告;负责医疗服务质量监控的部门或者专(兼)职人员接到报告后,应当立即进行调查、核实,将有关情况如实向本医疗机构的负责人报告,并向患者通报、解释。

涉及考点 | 医疗事故的报告

19. 城镇中发现甲类传染病和乙类传染病中的艾滋病、肺炭疽病的患者、病原携带者和疑似患者时,国家规定的报告时间是

- A.12 小时
B.8 小时
C.10 小时
D.6 小时以内
E.24 小时

【答案】D

【解析】卫生部第 37 号令《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》第十九条规定,责任报告单位对甲类传染病、传染性非典型肺炎和乙类传染病中艾滋病、肺炭疽、脊髓灰质炎的患者、病原携带者或疑似患者,城镇应于 6 小时内、农村应于 12 小时内通过传染病疫情监测信息系统进行报告。对其他乙类传染病患者、疑似患者和伤寒、副伤寒、痢疾、梅毒、淋病、乙型肝炎、白喉、疟疾的病原携带者,城镇应于 6 小时内、农村应于 12 小时内通过传染病疫情监测信息系统进行报告。

涉及考点 | 传染病疫情报告

20. 依据 2002 年 9 月 1 日实施的《医疗事故处理条例》,不属于医疗事故的是

- A.药房等非临床科室因过失导致患者人身损害
B.医务人员违反诊疗常规,造成患者一般功能性障碍
C.在医疗活动中,由于患者病情异常而发生医疗意外
D.医务人员违反护理常规,造成患者轻度残废
E.医疗机构违反规章造成患者重度残废

【答案】C

【解析】医疗事故是指医疗机构及其医务人员在医疗活动中,违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规,过失造成患者人身损害的事故。确定是否为医疗事故目前需要医疗事故鉴定委员会鉴定才能认定。选项C是由于患者病情的变化而发生的意外,不属于此范畴。

涉及考点 | 医疗事故的概念

(21~22题共用备选答案)

- A. 承担责任范围内的传染病监测管理工作
 - B. 对违反《中华人民共和国传染病防治法》的行为给予行政处罚
 - C. 对甲类传染病疫区实施封锁管理
 - D. 在必要时可以采取停工、停业、停课等措施
 - E. 承担本单位及负责地段的传染病预防、控制和疫情管理工作
21. 各级各类卫生防疫机构按照专业分工应

【答案】A

22. 各级各类医疗保健机构设立的预防保健组织或人员应

【答案】E

【解析】《传染病防治法实施办法》第四条规定,各级各类卫生防疫机构按照专业分工承担传染病监测管理的责任和范围,由省级政府卫生行政部门确定。第十三条规定,各级各类医疗保健机构的预防保健组织或者人员,在本单位及责任地段内承担下列工作:①传染病疫情报告和管理。②传染病预防和控制工作。③卫生行政部门指定的卫生防治机构交付的传染病防治和监测任务。所以21题选A,22题选E。

涉及考点 | 各级医疗机构在传染病预防控制中的职责

(23~24题共用备选答案)

- A. 非处方用药
- B. 保健药品
- C. 假药
- D. 劣药
- E. 特殊药品

23. 药品所含成分的名称与国家药品标准或者省、自治区、直辖市药品标准规定不符合的是

【答案】C

24. 药品成分的含量与国家药品标准或者省、自治区、直辖市药品标准规定不符合的是

【答案】D

【解析】按照《药品管理法》规定,药品所含成分与国家药品标准规定的成分不符的,以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品的为假药。药品成分的含量不符合国家药品标准的,为劣药。所以23题选C,24题选D。

涉及考点 | 禁止生产、销售假药、劣药

2年 易错考题

1. 下列各项,属于行政处罚的是

- A. 降级
- B. 赔礼道歉
- C. 罚款
- D. 赔偿损失

E. 撤职

【答案】C

【解析】行政处罚的种类:①警告。②罚款。③没收违法所得、没收非法财物;④责令停产、停业整顿;⑤暂扣或者吊销执照;⑥行政拘留;⑦法律、行政法规规定的其他行政处罚。

涉及考点 | 卫生行政处罚的种类

2. 依照《麻醉药品管理办法》的规定,麻醉药品的处方剂量,每张处方注射剂不得超过多少日的常用量

A. 14 日

B. 7 日

C. 5 日

D. 3 日

E. 2 日

【答案】E

【解析】对麻醉药品的规定,①对普通患者:每张处方最大量注射剂不得超过 2 日常用量,片剂、酞剂、糖浆剂等不得超过 3 日常用量。②对领有麻醉药品专用卡患者:每张处方最大量注射剂不得超过 3 日用量,片剂、酞剂、糖浆剂等不得超过 7 日用量,控释缓释剂不得超过 15 日用量。

涉及考点 | 麻醉药品管理的相关规定

3. 除特殊需要外,第一类精神药品的处方,每次不得超过多少日的常用量

A. 14 日

B. 7 日

C. 5 日

D. 3 日

E. 1 日

【答案】D

【解析】《处方管理办法》第二十三条规定,为门(急)诊患者开具的第一类精神药品注射剂,每张处方为 1 次常用量;控缓释制剂,每张处方不得超过 7 日常用量;其他剂型,每张处方不得超过 3 日常用量。哌甲酯用于治疗儿童多动症时,每张处方不得超过 15 日常用量。

涉及考点 | 精神药品管理的相关规定

4. 为保证儿童及时接受预防接种,医疗机构与儿童的监护人员应当

A. 先由监护人提出

B. 相互配合

C. 先由医疗机构提出

D. 订立合同

E. 共同协商

【答案】B

【解析】《传染病防治法》第十五条规定,国家对儿童实行预防接种证制度。国家免疫规划项目的预防接种实行免费。医疗机构、疾病预防控制机构与儿童的监护人应当相互配合,保证儿童及时接受预防接种。具体办法由国务院制定。

涉及考点 | 国家建立传染病预防的相关制度

(5~6 题共用备选答案)

A. 造成患者器官组织损伤

B. 造成患者重度残疾

C. 造成患者中度残疾

D. 造成患者死亡

E. 造成患者轻度残疾

5. 属于二级医疗事故的是

【答案】C

6.属于三级医疗事故的是

【答案】E

【解析】根据对患者人身造成的损害程度,医疗事故分为四级。一级医疗事故:造成患者死亡、重度残疾的;二级医疗事故:造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍的;三级医疗事故:造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的;四级医疗事故:造成患者明显人身损害的其他后果的。所以5题选C,6题选E。

涉及考点 || 医疗事故的分级

模拟试卷

第一单元

A1 型题

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- “元神之府”指的是
 - 脑
 - 胆
 - 骨
 - 髓
 - 女子胞
- 具有升散耗气特性的邪气是
 - 风邪
 - 寒邪
 - 暑邪
 - 湿邪
 - 燥邪
- 下列各项,不属于黑色所主病证的是
 - 寒证
 - 水饮
 - 瘀血
 - 肾虚
 - 脾虚
- 根据五轮学说,白睛属
 - 脾
 - 肺
 - 心
 - 肝
 - 肾
- “动极者镇之以静,阴亢者胜之以阳”,说明阴阳之间的关系是
 - 阴阳互藏
 - 阴阳互根
 - 阴阳平衡
 - 阴阳转化
 - 阴阳制约
- 阴中求阳的适应证是
 - 阴虚
 - 阳虚
 - 阴盛
 - 阳盛
 - 阴阳两虚
- “阴阳离决,精气乃绝”所反映的阴阳关系是
 - 对立制约
 - 互根互用
 - 相互交感
 - 消长平衡
 - 相互转化
- 见肝之病,知肝传脾的病机传变是
 - 木克土
 - 木乘土
 - 土侮木
 - 子病犯母
 - 母病及子
- 下列各项中,属于相乘传变的是
 - 肺病及肾
 - 肺病及心
 - 心病及肝
 - 肝病及肾
 - 脾病及肾

10. 下列不按五行相生顺序排列的是

- A. 呼、笑、歌、哭、呻
- B. 生、长、化、收、藏
- C. 青、赤、黄、白、黑
- D. 酸、苦、甘、辛、咸
- E. 角、徵、商、宫、羽

11. 肺主一身之气是指

- A. 吸入清气
- B. 宣发卫气
- C. 生成宗气
- D. 助心行血
- E. 呼出浊气

12. 三焦的生理功能是

- A. 通行元气
- B. 传化水谷
- C. 化生精气
- D. 调畅气机
- E. 助心行血

13. 心主神志最主要的物质基础是

- A. 血液
- B. 津液
- C. 精液
- D. 宗气
- E. 营气

14. 脾主升清的确切内涵是

- A. 脾的阳气主升
- B. 脾以升为健
- C. 脾气散精, 上归于肺
- D. 与胃的降浊相对而言
- E. 输布津液, 防止水湿内生

15. 肾主纳气的主要生理作用是

- A. 有助于元气的固摄
- B. 有助于元气的生成
- C. 有助于精液的固摄
- D. 使肺之呼吸保持一定的深度
- E. 有助于肺气的宣发

16. 说肺为娇脏的主要依据是

- A. 肺主一身之气
- B. 肺外合皮毛
- C. 肺朝百脉

D. 肺为水之上源

E. 肺气通于天, 不耐寒热

17. 脏腑关系中, 被称为“燥湿相济”的是

- A. 肺、大肠
- B. 心、肾
- C. 脾、胃
- D. 肾、膀胱
- E. 肺、肝

18. 下列各脏中, 其生理特性以升为主的是

- A. 肝与脾
- B. 肺与肝
- C. 肝与肾
- D. 肺与脾
- E. 心与肾

19. 目的视觉功能主要取决于

- A. 肾中精气的充盈
- B. 肝血的充足
- C. 脾气的健运
- D. 肾阳的蒸化
- E. 肾阴的滋养

20. 与语言、声音、呼吸强弱有关的气是

- A. 营气
- B. 经气
- C. 元气
- D. 卫气
- E. 宗气

21. “吐下之余, 定无完气”的生理基础是

- A. 气能生津
- B. 气能化津
- C. 气能摄津
- D. 津能载气
- E. 血能化气

22. 寒邪的性质和致病特征是

- A. 为阴邪, 易阻气机
- B. 其性凝滞, 易发疼痛
- C. 易伤津液
- D. 其性黏滞, 病难速愈
- E. 其性重浊, 可致周身酸痛

23. 下列各项, 属痰湿内阻型头晕的临床

表现的是

- A. 头晕胀痛
- B. 头晕昏沉
- C. 头晕眼花
- D. 头晕耳鸣
- E. 头晕欲仆

24. 患者口气酸臭,脘腹胀满者,其病机是

- A. 肝胃蕴热
- B. 胃肠蕴热
- C. 口腔不洁
- D. 内有脓疡
- E. 食积胃肠

25. 肾阳虚不能温脾,以致脾阳不振,其治疗宜

- A. 益火补土法
- B. 泻南补北法
- C. 抑木扶土法
- D. 培土制水法
- E. 金水相生法

26. 与水液代谢关系最密切的脏腑是

- A. 脾、胃、肝
- B. 肺、肾、脾
- C. 肝、肺、脾
- D. 肝、脾、肾
- E. 心、肾、肺

27. 独语、错语的共同病因是

- A. 风痰阻络
- B. 热扰心神
- C. 心气大伤
- D. 心气不足
- E. 痰火扰心

28. 假神的病机是

- A. 阴盛于内,格阳于外
- B. 机体阴阳严重失调
- C. 脏腑虚衰,功能低下
- D. 气血不足,精神亏损
- E. 精气衰竭,虚阳外越

29. 患者但卧不能坐,坐则晕眩,可见于

- A. 喘证
- B. 肺胀

C. 水气凌心

D. 痰饮停肺

E. 肝阳化风

30. 饮食五味失宜,引起“脉凝泣而变色”

的是

- A. 多食酸
- B. 多食苦
- C. 多食甘
- D. 多食辛
- E. 多食咸

31. 舌绛少苔有裂纹,多见于

- A. 热邪内盛
- B. 气血两虚
- C. 阴虚火旺
- D. 瘀血内阻
- E. 脾虚湿侵

32. 外感秽浊与热毒之邪相合的舌象是

- A. 白腻苔
- B. 黄腻苔
- C. 积粉苔
- D. 灰黑苔
- E. 腐苔

33. 阳虚湿盛的舌象是

- A. 舌红苔白滑
- B. 舌淡嫩苔白滑
- C. 舌边红苔黑润
- D. 舌红瘦苔黑
- E. 舌绛苔黏腻

34. 下列各项,与牙齿干燥如枯骨关系最

密切的是

- A. 热盛伤津
- B. 阳明热盛
- C. 胃阴不足
- D. 肾阴枯涸
- E. 肺阴亏虚

35. 口干但欲漱水不欲咽多见于

- A. 寒盛
- B. 阴虚
- C. 痰饮
- D. 热盛

- E.瘀血
- 36.咳声重浊者,多属
- A.风寒
B.风热
C.痰饮
D.燥热
E.寒湿
- 37.情志郁结所致胸痛的表现是
- A.胸背彻痛
B.胸痛咳嗽
C.憋闷疼痛
D.胀痛走窜
E.刺痛不移
- 38.患者口淡乏味,常提示的是
- A.脾胃虚弱
B.湿热蕴脾
C.肝胃郁热
D.痰热内盛
E.食滞胃脘
- 39.外感风寒或风热之邪,或痰湿壅肺,肺失宣肃,导致的音哑或失音,称为
- A.子暗
B.金破不鸣
C.金实不鸣
D.少气
E.短气
- 40.下列除哪项外,均有脉率快的特点
- A.数
B.促
C.滑
D.疾
E.动
- 41.下列各项,不属于弦脉所主的病证是
- A.健康老人
B.胃热
C.痛证
D.痰饮
E.肝郁
- 42.以下与饮食停滞无关的脉象是
- A.滑脉
B.促脉
C.滑数脉
D.结脉
E.紧脉
- 43.下列脉象,除哪项外,均主实证
- A.弦
B.长
C.滑
D.紧
E.濡
- 44.咳声如犬吠样,可见于
- A.百日咳
B.白喉
C.肺痿
D.肺癆
E.感冒
- 45.咳声短促,连续不断,咳后有鸡鸣样回声称为
- A.顿咳
B.肺癆
C.肺痈
D.肺痿
E.白喉
- 46.痰湿内阻所致头晕的特征,是伴有
- A.胀痛
B.跳痛
C.目眩
D.耳鸣
E.昏沉
- 47.少气懒言,神疲乏力,气短自汗,舌淡脉虚,其证候是
- A.气虚证
B.气陷证
C.气脱证
D.气逆证
E.气滞证
- 48.心气虚、心阳虚、心血虚、心阴虚四证
的共同临床表现是
- A.心痛
B.心烦

- C.失眠
D.健忘
E.心悸
- 49.下列哪项不是阴水证的临床表现
- A.水肿先从下肢肿起
B.下半身肿痛
C.腰酸肢冷
D.水肿皮薄光亮
E.起病缓,病程长
- 50.下列除哪项外,均为里实热证的表现
- A.身发高热
B.口渴饮冷
C.脉象洪数
D.热汗不止
E.两颧潮红
- 51.入汤剂时需后下的药物是
- A.磁石、牡蛎
B.蒲黄、海金沙
C.薄荷、白豆蔻
D.人参、鹿茸
E.芒硝、阿胶
- 52.龟甲入汤剂应当
- A.包煎
B.先煎
C.后下
D.另煎
E.烊化
- 53.功效有某种共性的药物配合应用,辅药能增强主药的疗效,这种配伍关系是
- A.相反
B.相恶
C.相杀
D.相畏
E.相使
- 54.人参配莱菔子在药物七情配伍关系中属
- A.相须
B.相使
C.相杀
D.相畏
E.相恶
- 55.功能祛风散寒止痛,善治巅顶头痛的药物是
- A.白芷
B.藁本
C.细辛
D.吴茱萸
E.川芎
- 56.干姜配伍附子,可降低附子的毒性,属于
- A.相须
B.相使
C.相畏
D.相杀
E.相反
- 57.治疗咽喉红肿疼痛,兼有肺热咳嗽痰多者,应首选
- A.鱼腥草
B.山豆根
C.马勃
D.板蓝根
E.射干
- 58.既能化湿,又能解暑的药物是
- A.豆蔻、砂仁
B.白术、厚朴
C.藿香、佩兰
D.橘皮、青皮
E.茯苓、白术
- 59.石膏的性味是
- A.辛、苦、大寒
B.辛、咸、大寒
C.辛、酸、大寒
D.辛、甘、大寒
E.甘、淡、大寒
- 60.治疗外感发热,邪郁肌腠,经气不利,项背强痛者,应首选
- A.荆芥
B.白芷
C.薄荷
D.葛根

- E.柴胡
- 61.既能润肠通便,又能利水消肿的药物是
- A.决明子
B.知母
C.杏仁
D.郁李仁
E.火麻仁
- 62.胃火炽盛,消谷善饥,烦渴多饮者,治疗宜选用
- A.黄芩
B.黄连
C.黄柏
D.栀子
E.苦参
- 63.下列药物中,能燥湿止带的是
- A.苍耳子
B.白芷
C.羌活
D.防风
E.藁本
- 64.下列各项,不属于薄荷功效的是
- A.疏散风热
B.疏肝行气
C.清热凉血
D.利咽透疹
E.清利头目
- 65.下列活血药中还具有润肠通便功效的是
- A.泽兰
B.桃仁
C.红花
D.益母草
E.丹参
- 66.具有燥湿健脾,祛风湿,发汗,明目功效的药物是
- A.苍术
B.厚朴
C.藿香
D.佩兰

- E.砂仁
- 67.具有利水通淋、通乳作用的药物是
- A.草薢
B.木通
C.泽泻
D.地肤子
E.车前草
- 68.既能消食化积,又能降气化痰的药物是
- A.麦芽
B.莱菔子
C.鸡内金
D.神曲
E.山楂
- 69.下列具有清热解毒,消痈排脓,利尿通淋功效的药物是
- A.大青叶
B.鱼腥草
C.夏枯草
D.蒲公英
E.地肤子
- 70.下列各项中,不属于竹叶石膏汤组成药物的是
- A.知母、生地
B.人参、粳米
C.竹叶、麦冬
D.石膏、麦冬
E.炙甘草、半夏
- 71.麦门冬汤的组成药物是
- A.麦门冬、沙参、半夏、粳米、甘草、大枣
B.麦门冬、人参、生姜、粳米、甘草、大枣
C.麦门冬、半夏、人参、粳米、甘草、大枣
D.麦门冬、竹叶、人参、生姜、甘草、大枣
E.麦门冬、半夏、人参、生姜、甘草、大枣
- 72.下列各项中,不属于普济消毒饮组成药物的是
- A.黄芩、黄连、连翘
B.防风、赤芍、当归
C.甘草、桔梗、马勃
D.升麻、陈皮、板蓝根

- E. 玄参、柴胡、牛蒡子
73. 止嗽散的组成药物中含有
- A. 青皮
B. 木香
C. 香附
D. 厚朴
E. 陈皮
74. 温经汤的功用是
- A. 温经散寒, 养血祛瘀
B. 温经散寒, 活血祛瘀
C. 活血祛瘀, 散结止痛
D. 活血化瘀, 温经止痛
E. 温经散寒, 养血通脉
75. 白虎汤中石膏与知母相伍之意为
- A. 清营凉血, 滋阴养血
B. 益胃生津, 凉血宽胸
C. 清热生津, 除烦止渴
D. 清热凉血, 养阴润燥
E. 泻火除湿, 滋阴凉血
76. 下列具有疏风散邪, 清热解毒功用的方剂是
- A. 黄连解毒汤
B. 普济消毒饮
C. 清瘟败毒饮
D. 青蒿鳖甲汤
E. 龙胆泻肝汤
77. 清营汤的功用是
- A. 清营解毒, 透热养阴
B. 益气养阴, 宁心安神
C. 清热凉血, 养阴生津
D. 泻火养阴, 凉血散瘀
E. 泻火解毒, 凉血止血
78. 清燥救肺汤原方配伍用量最大的药物是
- A. 石膏
B. 麦冬
C. 人参
D. 阿胶
E. 桑叶
79. 具有清热解毒, 消肿溃坚, 活血止痛功用的方剂是
- A. 四妙勇安汤
B. 大黄牡丹汤
C. 犀黄丸
D. 仙方活命饮
E. 苇茎汤
80. 至宝丹的功用是
- A. 开窍定惊, 清热化痰
B. 清热解毒, 开窍醒神
C. 清热解毒, 开窍安神
D. 化浊开窍, 清热解毒
E. 清热开窍, 息风止痉
81. 半夏泻心汤与小柴胡汤两方相同的药物是
- A. 半夏、黄连、黄芩、甘草、大枣
B. 人参、黄芩、半夏、干姜、甘草
C. 半夏、黄芩、人参、甘草、大枣
D. 人参、生姜、半夏、甘草、大枣
E. 柴胡、人参、黄芩、甘草、生姜
82. 旋覆代赭汤的组成药物中不含
- A. 丁香、厚朴
B. 大枣、炙甘草
C. 生姜、半夏
D. 人参、炙甘草
E. 生姜、大枣
83. 青蒿鳖甲汤主治证的热型是
- A. 骨蒸潮热
B. 夜热早凉
C. 日晡潮热
D. 身热夜甚
E. 皮肤蒸热
84. 下列各项, 不属理中丸主治范围的是
- A. 阳虚失血证
B. 脾胃虚寒之腹痛
C. 中焦虚寒之小儿慢惊风
D. 肝胃虚寒之胃脘痛
E. 脾胃虚寒之胸痹
85. 右归丸除温补肾阳外, 还具有的功用是
- A. 纳气平喘

- B.补益脾胃
C.理气健脾
D.散寒止痛
E.填精益髓
- 86.大黄宜后下的方剂是
A.大黄牡丹汤
B.大承气汤
C.黄龙汤
D.芍药汤
E.温脾汤
- 87.当归补血汤原方当归与黄芪的配伍用量比例是
A.1 : 1
B.1 : 3
C.1 : 5
D.3 : 1
E.5 : 1
- 88.四物汤的主治病证是
A.气衰血少
B.劳倦内伤
C.冲任虚损
D.郁怒伤肝
E.阴精亏虚
- 89.参苓白术散中具有芳香醒脾之功的药物是
A.厚朴
B.佩兰
C.藿香
D.砂仁
E.桔梗
- 90.症见寒热如疟,寒轻热重,口苦膈闷,吐酸苦水,舌红苔白腻,治疗宜选用
A.小柴胡汤
B.大柴胡汤
C.蒿芩清胆汤
D.逍遥散
E.半夏泻心汤
- 91.当归四逆汤的功用是
A.温经散寒,养血通脉
B.益气温经,和血通痹
C.回阳救逆,益气养阴
D.回阳救逆,养阴固脱
E.温中补虚,降逆止痛
- 92.酸枣仁汤中养肝血,安心神的药物是
A.知母
B.川芎
C.茯苓
D.甘草
E.酸枣仁
- 93.芍药汤的功用是
A.清热解毒,凉血止痢
B.清热燥湿,调和气血
C.燥湿运脾,行气和胃
D.宣畅气机,清利湿热
E.清热化湿,理气和中
- 94.长期服用肾上腺糖皮质激素的患者会出现
A.二尖瓣面容
B.满月面容
C.急性热病面容
D.无欲貌
E.贫血面容
- 95.容易闻及二尖瓣杂音的体位是
A.左侧卧位
B.右侧卧位
C.平卧位
D.立位
E.坐位
- 96.嘶哑样咳嗽,可见于
A.急性喉炎
B.声带疾患
C.百日咳
D.胸膜炎
E.支气管扩张
- 97.下列关于溶血性黄疸的叙述,正确的是
A.直接迅速反应阳性
B.尿中结合胆红素阴性
C.血中非结合胆红素不增加
D.尿胆原阴性

- E.大便呈灰白色
- 98.肺气肿时,心脏浊音界的改变多为
- A.心浊音界向左扩大
B.心浊音界缩小
C.心浊音界向右扩大
D.心浊音界向两侧扩大
E.以上均非
- 99.下列各项,可出现金属样肠蠕动音的是
- A.机械性肠梗阻
B.麻痹性肠梗阻
C.低血钾
D.急性胃炎
E.败血症
- 100.下列哪项体征最能提示腹膜炎的存在
- A.肠鸣音减弱
B.叩出移动性浊音
C.腹部压痛
D.腹部触及肿块
E.反跳痛
- 101.血清总胆红素、结合胆红素、非结合胆红素均中度增加。可见于
- A.蚕豆病
B.胆石症
C.珠蛋白生成障碍性贫血
D.急性黄疸性肝炎
E.胰头癌
- 102.下列除哪项外,均可为正常的叩诊音
- A.实音
B.清音
C.鼓音
D.浊音
E.震水音
- 103.下列各项,可出现双侧瞳孔散大的是
- A.阿托品影响
B.氯丙嗪影响
C.有机磷农药中毒
D.毒蕈中毒
E.毛果芸香碱中毒
- 104.下列哪项属于非感染性发热的疾病
- A.肺结核
B.血清病
C.急性肾盂肾炎
D.伤寒
E.肺炎
- 105.肺部叩诊出现实音应考虑的疾病是
- A.肺炎
B.胸膜炎
C.肺空洞
D.肺气肿
E.大量胸腔积液
- 106.大叶性肺炎叩诊呈
- A.过清音
B.鼓音
C.浊音或实音
D.清音
E.气过水声
- 107.心电图S-T段上抬超过正常范围且弓背向上,见于
- A.急性心肌梗死
B.急性心包炎
C.变异型心绞痛
D.低血钾
E.心肌肥厚
- 108.血白细胞总数增多,可见于
- A.伤寒杆菌感染
B.再生障碍性贫血
C.急性失血
D.使用氯霉素的影响
E.脾功能亢进
- 109.《突发公共卫生事件应急条例》规定:突发事件应急工作应当遵循的原则是
- A.完善并建立监测与预警手段
B.预防为主,常备不懈
C.积极预防,认真报告
D.及时调查,认真处理
E.监测分析,综合评价
- 110.人们在从事卫生活动的过程中,必须遵守的各项准则是

- A. 卫生行政法规
- B. 卫生法概念
- C. 卫生法基本原则
- D. 卫生法
- E. 地方卫生法规

111.《医疗废物管理条例》中所称医疗废物,是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健及其他相关活动中产生的

- A. 麻醉、精神性药品的废弃物
- B. 放射性、医疗用毒性药品的废弃物
- C. 具有直接或间接感染性、毒性以及其他危害性的废物

A2 型题

- D. 医院制剂配制中产生的中药材废渣
 - E. 普通医疗生活用品废弃物
112. 根据美国哈佛医学院提出的“脑死亡”概念,不能确诊“脑死亡”的条件是
- A. 自主运动和自主呼吸消失
 - B. 对外部刺激和内部需求毫无知觉和反应
 - C. 体温低于 32.2℃ 或服用中枢抑制药物者
 - D. 脑电波平直或等电位
 - E. 诱导反射消失

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

113. 患者头晕目花,少气倦怠,腹部有坠胀感,脱肛,舌淡苔白,脉弱。其证候是

- A. 气滞
- B. 气虚
- C. 气陷
- D. 气结
- E. 气逆

114. 患者,男性,48 岁。咳嗽,痰稠而黏,咳痰不爽,咽喉干燥,舌苔白而干。治疗首选方剂是

- A. 清气化痰丸
- B. 杏苏散
- C. 贝母瓜蒌散
- D. 二陈汤
- E. 麦门冬汤

115. 患者,男,41 岁。久泻脱肛,体倦肢软,自汗出,渴喜热饮,少气懒言,舌淡苔薄白,脉洪而虚。治疗应选用

- A. 参苓白术散
- B. 补中益气汤
- C. 真人养脏汤
- D. 四神丸
- E. 理中丸

116. 患者,男,70 岁。神志痴呆,表情淡漠,举止失常,面色晦滞,胸闷泛恶,舌苔白腻,脉滑。其病机是

- A. 痰迷心窍
- B. 痰火扰心
- C. 心血瘀阻
- D. 肾精亏虚
- E. 心脾两虚

117. 患者腹部痞胀,纳呆呕恶,肢体困重,身热起伏,汗出热不解,尿黄便溏。其舌象应是

- A. 舌红苔黄腻
- B. 舌红苔黄糙
- C. 舌绛苔少而干
- D. 舌绛苔少而润
- E. 舌红苔白而干

118. 患者面色萎黄,头晕眼花,四肢倦怠,气短少言,心悸不安,食欲减退,舌淡苔白,脉细弱。治疗应首选

- A. 四物汤
- B. 归脾汤
- C. 当归补血汤
- D. 四君子汤

E.八珍汤

119.患者,女,25岁,已婚。胃脘痞满,嘈杂,饥不欲食,暖气,口燥咽干,大便秘结,舌红少津,脉细数。其病机是

- A.脾阴不足
- B.胃阴不足
- C.胃燥津亏
- D.胃热炽盛
- E.肝胃不和

120.患者,女,32岁,已婚。面色萎黄,神疲乏力,气短懒言,食少便溏,月经淋漓不断,经血色淡,舌淡无苔,脉沉细无力。其病机是

- A.脾不统血
- B.脾肾阳虚
- C.气血两虚
- D.脾肺气虚
- E.肝血不足

121.患者,男,26岁。淋雨后寒战,发热,咳嗽,咯铁锈色痰,胸痛。查体:口唇周围有单纯疱疹,叩诊右下肺轻度浊音,听诊呼吸音减低。应首先考虑的是

- A.急性支气管炎
- B.肺结核
- C.急性肺脓肿
- D.肺炎链球菌肺炎
- E.病毒性肺炎

122.患者,成年男性。结喉两侧各有1个3 cm×2 cm×1 cm,表面光滑,无压痛,随吞咽上下活动的肿物。为明确诊断,应首选的检查方法是

- A.血清T₃、T₄测定
- B.血常规
- C.¹³¹I扫描
- D.胸颈部X线
- E.血气分析

123.患者,女,65岁。反复发作心绞痛20余年,12小时前剧烈胸痛伴大汗淋漓,含服硝酸甘油30分钟不缓解,心电图示V₁~V₃导联T段弓背向上抬高,呈单向曲线,伴深而宽的Q波,应诊断为

- A.急性前壁心肌梗死
- B.急性下壁心肌梗死
- C.急性前间壁心肌梗死
- D.急性后壁心肌梗死
- E.急性右室梗死

124.患者,男,43岁。近3日来发热,微恶寒,口苦,胁痛,尿短黄,大便黏臭,舌红苔薄白,脉数。其证候是

- A.表里俱热
- B.表寒里热
- C.真寒假热
- D.真热假寒
- E.表热里寒

125.患者,男,44岁。素有高血压病史,现症见眩晕耳鸣,面红头胀,腰膝酸软,失眠多梦,时有遗精或性欲亢进,舌红,脉沉弦细。其病机是

- A.阴虚内热
- B.阴损及阳
- C.阴虚火旺
- D.阳损及阴
- E.阴虚阳亢

126.患者,女,28岁。产后7天,右侧乳房红肿疼痛,触摸到硬块,大便如常,小便色黄。治疗应首选

- A.大青叶
- B.蒲公英
- C.淡竹叶
- D.栀子
- E.知母

127.患者,男,32岁。自觉两目模糊,视物不清,伴有头痛,眩晕,舌红少苔,脉细弦。治疗应首选

- A.升麻
- B.葛根
- C.薄荷
- D.柴胡
- E.菊花

128.患者,男,30岁。发热伴胸痛,咳嗽,体温40℃,持续1周,1日内体温上下波动不

超过 1℃。其发热的热型是

- A. 间歇热
- B. 弛张热
- C. 稽留热
- D. 不规则热
- E. 回归热

129. 某医生因技术过失致患者组织器官损伤造成功能障碍。在调查中发现其涂改、伪造病案和有关资料,给调查带来极大的困难,情节较为严重。其所在单位应采取的措施的是

- A. 罚款

B. 责令书面检查

C. 记大过

D. 吊销医师执业资格证书

E. 交有关部门追究刑事责任

130. 李某,自费学医后自行开业,因违反诊疗护理常规,致使患者死亡,追究其刑事责任的机关是

A. 卫生行政部门

B. 工商行政部门

C. 医疗事故鉴定委员会

D. 管辖地人民政府

E. 管辖地人民法院

B1 型题

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(131~132 题共用备选答案)

- A. 泻南补北
- B. 扶土抑木
- C. 滋水涵木
- D. 培土生金
- E. 佐金平木

131. 心肾不交的治法是

132. 肝阳上亢的治法是

(133~134 题共用备选答案)

- A. 心、肺
- B. 心、肝
- C. 肺、脾
- D. 肺、肝
- E. 肺、肾

133. 与气的生成关系最密切的是

134. 与呼吸运动关系最密切的是

(135~136 题共用备选答案)

- A. 肝胃不和
- B. 脾胃虚弱
- C. 脾胃湿热
- D. 寒水上泛
- E. 燥热伤津

135. 口甜黏腻是因

136. 口中泛酸是因

(137~138 题共用备选答案)

- A. 动则汗出
- B. 蒸蒸汗出
- C. 半身汗出
- D. 汗出如油
- E. 睡时汗出

137. 实热证汗出特点是

138. 阴虚证汗出特点是

(139~140 题共用备选答案)

- A. 寒积便秘
- B. 虫积便秘
- C. 阳虚便秘
- D. 肠燥便秘
- E. 热积便秘

139. 大黄的主治病证是

140. 巴豆的主治病证是

(141~142 题共用备选答案)

- A. 木香
- B. 藿香
- C. 苦杏仁

- D.羚羊角
E.川芎
141.血中气药是
142.行气止痛之要药是
(143~144 题共用备选答案)
A.青蒿鳖甲汤
B.茵陈蒿汤
C.半夏泻心汤
D.痛泻要方
E.蒿芩清胆汤
143.清胆利湿,和胃化痰的方剂是
144.寒热平调,消痞散结的方剂是
(145~146 题共用备选答案)
A.表虚自汗证
B.气阴两虚证
C.心脾两虚证
D.脾虚气陷证
E.脾虚夹湿证
145.补中益气汤的主治证是
146.玉屏风散的主治证是
(147~148 题共用备选答案)

- A.医患关系是一种民事法律关系
B.医患关系是具有道德意义较强的社会关系
C.医患关系是一种商家与消费者的关系
D.医患关系是包括非技术性和技术性方面的关系
E.医患关系是患者与治疗者在诊疗和保健中所建立的联系
147.反映医患关系本质的是
148.概括医患关系内容的是
(149~150 题共用备选答案)
A.仁爱
B.严谨
C.诚实
D.公正
E.奉献
149.以人道主义精神关心爱护患者的医学道德品质是
150.对待患者一视同仁,在医疗资源分配等问题上公平公正的医学道德品质是

第二单元

A1 型题

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1.治疗中风中经络阴虚风动证,首选的方剂是

- A.羚角钩藤汤
B.天麻钩藤饮
C.镇肝熄风汤
D.解语丹
E.地黄饮子
2.噎膈与梅核气最主要的鉴别点是
A.有无吞咽困难
B.有无进行性消瘦
C.有无胸骨后不适,呈烧灼感

D.有无情志不畅、酒食不节史

E.有无自觉咽中梗塞不舒

3.阴户的功能是

- A.排出月经的通道
B.分泌带下的通道
C.防御外邪入侵的第一道门户
D.阴阳交合的器官
E.娩出胎儿的路径

4.阳证的皮肤颜色主要是

- A.红赤
B.晦暗

- C.青紫
D.苍白
E.皮色不变
- 5.下列各项,属于新生儿病态的是
- A.马牙
B.胎怯
C.蝉螂子
D.女婴生后3~5天乳房隆起如蚕豆到鸽蛋大小,2~3周消退
E.女婴生后5~7天阴道有少量流血,1~3天自止
- 6.平时急躁易怒,心烦失眠,咯痰不爽,目赤,口苦而干,便秘,溲黄。发作时昏仆,抽搐吐涎,两目上视,如作猪羊叫声,舌红苔黄腻,脉弦滑数。其治疗方法是
- A.涤痰息风,开窍定痫
B.豁痰开窍,清心定痫
C.清热泻火,化痰开窍
D.理气解郁,化痰开窍
E.化痰息风,安神定志
- 7.小便短数,急迫不爽,灼热刺痛,尿色黄赤,口苦,少腹拘急胀痛,便秘,舌红苔黄腻,脉濡数。治疗应首选的方剂是
- A.沉香散
B.石韦散
C.八正散
D.小蓟饮子
E.程氏萆薢分清饮
- 8.头晕,伴心悸不宁,动则加剧,劳累即发,面色苍白,神疲懒言,饮食减少,舌淡,脉细弱。治疗应首选的方剂是
- A.天麻钩藤饮
B.大定风珠
C.温胆汤
D.归脾汤
E.左归丸
- 9.心悸不宁,少寐心烦,手足心热,耳鸣腰酸,舌红少苔,脉细数。此辨证当属
- A.心阳不足
B.肝阳上亢

- C.痰热扰心
D.心虚胆怯
E.阴虚火旺
- 10.积块软而不坚,固着不移,胀满或疼痛并存,舌苔薄,脉弦涩。其证候是
- A.气机阻滞
B.气滞血阻
C.血瘀气结
D.湿热蕴结
E.气滞湿阻
- 11.辨证为风毒(神经毒)的蛇咬伤,其治疗方法是
- A.清热解毒,凉血止血
B.清利湿热,凉血息风
C.凉血息风,豁痰开窍
D.活血祛风,清热解毒
E.活血祛风,凉血止血
- 12.肛周脓肿实证初起外治法宜用
- A.红灵油膏
B.金黄膏
C.阳和解凝膏
D.生肌白玉膏
E.冲和膏
- 13.下列各项,属于肛隐窝炎的并发症的是
- A.肛口出血
B.肛口肿胀
C.肛口疼痛
D.肛乳头炎
E.肛口潮湿
- 14.下列各项,不属月经先后不定期之肾虚证主要症状的是
- A.经行或先或后
B.月经量少色淡暗
C.小腹冷痛拒按
D.头晕耳鸣腰痛
E.舌淡苔白,脉细弱
- 15.下列各项不属妊娠病范畴的是
- A.恶阻
B.胞转

- C. 儿枕痛
D. 胞阻
E. 子冒
16. 月经先后无定期, 经量或多或少, 腰酸耳鸣, 经前乳房胀痛, 苔薄白, 脉细弦, 治疗应首选的方剂是
- A. 逍遥散
B. 调肝汤
C. 定经汤
D. 安冲汤
E. 固阴煎
17. 绝经前后诸证的产生机制主要是
- A. 肝血不足, 冲任亏虚
B. 脾气虚弱, 冲任失养
C. 肾气虚衰, 天癸渐竭
D. 心肾不交, 冲任失调
E. 心脾血虚, 冲任俱虚
18. 月经每 20 日一行, 量多色淡, 小腹空坠隐痛, 纳少便溏。应诊断为
- A. 月经先期
B. 月经过多
C. 经行腹痛
D. 经行泄泻
E. 以上都不是
19. 患者月经初潮来迟, 出血量多势急如崩, 头晕耳鸣, 腰酸腿软, 倦怠乏力, 小便频数, 舌淡少苔, 脉沉细。治疗应首选的方剂是
- A. 加味苁蓉菟丝子汤
B. 调肝汤
C. 左归丸
D. 固阴煎
E. 大营煎
20. 完带汤适用于带下病的哪种证候
- A. 脾虚
B. 肾阴虚
C. 肾阳虚
D. 湿热
E. 热毒
21. 治疗崩漏实热证, 应首选
- A. 保阴煎
B. 固本止崩汤
C. 清热固经汤
D. 清热调血汤
E. 左归丸
22. 阴痒之肝肾阴虚证, 治疗应首选的方剂是
- A. 知柏地黄丸
B. 归肾丸
C. 固阴煎
D. 保阴煎
E. 左归丸
23. 下列各项, 不属导致崩漏常见病因的是
- A. 脾虚
B. 肾虚
C. 血虚
D. 血瘀
E. 血热
24. 妊娠足月, 胎位下移, 腰腹阵痛, 有便意或见红者是
- A. 临产
B. 试胎
C. 弄胎
D. 分娩
E. 以上均非
25. 妇女妊娠后出现头痛, 厌食, 恶心呕吐, 称为
- A. 恶食
B. 恶阻
C. 纳呆
D. 纳减
E. 厌食
26. 治疗痛经之湿热瘀阻证, 应首选
- A. 清热调血汤
B. 龙胆泻肝汤
C. 知柏地黄丸
D. 血府逐瘀汤
E. 加味逍遥散
27. 新生儿生理性胎黄的特点是
- A. 黄疸常于生后 1~2 天出现

- B.黄疸常于生后1周消退
C.早产儿黄疸重,消退晚
D.早产儿黄疸轻,消退早
E.早产儿与足月产儿无明显差别
- 28.水痘任何年龄都可发生,儿童好发于
A.1岁以内
B.6~9岁
C.1~4岁
D.8~10岁
E.12岁以上
- 29.小儿疾病中最为多见的是
A.肺肾系病证
B.心肺系病证
C.肺脾系病证
D.心肝系病证
E.肝肾系病证
- 30.好发小儿泄泻的年龄是
A.9周岁以上
B.7~9周岁
C.4~6周岁
D.2~3周岁
E.2周岁以下
- 31.小儿“地图舌”是由于
A.肺气虚弱
B.脾阳亏虚
C.脾失健运
D.宿食内停
E.胃之气阴不足
- 32.小儿厌食之脾失健运证的治法是
A.调和脾胃,运脾开胃
B.健脾益气,佐以温中
C.滋脾养胃,佐以助运
D.运脾化湿,消积开胃
E.补脾开胃,消食助运
- 33.有头疽火陷证多发生在
A.初起
B.1~2候
C.3候
D.4候
E.收口

- 34.失荣初期的治疗方法是
A.解郁化痰,活血散结
B.调补气血,化痰散结
C.益气养荣,疏肝散结
D.益气养阴,疏肝解郁
E.养血柔肝,化痰散结
- 35.婴儿,8个月,壮热呕吐,囟门高凸,其病机是
A.心火上炎
B.肝风内动
C.热迫胃肠
D.邪入气分
E.邪入营血
- 36.下列除哪项外,均属于儿科望诊内容
A.望指纹
B.辨哭声
C.辨斑疹
D.察二便
E.审苗窍
- 37.小儿水肿之脾肾阳虚证,治疗应首选的方剂是
A.参附汤
B.真武汤
C.参附龙骨牡蛎汤
D.附子理中汤
E.参苓白术散
- 38.小儿患感冒与成人患感冒的相同之处是
A.年龄较大者病情多较重
B.平素体弱者病情多较重
C.易见夹惊兼证
D.易见夹痰兼证
E.易见夹滞兼证
- 39.小儿哮喘的外因为感受外邪,内因是
A.肺气虚弱
B.肾不纳气
C.痰饮留伏
D.脾气虚弱
E.瘀血阻滞
- 40.小儿口疮之风热乘脾证,治疗应首选

的方剂是

- A. 清胃散
- B. 银翘散
- C. 泻心导赤汤
- D. 六味地黄丸
- E. 清热泻脾散

41. 小儿肺炎喘嗽之风热郁肺, 治疗应首选的方剂是

- A. 杏苏散
- B. 桑菊饮
- C. 银翘散
- D. 安神丸
- E. 麻杏石甘汤

42. 小儿水肿突然出现头痛, 眩晕, 甚则抽搐, 昏迷, 其病机是

- A. 水毒内闭
- B. 水凌心肺
- C. 邪陷心肝
- D. 湿浊壅塞三焦
- E. 热扰心肝

43. 鹅口疮虚火上浮证的治法是

- A. 清泻胃火
- B. 清心泻脾
- C. 清心泻热
- D. 滋阴增液
- E. 滋阴降火

44. 眩晕, 耳鸣, 头目胀痛, 口苦, 失眠多梦, 遇怒而加重, 甚则仆倒急躁易怒, 舌红苔黄脉弦。治疗应首选方剂

- A. 归脾汤
- B. 温胆汤
- C. 大定风珠
- D. 天麻钩藤饮
- E. 左归丸

45. 以热退疹出为特征的疾病是

- A. 麻疹
- B. 奶麻
- C. 风痧
- D. 丹痧
- E. 手足口病

46. 下列各项中, 被称为“一源三歧”的是

- A. 带脉、督脉、带脉
- B. 任脉、督脉、冲脉
- C. 任脉、冲脉、带脉
- D. 任脉、督脉、阴脉
- E. 任脉、督脉、阴维脉

47. 手少阳三焦经与足少阳胆经的循行交接部位是

- A. 鼻旁
- B. 目外眦
- C. 目内眦
- D. 无名指端
- E. 足小趾端

48. 相互衔接的阴经与阴经的循行交接部位是

- A. 头面部
- B. 肘膝部
- C. 胸中
- D. 心中
- E. 手足末端

49. 同名的阳经与阳经的循行交接部位是

- A. 胸中
- B. 腹中
- C. 心中
- D. 头面部
- E. 肘膝部

50. 相表里的阴经与阳经的循行交接部位是

- A. 心中
- B. 胸中
- C. 腹中
- D. 头面部
- E. 手足末端

51. 足三阴经主治相同的是

- A. 肝病、脾胃病
- B. 肾病、脾胃病
- C. 肝病、脾病、肾病
- D. 妇科病、脾胃病
- E. 腹部病、妇科病

52. 手少阳三焦经的主治特点是

- A.前头、鼻、口、齿病
B.前头、口齿、胃肠病
C.侧头、胁肋病
D.后头、肩胛病、神志病
E.后头、背腰病
- 53.悬钟穴位于
A.外踝后缘中点上3寸,腓骨前缘
B.外踝前缘中点上3寸,腓骨前缘
C.外踝下缘中点上3寸,腓骨前缘
D.外踝高点上3寸,腓骨前缘
E.外踝上缘中点上3寸,腓骨前缘
- 54.治疗癃闭,遗尿的穴位是
A.太冲
B.大陵
C.神门
D.内关
E.阴郛
- 55.足厥阴肝经的荣穴是
A.侠溪
B.太冲
C.行间
D.内庭
E.蠡沟
- 56.肝经在循行中,未与以下何处发生联系
A.喉咙
B.唇内
C.耳中
D.目系
E.颊部
- 57.针刺肌肉浅薄部位的腧穴,常用的进针法是
A.指切
B.夹持
C.舒张
D.提捏
E.套管
- 58.化脓灸属于
A.直接灸
B.间接灸
C.温和灸
D.回旋灸
E.实按灸
- 59.下列哪项不宜用三棱针治疗
A.高热
B.脱证
C.昏迷
D.惊厥
E.咽痛
- 60.下列属于原络配穴法的是
A.合谷、偏历
B.太溪、大钟
C.太渊、列缺
D.合谷、列缺
E.冲阳、丰隆
- 61.采用背俞穴治疗皮肤痒疹,应首选
A.肝俞
B.肺俞
C.脾俞
D.三焦俞
E.心俞
- 62.经络系统中,具有维持人体正常运动功能的是
A.十二经脉
B.十五络脉
C.十二经别
D.十二经筋
E.十二皮部
- 63.按十二经脉气血流注次序,小肠经上接
A.胆经
B.心经
C.胃经
D.膀胱经
E.三焦经
- 64.“阴脉之海”是指
A.带脉
B.任脉
C.冲脉
D.阴跷脉

- E. 阴维脉
65. 循行于腹中线旁开 2 寸, 胸中线旁开 4 寸的经脉是
- A. 手太阴肺经
B. 足阳明胃经
C. 足少阴肾经
D. 足太阴脾经
E. 足厥阴肝经
66. 脾之大络, 名为
- A. 天枢
B. 俞府
C. 鸠尾
D. 大包
E. 虚里
67. 公孙穴所通的奇经是
- A. 任脉
B. 督脉
C. 冲脉
D. 阴维脉
E. 阳跷脉
68. 耳后两乳突之间的骨度分寸是
- A. 4 寸
B. 6 寸
C. 8 寸
D. 9 寸
E. 12 寸
69. 治疗滞产, 应首选
- A. 合谷
B. 太冲
C. 足三里
D. 血海
E. 至阴
70. 三焦经在上肢的循行部位是
- A. 外侧前缘
B. 内侧中线
C. 外侧后缘
D. 内侧前缘
E. 外侧中线
71. 十二经脉中, 相表里的阴经与阳经的交接部位在

- A. 四肢部
B. 胸部
C. 腹部
D. 头部
E. 面部
72. 按十二经脉的流注次序, 肝经向下流注的经脉是
- A. 膀胱经
B. 胆经
C. 三焦经
D. 心经
E. 肺经
73. 足三阴经从起始部至内踝上 8 寸段的分布是
- A. 厥阴在前, 太阴在中, 少阴在后
B. 厥阴在前, 少阴在中, 太阴在后
C. 少阴在前, 太阴在中, 厥阴在后
D. 太阴在前, 厥阴在中, 少阴在后
E. 太阴在前, 少阴在中, 厥阴在后
74. 联系舌根, 分散于舌下的经脉是
- A. 足厥阴肝经
B. 足少阴肾经
C. 足太阴脾经
D. 足阳明胃经
E. 足少阳胆经
75. 阴经之原穴与五输穴中的哪个穴为同一个穴位
- A. 井穴
B. 荥穴
C. 输穴
D. 经穴
E. 合穴
76. 以下腧穴中, 哪穴是肝的募穴
- A. 章门
B. 期门
C. 京门
D. 液门
E. 郄门
77. 足厥阴肝经的合穴是
- A. 水泉

- B. 曲阜
C. 曲泽
D. 阴谷
E. 膝关
78. 诊断肺心病的主要依据是
A. 长期肺结核病
B. 长期慢性支气管炎
C. 肺气肿
D. 肺动脉狭窄
E. 肺动脉高压及右心室肥大
79. 治疗肺炎球菌肺炎的方法, 不正确的是
A. 首选庆大霉素
B. 首选青霉素
C. 青霉素过敏者选红霉素
D. 抗生素疗程 5~7 天
E. 卧床休息, 适用支持疗法
80. 肺炎球菌肺炎的典型体征是
A. 呈急性病容
B. 肺实变体征
C. 感染性休克的体征
D. 叩诊过清音
E. 局部的干啰音
81. 胸骨后压榨样痛并有重压窒息感, 常见于
A. 心绞痛
B. 心肌梗死
C. 肺梗死
D. 肺淤血
E. 胸膜炎
82. 肺癌由原发癌肿引起的症状是
A. 吞咽困难
B. 胸痛
C. 咳嗽, 咯血, 胸闷, 气急
D. 头痛, 呕吐, 共济失调
E. 厌食, 肝区疼痛, 黄疸
83. 甲胎蛋白检测阳性最有诊断意义的疾病是
A. 慢性活动型乙型肝炎
B. 转移性肝癌
C. 肝硬化
D. 肝内胆管细胞癌
E. 原发性肝癌
84. 雄激素最适合治疗
A. 缺铁性贫血
B. 海洋性贫血
C. 慢性感染性贫血
D. 巨幼红细胞贫血
E. 再生障碍性贫血
85. 急性胰腺炎的腹痛特点是
A. 无规律性疼痛
B. 空腹与夜间痛
C. 节律性疼痛
D. 转移性疼痛
E. 持续性疼痛伴阵发性加剧
86. 下列属于癫痫大发作的表现是
A. 短暂意识丧失
B. 意识丧失, 四肢强直, 继之阵挛、昏睡
C. 单侧肢体抽动
D. 躁动、乱语
E. 发作性四肢抽搐
87. 传染病的基本特征为
A. 有传染性、免疫性和病原体
B. 有传染性、流行性、地方性和季节性
C. 有传染性、病原体、免疫性和流行性
D. 有传染性、传播途径和免疫性
E. 有传染性、免疫性和流行性
88. 甲类传染病是指
A. SARS、狂犬病
B. 黑热病、炭疽
C. 高致病性禽流感、天花
D. 鼠疫、霍乱
E. 伤寒、流行性出血热
89. 流行性乙型脑炎最主要的死亡原因是
A. 肺不张
B. 呼吸衰竭
C. 败血症
D. 尿路感染
E. 高热
90. 霍乱最主要的传播形式是通过

- A.食物
B.水
C.苍蝇媒介
D.餐具
E.生活接触
91. 典型霍乱发病最先出现的症状是
A.腹痛
B.腹泻
C.呕吐
D.肌肉痉挛
E.畏寒、发热
92. 流行性出血热患者全身各组织器官都可有充血、出血、变性、坏死,表现最为明显的器官是
A.心
B.肺
C.肾
D.脑垂体
E.胃肠
93. 流行性出血热常见的休克属于
A.心源性休克
B.感染性休克
C.过敏性休克
D.继发性休克
E.低血容量性休克
94. 下列各项,不支持流行性脑脊髓膜炎诊断的脑脊液检查是
A.外观混浊呈脓性
B.细胞数 $<0.5 \times 10^6/L$,以单核细胞为主
C.蛋白质含量高
D.糖含量明显减少
E.氯化物含量减少
95. 伤寒菌血液培养,阳性率最高的时间是
A.第1周
B.第2周
C.第3周
D.第4周
E.第5周
96. 腹痛,腹泻,黏液脓血便,伴发热恶寒,最可能的诊断是
A.细菌性痢疾
B.阿米巴痢疾
C.急性胃肠炎
D.流行性脑脊髓膜炎
E.霍乱
97. AIDS 急性感染期最常见的表现是
A.发热
B.头痛
C.皮疹
D.腹泻
E.淋巴结肿大
98. 治疗普通型流行性脑脊髓膜炎首选抗菌药物是
A.青霉素
B.磺胺药
C.氨苄西林
D.红霉素
E.庆大霉素
99. 胃脘胀满,攻撑作痛,痛连两胁,胸闷,暖气频繁,每因烦恼郁怒而痛作,矢气则舒,舌苔薄白,脉沉弦。其证候是
A.肝脾不和
B.肝胃郁热
C.肝气犯胃
D.胃气壅滞
E.食积气滞
100. 因生气后突发上气而喘,咽中如窒,但喉中痰声不著,胸闷气憋,舌苔薄白,脉弦。其证候是
A.风寒束肺
B.风热袭肺
C.肝火犯肺
D.肺气郁痹
E.痰浊壅肺
101. 多食易饥,口渴引饮,尿多,形体消瘦,大便干燥,苔黄,脉滑实有力。治疗应首选的方剂是
A.消渴方
B.益胃汤

- C. 玉女煎
D. 大承气汤
E. 六味地黄丸

102. 身目俱黄, 色鲜明如橘皮, 发热口渴, 脘腹满闷, 恶心欲吐, 小便短少, 色黄赤, 大便秘结, 舌苔黄腻, 脉弦数。治疗应首选的方剂是

- A. 茵陈蒿汤
B. 茵陈五苓散
C. 大柴胡汤
D. 茵陈术附汤
E. 麻黄连翘赤小豆汤

103. 尿量频多, 小便混浊如膏, 甚至饮一溲一, 面容憔悴, 耳轮焦干, 腰膝酸软, 形寒怕冷, 阳痿或月经不调, 舌淡苔白, 脉沉细无力。

A2 型题

治疗应首选的方剂是

- A. 右归丸
B. 左归丸
C. 消渴方
D. 金匱肾气丸
E. 六味地黄丸

104. 久患黄疸, 身目俱黄, 但黄色晦暗不泽, 或如烟熏, 痞满, 纳少, 腹胀便溏, 神疲畏寒, 舌淡苔白, 脉沉缓。治疗应首选的方剂是

- A. 茵陈五苓散
B. 加味逍遥散
C. 茵陈术附汤
D. 茵陈蒿汤
E. 连理汤

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的, 其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

105. 患者, 男, 27 岁。近 2 周自觉乏力, 食欲不振, 厌油, 腹胀。检查: 巩膜无黄染, 肝肋缘下 2 cm, 有压痛, 丙氨酸转氨酶升高。应首先考虑的是

- A. 急性肝炎
B. 慢性肝炎
C. 重型肝炎
D. 淤阻型肝炎
E. 肝炎肝硬化

106. 小儿, 阵发性痉挛性咳嗽 1 个半月, 经治疗咳嗽减轻, 但痰黏难以咳出, 伴低热, 烦躁盗汗, 舌红苔少, 脉细数。治疗应首选的方剂是

- A. 人参五味子汤
B. 沙参麦冬汤
C. 加味泻白散
D. 桑白皮汤
E. 牡蛎散

107. 患儿, 7 岁。发热 1 天。恶寒, 无汗, 头痛, 鼻塞流清涕, 喷嚏咳嗽, 口不渴, 咽不红,

舌苔薄白, 脉浮紧。其证候是

- A. 风寒感冒
B. 风热感冒
C. 暑邪感冒
D. 感冒夹滞
E. 感冒夹痰

108. 患儿, 1 岁。昨起舌上溃破, 色红疼痛, 进食哭闹, 心烦不安, 口干欲饮, 小便短黄, 舌尖红, 苔薄黄, 脉数, 指纹紫。治疗应首选

- A. 凉膈散
B. 泻心导赤汤
C. 清胃散
D. 泻心汤
E. 六味地黄丸

109. 患儿, 2 岁。形体极度消瘦, 面呈老人貌, 皮包骨头, 腹凹如舟, 精神萎靡, 大便溏薄, 舌淡苔薄腻, 其证候是

- A. 疳肿胀
B. 疳气
C. 疳积

D.干疖

E.心疖

110.患儿,7岁。曾咳喘反复发作。症见面色少华,气短懒言,倦怠乏力,自汗怕冷,舌淡苔薄,脉细无力。治疗应首选

A.玉屏风散

B.六君子汤

C.金匱肾气丸

D.二陈汤

E.参苓白朮散

111.小儿患者,高热流涕,鼻塞,咳嗽,突然两目凝视,继发四肢抽搐,针灸及用汤剂治疗时,还应注意加用

A.小儿回春丹

B.安宫牛黄丸

C.苏合香丸

D.紫雪

E.至宝丹

112.老年患者,证见左下肢内疔疮,面积5cm×5cm,疮面有少许腐肉。外治应首选

A.红油膏、九一丹

B.金黄膏、九一丹

C.白玉膏、生肌散

D.金黄膏掺桃花散

E.青黛膏、九一丹

113.患者胁肋胀痛,走窜不定,疼痛随情志的变化而增减,胸闷不舒,饮食减少,嗳气频作,苔薄,脉弦。辨证属何类型胁痛

A.瘀血停滞

B.肝胆湿热

C.肝气郁结

D.肝郁化火

E.肝阴不足

114.患者,女,30岁。产后乳房胀痛,左侧乳房外上方皮色焮红,皮肤灼热,肿块形似鸡卵,压痛明显,按之中软,有波动感,伴壮热,口渴。切开引流部位及切口是

A.乳晕旁弧形切口

B.脓肿处作任意切口

C.循环乳络方向作放射状切口

D.以乳头为中心的弧形切口

E.脓肿波动明显处作切口

115.患者,两小腿皮炎,在亚急性阶段,渗液与糜烂很少,红肿减轻,有鳞屑和结痂。外治剂宜选用

A.软膏

B.粉剂

C.溶液湿敷

D.洗剂

E.油剂

116.患者,女,35岁。颈两侧牛皮癣,皮疹呈淡褐色片状,粗糙肥厚,剧痒时作,夜间尤甚,舌苔薄白或白腻,脉濡而缓。应首选

A.银翘散

B.消风散

C.逍遥散

D.四物汤

E.防风通圣散

117.患者,女,21岁。右手背部有5~6枚表面光滑的扁平丘疹,如针头大,呈淡褐色,偶有瘙痒感。其诊断是

A.扁平疣

B.寻常疣

C.掌跖疣

D.丝状疣

E.传染性软疣

118.患者,男。患急性子痈2天,恶寒发热,左侧睾丸肿大疼痛,疼痛引及子系(精索),伴有发热,恶寒,舌红苔黄腻,脉滑数。证属湿热下注,气血壅滞,经络阻隔为患。治宜清泻肝经湿热,应首选方剂

A.透脓散

B.龙胆泻肝汤

C.草薺化毒汤

D.滋阴除湿汤

E.橘核汤加减

119.患者,男,43岁。尿频,尿急,茎中热痛,尿色黄浊,尿末或大便时有白浊溢出,会阴、腰骶、睾丸有明显的胀痛不适,舌红苔黄根腻,脉弦滑。诊为慢性前列腺炎,其证候是

- A. 湿热蕴结
- B. 肝肾不足
- C. 肾阳不足
- D. 阴虚火动
- E. 气滞血瘀

120. 患者,女,30岁,已婚。怀孕3个月,近3天尿频、尿急、尿道灼热刺痛,两颧潮红,五心烦热,舌红苔薄黄,脉细滑数。治疗应首选

- A. 五皮饮
- B. 加味五苓散
- C. 知柏地黄汤
- D. 六味地黄汤
- E. 导赤散

121. 患者,女,28岁,已婚。产时失血较多,产后小腹隐隐作痛,喜按,恶露量少、色淡,头晕耳鸣,大便干燥,舌淡,苔薄,脉虚细。治疗应首选

- A. 肠宁汤
- B. 生化汤
- C. 十全大补汤
- D. 人参养荣汤
- E. 八珍汤

122. 患者,女,23岁,已婚。产后恶露量少,少腹阵痛拒按,气粗喘促,不省人事,两手握拳,牙关紧闭,唇舌色紫,脉涩。其证候是

- A. 气滞血瘀
- B. 肝郁气闭
- C. 血热瘀闭
- D. 瘀滞子宫
- E. 肝风内动

123. 患者,女,32岁,已婚。妊娠2个月,近日因恶阻而恶心呕吐。呕吐酸苦水,不能进食,胸满胁痛,舌红苔黄,脉弦滑。其证候是

- A. 肝胃不和
- B. 胃虚
- C. 胃热
- D. 痰滞
- E. 以上均非

124. 患者,男,60岁。反复咳嗽、咳痰 10

年。近3年每当秋冬发病,天气变暖后逐渐减轻。检查:两肺闻及散在干啰音。X线显示肺纹理增多。其诊断是

- A. 慢性支气管炎
- B. 支气管扩张
- C. 支气管哮喘
- D. 肺结核
- E. 肺癌

125. 患者,男,50岁。慢性支气管炎病史5年。近2~3个月咳嗽加重,痰中持续带血,伴胸闷,气急,胸痛。X线检查见肺门阴影增大。应首先考虑的是

- A. 慢性支气管炎
- B. 原发性支气管肺癌
- C. 肺炎
- D. 肺结核
- E. 肺脓肿

126. 患者,男,34岁。上腹部灼痛1年,饥饿时加重,进食后可缓解,伴泛酸。查体:上腹部稍偏右有压痛。应首先考虑的是

- A. 慢性胃炎
- B. 慢性胆囊炎
- C. 十二指肠溃疡
- D. 胰腺炎
- E. 胃癌

127. 患者慢性支气管炎病史多年,每年冬季发作,来医院检查,呈桶状胸,叩诊过清音,心浊音界缩小,呼吸音减弱,应诊断慢性支气管炎并发

- A. 阻塞性肺疾病
- B. 支气管扩张
- C. 肺癌
- D. 肺源性心脏病
- E. 肺部感染

128. 患者,男,40岁。乙肝病史6年。近半个月肝区持续性疼痛,胃纳差,黄疸,消瘦。查体:肝肋下4cm,质硬,表面不平,压痛。应首先考虑的是

- A. 慢性肝炎
- B. 肝脓肿

- C.肝硬化
- D.继发性肝癌
- E.原发性肝癌

129.患者,男性,58岁。患胃溃疡病史10年,因上腹痛、呕吐、消瘦来医院检查,诊断为胃癌中、晚期。其主要体征是

- A.淋巴结增大
- B.腹部肿块
- C.肝大
- D.腹水
- E.血栓性静脉炎

130.患者面浮身肿,腰以下尤甚,按之凹陷不起,心悸,气促,腰部冷痛,尿少,肢冷,怯寒神疲,面色白,舌淡胖苔白,脉沉迟无力。其证候是

- A.脾阳虚衰
- B.湿热壅盛
- C.风水泛滥
- D.水湿浸渍
- E.肾阳虚衰

131.水痘患儿,男,7岁。壮热烦躁,面红目赤,口渴欲饮,痘疹分布稠密,根盘红晕较著,疹色紫暗,疱浆混浊,大便干结,小便黄赤。舌质红或红绛,舌苔黄糙而干,脉洪数。治疗首选方为

- A.清瘟败毒饮
- B.黄连解毒汤
- C.普济消毒饮
- D.清解透表汤
- E.清胃解毒汤

132.张某,男性,55岁。胸痛反复发作2个月,现症见胸部刺痛,夜间尤甚,持续10分钟左右,病处固定,多因生气及受寒后加重。时有心慌,舌质紫暗,脉象沉涩,治疗应首选的方剂是

- A.瓜蒌薤白半夏汤
- B.参附汤合右归饮
- C.血府逐瘀汤
- D.乌头赤石脂丸
- E.瓜蒌薤白白酒汤

133.男性,39岁。咳嗽气急,咳吐脓痰腥臭,壮热烦躁,胸闷而痛,转侧不利,口干咽燥,苔黄腻,脉滑数。治宜选用

- A.大黄牡丹汤
- B.银翘散
- C.千金苇茎汤
- D.加味桔梗汤
- E.桔梗白散

134.小儿,面、目、皮肤发黄,颜色较深,晦暗无华,日益加重,右胁下痞块,纳呆,食后易吐,小便黄短,大便溏或灰白,舌见瘀点,苔黄腻。治疗应首选的方剂是

- A.血府逐瘀汤
- B.茵陈理中汤
- C.茵陈蒿汤
- D.五苓散
- E.疳积散

135.患者,男,24岁。胁痛口苦,胸闷纳呆,恶心呕吐,目黄,小便黄,舌苔黄腻,脉弦滑数。其证型是

- A.肝气郁结
- B.肝肾阴虚
- C.瘀血阻络
- D.脾肾阳虚
- E.肝胆湿热

136.患者胁肋胀痛,走窜不定,疼痛随情志的变化而增减,胸闷不舒、梦食减少,嗳气频作,苔薄,脉弦。辨证属何类型胁痛

- A.瘀血停着
- B.肝胆湿热
- C.肝气郁结
- D.肝郁化火
- E.肝阴不足

137.患者,女,34岁,已婚。经行先后不定,经量多、色红、质稠,少腹胀痛,乳房胀痛,舌暗红苔薄黄,脉弦。治疗应首选

- A.归脾汤
- B.小柴胡汤
- C.逍遥散
- D.血府逐瘀汤

E. 当归芍药散

138. 患者,女,24岁,已婚。产后10天,高热3天,下腹疼痛拒按,恶露量少、色紫暗,有臭味,烦热渴饮,尿黄便结,舌红苔黄厚,脉滑数。其证候是

B1 型题

A. 外感风热

B. 阴虚内热

C. 血热

D. 血瘀

E. 感染邪毒

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(139~140 题共用备选答案)

A. 脾、胃、心

B. 胃、肝、心

C. 肝、脾、肾

D. 胃、肝、肾

E. 胃、肝、脾

139. 胃痛的发病病机,主要与哪些脏腑有关

140. 鼓胀的病机,主要是哪些脏腑功能失调

(141~142 题共用备选答案)

A. 寒湿痢

B. 虚寒痢

C. 休息痢

D. 湿热痢

E. 阴虚痢

141. 患者腹痛脓血便3周,痢下赤白黏冻,白多赤少,里急后重,纳差,胃脘饱闷,头身重困,舌淡苔白腻,脉濡缓。其证型是

142. 患者腹痛粘液便4周,下痢稀薄,带有白冻,且滑脱不禁,食少神疲,四肢不温,腰痛怕冷,舌淡苔薄白,脉沉细。其证型是

(143~144 题共用备选答案)

A. 颈痈

B. 肠痈

C. 黄水疮

D. 流注

E. 冻疮

143. 外科疾病以部位命名的是

144. 外科疾病以病因命名的是

(145~146 题共用备选答案)

A. 慢性前列腺炎

B. 阴茎痰核

C. 子痰

D. 子痈

E. 精癭(前列腺增生)

145. 患者,男,35岁。尿频,尿道灼热,会阴部隐痛不适,前列腺液镜检白细胞多,卵磷脂小体减少。应诊断为

146. 患者,男,45岁。阴茎背侧触及条索状斑块,无压痛,勃起时有疼痛。应诊断为

(147~148 题共用备选答案)

A. 粉剂

B. 溶液

C. 软膏

D. 酊剂

E. 油剂

147. 皮肤干燥,肥厚,皲裂,苔藓样变。宜选用

148. 皮肤红肿,水疱,糜烂,渗液较多。宜选用

(149~150 题共用备选答案)

A. 高热、剧烈头痛、皮肤瘀斑、脑膜刺激征

B. 高热、休克、惊厥、呼吸衰竭

C. 高热、低血压休克、出血、肾损害

D. 高热、目红、腿痛、淋巴肿大

E. 高热、相对缓脉

149. 流行性脑脊髓膜炎表现为

150. 流行性出血热表现为

参考答案

第一单元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	C	E	B	E	B	B	B	E	E
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	A	A	C	D	E	C	A	B	E
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	B	B	E	A	B	D	E	E	E
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
C	C	B	D	E	A	D	A	C	C
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
B	D	E	B	A	E	A	E	D	E
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
C	B	E	E	B	D	E	C	D	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
D	B	B	C	B	A	B	B	B	A
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
C	B	E	A	C	B	A	E	D	D
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
C	A	B	D	E	B	C	C	D	C
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
A	E	B	B	A	A	B	B	A	E
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
D	E	A	B	E	C	A	C	B	C
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
C	C	C	C	B	A	A	B	B	A
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
D	C	C	B	E	B	E	C	E	E
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
A	C	C	E	C	A	B	E	E	A
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
E	A	E	C	D	A	B	E	A	D

第二单元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	C	A	B	C	C	D	E	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	B	D	C	C	C	C	A	A	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	A	C	A	B	A	C	B	C	E
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
E	A	B	A	B	B	B	B	C	B
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
E	C	E	D	B	B	B	C	D	E
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
E	C	D	A	C	C	D	A	B	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
B	D	B	B	B	D	C	D	A	E
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
A	E	A	C	C	B	B	E	A	B
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
A	C	E	E	E	B	C	D	B	E
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
B	C	E	B	A	A	A	A	C	C
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
C	A	D	C	A	B	A	B	D	A
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
A	A	C	C	A	B	A	B	A	C
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
A	D	A	A	B	C	A	E	B	E
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
E	C	D	A	E	C	C	E	E	C
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
A	B	A	E	A	B	C	B	A	C