

# 临床执业(含助理)医师资格考试 实践技能考官评分手册

金英杰医学教育研究院 编

编委会成员 张 伟 赵鸿峰 刘 洋  
王冬竹 冯桂灵 文 墨  
刘 越 叶 凡 李 栋  
鹿 明

# 目 录

第一站 病史采集.....	1
第一站 病例分析 .....	30
第一站 多媒体机考 .....	61
第一站 X 线平片影像诊断 .....	62
第一站 心电图检查 .....	64
第一站 心肺听诊 .....	65
第二站 体格检查 .....	66
第三站 基本操作 .....	94

## 第一站 病史采集

试题编号:1

简要病史:男性,38岁。皮肤出血点、瘀斑伴乏力、胸骨压痛1周门诊就诊。		
要求:你作为住院医师,请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
时间:11分钟		
评分标准	总分 15分	
一、问诊内容	13分	
(一) 现病史	10分	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
(1) 发病诱因:有无劳累、皮肤外伤和服用药物		0.5分
(2) 出血情况:皮肤出血点和瘀斑的颜色、部位、数量,是否高出皮面,有无瘙痒,有无其他部位出血(如便血和尿血、鼻出血、牙龈出血)		3分
(3) 乏力、胸骨压痛情况,有无头晕、面色苍白		2分
(4) 伴随症状:有无发热、骨骼疼痛、关节痛		1.5分
2.诊疗经过		
(1) 是否曾到医院就诊,做过哪些检查:血常规、尿常规、粪常规及隐血、骨髓检查		1分
(2) 治疗情况:是否用过止血药物及其他治疗,疗效如何		1分
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠和体重变化情况		1分
(二) 其他相关病史	3分	
1.有无药物过敏史		0.5分
2.与该病有关的其他病史:有无心脏病、肝病、肾病和出血性疾病及肿瘤病史。职业和生活、工作环境情况,有无相关疾病家族史		2.5分
二、问诊技巧	2分	
(一) 条理性强,能抓住重点		1分
(二) 能够围绕病情询问		1分

## 第一站 病史采集

试题编号:2

简要病史:女性,31岁。发热、腹痛、脓血便3天急诊就诊。		
要求:你作为住院医师,请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
考试时间:10分钟		
评分标准	总分 15分	
<b>一、问诊内容</b>	13分	
<b>(一) 现病史</b>	10分	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
(1)发病诱因:有无不洁饮食、饮酒,有无服用药物		1分
(2)发热:程度,有无畏寒或寒战		1分
(3)腹痛:具体部位、性质、程度,有无放射痛,与排便的关系,加重或缓解因素		1.5分
(4)脓血便:大便次数、量、性状、气味,有无黏液,有无里急后重		1.5分
(5)伴随症状:有无恶心、呕吐、腹胀、皮疹,有无口干等脱水症状		2分
2.诊疗经过		
(1)是否曾到医院就诊,做过哪些检查:血常规、粪常规、腹部B超		1分
(2)治疗情况:是否用过抗菌药物和止痛、止泻治疗,疗效如何		1分
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、小便及近期体重变化情况		1分
<b>(二) 其他相关病史</b>	3分	
1.有无药物过敏史		0.5分
2.与该病有关的其他病史:有无类似发作史,有无消化系统疾病病史,有无疫区旅行、居住史,有无感染性腹泻患者接触史,月经与婚育史		2.5分
<b>二、问诊技巧</b>	2分	
1.条理性强,能抓住重点		1分
2.能够围绕病情询问		1分

试题编号:3

简要病史:男性,23岁。反复喘息3年,加重3天门诊就诊。		
要求:您作为住院医师,请围绕上述简短病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
考试时间:10分钟		
评分标准	总分 15分	
一、问诊内容	13分	
(一)现病史	10分	
1.根据主诉及相关鉴别进行询问		
(1)发病诱因:如有无接触过敏史、受凉、淋雨、上呼吸道感染、运动、服用药物。		1分
(2)喘息:程度、持续时间和发作频率,有无季节性,有无夜间发作,有无喘鸣,加重及缓解的因素(与活动和体位的关系)。		3分
(3)伴随症状:有无发热、咳嗽、咳痰、咯血、胸痛,有无心悸、双下肢水肿,有无大汗、意识障碍。		3分
2.诊疗经过		
(1)是否曾到医院就诊,做过哪些检查:血常规、胸部X线片、支气管舒张试验、心电图、过敏原实验。		1分
(2)治疗情况:是否用过抗菌药物、糖皮质激素和支气管扩张药物治疗,其疗效如何。		1分
3.一般情况		
发病以来饮食、睡眠、大小便及体重变化情况。		1分
(二)其他相关病史	3分	
1.有无药物过敏史。		0.5分
2.与该病有关的其他病史:有无过敏性鼻炎病史、有无慢性肺部疾病、心脏病史。有无烟酒嗜好。有无过敏性疾病家族史。		2.5分
二、问诊技巧	2分	
(一)条理性强,能抓住重点。		1分
(二)能够围绕病情询问。		1分

## 第一站 病史采集

试题编号:4

简要病史:女性,23岁。发热、胸痛7天,呼吸困难3天,胸部X线片示“左侧中等量胸腔积液”。		
要求:你作为住院医师,请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
考试时间:10分钟		
评分标准	总分 15分	
<b>一、问诊内容</b>	13分	
<b>(一) 现病史</b>	10分	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
(1)发病诱因:有无劳累、受凉、上呼吸道感染、外伤		1分
(2)发热:程度,有无畏寒或寒战		1分
(3)胸痛:具体部位、性质、程度、起病急缓、持续时间,有无放射,加重或缓解因素(与呼吸及体位的关系)		2分
(4)呼吸困难:程度,有无夜间呼吸困难,加重或缓解因素(与活动和体位的关系)		1分
(5)伴随症状:有无咳嗽、咳痰、咯血,有无盗汗,有无心悸、双下肢水肿		2分
2.诊疗经过		
(1)是否曾到医院就诊,做过哪些检查:血常规、胸部CT、PPD试验、胸腔积液检查		1分
(2)治疗情况:是否行胸腔穿刺抽液,抽液次数及量,是否用过抗菌感染或抗结核药物治疗,疗效如何		1分
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及体重变化情况		1分
<b>(二) 其他相关病史</b>	3分	
1.有无药物过敏史		0.5分
2.与该病有关的其他病史:有无慢性肺部疾病、心脏病病史。有无肺结核患者接触史,卡介苗接种史。工作性质及环境,有无烟酒嗜好。月经及婚育史		2.5分
<b>二、问诊技巧</b>	2分	
1.条理性强,能抓住重点		1分
2.能够围绕病情询问		1分

## 第一站 病史采集

试题编号:5

简要病史:女性,26岁。突发头痛4小时,神志不清3小时家属送来急诊就诊。		
要求:你作为住院医师,请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
考试时间:10分钟		
	评分标准	总分 15分
一、问诊内容		13分
(一) 现病史		10分
1.根据主诉及相关鉴别询问		
(1) 发病诱因:有无剧烈运动、咳嗽、用力排便、外伤、情绪激动		1分
(2) 头痛:具体部位、性质、持续时间、程度,加重或缓解因素		2分
(3) 神志不清:程度及其演变过程		1.5分
(4) 伴随症状:有无发热、恶心、呕吐(是否为喷射性呕吐),有无语言障碍、呼吸困难,有无颈强直、肢体活动障碍		2.5分
2.诊疗经过		
(1) 是否曾到医院就诊,做过哪些检查:头颅CT或MRI、脑脊液检查		1分
(2) 治疗情况:是否用过止痛药治疗,疗效如何		1分
3.一般情况:近期饮食、睡眠、大小便及体重变化情况		1分
(二) 其他相关病史		3分
1.有无药物过敏史		0.5分
2.与该病有关的其他病史:有无类似发作史,有无脑动脉瘤或脑血管畸形、脑外伤、高血压病史,有无烟酒嗜好,有无精神神经系统疾病家族史,月经及婚育史		2.5分
二、问诊技巧		2分
1.条理性强,能抓住重点		1分
2.能够围绕病情询问		1分

## 第一站 病史采集

试题编号:6

简要病史:女性,50岁。双手关节间断疼痛伴左肘部皮下结节6个月门诊就诊。		
要求:你作为住院医师,请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
考试时间:10分钟		
评分标准	总分 15分	
<b>一、问诊内容</b>	13分	
<b>(一) 现病史</b>	10分	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
(1)发病诱因:有无感染、劳累、外伤、受凉及接触有毒物质		1分
(2)双手关节疼痛,性质,程度,发生频度及持续的时间,加重或缓解因素,发病关节部位、个数,有无关节红肿、变形、运动障碍		2分
(3)皮下结节:性质、数量、发生的时间,有无压痛,皮肤有无红肿		2分
(4)伴随症状:其他关节有无受累,有无皮疹、晨僵、发热、乏力、胸闷		2分
2.诊疗经过		
(1)是否曾到医院就诊,做过哪些检查:血常规、类风湿因子、血沉、抗CCP抗体,双手及肘关节做X线片		1分
(2)治疗情况:是否用过非甾体抗炎药和改变病情抗风湿药治疗,疗效如何		1分
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及体重变化情况		1分
<b>(二) 其他相关病史</b>	3分	
1.有无药物过敏史		0.5分
2.与该病有关的其他病史:有无其他风湿性疾病(如银屑病关节炎、系统性红斑狼疮、骨关节炎)、甲状腺疾病病史。月经及婚育史。有无相关疾病家族史		2.5分
<b>二、问诊技巧</b>	2分	
1.条理性强,能抓住重点		1分
2.能够围绕病情询问		1分



## 第一站 病史采集

试题编号:7

简要病史:女性,12岁。寒战,高热伴左膝关节红肿热痛3天急诊就诊。		
要求:你作为住院医师,请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
考试时间:10分钟		
评分标准	总分 15分	
一、问诊内容	13分	
(一) 现病史	10分	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
(1)发病诱因:有无左膝外伤、手术、过度劳累,有无呼吸道等其他部位感染		1分
(2)寒战、高热:寒战与高热的关系,发热有无规律		2分
(3)关节肿痛:关节肿痛、红热的顺序,发展情况,有无功能障碍		2分
(4)伴随症状:有无乏力、心悸、呼吸急促,有无皮肤红斑,有无其他关节肿痛,有无手指关节晨僵		2分
2.诊疗经过		
(1)是否曾到医院就诊,做过哪些检查:血常规、血沉,C反应蛋白,左膝关节X线片		1分
(2)治疗情况:是否用过抗菌药物及退热、止痛药物治疗,疗效如何		1分
3.一般情况:近期饮食、睡眠、大小便及体重变化情况		1分
(二) 其他相关病史	3分	
1.有无药物过敏史		0.5分
2.与该病有关的其他病史:有无其他感染性疾病病史,有无风湿性关节炎和类风湿关节炎病史,有无结核病史或结核病患者接触史		2.5分
二、问诊技巧	2分	
1.条理性强,能抓住重点		1分
2.能够围绕病情询问		1分

## 第一站 病史采集

试题编号:8

简要病史:女性,49岁。间断咳痰、痰中带血2年,咯血1天门诊急诊。		
要求:你作为住院医师,请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
考试时间:10分钟		
评分标准	总分 15分	
<b>一、问诊内容</b>	13分	
<b>(一) 现病史</b>	10分	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
(1)发病诱因:有无受凉、劳累、上呼吸道感染		1分
(2)咳嗽:性质、音色、程度,发生的时间规律,加重或缓解因素		1分
(3)咯血:痰中带血的量和颜色、急缓、性状		2分
(4)咳痰:痰的性状和量,有无异味。有无季节性,加重或缓解因素		1分
(5)伴随症状:有无发热、盗汗,有无心悸、晕厥、呼吸困难,有无其他部位出血,有无双下肢水肿		2分
2.诊疗经过		
(1)是否曾到医院就诊,做过些检查:血常规、胸部X线片(或胸部CT)、支气管镜		1分
(2)治疗情况:是否用过抗菌药物、止咳、祛痰及止血药治疗,疗效如何		1分
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及体重变化情况		1分
<b>(二) 其他相关病史</b>	3分	
1.有无药物过敏史		0.5分
2.与该病有关的其他病史:有无幼年呼吸道感染病史(麻疹、肺炎、百日咳等),有无肺结核、心脏病、肝病、肾病及血液病病史。工作性质及环境,有无吸烟嗜好。月经与婚育史		2.5分
<b>二、问诊技巧</b>	2分	
1.条理性强,能抓住重点		1分
2.能够围绕病情询问		1分

## 第一站 病史采集

试题编号:9

简要病史:女性,24岁。心悸1年,消瘦3个月门诊就诊。		
要求:你作为住院医师,请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
考试时间:10分钟		
评分标准	总分 15分	
一、问诊内容	13分	
(一) 现病史	10分	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
(1) 发病诱因:有无劳累、剧烈运动、情绪激动、感染,有无饮浓茶、咖啡以及服用药物		1分
(2) 心悸:是否突发突止,发作频率及持续时间,加重或缓解因素(与活动及体位的关系)		2分
(3) 消瘦:发生的缓急、体重变化程度,是否与饮食相关		2分
(4) 伴随症状:有无胸痛、呼吸困难,有无头晕、黑矇、晕厥,有无发热、怕热、乏力,有无易饥、多食、出汗,有无腹泻		2分
2.诊疗经过		
(1) 是否曾到医院就诊,做过哪些检查:心电图、动态心电图、胸部X线片、超声心动图		1分
(2) 治疗情况:是否用过抗心律失常药物治疗,疗效如何		1分
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及体重变化情况		1分
(二) 其他相关病史	3分	
1.有无药物过敏史		0.5分
2.与该病有关的其他病史:有无贫血史,有无慢性呼吸系统疾病、心脏病、糖尿病、甲状腺功能亢进症病史。月经与婚育史。有无糖尿病家族史		2.5分
二、问诊技巧	2分	
1.条理性强,能抓住重点		1分
2.能够围绕病情询问		1分

## 第一站 病史采集

试题编号:10

简要病史:男性,68岁。全身进行性水肿1个月门诊就诊。		
要求:你作为住院医师,请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
考试时间:10分钟		
评分标准	总分 15分	
<b>一、问诊内容</b>	13分	
<b>(一) 现病史</b>	10分	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
(1)发病诱因:有无劳累、感染、服用药物		1分
(2)水肿:首发部位、发展顺序、发展速度,是否为凹陷性及对称性,与体位变化及活动的关系		3分
(3)伴随症状:有无尿量、尿色改变,有无泡沫尿,有无尿频、尿急、尿痛及排尿困难,有无咳嗽、咳痰、心悸、呼吸困难,有无恶心、纳差、皮肤黄染、腹胀,有无怕冷、反应迟钝		3分
2.诊疗经过		
(1)是否曾到医院就诊,做过哪些检查:尿常规、肝肾功能、腹部B超		1分
(2)治疗情况:是否用过利尿剂治疗,疗效如何		1分
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大便及近期体重变化情况		1分
<b>(二) 其他相关病史</b>	3分	
1.有无药物过敏史		0.5分
2.与该病有关的其他病史:有无心脏病、肺病、肝病、肾病、甲状腺疾病病史,有无糖尿病、肿瘤、营养不良病史		2.5分
<b>二、问诊技巧</b>	2分	
1.条理性强,能抓住重点		1分
2.能够围绕病情询问		1分

## 第一站 病史采集

试题编号:11

简要病史:女性,28岁。停经50天,恶心,呕吐10天门诊就诊。		
要求:你作为住院医师,请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
考试时间:10分钟		
评分标准	总分 15分	
<b>一、问诊内容</b>	13分	
<b>(一) 现病史</b>	10分	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
(1)发病诱因:有无饮食不当(不洁饮食、进食刺激性食物)、精神因素		1分
(2)停经:停经与恶心、呕吐发生的关系。月经周期、量,有无痛经		3分
(3)呕吐:起病缓急,发生的时间、频率,是否呈喷射性,呕吐物气味、性状和量,加重或缓解因素		2分
(4)伴随症状:有无咽痛、发热,有无乏力、头晕、头痛、心悸,有无腹痛、腹泻		1分
2.诊疗经过		
(1)是否曾到医院就诊,做过哪些检查:尿妊娠试验,腹部及妇科B超		1分
(2)治疗情况:是否用过止吐药治疗,疗效如何		1分
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及近期体重变化情况		1分
<b>(二) 其他相关病史</b>	3分	
1.有无药物过敏史		0.5分
2.与该病有关的其他病史:有无胃肠道疾病病史。有无精神、神经系统疾病病史		1.5分
3.婚育史、性生活史		1分
<b>二、问诊技巧</b>	2分	
1.条理性强,能抓住重点		1分
2.能够围绕病情询问		1分

## 第一站 病史采集

试题编号:12

简要病史:女性,36岁。突发右下腹痛伴恶心、呕吐2小时急诊就诊。曾有“妇科良性肿瘤”病史。		
要求:你作为住院医师,请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
考试时间:10分钟		
评分标准	总分 15分	
<b>一、问诊内容</b>	13分	
<b>(一) 现病史</b>	10分	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
(1)发病诱因:有无剧烈运动、突发改变体位、用力排便		1分
(2)腹痛:性质、程度、持续时间,有无放射,与体位的关系,加重或缓解因素		3分
(3)呕吐:次数、量,呕吐物性状、气味,呕吐与恶心的关系		2分
(4)伴随症状:有无寒战、发热、头晕、心悸、大汗、腹泻,有无阴道流血		1分
2.诊疗经过		
(1)是否曾到医院就诊,做过哪些检查;腹部及妇科B超、血常规		1分
(2)治疗情况:是否用过止痛药、止吐药治疗,疗效如何		1分
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及近期体重变化情况		1分
<b>(二) 其他相关病史</b>	3分	
1.有无药物过敏史		0.5分
2.与该病有关的其他病史:有无盆腔包块病史,有无盆腔炎病史,有无胃肠道疾病病史,有无腹部手术史。妇科肿瘤诊治情况		1.5分
3.月经是否规律,有无停经史		1分
<b>二、问诊技巧</b>	2分	
1.条理性强,能抓住重点		1分
2.能够围绕病情询问		1分

## 第一站 病史采集

试题编号:13

简要病史:女性,67岁。乏力、腹胀2年。呕血、黑便1小时急诊就诊。既往有反复肝功能异常10年。		
要求:您作为住院医师,请围绕上述简短病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
考试时间:10分钟		
评分标准	总分 15分	
<b>一、问诊内容</b>	13分	
<b>(一)现病史</b>	10分	
1.根据主诉及相关鉴别进行询问		
(1)发病诱因:如有无饮酒、进食粗糙或刺激性食物、服用药物、劳累或剧烈呕吐。		1分
(2)腹胀:具体部位、程度。乏力的程度。		1分
(3)呕血:次数、量、具体颜色,是否混有食物。		2分
(4)黑便:次数、量、具体性状。		2分
(5)伴随症状:有无腹痛(性质,加重及缓解的因素),有无发热、头晕、心悸、其他部位出血及意识障碍。		1分
2.诊疗经过		
(1)是否曾到医院就诊,做过哪些检查:血常规、粪常规及隐血、肝肾功能、腹部B超、胃镜检查。		1分
(2)治疗情况:是否禁食、输液、应用抑酸剂、输血、内镜治疗,其疗效如何。		1分
3.一般情况		
发病以来饮食、睡眠、小便及近期体重变化情况。		1分
<b>(二)其他相关病史</b>	3分	
1.有无药物过敏史。		0.5分
2.肝功能异常诊治情况。		0.5分
3.与该病有关的其他病史:有无消化性溃疡、肝硬化、血液系统疾病及肿瘤病史。有无输血史。有无地方病和流行病区居住史。有无肿瘤家族史。		2分
<b>二、问诊技巧</b>	2分	
(一)条理性强,能抓住重点。		1分
(二)能够围绕病情询问。		1分

## 第一站 病史采集

试题编号:14

简要病史:女性,48岁。间断腹泻、黏液血便3年门诊就诊。		
要求:你作为住院医师,请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
考试时间:10分钟		
评分标准	总分 15分	
<b>一、问诊内容</b>	13分	
<b>(一) 现病史</b>	10分	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
(1)发病诱因:有无饮酒、饮食不当(不洁饮食、进食刺激性食物)、精神因素、季节因素及服用药物		1分
(2)腹泻:发作时每日腹泻及黏液血便的次数、量、性状,有无里急后重。发作频率及持续时间		3分
(3)伴随症状:有无恶心、呕吐、腹痛及其具体情况。有无发热、盗汗、心悸、关节痛、皮疹及眼部症状		3分
2.诊疗经过		
(1)是否曾到医院就诊,做过哪些检查:粪常规及隐血、血常规、粪便培养,内镜检查或钡剂灌肠检查		1分
(2)治疗情况:是否用过抗菌药物等治疗,疗效如何		1分
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及近期体重变化情况		1分
<b>(二) 其他相关病史</b>	3分	
1.有无药物过敏史		0.5分
2.与该病有关的其他病史:有无感染性肠炎、痔、炎症性肠病、结核病、心脑血管疾病、肿瘤病史。有无地方病和流行病区居住史。有无家族肿瘤史。月经及婚育史		2.5分
<b>二、问诊技巧</b>	2分	
1.条理性强,能抓住重点		1分
2.能够围绕病情询问		1分



## 第一站 病史采集

试题编号:15

简要病史:女性,26岁。皮肤黄染3天门诊就诊。		
要求:你作为住院医师,请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
考试时间:10分钟		
评分标准	总分 15分	
一、问诊内容	13分	
(一) 现病史	10分	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
(1) 发病诱因:有无不洁饮食、饮酒、劳累、服用药物、进食特殊食物		1分
(2) 皮肤黄染:发生部位、颜色,有无巩膜黄染、皮肤瘙痒及皮肤黏膜出血		2分
(3) 大小便:尿色、尿量,粪便性状(如有无白陶土样便)		2分
(4) 伴随症状:有无发热、寒战,有无腹痛、腹胀、腰背痛、食欲不振、厌油腻食物,有无恶心、呕吐、腹泻、乏力		2分
2.诊疗经过		
(1) 是否曾到医院就诊,做过哪些检查:血常规、肝炎病毒标志物检查、肝功能、腹部B超		1分
(2) 治疗情况:是否用过保肝、利胆类药物治疗,疗效如何		1分
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及近期体重变化情况		1分
(二) 其他相关病史	3分	
1.有无药物过敏史		0.5分
2.与该病有关的其他病史:有无肝胆疾病、胰腺疾病、血液病病史。有无传染病患者接触史,有无输血史及手术史。有无疫区居住史。有无饮酒嗜好。月经及婚育史。有无遗传性疾病家族史		2.5分
二、问诊技巧	2分	
1.条理性强,能抓住重点		1分
2.能够围绕病情询问		1分

## 第一站 病史采集

试题编号:16

简要病史:女性,38岁。尿频、尿痛4天,肉眼血尿1天门诊就诊。		
要求:你作为住院医师,请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
考试时间:10分钟		
评分标准	总分 15分	
<b>一、问诊内容</b>	13分	
<b>(一) 现病史</b>	10分	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
(1)发病诱因:有无劳累、受凉或憋尿,有无接受导尿、尿道器械检查		1.5分
(2)尿频:排尿频率、每次排尿量		1分
(3)尿痛:性质、程度和出现的时间,加重或缓解因素		1分
(4)血尿:尿色,有无血凝块,是否为全程血尿,呈间歇性或持续性		2分
(5)伴随症状:有无尿急、排尿困难,有无发热、盗汗,有无腰痛、腹痛及放射痛,有无其他部位出血		1.5分
2.诊疗经过		
(1)是否曾到医院就诊,做过哪些检查:尿常规、尿培养、腹部及泌尿系统B超		1分
(2)治疗情况:是否用过抗菌药物治疗,疗效如何		1分
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及体重变化情况		1分
<b>(二) 其他相关病史</b>	3分	
1.有无药物过敏史		0.5分
2.有无尿路感染反复发作史		0.5分
3.与该病有关的其他病史:有无结核病、糖尿病、尿路结石、出血性疾病、盆腔疾病史。有无外伤、手术史。月经与婚育史		2分
<b>二、问诊技巧</b>	2分	
1.条理性强,能抓住重点		1分
2.能够围绕病情询问		1分

## 第一站 病史采集

试题编号:17

简要病史:男婴,10个月。发热1天伴惊厥1次急诊就诊。		
要求:你作为住院医师,请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
考试时间:10分钟		
评分标准	总分 15分	
一、问诊内容	13分	
(一) 现病史	10分	
1.根据代主诉及相关鉴别询问		
(1) 发病诱因:有无外伤、受凉、上呼吸道感染		1分
(2) 发热:程度,体温变化情况,有无寒战		2分
(3) 惊厥:肢体抽动部位和抽动次数,持续时间,发作时有无意识障碍、大小便失禁,发绀、发热与惊厥的关系,惊厥出现时间,惊厥时体温变化,发作后意识状态		3分
(4) 伴随症状:有无咳嗽、流涕,有无腹泻、呕吐,有无皮疹		1分
2.诊疗经过		
(1) 是否曾到医院就诊,做过哪些检查:血常规、粪常规		1分
(2) 治疗情况:是否用过止惊及退热药物治疗,疗效如何		1分
3.一般情况:近期精神状况、饮食、睡眠及大小便情况		1分
(二) 其他相关病史	3分	
1.出生时有无窒息;喂养史;生长发育情况		0.5分
2.与该病有关的其他病史:有无类似发作史,有无传染病患者接触史,有无发热惊厥家族史		2.5分
二、问诊技巧	2分	
1.条理性强,能抓住重点		1分
2.能够围绕病情询问		1分

## 第一站 病史采集

试题编号:18

简要病史:男性,50岁,头部撞击后短暂神志不清、失忆3小时急诊就诊。		
要求:你作为住院医师,请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
考试时间:10分钟		
评分标准	总分 15分	
<b>一、问诊内容</b>	13分	
<b>(一) 现病史</b>	10分	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
(1)受伤情况:受伤过程及具体部位		1分
(2)意识障碍:发生急缓、程度、持续时间、进展情况		2分
(3)失忆:是顺行性还是逆行性遗忘		2分
(4)伴随症状:有无头痛,有无恶心、呕吐(是否为喷射性呕吐),有无肢体麻木和活动障碍		2分
2.诊疗经过		
(1)是否曾到医院就诊,做过哪些检查:头颅CT或头颅X线片		1分
(2)治疗情况:是否接受过治疗,疗效如何		1分
3.一般情况:近期饮食、睡眠、大小便及体重变化情况		1分
<b>(二) 其他相关病史</b>	3分	
1.有无药物过敏史		0.5分
2.与该病有关的其他病史:有无癫痫、高血压及心脏病病史,有无精神神经系统疾病家族史		2.5分
<b>二、问诊技巧</b>	2分	
1.条理性强,能抓住重点		1分
2.能够围绕病情询问		1分

## 第一站 病史采集

试题编号:19

简要病史:女性,26岁。突发头痛4小时,神志不清3小时,家属送来急诊就诊。		
要求:你作为住院医师,请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
考试时间:10分钟		
	评分标准	总分 15分
一、问诊内容		13分
(一) 现病史		10分
1.根据代主诉及相关鉴别询问		
(1) 发病诱因:有无劳累、紧张、饮食不当(不洁饮食、进食刺激性食物)或服用药物,是否与月经周期相关		2分
(2) 头痛:具体部位、性质、程度、发作频率、每次持续时间、加重或缓解因素		3分
(3) 伴随症状:有无畏光和畏声、恶心、呕吐、视力减退、肢体活动障碍、抽搐、发热		2分
2.诊疗经过		
(1) 是否曾到医院就诊,血常规、头颅CT或MRI		1分
(2) 治疗情况:是否用过止痛药物治疗,疗效如何		1分
3.一般情况:近期饮食、睡眠、大小便及体重变化情况		1分
(二) 其他相关病史		3分
1.有无药物过敏史		0.5分
2.与该病有关的其他病史:有无上呼吸道感染、高血压病史,有无烟酒嗜好,月经与婚育史,有无遗传性疾病家族史		2.5分
二、问诊技巧		2分
1.条理性强,能抓住重点		1分
2.能够围绕病情询问		1分

## 第一站 病史采集

试题编号:20

简要病史:男性,75岁。全腹胀满5天,间歇呕吐8小时急诊就诊		
要求:您作为住院医师,请围绕上述简短病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
考试时间:10分钟		
评分标准	总分 15分	
<b>一、问诊内容</b>	13分	
<b>(一)现病史</b>	10分	
1.根据主诉及相关鉴别进行询问		
(1)发病诱因:如有无饮食不当(不洁饮食、进食刺激性食物)、体位突然变动、服用药物等。		1分
(2)腹胀:程度、加重及缓解的因素。是否停止排气、排便。		2.5分
(3)呕吐:次数,呕吐物形状和量,与进食的关系,有无胆汁,有无粪臭味。		1.5分
(4)伴随症状:有发热、头晕、乏力,有无腹痛、腹泻、粘液便血,排便习惯有无发生改变。		2分
2.诊疗经过		
(1)是否曾到医院就诊,做过哪些检查:腹部X线平片、腹部B超或CT、粪常规及隐血,肿瘤标志物。		1分
(2)治疗情况:有无胃肠减压和输液治疗,其疗效如何。		1分
3.一般情况		
发病以来饮食、睡眠、小便及近期体重变化情况。		1分
<b>(二)其他相关病史</b>	3分	
1.有无药物过敏史。		0.5分
2.与该病有关的其他病史:有无类似发作史,有无肿瘤、胃肠道疾病、慢性肝病、腹外疝病史,有无腹部手术史。有无肿瘤家族史。		2.5分
<b>二、问诊技巧</b>	2分	
(一)条理性强,能抓住重点。		1分
(二)能够围绕病情询问。		1分

## 第一站 病史采集

试题编号:21

简要病史:女性,27岁。争吵后被发现意识不清伴呕吐2小时,呕吐物有大蒜气味急诊入院。		
要求:你作为住院医师,请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
时间:11分钟		
评分标准	总分 15分	
一、问诊内容	13分	
(一) 现病史	10分	
1.根据代主诉及相关鉴别询问		
(1) 发病诱因:近期有无精神和行为异常,有无大量饮酒,有无接触毒物及服用特殊药物		1分
(2) 周围环境:有无毒物、空药瓶、遗书		1分
(3) 意识障碍:程度、发生的经过及变化情况		2分
(4) 呕吐:次数、量,呕吐与进食的关系,有无恶心,是否为喷射性呕吐,呕吐物的性状及有无其他气味		2分
(5) 伴随症状:有无流涎、多汗、腹泻,有无肌肉震颤,有无大小便失禁。有无头部受伤		1分
2.诊疗经过		
(1) 是否曾到医院就诊,做过哪些检查:血常规、肝肾功能、血糖、保留血或呕吐物送毒理检查		1分
(2) 治疗情况:是否用过阿托品、胆碱酯酶复活药物治疗,疗效如何		1分
3.一般情况		
近期饮食、睡眠情况		1分
(二) 其他相关病史	3分	
1.有无药物过敏史		0.5分
2.与该病有关的其他病史:有无心血管疾病、肝肾疾病、糖尿病病史。有无外伤史,生活状况,有无烟酒嗜好。有无精神疾病病史		2.5分
二、问诊技巧	2分	
(一) 条理性强,能抓住重点		1分
(二) 能够围绕病情询问		1分

## 第一站 病史采集

试题编号:22

简要病史:男性,58岁。咳嗽、咳痰伴发热8天。有胸痛3天门诊就诊。		
要求:您作为住院医师,请围绕上述简短病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
考试时间:10分钟		
评分标准	总分 15分	
<b>一、问诊内容</b>	13分	
<b>(一)现病史</b>	10分	
1.根据主诉及相关鉴别进行询问		
(1)发病诱因:如有无受凉、劳累、误吸、淋雨等。		1分
(2)咳嗽:程度、性质、音色,咳嗽发生的时间和规律。加重及缓解的因素。		1.5分
(3)咳痰:痰的形状和量,有无异味。		1.5分
(4)发热:程度,有无寒战。		1分
(5)胸痛:具体部位、性质、程度,加重及缓解的因素。		1分
(6)伴随症状:如有无咯血、呼吸困难,有无盗汗、乏力等。		1分
2.诊疗经过		
(1)是否曾到医院就诊,做过哪些检查:血常规、痰病原学检查、胸部X线片(或胸部CT)		1分
(2)治疗情况:是否用过抗菌药物治疗,其疗效如何。		1分
3.一般情况		
近期饮食、睡眠、大小便及体重变化情况。		1分
<b>(二)其他相关病史</b>	3分	
1.有无药物过敏史。		0.5分
2.与该病有关的其他病史:有无鼻窦炎、牙周脓肿等感染灶,有无支气管扩张、肺结核病史,有无长期卧床史,有无皮肤化脓性感染。有无烟酒嗜好。		2.5分
<b>二、问诊技巧</b>	2分	
(一)条理性强,能抓住重点。		1分
(二)能够围绕病情询问。		1分



## 第一站 病史采集

试题编号:23

简要病史:男性,45岁。干咳、胸痛2周,咯血门诊就诊。		
要求:你作为住院医师,请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
时间:11分钟		
评分标准	总分 15分	
一、问诊内容	13分	
(一) 现病史	10分	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
(1) 发病诱因:有无劳累、受凉、上呼吸道感染		1分
(2) 咳嗽:性质、音色、程度,加重或缓解因素		1.5分
(3) 咯血:性状和量		1.5分
(4) 胸痛:具体部位、性质、程度,有无放射、加重或缓解因素(与呼吸、体位和活动的关系)		1.5分
(5) 伴随症状:有无呼吸困难,有无发热、乏力、盗汗,有无关节痛,有无其他部位出血		1.5分
2.诊疗经过		
(1) 是否曾到医院就诊,做过哪些检查:胸部X线片(或胸部CT)、肿瘤标志物、支气管镜		1分
(2) 治疗情况:是否用过抗菌药物、祛痰、止血药物治疗,疗效如何		1分
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大小便及体重变化情况		1分
(二) 其他相关病史	3分	
1.有无药物过敏史		0.5分
2.与该病有关的其他病史:有无肺结核、支气管扩张等慢性呼吸系统疾病病史,有无高血压、心脏病、糖尿病及血液病病史。工作性质及环境,有无烟酒嗜好		2.5分
二、问诊技巧	2分	
(一) 条理性强,能抓住重点		1分
(二) 能够围绕病情询问		1分

## 第一站 病史采集

试题编号:24

简要病史:男性,38岁。间歇性上腹痛3年,突发上腹剧痛并迅速波及全腹1小时急诊就诊。		
要求:您作为住院医师,请围绕上述简短病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
考试时间:10分钟		
评分标准	总分 15分	
<b>一、问诊内容</b>	13分	
<b>(一)现病史</b>	10分	
1.根据主诉及相关鉴别进行询问		
(1)发病诱因:如有无劳累、精神紧张、饮酒、饮食不当(不洁饮食、进食刺激性食物)、服用药物。		2分
(2)腹痛:慢性上腹痛的性质、程度、发作频率,加重及缓解的因素。突发腹痛的具体部位及转移、放射情况,腹痛性质,与呼吸及体位的关系。		3分
(3)伴随症状:有无反酸、烧心、恶心、呕吐,有无腹泻、腹胀、便血、停止排气与排便、发热。		2分
2.诊疗经过		
(1)是否曾到医院就诊,做过哪些检查:血常规、立位腹部X线片、腹部B超。本次发作前是否曾进行胃镜或上消化道钡餐造影检查。		1分
(2)治疗情况:有无用过抑酸剂或粘膜保护剂治疗,其疗效如何。		1分
3.一般情况		
发病以来饮食、睡眠、小便及体重变化情况。		1分
<b>(二)其他相关病史</b>	3分	
1.有无药物过敏史。		0.5分
2.与该病有关的其他病史:有无类似发作史,有无胃肠道疾病、胆胰及心肺疾病病史。有无肿瘤家族史。		2.5分
<b>二、问诊技巧</b>	2分	
(一)条理性强,能抓住重点。		1分
(二)能够围绕病情询问。		1分

## 第一站 病史采集

试题编号:25

简要病史:女性,48岁。阵发性头痛3年,右侧头痛6小时门诊就诊。		
要求:你作为住院医师,请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
时间:11分钟		
评分标准	总分 15分	
一、问诊内容	13分	
(一) 现病史	10分	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
(1) 发病诱因:有无劳累、紧张、饮食不当(不洁饮食、进食刺激性食物)或服用药物,是否与月经周期相关		1分
(2) 头痛:具体部位、性质、程度、发作频率、每次持续时间,加重或缓解因素		3分
(3) 伴随症状:有无畏光、恶心、呕吐,有无视力减退、肢体活动障碍、抽搐、发热		3分
2.诊疗经过		
(1) 是否曾到医院就诊,做过哪些检查:血常规、头颅CT或MRI		1分
(2) 治疗情况:是否用过止痛药物治疗,疗效如何		1分
3.一般情况:近期饮食、睡眠、大小便及体重变化情况		1分
(二) 其他相关病史	3分	
1.有无药物过敏史		0.5分
2.与该病有关的其他病史:有无上呼吸道感染、高血压病史,有无烟酒嗜好,月经与婚育史,有无遗传性疾病家族史		2.5分
二、问诊技巧	2分	
(一) 条理性强,能抓住重点		1分
(二) 能够围绕病情询问		1分

## 第一站 病史采集

试题编号:26

简要病史:男孩,1岁1个月。发热2天,惊厥1次急诊入院。		
要求:你作为住院医师,请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
时间:11分钟		
评分标准	总分 15分	
<b>一、问诊内容</b>	13分	
<b>(一) 现病史</b>	10分	
1.根据代主诉及相关鉴别询问		
(1) 发病诱因:有无外伤、受凉、上呼吸道感染		1分
(2) 发热:程度、体温变化情况,有无寒战		1分
(3) 惊厥:肢体抽动部位和抽动次数,持续时间,发作时有无意识障碍、大小便失禁、发绀		2分
(4) 发热与惊厥的关系:惊厥出现时间,惊厥时体温,发作后意识状态		2分
(5) 伴随症状:有无咳嗽、流涕,有无呕吐、腹泻,有无哭闹、烦躁,有无皮疹		1分
2.诊疗经过		
(1) 是否曾到医院就诊,做过哪些检查:血常规		1分
(2) 治疗情况:是否用过退热及止惊药物治疗,疗效如何		1分
3.一般情况:近期精神状况、饮食、睡眠及小便情况		1分
<b>(二) 其他相关病史</b>	3分	
1 出生时有无窒息,喂养史,生长发育情况		1分
2.有无药物过敏史。预防接种史		1分
3.与该病有关的其他病史:有无类似发作史,有无传染病患者接触史。有无发热惊厥家族史		1分
<b>二、问诊技巧</b>	2分	
<b>(一) 条理性强,能抓住重点</b>		1分
<b>(二) 能够围绕病情询问</b>		1分

## 第一站 病史采集

试题编号:27

简要病史:男性,25岁。肉眼血尿伴尿量减少5天门诊就诊。		
要求:你作为住院医师,请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
时间:11分钟		
评分标准	总分 15分	
一、问诊内容	13分	
(一) 现病史	10分	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
(1) 发病诱因:有无感染、外伤、剧烈运动、服用药物		1.5分
(2) 血尿:尿色,有无血凝块,是否为全程血尿,呈间歇性或持续性		2分
(3) 排尿情况:尿量减少速度及具体尿量,有无泡沫尿,有无尿频、尿急、尿痛及排尿困难		1.5分
(4) 伴随症状:有无发热、咯血、腰痛、皮疹、关节痛,有无其他部位出血,有无恶心、呕吐、水肿、心悸、呼吸困难		2分
2.诊疗经过		
(1) 是否曾到医院就诊,做过哪些检查:尿常规、血常规、肝肾功能、腹部B超		1分
(2) 治疗情况:是否用过利尿剂及止血药治疗,疗效如何		1分
3.一般情况:发病以来饮食、睡眠、大便及体重变化情况		1分
(二) 其他相关病史	3分	
1.有无药物过敏史		0.5分
2.与该病有关的其他病史:有无心脏病、肝病、肾病病史,有无出血性疾病及结缔组织病病史。有无肿瘤家族史		2.5分
二、问诊技巧	2分	
(一) 条理性强,能抓住重点		1分
(二) 能够围绕病情询问		1分

## 第一站 病史采集

试题编号:28

简要病史:女性,26岁。高处坠落后,右胸痛伴呼吸困难2小时急诊就诊。		
要求:你作为住院医师,请围绕以上简要病史,将应该询问的患者现病史及相关病史的内容写在答题纸上。		
时间:11分钟		
评分标准	总分 15分	
<b>一、问诊内容</b>	13分	
<b>(一) 现病史</b>	10分	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
(1)发病诱因:具体受伤部位和受伤经过(如坠落高度及发生坠落的原因,着地部位及身体姿势)		1分
(2)胸痛:具体部位、程度、性质,有无放射,加重或缓解因素(与呼吸、体位、活动的关系)		2分
(3)呼吸困难:程度、性质,加重或缓解因素(与体位及活动的关系)		2分
(4)伴随症状:有无心悸,有无头晕、头痛、意识障碍,有无咳嗽、咯血,有无腹痛及其他具体部位疼痛,有无肢体感觉、运动障碍		2分
2.诊疗经过		
(1)是否曾到医院就诊,做过哪些检查:血常规、胸部X线片或CT、心电图		1分
(2)治疗情况:是否接受过吸氧及胸部固定治疗,疗效如何		1分
3.一般情况:近期饮食、睡眠、大小便情况		1分
<b>(二) 其他相关病史</b>	3分	
1.有无药物过敏史		0.5分
2.与该病有关的其他病史:有无慢性肺部疾病病史,有无心血管疾病病史,有无烟酒嗜好		2.5分
<b>二、问诊技巧</b>	2分	
<b>(一) 条理性强,能抓住重点</b>		1分
<b>(二) 能够围绕病情询问</b>		1分

## 第一站 案例分析

病例分析

试题编号:1

病例摘要:男性,67岁。间断咳嗽、咳痰10余年,发热伴呼吸困难2天。

患者10余年前开始出现咳嗽、咳痰,多以冬季明显。病情严重时咳脓性痰,并伴气短,一般经抗感染、祛痰及口服“茶碱缓释片”等治疗症状可好转。2天前受凉后出现发热、寒战,咳嗽加重、咳痰增多,呈脓性,并出现憋气,夜间仅能半卧位休息。本次发病以来食欲正常,大、小便正常,睡眠差。否认高血压、心脏病、糖尿病病史及药物过敏史。吸烟40年,每日20支,戒烟1年。否认遗传病家族史。

查体:T38.5℃,P102次/分,R28次/分,BP136/84mmHg,神志清楚,半卧位,喘息状。口唇发绀,静脉无怒张。双肺叩诊呈过清音,双肺可闻及散在哮鸣音,右下肺可闻及湿性啰音。心界不大,心率102次/分,律齐,未闻及杂音及附加音。腹平软,无压痛,肝脾肋下未触及,移动性浊音(-),双下肢无水肿。

实验室检查:血常规:Hb143g/L,WBC13.5×10<sup>9</sup>/L,N0.86,PLT285×10<sup>9</sup>/L。动脉血气分析(鼻导管吸氧1L/min)示:pH7.32,PaCO<sub>2</sub>56mmHg,PaO<sub>2</sub>60mmHg,HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>28mmol/L。胸部X线片:右下肺可见斑片状渗出影,双肺透亮度增高,膈肌低平。

要求:根据以上病例摘要,请将初步诊断、诊断依据、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

考试时间:15分钟

评分标准	总分 22分	
<b>一、初步诊断</b>	4分	
1.右下肺肺炎		1分
2.慢性阻塞性肺疾病		1.5分
3.Ⅱ型呼吸衰竭		1.5分
<b>二、诊断依据(初步诊断错误,诊断依据不得分)</b>	6分	
1.右下肺肺炎		
(1)发热;寒战、咳嗽、脓性痰		0.5分
(2)查体:右下肺湿性啰音		0.5分
(3)血常规“白细胞总数及中性粒细胞”比例增加		0.5分
(4)胸部X线片:右下肺渗出性病变		0.5分
2.慢性阻塞性肺疾病		
(1)老年男性,大量吸烟史		1分
(2)长期间断咳嗽、咳痰、呼吸困难		1分
(3)查体:双肺叩诊呈过清音,双肺可闻及散在哮鸣音;胸部X线片:双肺透亮度增高,膈肌低平。提示肺气肿		1分
3.Ⅱ型呼吸衰竭:动脉血气分析示低氧血症合并二氧化碳潴留		1分
<b>三、鉴别诊断</b>	4分	
1.支气管哮喘		1.5分
2.支气管扩张		1分

续表

3.左心衰竭		1.5分
<b>四、进一步检查</b>	4分	
1.肝功能、肾功能、血电解质		1分
2.心电图,超声心动图		1分
3.痰病原菌培养及药敏		1分
4.肺功能检查(治疗后)		1分
<b>五、治疗原则</b>	4分	
1.休息,持续低流量吸氧,止咳、祛痰		1分
2.静脉点滴广谱抗生素		1分
3.使用支气管舒张剂,短期使用糖皮质激素		1.5分
4.必要时机械通气		0.5分



## 第一站 案例分析

试题编号:2

<p>病例摘要:女性,27岁。反复喘息伴咳嗽,咳痰1年,再发1天。 患者1年来反复发作喘息,多与气候变化、接触油烟等刺激性气味有关。伴咳嗽,咳少许白痰。无胸闷、胸痛、心悸,无发热、盗汗。在脱离刺激性气味后症状可自行缓解。喘息持续发作时,曾在当地诊所按“上呼吸道感染”治疗,症状可逐渐缓解。缓解期间无不适症状。1天前患者逛宠物市场后喘息再次发作,轻微活动即感胸闷、气促,夜间症状严重,需高枕卧位。发病以来,精神、食欲、睡眠差,大小便正常。否认过敏史。无烟酒嗜好。月经正常。否认遗传病家族史。 查体:T 36.5℃,P 95次/分,BP 120/76 mmHg。坐位,喘息状,表情焦虑,精神差。口唇无明显发绀。皮肤湿润。全身浅表淋巴结未触及肿大。胸廓外形正常,双侧触觉震颤减弱,双肺叩诊呈过清音,可闻及中量呼气相哮鸣音,未闻及湿性啰音和胸膜摩擦音。心界不大,心率95次/分,律齐,未闻及心脏杂音。双下肢无水肿。 实验室检查:动脉血气分析:pH 7.43,PaCO<sub>2</sub> 47 mmHg,PaO<sub>2</sub> 70 mmHg,HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> 23 mmol/L,SaO<sub>2</sub> 92%。</p>		
<p>要求:根据以上病例摘要,请将初步诊断、诊断依据、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。 考试时间:15分钟</p>		
	评分标准	总分 22分
一、初步诊断		3分
支气管哮喘急性发作期(仅答出“支气管哮喘”或“哮喘”得2分)		3分
二、诊断依据(初步诊断错误,诊断依据不得分)		4分
1.青年女性,反复发作哮喘伴咳嗽,1天来再发伴胸闷、气促		1分
2.与气候变化、接触刺激性气味等有关,可自行缓解。缓解期无不适症状		2分
3.查体:坐位,喘息状,双肺触觉震颤减弱、叩诊呈过清音,可闻及中量哮鸣音		1分
三、鉴别诊断		4分
1.急性左心衰竭		1.5分
2.慢性阻塞性肺疾病		1.5分
3.慢性支气管炎		0.5分
4.气道阻塞		0.5分
四、进一步检查		5分
1.血常规(嗜酸性粒细胞计数+百分比)		0.5分
2.胸部X线片		1分
3.心电图,必要时超声心动图		0.5分
4.肺功能检查(支气管舒张试验)		2分
5.皮肤变应原检测(病情控制后)		1分
五、治疗原则		6分
1.休息、吸氧,脱离变应原		1分

续表

2.联合使用支气管舒张剂,静脉或口服糖皮质激素缓解症状		2分
3.吸入糖皮质激素+支气管舒张剂预防发作		2分
4.必要时机械通气治疗		0.5分
5.哮喘的健康教育与管理		0.5分

## 第一站 案例分析

试题编号:3

<p><b>病例摘要</b></p> <p>男性,42岁,间断咳嗽、咳痰、痰中带血6年,咯血3小时。</p> <p>患者6年前开始间断出现咳嗽。咳痰、痰量不多,为粘痰和脓性痰,有时痰中带血。2年前曾行胸部X线片检查示:“右上肺尖纤维索条影及硬结灶,可见透亮区”,多次查痰抗酸杆菌阴性。给予抗感染及止血治疗症状可好转。3小时前突然咯鲜红色血液,量约180ml,无发热、胸痛及呼吸困难,急诊就诊。发病以来食欲、大小便及睡眠正常,体重无明显变化,8年前患右上肺结核,抗结核治疗1年后痊愈。否认高血压、心脏病、糖尿病史。无药物过敏史。无烟酒嗜好。否认遗传病家族史。</p> <p>查体:T 36.8℃,P 80次/分,R 21次/分 BP 140/80 mmHg。睑结膜无苍白,浅表淋巴结未触及肿大,颈静脉无怒张。右上肺可闻及湿性啰音 心界不大,心律80次/分,率齐,未闻及心脏杂音,腹平软,肝脾肋下未触及,未见杵状指。</p> <p>实验室检查:血常规:Hb 120 g/L,RBC <math>4.2 \times 10^{12}/L</math>,WBC <math>7.5 \times 10^9/L</math>,N 0.70,杆状核 0.05,Plt <math>255 \times 10^9/L</math>,胸部X线片:右上肺尖纤维索条影及硬结灶,可见数个囊状阴影,与2年前胸片比较无明显变化。</p> <p>要求:根据以上病例摘要,请将初步诊断、诊断依据(两个以上诊断,应分别列出各自诊断依据,未分别列出扣分)、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。</p>		
<p>考试时间:15分钟</p>		
评分标准	总分 22分	
<b>一、初步诊断</b>	3分	
1.支气管扩张		2分
2.右上肺陈旧性肺结核		1分
<b>二、诊断依据</b> (初步诊断错误、诊断依据不得分)	5分	
1.支气管扩张:	3分	
(1)间断咳嗽/咳痰,伴痰中带血		1分
(2)本次大咯血		0.5分
(3)查体:右上肺湿性啰音		0.5分
(4)胸部X线片:右上肺尖纤维索条影及硬结灶,可见数个囊状阴影		1分
2.右上肺陈旧性肺结核	2分	
(1)胸部X线片示右上肺尖纤维条影及硬结灶,较前无明显变化		1分
(2)肺结核病史,多次痰查找抗酸杆菌阴性		1分
<b>三、鉴别诊断</b>	4分	
1.支气管肺癌		2分
2.肺脓肿(或特殊类型肺部感染)		2分
<b>四、进一步检查</b>	5分	
1.肝、肾功能,血糖,电解质,肿瘤标志物,血型		1分

续表

2.胸部高分辨率 CT		1.5 分
3.疾病原学检查(细菌培养+药敏、痰涂片抗酸染色)		1.5 分
4.必要时支气管镜检查		1 分
<b>五、治疗原则</b>	5 分	
1.休息、吸氧、营养支持、必要时输血		1 分
2.应用广谱抗生素+抗厌氧菌药物		1.5 分
3.体位引流,应用祛痰药,支气管舒张药		1.5 分
4.垂体后叶素、氨基乙酸等药物止血治疗		0.5 分
5.必要时手术或支气管动脉栓塞		0.5 分

## 第一站 案例分析

试题编号:4

<p><b>病例摘要</b></p> <p>女性,37岁,下腹痛伴发热4天。</p> <p>患者4天前出现下腹坠痛,持续性,向腰骶部放射,伴发热,体温最高39.0℃,无恶心、呕吐,无腹泻,无阴道出血。自服“阿莫西林”症状无改善,急诊入院。平素月经规律,周期28~30天,经期3天,量中,无痛经。末次月经4天前。</p> <p>入院查体:T 38.9℃,P 100次/分,R 26次/分,BP 110/60 mmHg。营养中等,心肺未见异常。腹软,肝脾肋下未触及,下腹压痛(+),无反跳痛,未触及包块。移动性浊音(-),肠鸣音正常。妇科检查:外阴经产式;阴道通畅,壁充血,脓性分泌物多,有异味;宫颈充血,举痛(+),宫颈管有脓性分泌物;宫体前位,稍大,质中,活动可,压痛(+);左侧增厚,压痛(+),右侧未触及明显异常。</p> <p>实验室检查:血常规:WBC <math>14.0 \times 10^9/L</math>,N 0.9。尿妊娠试验(-)。</p> <p>要求:根据以上病例摘要,请将初步诊断、诊断依据(两个以上诊断,应分别列出各自诊断依据,未分别列出扣分)、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。</p> <p>考试时间:15分钟</p>		
评分标准		总分 22分
<b>一、初步诊断</b>		4分
急性盆腔炎		4分
<b>二、诊断依据</b> (初步诊断错误,诊断依据不得分)		5分
1.下腹坠痛伴发热		1分
2.查体:T 38.9℃,下腹部压痛(+)。妇科检查:阴道充血,脓性分泌物多,有异味。宫颈充血,举痛(+),颈管有脓性分泌物;宫体前位,稍大,压痛(+);左侧附件增厚,压痛(+)		3分
3.辅助检查:血 WBC 及中性粒细胞比例增高		1分
<b>三、鉴别诊断</b>		5分
1.急性阑尾炎		2分
2.异位妊娠		2分
3.卵巢囊肿蒂扭转或破裂		1分
<b>四、进一步检查</b>		4分
1.宫颈管分泌物细菌培养+药敏试验		2分
2.妇科B超		2分
<b>五、治疗原则</b>		4分
1.休息(半卧位)		1分
2.静脉滴注广谱抗菌药物,并根据药敏结果调整。		3分

## 第一站 案例分析

试题编号:5

<p><b>病例摘要</b></p> <p>男性,57岁。间断咳嗽、咳痰8余年,发热伴呼吸困难3天。</p> <p>患者8年前开始出现咳嗽、咳痰,多以冬季明显。病情严重时咳脓性痰,并伴气短,一般经抗感染、祛痰及口服“茶碱缓释片”等治疗症状可好转。3天前受凉后出现发热、寒战,咳嗽加重、咳痰增多,呈脓性,并出现憋气,夜间仅能半卧位休息。本次发病以来食欲正常,大小便正常,睡眠差。否认高血压病史及药物过敏史。吸烟35年,每日15支,戒烟2年。否认遗传病家族史。</p> <p>查体:T 37.8℃,P 105次/分,BP 138/80 mmHg,神志清楚,半卧位,喘息状。口唇发绀,颈静脉无怒张。双肺叩诊呈过清音,双肺可闻及散在哮鸣音,右下肺可闻及湿性啰音。心界不大,心率105次/分,律齐,未闻及杂音及附加音。腹平软,无压痛,肝脾肋下未触及,移动性浊音(-),双下肢无水肿。</p> <p>实验室检查:血常规:Hb 140 g/L,WBC 12.5×10<sup>9</sup>/L,N 0.80,Plt 280×10<sup>9</sup>/L。动脉血气分析(鼻导管吸氧1 L/min)示:pH 7.25,PaCO<sub>2</sub>58 mmHg,PaO<sub>2</sub>59 mmHg,HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> 27 mmol/L</p> <p>胸部X线片:右下肺可见斑片状渗出影,双肺透亮度增高,膈肌低平。</p>		
<p>要求:根据以上病例摘要,请将初步诊断、诊断依据(两个以上诊断,影分别列出各自诊断依据,未分别列出扣分)、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。</p>		
<p>考试时间:15分钟</p>		
	评分标准	总分 22分
	<b>一、初步诊断</b>	4分
	1.右下肺炎	1分
	2.慢性阻塞性肺疾病(COPD)	1.5分
	3.Ⅱ型呼吸衰竭	1.5分
	<b>二、诊断依据</b> (初步诊断错误,诊断依据不得分;未分别列出各自诊断依据,扣1分)	6分
	1.右下肺炎	2分
	(1)发热、寒战、咳嗽、脓性痰	0.5分
	(2)查体:右下肺湿性啰音	0.5分
	(3)血常规:白细胞总数及中性粒比例增加	0.5分
	(4)胸部X线片:右下肺渗出性病变	0.5分
	2.慢性阻塞性肺疾病(COPD)	2分
	(1)长期吸烟病史	0.5分
	(2)间断咳嗽、咳痰8余年	0.5分
	(3)叩诊肺部过清音	0.5分
	(4)X线:双肺透亮度增高,膈肌低平	0.5分
	3.Ⅱ型呼吸衰竭	2分

续表

慢性肺部疾病病史,血气分析:氧分压低,二氧化碳分压高		2分
<b>三、鉴别诊断</b>	4分	
1.肺心病		1分
2.支气管扩张症		1分
3.支气管哮喘		1分
4.支气管肺癌		1分
<b>四、进一步检查</b>	4分	
1.肝、肾功能,血电解质		1分
2.心电图,超声心动图		1分
3.痰病原菌培养及药敏		1分
4.肺功能检查(治疗后)		1分
<b>五、治疗原则</b>	4分	
1.休息,持续低流量吸氧,止咳、祛痰		1分
2.静脉点滴广谱抗生素		1分
3.使用支气管舒张剂,短期使用糖皮质激素		1.5分
4.必要是机械通气		0.5分

## 第一站 病例分析

试题编号:6

病例摘要:男性,67岁。突发心悸伴气促5小时。 患者5小时前用力排便时突发心悸、气促,无胸痛,无咳嗽、咯血,送来急诊。既往有“急性广泛前壁心肌梗死”2年,保守治疗。否认糖尿病病史。吸烟40年,每天30支。无遗传病家族史。 查体:T36.1℃,P96次/分,R24次/分,BP100/60mmHg。神志清楚,半卧位,口唇发绀,颈静脉未见充盈,甲状腺无肿大。双肺可闻及大量湿性啰音。心尖搏动位于左侧第五肋间锁骨中线外2cm处,心率136次/分,律绝对不齐,未闻及心脏杂音。腹平坦,无压痛,肝、脾未触及,移动性浊音,双下肢无水肿。 实验室检查:入院后急查CK 250U,CK-MB18U/L。		
要求:根据以上病例摘要,请将初步诊断、诊断依据、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。 考试时间:15分钟		
评分标准	总分 22分	
<b>一、初步诊断</b>	4分	
1.急性左心衰竭		1分
2.冠心病		0.5分
陈旧性广泛前壁—心肌梗死		1分
心脏扩大		0.5分
3.快速心房颤动		1分
<b>二、诊断依据(初步诊断错误,诊断依据不得分)</b>	5分	
1.急性左心衰竭		
(1)用力排便后突发呼吸困难		0.5分
(2)半卧位,口唇发绀,双肺大量湿性啰音		1分
(3)心率136次/分		0.5分
2.冠心病,陈旧性广泛前壁心肌梗死,心脏扩大		
(1)老年男性,有吸烟史、陈旧性心肌梗死病史		1分
(2)“广泛前壁心肌梗死”病史2年,心脏扩大		0.5分
(3)心肌坏死标记物正常		0.5分
3.快速心房颤动:心率136次/分,心律绝对不齐,短绌脉		1分
<b>三、鉴别诊断</b>	4分	
1.心绞痛		1分
2.主动脉夹层		1分
3.急性肺栓塞		1分
4.支气管哮喘		1分
<b>四、进一步检查</b>	4分	



续表

1.BNP		1分
2.心电图		1分
3.血常规,动脉血气分析,血糖,肝、肾功能,血脂		1分
4.胸部 X 线片,超声心动图		1分
<b>五、治疗原则</b>	5分	
1.坐位,双腿下垂,吸氧,控制液体入量		0.5分
2.应用吗啡		1分
3.应用快速利尿剂		1分
4.应用血管扩张剂		1分
5.应用洋地黄类药物		1分
6.冠心病二级预防		0.5分

## 第一站 案例分析

试题编号:7

病例摘要:男性,55岁。反复头痛、头晕5年,加重2天。 患者5年前开始常在劳累或情绪波动时出现头痛、头晕,休息后能缓解,未诊治。2年前体检时发现血压200/120 mmHg,自行购“复方降压片”间断服用,血压控制不理想。近2天无诱因出现头痛,伴有恶心,无呕吐,无意识改变及肢体活动障碍。发病以来睡眠差,食欲及大小便正常。既往有糖尿病3年,长期口服降糖药,空腹血糖控制在7 mmol/L左右。吸烟35年,每天20~30支,饮少量黄酒。母亲有糖尿病。 查体:T 36.1℃,P 86次/分,R 18次/分,BP 170/99 mmHg。体型肥胖,神志清楚,浅表淋巴结未触及,甲状腺无肿大。双肺呼吸音清晰。心界不大,心率86次/分,律齐,A <sub>2</sub> >P <sub>2</sub> ,未闻及心脏杂音。腹平软,无压痛,肝、脾未触及。双下肢无水肿。 实验室检查:空腹血糖9.5 mmol/L,K <sup>+</sup> 3.3 mmol/L,Na <sup>+</sup> 135 mmol/L		
要求:根据以上病例摘要,请将初步诊断、诊断依据、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。 考试时间:15分钟		
评分标准	总分 22分	
<b>一、初步诊断</b>	3分	
1.高血压3级(很高危)		2分
2.2型糖尿病		0.5分
3.低钾血症		0.5分
<b>二、诊断依据(初步诊断错误,诊断依据不得分)</b>	6分	
1.高血压3级(很高危)		
(1)中年男性,病程长		0.5分
(2)劳累或情绪波动时出现头痛、头晕;最高血压200/120 mmHg,为3级		2分
(3)A <sub>2</sub> >P <sub>2</sub>		0.5分
(4)有糖尿病及吸烟史,为很高危		1分
2.2型糖尿病		
(1)有糖尿病病史,体型肥胖,长期口服降糖药		1分
(2)空腹血糖9.5 mmol/L		0.5分
3.低钾血症:3.3 mmol/L		0.5分
<b>三、鉴别诊断</b>	4分	
1.原发性醛固酮增多症		1分
2.肾实质性高血压		1分
3.肾血管性高血压		1分
4.皮质醇增多症		1分
<b>四、进一步检查</b>	5分	

续表

1.肾上腺及腹部 B 超		1 分
2.血电解质,肝、肾功能,血脂,尿常规、尿钾检查		1 分
3.血肾素、血管紧张素醛固酮测定,肾上腺皮质功能检查		1 分
4.超声心动图		1 分
5.心电图,胸部 X 线片		1 分
<b>五、治疗原则</b>	4 分	
1.控制体重、戒烟;糖尿病低钠饮食,适度运动		1 分
2.纠正低血钾		1 分
3.长期降压治疗		1 分
4.控制血糖		1 分

## 第一站 案例分析

试题编号:8

<p><b>病例摘要</b>                  男性,62岁。持续性上腹痛1天,伴发热、少尿3小时。                  患者于昨天进油腻食物后出现上腹部持续性剧烈疼痛,不能平卧,服用“酵母片”及“颠茄”无缓解。近3小时自感发热,尿量不足50ml。既往曾患胆石病多年,间断口服药物治疗。                  查体:T 38.8℃,P 108次/分,R 26次/分,BP 85/60 mmHg。神志恍惚。四肢皮温低。巩膜黄染,浅表淋巴结未触及。肺肝界于右锁骨中线第6肋间,双肺听诊无异常,心率108次/分,律齐。腹部膨隆,腹肌紧张,全腹有压痛及反跳痛,肝脾触诊不满意,移动性浊音阳性,肠鸣音减弱。                  实验室检查:血常规:Hb 122 g/L,RBC <math>4.0 \times 10^9/L</math>,WBC <math>19.5 \times 10^9/L</math>,N 0.90,Plt <math>250 \times 10^9/L</math>。Plt <math>250 \times 10^9</math>,CK-MB 20 U/L,TnT 0.01 ng/ml。                  腹部B超:胆囊多发结石,胆管扩张。胰腺肿大,弥漫性低回声改变,腹腔积液。</p>		
<p>要求:根据以上病例摘要,请将初步诊断、诊断依据(两个以上诊断应分别列出各自诊断依据,未分别列出扣分)鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。</p>		
<p>考试时间:15分钟</p>		
	评分标准	总分 22分
<b>一、初步诊断</b>		3分
1.重症急性胰腺炎(答出“急性胰腺炎”得1.5分)		2.5分
2.胆石病		0.5分
<b>二、诊断依据</b> (初步诊断错误,诊断依据不得分;未分别列出各自诊断依据,扣1分)		6分
1.重症急性胰腺炎:		
(1)老年患者,急性病程。既往有胆石病史		0.5分
(2)进油腻食物后出现剧烈的持续性上腹部疼痛,伴发热及少尿		1分
(3)体温达38.8℃,脉搏加速,呼吸急促,血压下降。四肢皮温低,全腹压痛及反跳痛,肌紧张,腹水征阳性,肠鸣音减弱		1.5分
(4)血淀粉酶升高,WBC总数及中性粒细胞比例均增高,心肌坏死标记物正常		1.5分
(5)腹部B超:胆囊多发结石,胆管扩张,胰腺肿大,弥漫性低回声改变,腹腔积液		1分
2.胆石病:既往病史及腹部B超检查所见		0.5分
<b>三、鉴别诊断</b>		3分
1.消化性溃疡穿孔		1分
2.急性肠梗阻		1分
3.急性心肌梗死		1分
<b>四、进一步检查</b>		4分
1.血脂酶,监测血、尿淀粉酶,腹水淀粉酶测定		1分
2.肝、肾功能,血胆红素,电解质(尤其血钙)及动脉血气分析		1分

续表

3.腹部 CT		1 分
4.立位腹部 X 线平片		0.5 分
5.心电图		0.5 分
<b>五、治疗原则</b>	6 分	
1.重症监护,禁食、胃肠减压		1 分
2.扩容、补液,营养支持疗法,维持水电解质酸碱平衡		1 分
3.合理应用抗生素		1 分
4.抑制胰腺外分泌及胰酶活性,如药物应用抑酸剂、生长抑素等		1 分
5.酌情考虑内镜治疗		1 分
6.中医中药治疗及对症治疗(解痉镇痛)		0.5 分
7.可酌情考虑外科治疗		0.5 分

## 第一站 案例分析

试题编号:9

<p>病例摘要:男,45岁,消瘦3个月。患者3个月前开始无明显诱因出现消瘦,体重在3个月内下降10公斤,伴烦、渴,多饮。日饮水约3000 mL,日间无明显尿量增多,夜间排尿次数较前增加,约2~4次,无尿急,尿痛及排尿困难,无怕热、多汗,无明显多食情况,大便正常。平素工作紧张,应酬多,运动少,喜甜食和油腻食物,既往体健,无药物过敏及手术外伤史。父亲患有2型糖尿病。</p> <p>查体:36.3℃,P 76次/分,R 16次/分,BP 130/80 mmHg 身高165 cm 体重78 kg 神志清楚。自主体位,查体合作。皮肤巩膜无黄染,浅表淋巴结未触及肿大,口唇及舌粘膜较干燥,甲状腺不大,甲状腺区未闻及杂音、双肺呼吸音清晰,未闻及干湿性啰音,心率76次/分,律齐,心音正常。各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音,腹部检查未见明显异常。双下肢皮肤未见色素沉着,足部未见皮损。</p> <p>实验室检查:尿糖(++),尿酮体(-),尿蛋白(-)。</p>		
<p>要求:根据以上病例摘要,请将初步诊断、诊断依据(两个以上诊断,应分别列出各自诊断依据,未分别列出扣分)、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。</p> <p>考试时间:15分钟</p>		
评分标准		总分 22分
<b>一、初步诊断</b>		3分
2型糖尿病(仅答“糖尿病”得2分,答“1型糖尿病”不得分)		3分
<b>二、诊断依据(初步诊断错误,诊断依据不得分)</b>		5分
1.中年男性,有2型糖尿病家族史		1分
2.症状:烦渴、多饮、多尿、夜尿增多、疲乏、体重下降		1分
3.查体:肥胖体型		2分
4.实验室检查:尿糖(++)		1分
<b>三、鉴别诊断</b>		4分
1.1型糖尿病		1分
2.肾性糖尿		1分
3.尿崩症		1分
4.精神性烦渴		1分
<b>四、进一步检查</b>		5分
1.空腹血糖和餐后2小时血糖(或OGTT)		1分
2.糖化血红蛋白		1分
3.胰岛素释放试验(或C肽释放试验)		1分
4.血脂,心电图,眼底,外周神经系统检查,尿微白蛋白排泄率		2分
<b>五、治疗原则</b>		5分
1.糖尿病健康教育		0.5分
2.医学营养治疗		1分
3.体育锻炼(答“体育运动或运动治疗”亦得分)		1分
4.病情监测		0.5分
5.首选二甲双胍降糖治疗		2分

## 第一站 案例分析

试题编号:10

<p><b>病例摘要</b></p> <p>女性,30岁,头晕、乏力、面色苍白1年,加重伴活动后心悸半个月。</p> <p>患者半年前无明显诱因出现头晕、乏力,家人发现面色不如以前红润,一直未予诊治,近半个月来加重,伴活动后心悸,曾到医院检查示血红蛋白减低(具体不详)。发病以来睡眠和饮食正常,但食肉少,大小便正常,无鲜血便和黑便,尿色正常,无鼻和牙龈出血,体重无明显变化。既往无胃病、肝病和痔疮病史。结婚2年半,连续妊娠2次,分别足月分娩1女婴和1男婴,后一次分娩时阴道出血较多,均行母乳喂养,现在哺乳中。平时爱饮浓茶。无遗传病家族史。</p> <p>查体:T 36.5℃,P 102次/分,R 18次/分,BP 120/80 mmHg。贫血貌。皮肤未见出血点和皮疹,浅表淋巴结未触及肿大,巩膜未见黄染,睑结膜和口唇苍白,双肺未见异常,心界不大,心率102次/分,律齐,心尖部闻及2/6级收缩期吹风样杂音,腹软,无压痛,肝脏肋下未触及,双下肢无水肿。</p> <p>实验室检查:血常规:Hb 65 g/L,MCV 70 fl,MCH 25 pg,MCHC 30%,WBC <math>6.5 \times 10^9/L</math>,N 0.70,L 0.27,M 0.03,Plt <math>350 \times 10^9/L</math>,Ret 0.015。尿蛋白(-),尿镜检(-),粪隐血(-)。</p>		
<p>要求:根据以上病例摘要,请将初步诊断、诊断依据(两个以上诊断,应分别列出各自诊断依据,未分别列出扣分)、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。</p>		
<p>考试时间:15分钟</p>		
评分标准	总分 22分	
<b>一、初步诊断</b>	4分	
缺铁性贫血(答出“贫血待查”扣2分)		4分
<b>二、诊断依据</b> (初步诊断错误,诊断依据不得分)	5分	
1.有头晕、乏力、面色苍白、活动后心悸等贫血症状		1分
2.连续两次妊娠,最近一次分娩时阴道出血较多,均行母乳喂养,平时爱饮浓茶,食肉少		1.5分
3.查体:贫血貌,睑结膜和口唇苍白,心率快,心尖部闻及2/6级收缩期吹风样杂音		1分
4.血常规呈小细胞低色素性贫血,WBC和分类及网织红细胞均正常		1.5分
<b>三、鉴别诊断</b>	5分	
1.慢性病性贫血		2分
2.铁粒幼细胞性贫血		1分
3.地中海贫血		1分
4.巨幼细胞贫血		1分
<b>四、进一步检查</b>	4分	
1.血涂片观察红细胞形态		1分
2.血清铁、铁蛋白和总铁结合力测定		1分
3.骨髓细胞学检查和铁染色		1分

续表

4.血清叶酸和维生素 B <sub>12</sub> 测定		1分
5.腹部B超		
<b>五、治疗原则</b>	4分	
1.调整饮食,禁饮浓茶。		2分
2.口服铁剂补充治疗		1分
3.必要时输注浓缩红细胞。		1分



## 第一站 案例分析

试题编号:11

<p><b>病例摘要</b></p> <p>男性,72岁,头昏、右侧肢体无力3小时。</p> <p>患者于2小时前早晨醒来后感到头昏、右侧肢体无力伴麻木,右上肢无力逐渐加重至来院时已经不能移动。无耳鸣、视物旋转、头痛、恶心、呕吐、视物模糊。既往有高血压史10年,血压波动在140~180/90~110 mmHg,未规范服用降压药物治疗。无血脂异常,无心脏病、糖尿病病史,无药物过敏及手术、外伤史。无吸烟史。</p> <p>查体:T 36.5℃,P 82次/分,R 18次/分,BP 180/110 mmHg。双肺呼吸音清晰,未闻及干湿性啰音。心界不大,心率82次/分,律齐,未闻及杂音。腹部平软,肝脾肋下未触及,神经系统:意识清晰,查体合作,吐词含糊、言语欠流利。双侧眼球运动正常,未见眼球震颤,两侧瞳孔直径均为3mm,对光反射灵敏。双侧额纹对称,右侧鼻唇沟较左侧浅,露齿时口角左偏,右侧鼓腮不能。右侧上肢肌力0级、下肢肌力5级,右侧肢体肌张力略高,右侧肱二、三头肌反射亢进,右侧 Babinski 征阳性。右侧面部和肢体痛觉较左侧明显减退。</p> <p>头颅 CT(发病2小时)示双侧大脑半球未见明显异常信号。</p>		
<p>要求:根据以上病例摘要,请将初步诊断、诊断依据(两个以上诊断应分别列出各自诊断依据,未分别列出扣分)、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。</p>		
<p>考试时间:15分钟</p>		
评分标准	总分 22分	
<b>一、初步诊断</b>	3分	
1.急性左侧脑血栓形成		2分
2.高血压3级很高危(仅答“高血压”扣0.5分)		1分
<b>二、诊断依据</b> (初步诊断错误,诊断依据不得分;未分别列出各自诊断依据,扣1分)	6分	
1.急性左侧脑血栓形成		
(1)老年患者,未经规范治疗的高血压史		1分
(2)急性病程,头昏、右侧肢体无力和麻木3小时		1分
(3)安静中发病,右上肢肌力减退逐渐加重		1分
(4)查体:吐词含糊、言语欠流利,右侧中枢性面瘫,右侧肢体瘫痪,右侧偏身痛觉减退		1分
(5)头颅 CT 示双侧大脑半球未见异常信号		1分
2.高血压病3级很高危;未经正规治疗的高血压史,血压最高达 BP 180/110 mmHg,本次诊断脑血栓形成		1分
<b>三、鉴别诊断</b>	4分	
1.脑出血		2分
2.脑栓塞		1分

续表

3.颅内占位病变		1分
<b>四、进一步检查</b>	3分	
1 头颅 MRI 检查(条件许可时)或复查头颅 CT		1分
2.颅脑动脉血管 CT 成像(CTA)或 MR 成像(MRA)检查		1分
3.血常规、凝血功能、血脂、血糖		1分
<b>五、治疗原则</b>	6分	
1 溶栓治疗		2分
2 控制血压、维持生命体征稳定		1分
3.抗血小板聚集治疗		1分
4.减轻脑水肿、降低颅内压和防止并发症治疗		1分
5 二级预防,康复锻炼		1分

## 第一站 案例分析

试题编号:12

<p>病例摘要:男孩,6个月。因发热、腹泻2天,于2013年2月1日入院。患儿2天前无明显诱因出现发热,体温波动于37.5~39℃,后出现腹泻,为蛋花水样便,量较多,无腥臭味,无黏液及脓血。每日排大便10余次,无呕吐,患儿精神差,食欲下降。已6小时未解小便。既往体健,混合喂养,按时添加辅食,生长发育同正常儿,否认药物过敏史,按计划接种疫苗。</p> <p>查体:T 38.5℃,P 158次/分,R 40次/分,BP 80/50 mmHg。体重7 kg。急性病容,嗜睡,精神差。皮肤干燥、弹性差,四肢冷,眼窝深凹陷。前囟1.2cm×1.2cm,深凹陷。口唇干燥,无发绀。咽部略充血。双肺呼吸音清,心音低钝,律齐,未闻及杂音,肝肋下1.0 cm,质软,脾肋下未触及,移动性浊音阴性。</p> <p>实验室检查:血常规:Hb 138 g/L,RBC <math>5.1 \times 10^{12}</math>/L,WBC <math>4.8 \times 10^9</math>/L,N 0.20,L 0.80,PLT <math>279 \times 10^9</math>/L。粪常规:未见WBC/RBC。</p>		
<p>要求:根据以上病例摘要,请将初步诊断、诊断依据、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。</p> <p>考试时间:15分钟</p>		
评分标准	总分 22分	
<b>一、初步诊断</b>	4分	
1.腹泻病(轮状病毒肠炎可能性大)		2分
2.重度脱水		2分
<b>二、诊断依据(初步诊断错误,诊断依据不得分)</b>	7分	
1.小儿腹泻病(轮状病毒肠炎可能性大)		
(1) 婴儿,急性起病		0.5分
(2) 冬季起病,为轮状病毒肠炎好发季节		0.5分
(3) 发热,大便次数增多,大便性状改变,呈蛋花水样便,无腥臭味,无黏液、脓血		1.5分
(4) 实验室检查:血白细胞总数偏低,分类淋巴细胞比例增高,粪常规未见红、白细胞		1分
2.重度脱水		
(1) 嗜睡,精神差		0.5分
(2) 尿极少		1分
(3) 皮肤干燥、弹性差,四肢冷		1分
(4) 眼窝和前囟深凹陷		0.5分
(5) 心音低钝、脉搏增快		0.5分
<b>三、鉴别诊断</b>	3分	
1.细菌性腹泻		1分
2.生理性腹泻		1分
3.肠吸收功能障碍		1分
<b>四、进一步检查</b>	3分	

续表

1.动脉血气分析、血清电解质		1.5分
2.病毒抗原检测		1分
3.粪便细菌培养		0.5分
<b>五、治疗原则</b>	5分	
1.饮食疗法		0.5分
2.液体疗法:补液总量(定量)、溶液种类(定性)、输液速度(定速)、纠正酸中毒、补钾、补钙或镁		2.5分
3.肠道微生态疗法,如双歧杆菌、嗜酸乳杆菌等		0.5分
4.应用肠黏膜保护剂,如蒙脱石粉		0.5分
5.慎用抗生素和止泻剂		0.5分
6.补锌治疗		0.5分

## 第一站 案例分析

试题编号:13

<p><b>病例摘要</b></p> <p>男性,56岁,双手背肿痛1个月。</p> <p>患者1个月前劳累后出现双手背肿胀、疼痛,以右侧为主。2周前曾到医院检查,诊断为关节炎(具体不详),未予治疗。追问病史,患者4年前即出现双手晨僵,时间约80分钟。病后无发热,无皮疹,无口腔溃疡,无光过敏,偶腰痛,活动后无改善,大、小便及睡眠均正常。既往体健,无银屑病,无外伤病史。喜饮酒,不偏食。一子身体健康,无遗传病家族史。</p> <p>查体:T 36℃,P 66次/分,R 18次/分,BP 120/70 mmHg。皮肤未见出血点和皮疹,浅表淋巴结未触及肿大,结膜无苍白。巩膜无黄染,甲状腺无肿大,双肺未闻及干湿性啰音,心界不大,心率66次/分,律齐,未闻及杂音,腹平软,无压痛,肝脾肋下未触及,移动性浊音(-),双手远端指间关节 Heberden 结节,双手2~4掌指关节肿胀,压痛阳性;双手腕关节肿胀,压痛阳性;双膝关节无水肿,有骨摩擦感。余关节正常。</p> <p>实验室检查:血常规:Hb 120 g/L,WBC 7.5×10<sup>9</sup>/L,Plt 330×10<sup>9</sup>/L。尿常规(-),类风湿因子 69 IU/ml(正常值 0~30 IU/ml)。血沉 80 mm/h。</p> <p>双手 X 线片:双手远端指间关节骨质增生,双手第2掌指关节,左腕关节可见小囊性变。双膝 X 线片:双膝关节间隙狭窄,多发骨刺。</p>		
<p>要求:根据以上病例摘要,请将初步诊断、诊断依据(两个以上诊断,应分别列出各自诊断依据,未分别列出扣分)、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。</p>		
<p>考试时间:15分钟</p>		
评分标准	总分 22分	
<b>一、初步诊断</b>	4分	
1.类风湿关节炎		3分
2.骨关节炎		1分
<b>二、诊断依据(初步诊断错误,诊断依据不得分)</b>	5分	
1.类风湿关节炎:		
(1)多关节、小关节、对称性关节肿痛,晨僵大于1小时。		1.5分
(2)类风湿因子阳性,血沉快。		1分
(3)双手 X 线片:双手第2掌指关节,左腕关节可见小囊性变。		1分
2.骨关节炎:		
(1)双膝关节疼痛,双手 Heberden 结节。		0.5分
(2)X 线片:双手远端指间关节骨质增生,双膝关节间隙狭窄,多发骨刺。		1分
<b>三、鉴别诊断</b>	4分	
1.血清阴性脊柱关节病		2分
2.痛风		1分
3.筋膜炎		1分

续表

<b>四、进一步检查</b>	4分	
1.抗环胍氨酸抗体,CRP。		2分
2.HLA-B27,血尿酸		1分
3.骶髂关节 X 线片。		1分
<b>五、治疗原则</b>	5分	
1.非甾体抗炎药缓解症状。		1分
2.可使用小剂量糖皮质激素缓解症状。		1分
3.慢作用抗风湿药(或改变病情抗风湿药)治疗。		1.5分
4.必要时免疫及生物治疗。		0.5分
5.骨关节炎治疗(口服氨基葡萄糖等)。		1分

## 第一站 案例分析

试题编号:14

<p><b>病例摘要</b></p> <p>男孩,8岁,因“发热、咳嗽1周”于2018年12月9日入院。</p> <p>患儿5天前受凉后出现发热,最高体温39.5℃,流清涕,咳嗽,为连声咳,有白色黏痰,无呕吐、腹泻,无抽搐。当地医院诊断“急性上呼吸道感染”予以治疗(具体不详),每天体温波动在37.2~39.5℃,咳嗽逐渐加重,精神差,食欲下降,为进一步诊治入院。患病以来,睡眠可,大小便正常。患儿为小学生,既往体健,家族史无异常。</p> <p>查体:T 38.6℃,P 106次/分,R 40次/分,BP 100/65 mmHg。体重25公斤,发育正常,营养良好。急性热病容,皮肤未见皮疹,浅表淋巴结不大,口周无发绀,咽部充血,扁桃体I度肿大,颈无抵抗,胸廓对称,未见三凹征,左下肺叩诊浊音,左肺听诊呼吸音低,可闻及少量细湿性啰音。心率106次/分,律齐,心音有力,未闻及杂音,腹软,肝脾未触及,肠鸣音存在。双下肢无水肿,病理征阳性。</p> <p>实验室检查:WBC <math>6.2 \times 10^9/L</math>,N 0.72,L 0.28,CRP 25 mg/L(正常值<math>\leq 8</math> mg/L)。</p>		
<p>要求:根据以上病例摘要,请将初步诊断、诊断依据(两个以上诊断,应分别列出各自诊断依据,未分别列出扣分)、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。</p>		
<p>考试时间:15分钟</p>		
评分标准	总分 22分	
<b>一、初步诊断</b>	4分	
肺炎(支原体感染可能性大)(仅答出“支原体感染”得3分)		4分
<b>二、诊断依据</b> (初步诊断错误,诊断依据不得分)	5分	
1.学龄前儿童,急性起病。		1分
2.以发热、咳嗽、咳痰为主要表现。		1分
3.左下肺叩诊浊音,左肺听诊呼吸音低,可闻及少量细湿啰音。		1分
4.血常规白细胞正常,中性粒细胞比例增高。		1分
5.C反应蛋白增高。		1分
<b>三、鉴别诊断</b>	4分	
1.病毒性肺炎		1分
2.细菌性肺炎		1分
3.急性支气管炎		1分
4.肺结核		1分
<b>四、进一步检查</b>	5分	
1 支原体抗体或冷凝集试验。		1分
2.胸部X线片。		2分
3.痰细菌培养+药试敏试验。		1分
4.必要时PPD试验或痰查抗酸杆菌。		1分

续表

五、治疗原则	4分	
1 注意休息,清淡饮食。		1分
2.保持呼吸道通畅,必要时吸氧。		1分
3 首选大环内酯类药物抗感染治疗。		1分
4 止咳、祛痰,必要时退热。		1分





## 第一站 案例分析

试题编号:15

<p>病例摘要:男孩,7岁,发热3天,皮疹2天。</p> <p>患儿3天前无明显诱因出现发热,体温37.5~38℃。无咳嗽、流涕,无呕吐及腹泻,自服板蓝根,没有明显效果。2天前躯干部开始出现红色皮疹并有水疱,略痒。病后进食正常,大、小便及睡眠均正常。既往体健,无肝病和心脏病史。上小学1年级。否认传染病患者接触史。</p> <p>查体:T37℃,P102次/分,R22次/分,BP90/60mmHg,体重23公斤,躯干部皮肤见散在红色斑丘疹,可见水疱及部分结痂,浅表淋巴结未触及肿大,结膜无苍白,巩膜无黄染,舌面正常,双肺未闻及干湿性啰音,心界不大,心率102次/分,律齐,未闻及杂音,腹平软,无压痛,肝脾肋下未触及,移动性浊音(-),双下肢无水肿。</p> <p>实验室检查:血常规:Hb126g/L,RBC4.0×10<sup>12</sup>/L,WBC7.5×10<sup>9</sup>/L,分类正常,Plt305×10<sup>9</sup>/L,粪常规(-),尿常规(-)。</p>		
<p>要求:根据以上病例摘要,请将初步诊断、诊断依据(两个以上诊断,应分别列出各自诊断依据,未分别列出扣分)、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。</p>		
<p>时间:15分钟</p>		
评分标准	总分 22分	
<b>一、初步诊断</b>	5分	
水痘		5分
<b>二、诊断依据(初步诊断错误,诊断依据不得分)</b>	5分	
1.学龄期男孩,急性起病		1分
2.发热1天出现皮疹		1分
3.皮疹呈向心性分布,斑丘疹、水疱及结痂共存		2分
4.血常规未见异常		1分
<b>三、鉴别诊断</b>	4分	
1.麻疹		1分
2.风疹		1分
3.猩红热		1分
4.过敏性皮肤病		1分
<b>四、进一步检查</b>	3分	
1.疱疹刮片(细胞核内包涵体或病毒抗原)		1分
2.病毒分离		1分
3.血清学检查(IgM抗体)		1分
<b>五、治疗原则</b>	5分	
1.饮食、护理,避免皮肤抓伤,注意隔离		2分
2.局部涂以2%甲紫溶液或阿昔洛韦乳剂对症治疗		1.5分
3.首选阿昔洛韦抗病毒治疗		1.5分

## 第一站 案例分析

试题编号:16

<p>病例摘要:女性,18岁,心悸、消瘦半年。</p> <p>患者半年前因学习紧张出现心悸,活动后加重,休息时亦感觉心跳明显,且渐消瘦,体重下降约15kg。伴怕热、多汗。食量增加,饭量由每餐1碗增至2碗左右,且经常未到进餐时间即感饥饿。大便由每天1次增加至3~4次,成形,脾气急躁,记忆力减退,学习成绩下降。无明显烦渴、多次及尿量增多,无颈前疼痛、眼球突出、胫前水肿。未予重视,发病以来入睡困难,既往无长期发热、咳嗽、腹泻病史,无糖尿病、肝病、肾病和心脏病病史。无烟酒嗜好,母亲有甲状腺功能亢进症病史,已“治愈”。</p> <p>查体:T37℃,P130次/分,R22次/分,BP130/60mmHg。突眼(-)。甲状腺Ⅱ度弥漫肿大,对称,未扪及结节,质软,双上极可闻及明显血管杂音。双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音。心界不大,心率130次/分,律齐,心尖部可闻及2/6级收缩期吹风样杂音,腹平软,无压痛,肝脾肋下未触及。双下肢无水肿。手颤(+).</p> <p>实验室检查:血、尿常规均正常。肝、肾功能均正常。空腹血糖5.0mmol/L。FT<sub>3</sub>和FT<sub>4</sub>显著升高,TSH显著降低。</p> <p>心电图:窦性心动过速。</p>		
<p>要求:根据以上病例摘要,请将初步诊断、诊断依据(两个以上诊断应分别列出各自诊断依据,未分别列出扣分)、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。</p> <p>时间:15分钟</p>		
评分标准	总分22分	
一、初步诊断	3分	
弥漫性毒性甲状腺肿(或Graves病)(答“甲亢”或“甲状腺功能亢进症”得2分)		3分
二、诊断依据(初步诊断错误,诊断依据不得分)	6分	
1.青年女性,因学习紧张起病,母亲有甲状腺功能亢进症病史		1分
2.症状:心悸、消瘦、怕热、多汗,多食易饥,大便次数增多,脾气急躁,记忆力减退、入睡困难		1.5分
3.查体:甲状腺Ⅱ度肿大,对称,质软,无结节,可闻及血管杂音。心率增快,心尖部可闻及2/6级收缩期吹风样杂音,手颤(+)		2分
4.辅助检查:FT <sub>3</sub> 和FT <sub>4</sub> 显著升高,TSH显著降低。ECG:窦性心动过速		1.5分
三、鉴别诊断	4分	
1.亚急性甲状腺炎		1分
2.慢性淋巴细胞性甲状腺炎(或桥本甲状腺炎、自身免疫性甲状腺炎)		1分
3.结节性毒性甲状腺肿		1分
4.甲状腺自主性功能腺瘤		1分
四、进一步检查	4分	
1.TSH受体抗体(或TSAb,或TRAb),TPOAb,TGAb		2分
2.甲状腺B超		1分

续表

3.甲状腺同位素检查(或甲状腺核素检查,或甲状腺摄 138I 率,或甲状腺同位素扫描)		1 分
五、治疗原则	5 分	
1.低碘饮食,补充蛋白质及维生素,休息		1 分
2.使用抗甲状腺药物		2 分
3.使用 $\beta$ 受体阻滞剂		1 分
4.对症治疗		1 分



## 第一站 病例分析

试题编号:17

<p>病例摘要:女性,26岁,间断牙龈和鼻出血伴皮肤出血点、紫癜5天。 患者5天来无明显诱因间断出现牙龈出血,刷牙时明显,同时间断有双侧鼻出血,出血量不多,并发现皮肤有出血点和紫癜,无发热、口腔溃疡和关节痛,未曾到医院检查和治疗过,发病以来饮食和睡眠好、无尿血、便血。既往体健,否认近期服用过任何药物,无药物过敏史,平时月经正常,仅最近一次月经量较前增多,爱人及一子体健,无遗传病家族史。 查体:T36.5℃,BP120/80mmHg。前胸和四肢皮肤可见散在出血点和紫癜。浅表淋巴结未触及,巩膜无黄染,双鼻孔有陈旧血迹,牙龈有少量新鲜渗血,口腔颊黏膜未见溃疡、血疱和出血点,甲状腺不大,胸骨无压痛,心肺查体未见异常,腹平软,肝脾肋下未触及,双下肢无水肿。 实验室检查:血常规:Hb110g/L,WBC8.5×10<sup>9</sup>/L,分类N0.65,L0.35,Plt10×10<sup>9</sup>/L,尿常规、粪常规均未见异常。</p>		
<p>要求:根据以上病例摘要,请将初步诊断、诊断依据(两个以上诊断,应分别列出各自诊断依据,未分别列出扣分)、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。 时间:15分钟</p>		
	评分标准	总分 22分
一、初步诊断		4分
特发性血小板减少性紫癜(答出“血小板减少性紫癜”得2分)		4分
二、诊断依据(初步诊断错误,诊断依据不得分)		5分
1.有牙龈和鼻出血及皮肤出血表现,最近一次月经量较前增多		1分
2.无发热、关节痛和口腔溃疡等结缔组织病的表现,否认近期服用任何药物		1分
3.查体:皮肤见出血点和瘀斑,双鼻孔有陈旧血迹,牙龈渗血,肝脾不大		1.5分
4.辅助检查:血小板明显减少。血红蛋白、白细胞总数及分类未见异常		1.5分
三、鉴别诊断		4分
1.继发性免疫性血小板减少性紫癜(如自身免疫病)		2分
2.药物免疫性血小板减少性紫癜		2分
四、进一步检查		5分
1.骨髓细胞学检查		1.5分
2.血小板相关抗体(PAIg)检查		1分
3.腹部B超		1分
4.血清ANA、抗ENA抗体、抗双链DNA抗体,免疫球蛋白(IgG、IgA、IgM)、补体(C <sub>3</sub> 和C <sub>4</sub> )测定		1.5分
五、治疗原则		4分
1.血小板成分输注		1分
2.大剂量免疫球蛋白静脉滴注		0.5分

续表

3.应用糖皮质激素		1.5 分
4.必要时脾切除治疗		0.5 分
5.必要时采用免疫抑制剂治疗		0.5 分

金英杰医学®  
WWW.JINYINGJIE.COM




## 第一站 多媒体机考




虚拟考场介绍

(一) X线平片影像诊断	1.正常胸片;2.肺炎;3.浸润型肺结核;4.肺癌;5.心脏增大(二尖瓣型、主动脉型和普大型);6.气胸;7.胸腔积液;8.正常腹平片;9.消化道穿孔;10.肠梗阻;11.泌尿系结石;12.长骨骨折;13.肋骨骨折(助理不考)
(二) X线胃肠道造影影像诊断(助理不考)	1.食管静脉曲张;2.食管癌;3.消化性溃疡;4.胃癌;5.结肠癌
(三) 超声诊断(助理不考)	1.肝硬化;2.急性胆囊炎;3.胆囊结石;4.肾结石
(四) CT影像学诊断	1.肺炎(助理不考);2.肺结核(助理不考);3.肺癌(助理不考);4.肝癌(助理不考);5.肝血管瘤(助理不考);6.肝囊肿(助理不考);7.急性胰腺炎(助理不考);8.腹部外伤(肝损伤、脾损伤、肾损伤)(助理不考);9.颅脑外伤(颅骨骨折、急性硬脑膜外血肿、急性硬脑膜下血肿);10.脑出血;11.脑梗死
(五) 心电图	1.正常心电图;2.窦性心动过速;3.窦性心动过缓;4.房性期前收缩;5.心房颤动;6.阵发性室上性心动过速;7.室性期前收缩;8.室性心动过速;9.心室颤动;10.房室传导阻滞;11.左、右束支传导阻滞(助理不考);12.左、右心室肥厚(助理不考);13.急性心肌梗死
(六) 心肺听诊	1.正常呼吸音(支气管呼吸音、支气管肺泡呼吸音、肺泡呼吸音);2.异常呼吸音(呼吸音增强或减弱);3.啰音(干啰音、湿啰音);4.胸膜摩擦音
	1.心脏听诊部位(5个听诊区);2.心律(窦性心律不齐);3.心律失常(早搏、二联律、三联律、房颤);4.杂音(收缩期、舒张期、连续性);5.杂音性质(吹风样、隆隆样、机械样);6.额外心音(奔马律);7.心包摩擦音
(七) 实验室检查	1.血常规;2.尿常规;3.粪常规;4.骨髓异常检查(助理不考);5.凝血功能检查;6.痰液病原学检验;7.脑脊液常规及生化检查;8.浆膜腔积液检测;9.肝功能;10.肾功能;11.电解质;12.血糖;13.血脂;14.心肌损伤标记物;15.血尿酸淀粉酶(助理不考);16.血清铁、铁蛋白、血清总铁结合力(助理不考);17.甲状腺功能(助理不考);18.乙肝病毒免疫标记物(助理不考);19.血气分析;20.肿瘤标记物;21.血尿hCG检测
(八) 职业素质	—


## 第一站 X 线平片影像诊断

病史-1	男性,26岁。受凉后寒颤高热,咳嗽,咳铁锈色痰5天,此诊断为	
	A.肺癌	
	B.气胸	
	C.正常胸片	
	D.肺炎	
	E.胸腔积液	


答案:D

病史-2	男,28岁。发热、乏力、咳嗽4周。结合X线平片影像,此诊断为	
	A.正常胸片	
	B.肺结核	
	C.肺炎	
	D.气胸	
	E.肺癌	

答案:B


病史-3	男,55岁。胸闷、胸痛2周。结合X线平片影像,此诊断为	
	A.主动脉型心	
	B.普大型心	
	C.二尖瓣型心	
	D.胸腔积液	
	E.肺癌	

答案:A


病史-4	男,27岁。突发憋气、胸痛2小时。结合X线平片影像,此诊断为	
	A.正常胸片	
	B.气胸	
	C.肺炎	
	D.肺结核	
	E.肺癌	

答案:B


## 第一站 X 线平片影像诊断

病史-5	女,46岁。胸背疼痛3天,胸闷、憋气2天。结合X线平片影像,此诊断为	
	A.正常胸片	
	B.肺炎	
	C.胸腔积液	
	D.气胸	
	E.肺癌	

答案:C

病史-6	男,57岁。腹痛1天。结合X线平片影像,此诊断为	
	A.肾结石	
	B.正常腹平片	
	C.肠梗阻	
	D.消化道穿孔	
	E.盆腔积液	


答案:D

病史-7	男,21岁。外伤2小时。结合X线平片影像,此诊断为	
	A.左腓骨骨折	
	B.左胫骨骨折	
	C.左股骨骨折	
	D.左胫、腓骨双骨折	
	E.股骨颈骨折	


答案:B




## 第一站 心电图检查

病史-1	男,53岁。心悸、心慌、胸闷4小时。最可能的心电图诊断是	
	A. 窦性心动过缓	
	B. 正常心电图	
	C. 急性心肌梗死	
	D. 心房颤动	
	E. 室早	

答案:D


病史-2	女,35岁。头晕30分钟,结合以下心电图考虑为	
	A. 正常心电图	
	B. 急性心肌梗死	
	C. 心房颤动	
	D. 房室传导阻滞	
	E. 窦性心动过缓	

答案:D


病史-3	女,35岁。胸闷3天。最可能的心电图诊断是	
	A. 心房颤动	
	B. 右心室肥厚	
	C. 房性期前收缩	
	D. 三度房室传导阻滞	
	E. 正常心电图	

答案:C


## 第一站 心肺听诊

病史-1	男,27岁。发热、咳嗽、咳痰3天。查体:T 38.1℃在下图所示听诊区可闻及	
	A.干啰音	
	B.肺泡呼吸音	
	C.支气管肺泡呼吸音	
	D.支气管呼吸音	
	E.异常支气管呼吸音	

答案:C

病史-2	男,55岁。高血压病史10年。最近1周出现心慌、气短。查体:脉搏61次/分。请指出心尖部听到的心律性质	
	A.窦性心动过速	
	B.窦性心律不齐	
	C.期前收缩	
	D.心房颤动	
	E.收缩期杂音	

答案:D

病史-3	男,31岁。劳累后胸闷、气短2年。以往有咯血病史。请指出心尖部听到的心音性质	
	A.收缩期吹风样杂音	
	B.舒张期隆隆样杂音	
	C.连续性杂音	
	D.舒张期叹气样杂音	
	E.收缩期喷射样杂音	

答案:B



扫码做题1



扫码做题2



扫码做题3

## 第二站 体格检查

试题编号:1(注:出现重复因为原版考试题库为26大项体格检查任意组合)

请你对被检查者进行下列体格检查并回答问题。
<p>体格检查考试项目:1、甲状腺检查(须口述视诊内容和报告检查结果,前面触诊和后面触诊可任选一); 2、肝脏触诊(单、双手触诊)(须报告检查结果);3、手部及其关节视诊检查(须口述视诊内容)。 考试时间:15分钟</p>
评分标准(总分20分)
<b>一、甲状腺检查(须口述视诊内容和报告检查结果,前面触诊、和后面触诊可任选一)(6分)</b>
<p>(一)视诊(口述内容):观察甲状腺大小,是否对称(1分) (二)触诊方法正确,动作规范(4分) 1.甲状腺侧叶触诊(3分) (1)后面触诊:告知被检者取坐位,考生站在其后,一手示、中指施压于一侧甲状软骨,将气管推向对侧(1分),另一手拇指在对侧胸锁乳突肌后缘向前推挤甲状腺,示、中指在其前缘触诊甲状腺(1分)。检查过程中,嘱被检者做吞咽动作,重复检查,用同样方法检查另一侧甲状腺(1分) (2)前面触诊:告知被检者取坐位,考生面对被检者,考生一手拇指施压于一侧甲状腺软骨,将气管推向对侧(1分),另一手示、中指在对侧胸所乳突肌后缘向前推挤甲状腺,拇指在胸锁乳突肌前缘触诊(1分),嘱被检者做吞咽动作,并随吞咽动作进行触诊。用同样方法检查另一侧甲状腺(1分) 2.甲状腺峡部触诊(1分) 考生面对被检查者,用拇指(或站在被检查后面用示指)自胸骨上切迹向上触摸,可触气管前甲状腺组织,判断有无增厚,嘱被检者做吞咽动作 (三)听诊方法正确,动作规范(0.5分) 考生用听诊器钟形体件放于甲状腺部位,两侧均需检查 (四)检查结果正确(0.5分) 报告检查结果:甲状腺是否肿大,有无结节、震颤,听诊有无杂音</p>
<b>二、肝脏触诊(单、双手触诊)(须报告检查结果)(8分)</b>
<p>(一)考生站位正确,告知被检查者体位、姿势正确(0.5分) 告知被检查者取仰卧位,双腿屈曲,暴露腹部,腹部放松,做腹式呼吸,考生站在被检查者右侧 (二)检查方法正确,动作规范(7分) 1.单手触诊(4分) 考生将右手四指并拢,掌指关节伸直,平行地放在被检查者右侧腹部脐水平线上,用示、中指末端桡侧进行触诊(1分)。被检者呼气时,手指压向腹深部,吸气时,手指向前上迎下移的肝缘(1分)。如此反复进行,并逐渐向肋缘方向滑动,直至触及肝缘或右肋缘(2分) 2.双手触诊(3分) 考生右手位置同单手触诊(1分),左手托住被检查者右腰部,拇指张开置于季肋部,触诊时左手向上推(1分),右手触诊方法同单手触诊(1分) (三)检查结果正确(0.5分) 报告检查结果:肝脏肋下是否触及</p>
<b>三、手部及其关节视诊检查(须口述视诊内容)(4分)</b>

续表

<p>(一) 考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确(1分)</p> <p>告知被检查者取立位、坐位或仰卧位,双手自然放松并充分暴露,考生站在被检查者前面或右侧</p> <p>(二) 视诊检查内容正确(3分)</p> <p>被检者双手有无红肿、皮肤破损、皮下出血,有无肌萎缩等(1分);手指末端有无发绀、苍白,有无杵状指、反甲(匙状甲)(1分),双手指关节有无畸形、肿胀、活动受限等(1分)</p>
<p><b>四、职业素质(2分)</b></p>
<p>(一) 体检前能向被检者告知。与被检者沟通时态度和蔼,体检中动作轻柔,能体现爱护被检者的意识。体检结束后能告知,有体现关爱被检者的动作(1分)</p> <p>(二) 着装(工作服)整洁,仪表举止大方,语言文明,体检认真细致,表现出良好的职业素质(1分)</p>



## 第二站 体格检查

试题编号:2(注:出现重复因为原版考试题库为26大项体格检查任意组合)

<p>请你对被检查者进行以下体格检查并回答问题。          体格检查考试项目:1.眼集合反射检查(须报告正常表现);2.腹壁紧张度和腹部压痛、反跳痛检查(须报告检查结果);3.腹股沟淋巴结检查(须报告检查结果)。          考试时间:15分钟</p>	
评分标准	总分 20分
<b>一、眼集合反射检查(须报告正常表现)(6分)</b>	
(一)检查方法	
1.嘱被检者注视1米外目标(通常用考试的示指尖),将目标物缓慢移近距离被检者眼球约5~10cm处,观察眼球辐辏活动	2分
2.嘱被检者注视距离1米外目标,将目标物快速移近距离被检者眼球约5~10cm处,观察瞳孔变化	2分
(二)报告正常表现及检查结果	
1.报告受检者的情况	1分
2.正常表现:随目标移近,正常人表现为眼球内聚,瞳孔缩小	1分
<b>二、腹壁紧张度和腹部压痛、反跳痛检查(须报告检查结果)(6分)</b>	
(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确	
告知被检者取仰卧位,双腿屈曲,暴露腹部,腹部放松,考生站在被检者右侧	0.5分
(二)检查方法正确,动作规范	
1.腹壁紧张度	
①考生先将全手掌放于被检者腹壁上,让被检者适应片刻,此时可感受被检者腹壁紧张程度,然后以轻柔动作开始触诊	1分
②检查完一个区域后,考生的手应提起并离开腹壁,再以上述手法检查下一区域	0.5分
③一般先从左下腹开始,逆时针方向进行触诊,最后检查病痛部位	0.5分
2.腹部压痛、反跳痛	
①考生先将全手掌放于被检者腹壁上,让被检者适应片刻,然后用手指指腹压于腹壁,检查被检者有无疼痛反应	1分
②当出现疼痛时,手指在原处停留片刻	1分
③然后迅速将手指抬起,观察被检者疼痛有无骤然加重	1分
(三)检查结果正确	
报告检查结果:有无腹壁紧张和压痛、反跳痛(正常人腹软,无腹部压痛和反跳痛)	0.5分
<b>三、腹股沟淋巴结检查(须报告检查结果)(6分)</b>	
(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确	

续表

告知被检者取仰卧位,下肢自然伸直,暴露腹股沟区,考生位于被检者右侧	1分
(二)检查部位	
主要检查上、下两群	
1.上群位于腹股沟韧带下,与韧带平行排列	1分
2.下群位于大隐静脉的上段,沿静脉走向排列	1分
(三)检查方法	
1.考生三指(示、中、环指)并拢	0.5分
2.手指指腹紧贴腹股沟检查部位皮肤,由浅入深进行滑动触诊	1分
3.左右腹股沟淋巴结均应进行检查	1分
(四)报告检查结果	
是否触及淋巴结	0.5分
<b>四、职业素质(2分)</b>	
(一)体检前能向被体检者告知。与被体检者沟通时态度和蔼,体检中动作轻柔,能体现爱护被检查者的意识。体检结束后能告知,有体现关爱被检查者的动作	1分
(二)着装(工作服)整洁,仪表举止大方,语言文明,体检认真细致,表现出良好的职业素质	1分



## 第二站 体格检查



心脏触诊

试题编号:3(注:出现重复因为原版考试题库为26大项体格检查任意组合)

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。
<p>体格检查考试项目:1、眼睑、巩膜、结膜检查(须口述检查结果);2、心脏触诊检查(须口述检查内容,报告检查结果);3、腹壁紧张度和腹部压痛、反跳痛检查(须报告检查结果)。</p> <p>考试时间:15分钟</p>
评分标准(总分20分)
<b>一、眼睑、巩膜、结膜检查(须口述检查内容)(6分)</b>
<p>(一)检查内容叙述正确(3分)</p> <p>眼睑有无水肿,上睑有无下垂,有无闭合障碍,有无倒睫(1分);巩膜有无黄染(1分);睑结膜有无苍白或充血,球结膜有无充血或水肿(1分)。</p> <p>(二)检查方法正确(3分)</p> <p>告知被检者闭眼、睁眼(0.5分),以示指和拇指捏起上睑中外1/3交界处的边缘,告知被检者向下看,趁机将眼睑轻轻向前下方牵拉,示指向下压睑板上缘,与拇指配合将睑缘向上捻转(1分)。另嘱被检者向上看,以拇指轻压下眼睑下缘,充分暴露巩膜与结膜(1分)。同样方法检查另一侧(0.5分)。</p>
<b>二、心脏触诊检查(须口述检查内容,报告检查结果)(6分)</b>
<p>(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确(0.5分)</p> <p>告知被检者取坐位或仰卧位,充分暴露前胸部,考生站在被检者前面或右侧。</p> <p>(二)检查内容和方法正确,动作规范(4.5分)</p> <p>心尖搏动及心前区搏动:考生用右手全手掌置于心前区(0.5分),示指、中指指腹并拢触诊(1分)。</p> <p>震颤:用手掌尺侧(小鱼际)在各瓣膜区(1.5分)和胸骨左缘第3、4肋间(0.5分)触诊。</p> <p>心包摩擦感:在心前区或胸骨左缘第3、4肋间用小鱼际或并拢四指的掌面触诊。嘱被检者屏住呼吸,检查心包摩擦感有无变化(1分)。</p> <p>(三)检查结果正确(1分)</p> <p>报告检查结果:心尖搏动的具体位置(正常成人心尖搏动位于第5肋间,左锁骨中线内侧0.5~1.0cm),有无增强或减弱(0.5分)。心前区有无异常搏动、有无触及震颤和心包摩擦感(0.5分)。</p>
<b>三、腹壁紧张度和腹部压痛、反跳痛检查(须报告检查结果)(6分)</b>
<p>(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确(0.5分)</p> <p>告知被检者取仰卧位,双腿屈曲,暴露腹部,腹部放松,考生站在被检者右侧。</p> <p>(二)检查方法正确,动作规范(5分)</p> <p>1.腹壁紧张度(2分)</p> <p>考生先将全手掌放于被检者腹壁上,让被检者适应片刻,此时可感受被检者腹壁紧张程度,然后以轻柔动作开始触诊(1分)。检查完一个区域后,考生的手应提起并离开腹壁,再以上述手法检查下一个区域(0.5分)。一般先从左下腹开始,逆时针方向进行触诊,最后检查病痛部位(0.5分)。</p> <p>2.腹部压痛、反跳痛(3分)</p> <p>考生先将全手掌放于被检者腹壁上,让被检者适应片刻,然后用于手指指腹压于腹壁,观察被检者有无疼痛反应(1分);当出现疼痛时,手指在远处停留片刻(1分),然后迅速将手指抬起,观察被检者疼痛有无骤然加重(1分)。</p> <p>(三)检查结果正确(0.5分)</p> <p>报告检查结果:有无腹壁紧张和压痛、反跳痛(正常人腹软,无腹部压痛和反跳痛)。</p>

续表

**四、职业素质(2分)**

(一)体检前能向被检者告知。与被检者沟通时态度和蔼,体检中动作轻柔,能体现爱护被检者的意识。体检结束后能告知,有体现关爱被检者的动作(1分)。

(二)着装(工作服)整洁,仪表举止大方,语言文明,体检认真细致,表现出良好的职业素质(1分)。





## 第二站 体格检查

试题编号:4(注:出现重复因为原版考试题库为26大项体格检查任意组合)

请你对被检查者进行以下体格检查并回答提问。 体格检查考试项目:1.心脏触诊检查(须口述检查内容,报告检查结果);2.肝上界叩诊(须告知检查结果);3.脊柱弯曲度、压痛、叩击痛检查(须口述视诊内容)。 考试时间:15分钟	
评分标准	总分 20 分
<b>一、心脏触诊检查(须口述检查内容,报告检查结果)(6分)</b>	
(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确	
告知被检者取坐位或仰卧位,充分暴露前胸部,考生站在被检者前面或右侧	0.5分
(二)检查内容和方法正确,动作规范	
1.心前区搏动:考生用右手全手掌置于心前区	0.5分
2.心尖搏动:示指、中指指腹并拢触诊	1分
3.震颤:用手掌尺侧(小鱼际)在各瓣膜区	1.5分
4.摩擦感:在心前区或胸骨左缘第3、4肋间用小鱼际或并拢四指的掌面触诊。嘱被检者屏住呼吸,检查心包摩擦感有无变化	1.5分
(三)检查结果正确	
1.报告检查结果:心尖搏动的具体位置(正常成人心尖搏动位于第5肋间;左锁骨中线内侧0.5~1.0cm),有无增强减弱	0.5分
2.心前区有无异常搏动、有无触及震颤和心包摩擦感	0.5分
<b>二、肝上界叩诊(须告知检查结果)(4分)</b>	
(一)检查者站位正确,告知被检者体位、姿势正确	
检查者取仰卧位,双腿屈曲,腹部放松,做腹式呼吸,检查者站在被检者的右侧	1分
(二)检查方法正确,动作规范	
叩诊法确定肝上界:检查者沿右锁骨中线,自上而下逐个肋间隙进行叩诊。当叩诊音由清音转为浊音时,即为肝上界,做标记	2分
(三)口述检查结果正确	
1.被检者肝上界位于右锁骨中线第5肋间	1分
<b>三、脊柱弯曲度、压痛、叩击痛检查(须口述视诊内容)(8分)</b>	
(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确	
被检者取坐位或站立位,充分暴露躯干,检查者站在被检者后面	0.5分
(二)检查方法正确,动作规范	
1.视诊	
①观察脊柱生理弯曲是否存在	0.5分

续表

②有无脊柱侧弯、病理性前凸和后凸、畸形	0.5分
2.活动度检查	
(1)颈椎活动度检查:①检查者双手固定被检者双肩	0.5分
②嘱被检者做颈部前屈、后伸、左右侧屈	1分
③左右旋转运动,观察被检者颈椎活动度	0.5分
(2)腰椎活动度检查:①被检者双手固定被检者骨盆	0.5分
②嘱被检者做腰椎前屈、后伸、左右侧屈	1分
③左右旋转运动,观察被检者腰椎活动度	0.5分
3.脊柱压痛和叩击痛检查	
(1)压痛:用拇指或示指指腹自上而下依次按压颈椎、胸椎、腰椎棘突和椎旁肌肉,发现压痛点时需重复检查确认	0.5分
(2)叩击痛(直接法和间接法任选一种)	
①直接法:检查者以叩诊锤或单一指端依次轻叩各个脊椎棘突	1分
②间接法:检查者将左手掌置于被检者头部,右手握拳以小鱼际肌部位叩击左手背,了解被检者脊柱各部位有无疼痛	1分
四、职业素质(2分)	
(一)体检前能向被体检者告知。与被体检者沟通时态度和蔼,体检中动作轻柔,能体现爱护被检查者的意识。体检结束后能告知,有体现关爱被检查者的动作	1分
(二)着装(工作服)整洁,仪表举止大方,语言文明,体检认真细致,表现出良好的职业素质	1分



## 第二站 体格检查

试题编号:5(注:出现重复因为原版考试题库为26大项体格检查任意组合)

请你对被检查者进行以下体格检查并回答提问。 体格检查考试项目:1.扁桃体检查(须口述检查内容);2.心前区视诊(仰卧位)检查(须口述检查内容); 3.脾脏触诊检查(仰卧位双手触诊)(须报告检查结果)。 考试时间:15分钟	
评分标准	总分 20 分
<b>一、扁桃体检查(须口述检查内容)(4分)</b>	
(一)检查方法正确	
1.告知被检者取坐位,头略后仰,嘱其口张大并发“啊”音	0.5分
2.此时考生用压舌板在被检者舌前2/3与后1/3交界处迅速下压	1分
3.在光照的配合下观察扁桃体	0.5分
(二)检查内容正确	
1.观察扁桃体有无红肿	0.5分
2.判断扁桃体肿大的程度	0.5分
3.其分泌物颜色、性状	0.5分
4.有无苔及片状假膜	0.5分
<b>二、心前区视诊(仰卧位)检查(须口述检查内容)(6分)</b>	
(一)考生站位正确,告知被检者体位,充分暴露前胸部,考生站在被检者前面或右侧	1分
(二)检查内容和方法正确	
1.考生俯视被检者心前区,必要时可将视线与胸廓同高	1分
2.观察心前区有无凹陷,有无异常搏动	2分
3.心尖搏动的位置、强度与范围	2分
<b>三、脾脏触诊检查(仰卧位双手触诊)(须报告检查结果)(8分)</b>	
(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确	
告知被检者取仰卧位,暴露腹部,腹部放松,双腿屈曲,做腹式呼吸,考生站在被检查者右侧	1分
(二)检查方法正确,动作规范	
1.考生左手掌置于被检者左腰部第9~11肋处,将其脾脏从后向前托起	2分
2.右手掌放于脐部	1分
3.右手三指(示、中、环指)伸直并拢,与肋缘大致呈垂直方向	1分
4.从脐水平开始,配合被检者腹式呼吸,用示、中指末端桡侧进行触诊,直至触及脾或左肋缘	2分
(三)报告检查结果	
脾脏肋下是否触及	1分
<b>四、职业素质(2分)</b>	

续表

(一)体检前能向被体检者告知。与被体检者沟通时态度和蔼,体检中动作轻柔,能体现爱护被检查者的意识。体检结束后能告知,有体现关爱被检查者的动作	1分
(二)着装(工作服)整洁,仪表举止大方,语言文明,体检认真细致,表现出良好的职业素质	1分



## 第二站 体格检查

试题编号:6(注:出现重复因为原版考试题库为26大项体格检查任意组合)

<p>请你对被检查者进行以下体格检查并回答提问。          体格检查考试项目:1.眼球运动检查(须口述检查内容);2.心前区视诊(仰卧位)检查(须口述检查内容);3.右肋下肝脏触诊检查(单手触诊)(须报告检查结果)。          考试时间:15分钟</p>	
评分标准	总分 20 分
<b>一、眼球运动检查(须口述检查内容)(4分)</b>	
(一)检查方法	
1.考生手执目标物(如棉签)或用示指尖,置于被检者眼前30~40cm处	1分
2.告知被检者头部不要转动,眼球随目标物或示指尖移动	1分
(二)检查顺序	
目标物(或示指尖)按左、左上、左下、右、右上、右下6个方向的顺序进行移动,观察被检者眼球运动情况	1分
(三)报告检查结果	
双眼眼球运动是否正常	1分
<b>二、心前区视诊(仰卧位)检查(须口述检查内容)(6分)</b>	
(一)考生站位正确,告知被检者体位,充分暴露前胸部,考生站在被检者前面或右侧	1分
(二)检查内容和方法正确	
1.考生俯视被检者心前区,必要时可将视线与胸廓同高	1分
2.观察心前区有无凹陷,有无异常搏动	2分
3.心尖搏动的位置、强度与范围	2分
<b>三、右肋下肝脏触诊检查(单手触诊)(须报告检查结果)(8分)</b>	
(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确	
1.告知被检者取仰卧位,暴露腹部,腹部放松,双腿屈曲,做腹式呼吸,考生位于被检者右侧	1分
(二)检查方法	
1.考生将右手手指并拢,示指和中指末端与肋缘平行,放置于平脐处	1分
2.用示指、中指末端桡侧进行触诊	1分
3.嘱被检者做腹式呼吸,当被检者呼气时,手指压向腹深部,吸气时,手指向前上迎触下移的肝下缘	2分
4.如此反复进行,并逐渐向肋缘方向滑动,直至触及肝下缘或右肋缘	2分
(三)报告检查结果	
肝脏肋下是否触及	1分

续表

四、职业素质(2分)	
(一)体检前能向被体检者告知。与被体检者沟通时态度和蔼,体检中动作轻柔,能体现爱护被检查者的意识。体检结束后能告知,有体现关爱被检查者的动作	1分
(二)着装(工作服)整洁,仪表举止大方,语言文明,体检认真细致,表现出良好的职业素质	1分



## 第二站 体格检查

试题编号:7(注:出现重复因为原版考试题库为26大项体格检查任意组合)

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。	
体格检查考试项目:1.眼睑、巩膜、结膜检查(须口述检查结果);2.心脏触诊检查(须口述检查内容,报告检查结果);3.腹壁紧张度和腹部压痛、反跳痛检查(须报告检查结果)。 考试时间:15分钟	
评分标准	总分 20分
<b>一、眼睑、巩膜、结膜检查(须口述检查内容)(6分)</b>	
(一)检查内容叙述正确	
眼睑有无水肿,上睑有无下垂,有无闭合障碍,有无倒睫(1分);巩膜有无黄染(1分);睑结膜有无苍白或充血,球结膜有无充血或水肿(1分)	3分
(二)检查方法正确	
告知被检者闭眼、睁眼(0.5分),以示指和拇指捏起上睑中外1/3交界处的边缘,告知被检者向下看,趁机将眼睑轻轻向前下方牵拉,示指向下压睑板上缘,与拇指配合将睑缘向上捻转(1分)。另嘱被检者向上看,以拇指轻压下睑下缘,充分暴露巩膜与结膜(0.5分)。同样方法检查另一侧(1分)	3分
<b>二、心脏触诊检查(须口述检查内容,报告检查结果)(6分)</b>	
(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确	
告知被检者取坐位或仰卧位,充分暴露前胸部,考生站在被检者前面或右侧。	0.5分
(二)检查内容和方法正确,动作规范	
1.心尖搏动及心前区搏动:考生用右手全手掌置于心前区(0.5分),示指、中指指腹并拢触诊(1分)	1.5分
2.震颤:用手掌尺侧(小鱼际)在各瓣膜区(1.5分)和胸骨左缘第3、4肋间(0.5分)触诊	2分
3.心包摩擦感:在心前区或胸骨左缘第3、4肋间用小鱼际或并拢四指的掌面触诊。嘱被检者屏住呼吸,检查心包摩擦感有无变化	1分
(三)检查结果正确	
报告检查结果:心尖搏动的具体位置(正常成人心尖搏动位于第5肋间,左锁骨中线内侧0.5~1.0cm),有无增强或减弱(0.5分)。心前区有无异常搏动、有无触及震颤和心包摩擦感(0.5分)	1分
<b>三、腹壁紧张度和腹部压痛、反跳痛检查(须报告检查结果)(6分)</b>	
(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确	
告知被检者取仰卧位,双腿屈曲,暴露腹部,腹部放松,考生站在被检者右侧	0.5分
(二)检查方法正确,动作规范	
1.腹壁紧张度	

续表

考生先将全手掌放于被检者腹壁上,让被检者适应片刻,此时可感受被检者腹壁紧张程度,然后以轻柔动作开始触诊(1分)。检查完一个区域后,考生的手应提起并离开腹壁,再以上述手法检查下一个区域(0.5分)。一般先从左下腹开始,逆时针方向进行触诊,最后检查病痛部位(0.5分)	2分
2.腹部压痛、反跳痛	
考生先将全手掌放于被检者腹壁上,让被检者适应片刻,然后用于手指指腹压于腹壁,观察被检者有无疼痛反应(1分);当出现疼痛时,手指在远处停留片刻(1分),然后迅速将手指抬起,观察被检者疼痛有无骤然加重(1分)	3分
(三)将检查结果正确	
报告检查结果:有无腹壁紧张和压痛、反跳痛(正常人腹软,无腹部压痛和反跳痛)	0.5分
四、职业素质(2分)	
(一)体检前能向被检者告知。与被检者沟通时态度和蔼,体检中动作轻柔,能体现爱护被检者的意识。体检结束后能告知,有体现关爱被检者的动作	1分
(二)着装(工作服)整洁,仪表举止大方,语言文明,体检认真细致,表现出良好的职业素质	1分





## 第二站 体格检查

试题编号:8(注:出现重复因为原版考试题库为26大项体格检查任意组合)

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。
<p>体格检查考试项目:1、腋窝淋巴结检查(须口述检查内容和报告检查结果);2、胸膜摩擦感检查(须报告检查结果);3、脾脏触诊(双手触诊)(须报告检查结果)。</p> <p>考试时间:15分钟</p>
评分标准(总分20分)
<b>一、腋窝淋巴结检查(须口述检查内容和报告检查结果)(6分)</b>
<p>(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确(0.5分) 告知被检者取坐位或仰卧位,考生站在被检者前面或右侧。</p> <p>(二)检查方法正确,动作规范(2.5分) 检查左侧时,考生左手握被检者左手,将其前臂稍外展(1分),右手三指(示、中、环指)并拢,稍弯曲,由浅入深触诊被检者左侧腋窝淋巴结(0.5分)。 两侧均须检查,以左手检查右侧,步骤同左侧(1分)。</p> <p>(三)检查内容、部位正确(2.5分) 腋窝的5组淋巴结群(液尖群、中央群、胸肌群、肩胛下群、外侧群)均应触诊。 液尖群:位于腋窝顶部(0.5分)。 中央群:位于腋窝内侧壁近肋骨及前锯肌处(0.5分)。 胸肌群:位于胸大肌下缘深部(0.5分)。 肩胛下群:位于腋窝后皱襞深部(0.5分)。 外侧群:位于腋窝外侧壁(0.5分)。</p> <p>(四)检查结果正确(0.5分) 报告检查结果:是否触及淋巴结。</p>
<b>二、胸膜摩擦感检查(须报告检查结果)(4分)</b>
<p>(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确(1分) 告知被检者取坐位或仰卧位,充分暴露前胸部,考生站在被检者前面或右侧。</p> <p>(二)检查方法正确,动作规范(2分) 考生将手掌平放于被检者前下侧胸部。嘱被检者深慢呼吸,注意吸气相和呼气相有无如皮革互相摩擦的感觉(1分)。嘱被检者屏住呼吸,重复前述检查(1分)。</p>
<p>(三)检查结果正确(1分) 报告检查结果:有无触及胸膜摩擦感</p>
<b>三、脾脏触诊(双手触诊)(须报告检查结果)(8分)</b>

(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确(1分)

告知被检者取仰卧位,双腿屈曲,暴露腹部,腹部放松,做腹式呼吸,考生站在被检者右侧(0.5分);告知被检者取右侧卧位时,右下肢伸直,左下肢屈曲(0.5分)。

(二)检查方法正确,动作规范(6.5分)

1.仰卧位触诊(4分)

考生左手掌置于被检者左腰部第9~11肋处,将其脾脏从后面托起(1分),右手掌平放于脐部(1分),右手三指(示、中、环指)伸直并拢,与肋缘大致呈垂直方向(1分),从脐水平开始,配合被检者腹式呼吸,用示、中指末端桡侧进行触诊,直至触及脾缘或左肋缘(1分)。

2.侧卧位触诊(2.5分)

嘱被检者右侧卧位,考生左手掌置于被检者左腰部第9~11肋处,将其脾脏从腰背部向腹部推(0.5分),右手三指(示、中、环指)伸直并拢,与肋缘大致呈垂直方向(1分),配合呼吸,用示、中指末端桡侧进行触诊,直至触及脾缘或左肋缘(1分)。

(三)检查结果正确(0.5分)

报告检查结果:脾脏肋下是否触及。

#### 四、职业素质(2分)

(一)体检前能向被检者告知。与被检者沟通时态度和蔼,体检中动作轻柔,能体现爱护被检者的意识。体检结束后能告知,有体现关爱被检者的动作(1分)。

(二)着装(工作服)整洁,仪表举止大方,语言文明,体检认真细致,表现出良好的职业素质(1分)。



## 第二站 体格检查

试题编号:9(注:出现重复因为原版考试题库为26大项体格检查任意组合)

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。	
体格检查考试项目:1.扁桃体检查(须口述检查内容);2.心脏触诊检查(须口述检查内容,报告检查结果);3.腹壁紧张度和腹部压痛、反跳痛检查(须报告检查结果)。 考试时间:15分钟	
评分标准	总分 20分
<b>一、扁桃体检查(须口述检查内容)(6分)</b>	
(一)检查方法正确	
告知被检查者取坐位,头略后仰,嘱其口张大并发长“啊”音(1分),此时考生用压舌板在被检者舌前2/3与后1/3交界处迅速下压(1分),在光照的配合下观察扁桃体(1分)	3分
(二)检查内容正确	
观察扁桃体有无红肿(0.5分),判断扁桃体肿大的程度(1分),其分泌物颜色、形状(0.5分),有无苔及片状假膜(1分)	3分
<b>二、心脏触诊检查(须口述检查内容,报告检查结果)(6分)</b>	
(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确	
告知被检者取坐位或仰卧位,充分暴露前胸部,考生站在被检者前面或右侧	0.5分
(二)检查内容和方法正确,动作规范	
1.心尖搏动及心前区搏动:考生用右手全手掌置于心前区(0.5分),示指、中指指腹并拢触诊(1分)。	1.5分
2.震颤:用手掌尺侧(小鱼际)在各瓣膜区(1.5分)和胸骨左缘第3、4肋间(0.5分)触诊	2分
3.心包摩擦感:在心前区或胸骨左缘第3、4肋间用小鱼际或并拢四指的掌面触诊。嘱被检者屏住呼吸,检查心包摩擦感有无变化(1分)	1分
(三)检查结果正确	
报告检查结果:心尖搏动的具体位置(正常成人心尖搏动位于第5肋间,左锁骨中线内侧(0.5~1.0cm),有无增强或减弱(0.5分)。心前区有无异常搏动、有无触及震颤和心包摩擦感(0.5分)	1分
<b>三、腹壁紧张度和腹部压痛、反跳痛检查(须报告检查结果)(6分)</b>	
(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确	
告知被检者取仰卧位,双腿屈曲,暴露腹部,腹部放松,考试站在被检者右侧	0.5分
(二)检查方法正确,动作规范	
1.腹壁紧张度	

续表

考生先将全手掌放于被检者腹壁上,让被检者适应片刻,此时可感受被检者腹壁紧张强度,然后以轻柔动作开始触诊(1分)。检查完一个区域后,考生的手应提起并离开腹壁,再以上述方法检查下一区域(0.5分)。一般先从左下腹开始,逆时针方向进行触诊,最后检查病痛部位(0.5分)	2分
2.腹部压痛、反跳痛	
考生先将全手掌放于被检者腹壁上,让被检者适应片刻,然后用手指指腹压于腹壁观察被检者有无疼痛反应(1分);当出现疼痛时,手指在远处停留片刻(1分),然后迅速将手指抬起观察被检者疼痛有无骤然加重(1分)。	3分
(三)检查结果正确	
报告检查结果:有无腹壁紧张和压痛、反跳痛(正常人腹软,无腹部压痛和反跳痛)	0.5分
<b>四、职业素质(2分)</b>	
(一)体检前能向被检者告知。与被检者沟通时态度和蔼,体检中动作轻柔,能体现爱护被检者的意识。体检结束后能告知,有体现关爱被检者的动作	1分
(二)着装(工作服)整洁,仪表举止大方,语言文明,体检认真细致,表现出良好的职业素质	1分



## 第二站 体格检查

试题编号:10(注:出现重复因为原版考试题库为26大项体格检查任意组合)

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。
体格检查考试项目:1、眼睑、巩膜、结膜检查(需口述检查内容);2、心脏触诊检查(需检查内容,报告检查结果);3、肺部听诊检查(需报告检查内容和结果)。 考试时间:15分钟
评分标准(总分20分)
<b>一、眼睑、巩膜、结膜检查(需口述检查内容)(6分)</b>
<p><b>(一)检查内容叙述正确(2.5分)</b> 眼睑有无水肿,上睑有无下垂,有无闭合障碍,有无倒睫(1分);巩膜有无黄染(0.5分);睑结膜有无苍白或充血,球结膜有无充血或水肿(1分)。</p> <p><b>(二)检查方法正确(3.5分)</b> 告知被检者闭眼、睁眼(0.5分)以示指和拇指捏起上睑中外1/3交界处的边缘,告知被检者向下看,趁机将眼睑轻轻向下方牵拉,示指向下压睑板上缘,与拇指配合将睑缘向上捻转(1分)。另嘱被检者向上看,以拇指轻压下眼睑下缘,充分暴露巩膜与结膜(1分)。同样方法检查另一侧(1分)。</p>
<b>二、心脏触诊检查(需口述检查内容,报告检查结果)(6分)</b>
<p><b>(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确(0.5分)</b> 告知被检者取坐位或仰卧位,充分暴露前胸部,考生站在被检者前面或右侧。</p> <p><b>(二)检查内容和方法正确,动作规范(4.5分)</b> 心尖搏动及心前区搏动:考生用右手全手掌置于心前区(0.5分),示指、中指指腹并拢触诊(1分)。 震颤:用手掌尺侧(小鱼际)在各瓣膜区(1.5分)和胸骨左缘第3、4肋间(0.5分)触诊。 心包摩擦感:在心前区或胸骨左缘第3、4肋间用小鱼际或并拢四指的掌面触诊。嘱被检者屏住呼吸,检查心包摩擦感有无变化(1分)。</p> <p><b>(三)检查结果正确(1分)</b> 报告检查结果:心尖搏动的具体位置(正常成人心尖搏动位于第5肋间,左锁骨中线内侧0.5~1.0cm),有无增强或减弱(0.5分)。心前区有无异常搏动、有无触及震颤和心包摩擦感(0.5分)。</p>
<b>三、肺部听诊检查(需报告检查内容和结果)(6分)</b>
<p><b>(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确(0.5分)</b> 告知被检者取仰卧位或坐位,充分暴露前胸部和背部,考生站在被检者右侧(坐位时站在被检者前面或后面)。</p> <p><b>(二)检查方法正确,动作规范(4.5分)</b> 考生用听诊器的膜型体件置于胸壁,听诊顺序由肺尖开始,自上而下,由前胸到侧胸、背部(1分),左右两侧对称部位进行比较(0.5分),每处至少听1~2个呼吸周期(0.5分)。要求被检者均匀而平静地呼吸,必要时嘱被检者深呼吸、屏气或咳嗽(0.5分)。 语音共振检查:嘱被检者用一般声音强度重复发“yi”长音(或耳语“1、2、3”),考生用听诊器的膜型体件在被检者胸壁由上而下、左右两侧对称部位对比听诊(1分)。 胸膜摩擦音检查:考生将听诊器的膜型体件置于被检者前下侧胸部进行听诊,嘱被检者屏住呼吸和深呼吸时重复听诊(1分)。</p> <p><b>(三)检查结果正确(1分)</b> 报告检查结果:双肺呼吸音是否清晰,有无增强或减弱,有无异常呼吸音,有无啰音,有无胸膜摩擦音,语音共振有无增强或减弱。</p>

**四、职业素质(2分)**

(一)体检前能向被检者告知。与被检者沟通时态度和蔼,体检中动作轻柔,能体现爱护被检者的意识。体检结束后能告知,有体现关爱被检者的动作(1分)。

(二)着装(工作服)整洁,仪表举止大方,语言文明,体检认真细致,表现出良好的职业素质(1分)。



## 第二站 体格检查

试题编号:11(注:出现重复因为原版考试题库为26大项体格检查任意组合)

请你对被检查者进行下列体格检查并回答提问。
<p>体格检查考试项目:1、对光反射检查(需报告检查结果);2、肺部听诊检查(需口述检查结果);3、甲状腺检查(需口述视诊内容和报告检查结果,前面触诊和后面触诊可任选一)。</p> <p>考试时间:15分钟</p>
评分标准(总分20分)
<b>一、对光反射检查(需报告检查结果)(6分)</b>
<p>(一)直接对光反射检查方法正确(2.5分)</p> <p>用手电筒照射被检者一侧瞳孔,观察该侧瞳孔变化(0.5分);快速移开光源后再次观察该侧瞳孔变化(1分)。用上述方法检查另侧瞳孔(1分)。</p> <p>(二)间接对光反射检查方法正确(2.5分)</p> <p>手或遮挡物在被检者鼻梁处遮挡光线,用手电筒照射一侧瞳孔,观察对侧瞳孔变化(0.5分);快速移开光源后再次观察对侧瞳孔变化(1分)。用上述方法检查另侧瞳孔(1分)。</p> <p>(三)检查结果正确(1分)</p> <p>双眼直接对光反射正常(正常人):受到光线刺激后瞳孔立即缩小,移开光源后瞳孔迅速复原(0.5分)。</p> <p>双眼间接对光反射正常(正常人):一侧瞳孔受到光线照射后,另一侧瞳孔立即缩小,移开光源,瞳孔复原(0.5分)。</p>
<b>二、肺部听诊检查(需报告检查结果)(6分)</b>
<p>(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确(0.5分)</p> <p>告知被检者取仰卧位或坐位,充分暴露前胸部和背部,考生站在被检者右侧(坐位时站在被检者前面和后面)。</p> <p>(二)检查方法正确,动作规范(4.5分)</p> <p>考生用听诊器的膜型体件置于胸壁,听诊顺序由肺尖开始,自上而下,由前胸到侧胸、背部(1分),左右两侧对称部位进行比较(0.5分),每处至少听1~2个呼吸周期(0.5分)。要求被检者均匀而平静地呼吸,必要时嘱被检者深呼吸、屏气或咳嗽(0.5分)。</p> <p>语音共振检查:嘱被检者用一般声音强度重复发“yi”长音(或耳语“1、2、3”),考生用听诊器的膜型体件在被检者胸壁由上而下,左右两侧对称部位对比听诊(1分)。</p> <p>胸膜摩擦音检查:考生将听诊器的膜型体件置于被检者前下侧胸部进行听诊,嘱被检者屏住呼吸和深呼吸时重复听诊(1分)。</p> <p>(三)检查结果正确(1分)</p> <p>报告检查结果:双肺呼吸音是否清晰,有无增强或减弱,有无异常呼吸音,有无啰音,有无胸膜摩擦音,语音共振有无增强或减弱。</p>
<b>三、甲状腺检查(需口述视诊内容和报告检查结果,前面触诊和后面触诊可任选一)(6分)</b>

(一)视诊(口述内容):观察甲状腺大小,是否对称(1分)

(二)触诊方法正确,动作规范(4分)

1.甲状腺侧叶触诊(3分)

后面触诊

告知被检者取坐位,考生站在其后,一手示、中指施压于一侧甲状软骨,将气管推向对侧(1分),另一手拇指在对侧胸锁乳突肌后缘向前推挤甲状腺,示、中指在其前缘触诊甲状腺(1分)。检查过程中,嘱被检者做吞咽动作,重复检查,用同样方法检查另一侧甲状腺(1分)。

前面触诊

告知被检者取坐位,考生面对被检者,考生一手拇指施压于一侧甲状软骨,将气管推向对侧(1分),另一手示、中指在对侧胸锁乳突肌后缘向前推挤甲状腺,拇指在胸锁乳突肌前缘触诊(1分),嘱被检者做吞咽动作,并随吞咽动作进行触诊。用同样方法检查另一侧甲状腺(1分)。

2.甲状腺峡部触诊(1分)

考生面对被检者,用拇指(或站在被检者后面用示指)自胸骨上切迹向上触摸,可触到气管前甲状腺组织,判断有无增厚,嘱被检者做吞咽动作。

(三)听诊方法正确,动作规范(0.5分)

考生用听诊器钟形体件放于甲状腺部位,两侧均需检查。

(四)检查结果正确(0.5分)

报告检查结果:甲状腺是否肿大,有无结节、震颤,听诊有无杂音。

#### 四、职业素质(2分)

(一)体检前能向被检者告知。与被检者沟通时态度和蔼,体检中动作轻柔,能体现爱护被检者的意识。体检结束后能告知,有体现关爱被检者的动作(1分)。

(二)着装(工作服)整洁,仪表举止大方,语言文明,体检认真细致,表现出良好的职业素质(1分)。





## 第二站 体格检查

试题编号:12(注:出现重复因为原版考试题库为26大项体格检查任意组合)

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。	
体格检查考试项目:1、眼睑、巩膜、结膜检查(须口述检查内容);2、肺部听诊检查(须报告检查结果);3、腹部移动性浊音检查(须报告检查结果)。 考试时间:15分钟	
评分标准	总分 20分
<b>一、眼睑、巩膜、结膜检查(须口述检查内容)(6分)</b>	
(一)检查内容叙述正确	
眼睑有无水肿,上睑有无下垂,有无闭合障碍,有无倒睫(1分);巩膜有无黄染(1分);睑结膜有无苍白或充血,球结膜有无充血或水肿(1分)	3分
(二)检查方法正确	
告知被检者闭眼、睁眼(0.5分)以示指和拇指捏起上睑中外1/3交界处的边缘,告知被检者向下看,趁机将眼睑轻轻向下方牵拉,示指向下压睑板上缘,与拇指配合将睑缘向上捻转(1分)。另嘱被检者向上看,以拇指轻压下睑下缘,充分暴露巩膜与结膜(1分)。同样方法检查另一侧(0.5分)	3分
<b>二、肺部听诊检查(须报告检查结果)(6分)</b>	
(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确	
告知被检者取仰卧位或坐位,充分暴露前胸部和背部,考生站在被检者右侧(坐位时站在被检者前面和后面)	0.5分
(二)检查方法正确,动作规范	
考生用听诊器的膜型体件在胸壁检查,听诊顺序由肺尖开始,自上而下,由前胸到侧胸、背部(1分),左右两侧对称部位进行比较(0.5分),每处至少听1~2个呼吸周期(0.5分)。要求被检者均匀而平静地呼吸,必要时嘱被检者深呼吸、屏气或咳嗽(0.5分)	2.5分
语音共振检查:嘱被检者用一般声音强度重复发“yi”长音(或耳语“1、2、3”),考生用听诊器的膜型体件在被检者胸壁由上而下,左右两侧对称部位对比听诊	1分
胸膜摩擦音检查:考生将听诊器的膜型体件置于被检者前下侧胸部进行听诊,嘱被检者屏住呼吸和深呼吸时重复听诊	1分
(三)检查结果正确	
报告检查结果:双肺呼吸音是否清晰,有无增强或减弱,有无异常呼吸音,有无啰音,有无胸膜摩擦音,语音共振有无增强或减弱	1分
<b>三、腹部移动性浊音检查(须报告检查结果)(6分)</b>	
(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确	
告知被检者取仰卧位,双腿屈曲,暴露腹部,腹部放松,考生站在被检者右侧	0.5分
(二)检查方法正确,动作规范	

续表

考生自被检者腹中部脐水平向左侧腹部叩诊,直至出现浊音,左手扳指不离开腹壁(1分),请被检者右侧卧(1分),再继续叩诊,若叩诊音呈鼓音,则为移动性浊音阳性(1分)。自该处继续向腹下侧叩诊,直至再度出现浊音(1分);再请被检者左侧卧,同样方法叩击(1分)	5分
(三)检查结果正确	
报告检查结果:移动性浊音阳性或阴性(正常人移动性浊音检查为阴性)	0.5分
<b>四、职业素质(2分)</b>	
(一)体检前能向被检者告知。与被检者沟通时态度和蔼,体检中动作轻柔,能体现爱护被检者的意识。体检结束后能告知,有体现关爱被检者的动作	1分
(二)着装(工作服)整洁,仪表举止大方,语言文明,体检认真细致,表现出良好的职业素质	1分



## 第二站 体格检查

试题编号:13(注:出现重复因为原版考试题库为26大项体格检查任意组合)

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。	
体格检查考试项目:1、眼睑、巩膜、结膜检查(需口述检查内容);2、乳房触诊检查(使用女性胸部模具,需口述检查内容,报告检查结果);3、腹部移动性浊音检查(需报告检查结果)。 考试时间:15分钟	
评分标准	总分 20分
<b>一、眼睑、巩膜、结膜检查(需口述检查内容)(6分)</b>	
(一)检查内容叙述正确	
眼睑有无水肿,上睑有无下垂,有无闭合障碍,有无倒睫(1分);巩膜有无黄染(1分);睑结膜有无苍白或充血,球结膜有无充血或水肿(1分)	3分
(二)检查方法正确	
告知被检者闭眼、睁眼(0.5分)以示指和拇指捏起上睑中外1/3交界处的边缘,告知被检者向下看,趁机将眼睑轻轻向下方牵拉,示指向下压睑板上缘,与拇指配合将睑缘向上捻转(1分)。另嘱被检者向上看,以拇指轻压下眼睑下缘,充分暴露巩膜与结膜(1分)。同样方法检查另一侧(0.5分)	3分
<b>二、乳房触诊检查(使用女性胸部模具,需报告检查结果)(6分)</b>	
(一)考生站位正确	
充分暴露被检者前胸,考生站在其前面或右侧	0.5分
(二)检查方法正确,动作规范(4.5分)	
考生的手指和手掌平置在乳房上,用指腹轻施压力,以旋转或来回滑动进行触诊(1分)。双侧乳房触诊先由健侧开始,后检查患者(0.5分)。检查左侧乳房时,由外上象限开始。沿顺时针方向由浅入深触诊,直至4个象限检查完毕(1分),最后触诊乳头(1分)。检查右侧乳房也从外上象限开始,沿逆时针方向进行触诊(1分)	4.5分
(三)检查结果正确	
报告检查结果:双侧乳房有无触(压)痛,有无包块及其大小、位置、硬度、活动度、压痛(0.5分),乳头有无触痛,有无硬结、弹性消失(0.5分)	1分
<b>三、腹部移动性浊音检查(需报告检查结果)(6分)</b>	
(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确	
告知被检者取仰卧位,双腿屈曲,暴露腹部,腹部放松,考生站在被检者右侧	0.5分
(二)检查方法正确,动作规范	
考生自被检者腹中部脐水平向左侧腹部叩诊,直至出现浊音,左手扳指不离开腹壁(1分)请被检者右侧卧(1分),再继续叩诊,若叩诊音呈鼓音,则为移动性浊音阳性(1分)。自该处继续向腹下侧叩诊,直至再度出现浊音(1分);再请被检者左侧卧,同样方法叩诊(1分)	5分

续表

(三)检查结果正确	
报告检查结果:移动性浊音阳性或阴性(正常人移动性浊音检查为阴性)	0.5分
四、职业素质(2分)	
(一)体检前能向被检者告知。与被检者沟通时态度和蔼,体检中动作轻柔,能体现爱护被检者的意识。体检结束后能告知,有体现关爱被检者的动作	1分
(二)着装(工作服)整洁,仪表举止大方,语言文明,体检认真细致,表现出良好的职业素质	1分



## 第二站 体格检查

试题编号:14(注:出现重复因为原版考试题库为26大项体格检查任意组合)

请你对被检者进行下列体格检查并回答提问。	
体格检查考试项目:1、腋窝淋巴结检查(需口述检查内容和报告检查结果);2、胸廓扩张度(前)检查(需报告检查结果);3、肝脏触诊(单、双手触诊)(需报告检查结果)。	
考试时间:15分钟	
评分标准	总分 20分
<b>一、腋窝淋巴结检查(需口述检查内容和报告检查结果)(6分)</b>	
(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确	
告知被检者取坐位或仰卧位,考生站在被检者前面或右侧	0.5分
(二)检查方法正确,动作规范	
检查左侧时,考生左手握被检者左手,将其前臂稍外展(1分),右手三指(示、中、环指)并拢,稍弯曲,由浅入深触诊被检者左侧腋窝淋巴结(0.5分)	1.5分
两侧均需检查,以左手检查右腋窝,步骤同左侧(1分)	1分
(三)检查内容、部位正确	
腋窝的5组淋巴结群(腋尖群、中央群、胸肌群、肩胛下群、外侧群)均应触诊	
腋尖群:位于腋窝顶部	0.5分
中央群:位于腋窝内侧壁近肋骨及前锯肌处	0.5分
胸肌群:位于胸大肌下缘深部	0.5分
肩胛下群:位于腋窝后皱襞深部	0.5分
外侧群:位于腋窝外侧壁	0.5分
(四)检查结果正确	
报告检查结果:是否触及淋巴结	0.5分
<b>二、胸廓扩张度(前)检查(需口述检查内容)(4分)</b>	
(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确	
告知被检者取坐位或仰卧位,充分暴露前胸部,考生站在被检者前面或右侧	1分
(二)检查内容正确,动作规范	
考生双手放在被检者胸廓前侧部,双拇指分别沿两侧肋缘指向剑突,拇指尖在前正中线两侧对称部位,手掌和伸展的手指置于前侧胸壁(1分),嘱被检者作深呼吸运动,利用手掌感觉并观察双侧呼吸运动强度和一致性(1分)	2分
(三)检查结果正确	
报告检查结果:(正常人)两侧胸廓呈对称性的张缩	1分
<b>三、肝脏触诊(单、双手触诊)(需报告检查结果)(8分)</b>	
(一)考生站位正确,告知被检者体位、姿势正确	

续表

告知被检者取仰卧位,双腿屈曲,暴露腹部,腹部放松,做腹式呼吸,考生站在被检者右侧	0.5
(二)检查方法正确,动作规范	
1.单手触诊	
考生将右手四指并拢,掌指关节伸直,平行地放在被检者右侧腹部脐水平线上,用示、中指末端桡侧进行触诊(1分),嘱做腹式呼吸,被检者呼气时,手指压向腹深部,吸气时,手指向上迎触下移的肝下缘(1分)。如此反复进行,并逐渐向肋缘方向滑动,直至触及肝下缘或右肋缘(2分)	4分
2.双手触诊	
考生右手位置同单手触诊(1分),左手托住被检者右腰部,拇指张开置于季肋部,触诊时左手向上推(1分),右手触诊方法同单手触诊(1分)	3分
(三)检查结果正确	
报告检查结果:肝脏肋下是否触及	0.5分
<b>四、职业素质(2分)</b>	
(一)体检前能向被检者告知。与被检者沟通时态度和蔼,体检中动作轻柔,能体现爱护被检者的意识。体检结束后能告知,有体现关爱被检者的动作	1分
(二)着装(工作服)整洁,仪表举止大方,语言文明,体检认真细致,表现出良好的职业素质	1分



## 第三站 基本操作

试题编号:1 穿、脱隔离衣

<p>临床情景:您作为一位住院医师,准备进入隔离病房检查患者病情。 要求:请完成在半污染区穿隔离衣的操作,并脱隔离衣备用。 考试时间:10 分钟</p>	
评分标准(全过程任何步骤违反无菌操作原则,一处扣 2 分)	总分 20 分
<b>一、穿隔离衣过程</b>	
1.准备工作:戴帽子、口罩(头发、鼻孔不外露),洗手(口述)。手持衣领从衣钩上取下隔离衣,清洁面朝自己将衣服展开,露出肩袖内口	2 分
2.一手持衣领,另一手伸入袖内并向上抖,拉衣袖使手露出。同法穿好另一袖	2 分
3.两手沿衣领边缘由前向后,在颈后系好领口,然后扣好袖扣或系上袖带	2 分
4.从腰下 5 cm 侧衣缝处将隔离衣后身部分向前拉并触及衣边,捏住。同法将另一侧衣边捏住	2 分
5.两手在背后将两侧衣边对齐,向一侧按压折叠,以一手按住,另一手将腰带拉至背后压住折叠处,在背后交叉,回到前面打一活结,系好腰带	2 分
<b>二、脱隔离衣过程</b>	
1.解好腰带,将腰带牵至身前,并打一活结	1 分
2.解开袖口,在肘部将部分袖管塞入袖内,暴露前臂	1 分
3.消毒双手,从前臂至指尖刷洗两分钟,清水冲洗擦干(口述)	2 分
4.解开衣领	1 分
5.一手伸入另一侧袖口内清洁面,拉下衣袖过手;再用衣袖遮盖着的手在外面拉下另一衣袖;两手在袖内使袖子对齐,双臂逐渐退出	2 分
6.双手持衣领,将隔离衣清洁面向外两边对齐,挂在钩上	1 分
<b>三、职业素质(2 分)</b>	
1.在操作过程中,无菌观念强,动作规范,体现出爱护患者的意识	1 分
2.着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现出良好的职业素质	1 分

## 第三站 基本操作

试题编号:2 切开、缝合

临床情景:李先生,23岁。发现左上臂皮肤肿块2年,近期稍增大。体检扪及局部2.5 cm×2 cm肿块,质软,边界清。初步诊断为脂肪瘤。拟行脂肪瘤切除术。 要求:请为患者(医学模拟人或模具)行切开、缝合的操作(切口长3 cm,间断缝合3针,不做肿瘤切除)。 考试时间:10分钟	
评分标准(全过程任何步骤违反无菌操作原则,一处扣2分)	总分 20分
<b>一、操作前准备</b>	
1.戴帽子、口罩(头发、鼻孔不外露),手术刷手(口述)	1分
2.预定切口为中心从内向外行手术区域的常规消毒3遍,范围正确,手术区铺洞巾	1分
3.戴无菌手套	1分
4.选择合适的手术刀片、三角针、缝线	1分
<b>二、切开、缝合操作过程</b>	
1.用2%利多卡因行局部浸润麻醉	1分
2.安装刀片正确	1分
3.用拇指和食指在切口两侧固定皮肤;在模具上做皮肤切开,执刀方法正确;切开的手法正确(垂直下刀,水平走刀,垂直出刀)	4分
4.切口长度适中,切口整齐,深度均匀	1分
5.缝合前先用70%乙醇棉球消毒切口旁皮肤,一手持有齿镊,另一手持持针钳,握持方法正确,持针钳夹针位置正确(于缝针的中后2/3~1/4处)	1分
6.缝合伤口:缝合手法正确(垂直进针,沿缝针弧度挽出),不留死腔;打结手法正确,松紧适度,剪线手法正确,线头长短适中	4分
7.针距、边距恰当(通常针距为1 cm,边距为0.5 cm),皮肤对合整齐	2分
<b>三、职业素质(2分)</b>	
1.在操作过程中,无菌观念强,动作规范,体现出爱护患者的意识	1分
2.着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现出良好的职业素质	1分



## 第三站 基本操作

试题编号:3 吸痰术

临床情景:王先生,68岁。直肠癌手术后第6天。气喘、痰多且黏稠,难以咳出,影响呼吸,需吸痰治疗。	
要求:请为患者(医学模拟人)吸痰。	
考试时间:10分钟	
评分标准(全过程任何步骤违反无菌操作原则,一处扣2分)	总分20分
<b>一、操作前准备</b>	
1.将治疗台(盘)放置床旁,患者取半卧位或仰卧位	1分
2.吸痰器接通电源,检查吸引器性能是否良好,吸收管是否通畅,调节负压在40~53.3 kPa (300~400 mmHg)	3分
3.戴帽子、口罩(头发、鼻孔不外露)和手套,铺治疗巾	1分
<b>二、吸痰操作过程</b>	
1.连接吸痰管,试吸少量生理盐水确定其通畅并浸润导管	2分
2.一手反折吸痰管末端(使用控制侧孔装置的,打开侧孔),另一手持其前端,向口腔插入吸痰管至咽喉部	2分
3.松开吸痰管末端反折(使用控制侧孔装置的,按压侧孔),吸尽口腔和咽喉部分泌物	2分
4.更换吸痰管	1分
5.再次反折吸痰管末端(使用控制侧孔装置的,打开侧孔),另一手持其前端,在无负压的状态下经一侧鼻孔在患者吸气时插入至气管深部,松开反折,吸尽气管深部分泌物	2分
6.吸痰时以轻巧的动作左右旋转、上下提插,以便吸尽气管内痰液	2分
7.吸痰后抽吸生理盐水冲洗管道,关闭吸引器开关	1分
8.处理吸痰管、脱手套。整理操作器械	1分
<b>三、职业素质</b>	
1.在操作过程中,无菌观念强,动作规范,体现出爱护患者的意识	1分
2.着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现出良好的职业素质	1分

## 第三站 基本操作



试题编号:4 手术区域皮肤消毒、铺巾

<p>临床情景:赵先生,40岁。突发上腹痛6小时。腹肌紧张,立位腹平片膈下见游离气体。拟行上腹部剖腹探查术。已完成术前准备,赵先生仰卧于手术台上。</p>
<p>要求:请用碘伏为患者(医学模拟人)进行手术区域皮肤消毒,并铺手术巾、手术单。 考试时间:10分钟 评分标准(总分20分)(全过程任何步骤违反无菌操作原则,一处扣2分)</p>
<p><b>一、消毒前准备(3分)</b></p> <p>(一)戴帽子、口罩(头发、鼻孔不外露)(0.5分)。 (二)手术野皮肤暴露范围正确:上自乳头连线水平以上,下至大腿中段,两侧至腋后线(2分)。 (三)手术刷手(可口述)(0.5分)。</p>
<p><b>二、消毒操作过程(9分)</b></p> <p>(一)考生一手端盛有碘伏棉球的消毒碗,另一手持卵圆钳,站立于患者右侧(1分)。 (二)首先将碘伏滴入肚脐眼内,涂擦时绕过肚脐。涂擦完毕,翻过卵圆钳用棉球的另一侧将肚脐内的消毒液蘸干(第2遍和第3遍可不再专门沾肚脐,也可以和第1遍相同)(2分)。 (三)以上腹部探查切口为中心。自上而下、由内及外消毒皮肤(1分)。各次消毒涂擦之间不留空白区(1分)。 (四)共消毒3遍,每遍均不超过前次范围(1分)。 (五)消毒过程中,一直保持卵圆钳头端低于握持端(2分)。 (六)消毒范围上自乳头连线,下至大腿上、中三分之一交界处,两侧至腋中线(1分)。</p>
<p><b>三、铺巾操作过程(6分)</b></p> <p>(一)用四块无菌巾,内折少许,铺盖在拟定切口四周,反折部靠近切口。铺巾后手术野皮肤暴露不要过于宽大(2分)。 (二)先铺考生对侧或患者会阴侧无菌巾,最后铺靠近考生侧的无菌巾。用四把巾钳固定(2分)。 (三)铺中单(考官协助):在拟定切口上下方各铺一块中单(1分)。 (四)铺大单(考官协助):铺大单时先将洞口对准拟定切口,然后将大单头端盖过麻醉架,两侧和足端下垂超过手术台边30cm(1分)。</p>
<p><b>四、职业素质(2分)</b></p> <p>(一)在操作过程中,无菌观念强,动作轻柔规范,体现爱护患者的意识(1分)。 (二)着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现出良好的职业素质(1分)。</p>

## 第三站 基本操作



腰椎穿刺术

试题编号:5 腰椎穿刺术

<p>临床情景:患儿,男性,10岁。头痛、发热2天,伴有喷射状呕吐。急诊室初步诊断为急性脑膜炎。需作脑脊液检查。</p>
<p>要求:请为患儿(医学模拟人)行腰椎穿刺并测脑脊液压力。 考试时间:10分钟 评分标准(总分20分)(全过程中任何步骤违反无菌操作原则,一处扣2分)</p>
<p><b>一、操作前准备(5分)</b></p> <p>(一)戴帽子、口罩(头发、鼻孔不外露),洗手(口述)(1分)。 (二)模拟人侧卧于硬板床上,背部与床面垂直,头向前胸屈曲,两手抱膝紧贴腹部,使躯干呈弓形;或由助手在考生对面一手挽住模拟人头部,另手挽双下肢腘窝处并用力抱紧,使脊柱尽量后凸以增宽椎间隙,便于进针。(1分)。 (三)选择常用的穿刺点之一并在体表定位(一般以第3~4腰椎棘突间隙为穿刺点,即两侧髂嵴连线与后正中线的交会处,也可上移或下移一个腰椎间隙)(2分)。 (四)常规消毒皮肤:以穿刺点为中心由内及外消毒2遍,范围正确(1分)。</p>
<p><b>二、腰椎穿刺操作过程(13分)</b></p> <p>(一)戴无菌手套(1分)。 (二)铺洞巾(1分)。 (三)用2%利多卡因自穿刺点皮肤至椎间韧带进行逐层浸润麻醉(1分)。 (四)用左手固定穿刺点皮肤,右手持穿刺针以垂直背部或针尖稍斜向头部的方向缓慢刺入(2分)。 (五)当感到穿刺阻力突然消失(即针头穿过韧带与硬脊膜),此时将针芯慢慢抽出,见有脑脊液流出(2分)。 (六)测压与放液:接测压管测量脑脊液压力并记录(2分)。撤去测压管,用试管收集适量脑脊液送检(1分)。 (七)收集脑脊液后将针芯插入,缓慢拔出穿刺针,按压穿刺点。消毒穿刺点,无菌纱布覆盖,胶布固定(1分)。 (八)嘱患者去枕平卧4~6小时(2分)。</p>
<p><b>三、职业素质(2分)</b></p> <p>(一)操作前能以和蔼的态度告知患者腰椎穿刺的目的,取得患者的配合。操作时注意无菌观念,动作轻柔规范,体现爱护患者的意识,操作结束后告知患者相关注意事项(1分)。 (二)着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现出良好的职业素质(1分)。</p>

## 第三站 基本操作



心肺复苏

试题编号:6 心肺复苏

<p>临床情景:杨先生,67岁。因心前区压榨样疼痛伴出汗半小时急诊就诊。查体时,患者突然四肢抽搐,意识丧失,心音听不到。</p> <p>要求:请为患者(医学模拟人)行心肺复苏抢救,至少做2个循环。</p> <p>考试时间:10分钟</p>	
评分标准(全过程任何步骤违反无菌操作原则,一处扣2分)	总分 20分
<b>一、操作前准备</b>	
使患者仰卧于硬质平面上	2分
<b>二、心肺复苏操作过程</b>	
1.考生站在或跪在患者身体右侧。两手掌根部重叠置于胸骨中、下1/3交界处,手指抬起不触及胸壁	2分
2.肘关节伸直,借助身体重力垂直向下按压,按压力度使胸骨下陷至少5~6cm,立刻放松,按压和放松时间一致,放松时手掌不离开按压部位。按压频率100~120次/分钟	3分
3.清除口、鼻腔分泌物、异物等,保持呼吸道通畅	2分
4.右手抬起患者颈部,使其头部后仰,左手按压患者前额保持其头部后仰位置,使患者下颌和耳垂连线与地面垂直,右手将患者的下颌向上提起,左手以拇指和示指捏紧患者的鼻孔	3分
5.平静吸气后,将口唇紧贴患者口唇,把患者口部完全包住,深而快地向患者口内吹气,应持续1秒钟以上,直至患者胸廓向上抬起。吹气量每次500~600ml	2分
6.然后使患者的口张开,并松开捏鼻的手指,观察胸部恢复状况,再进行下一次人工呼吸	2分
7.每胸外按压30次进行2次人工呼吸,至少做2个循环	2分
<b>三、职业素质</b>	
1.在操作过程中,无菌观念强,动作规范,体现出爱护患者的意识	1分
2.着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现出良好的职业素质	1分



## 第三站 基本操作

试题编号:7 清创术

临床情景:祝先生,47岁。事故中左侧大腿前部软组织损伤2小时。伤口长4cm,深达肌层,有渗血,并有轻度污染。	
要求:请为患者(医学模拟人或模具)行清创术,并单纯间断缝合2针。 考试时间:10分钟	
评分标准(全过程任何步骤违反无菌操作原则,一处扣2分)	总分20分
<b>一、操作前准备(2分)</b>	
(一)戴帽子、口罩(头发、鼻孔不外露),洗手(口述) (二)戴无菌手套	2分
<b>二、清创、缝合操作过程(16分)</b>	
(一)用无菌纱布覆盖伤口,用肥皂水刷洗伤口周围皮肤	1分
(二)移去伤口纱布,用3%双氧水及生理盐水反复冲洗伤口,初步检查伤口	2分
(三)脱手套,消毒手臂(口述)	1分
(四)伤口周围皮肤消毒2~3遍,操作规范,范围正确,铺洞巾	2分
(五)戴无菌手套	1分
(六)用2%利多卡因沿切口行局部浸润麻醉	1分
(七)修剪创缘皮肤,去除可能存在的异物及失活组织(2分)。用3%双氧水和生理盐水再次冲洗伤口(2分)	4分
(八)缝合操作:缝合手法正确(垂直进针,沿缝针弧度挽出),不留死腔	2分
(九)用70%酒精棉球消毒伤口周围皮肤(1分)。用无菌纱布或棉垫覆盖伤口,胶布固定(1分)	2分
<b>三、职业素质(2分)</b>	
(一)操前能以和蔼的态度告知患者操作的目的,取得患者的配合。操作时注意无菌观念,动作轻柔规范,体现爱护患者的意识,操作结束后告知患者相关注意事项	1分
(二)着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现出良好的职业素质	1分

## 第三站 基本操作

试题编号:8 四肢骨折现场急救外固定术

<p>临床情景:王先生,26岁。在车祸中受伤,现场急救人员初步诊断为右小腿开放性骨折,伤口未见活动性出血。</p>
<p>要求:请为患者(医学模拟人)行现场伤口包扎并用夹板行骨折外固定。</p> <p>考试时间:10分钟</p> <p>评分标准(总分20分)</p>
<p><b>一、操作前准备(4分)</b></p>
<p>(一)检测患者生命体征(口述)(2分)。</p> <p>(二)检查患肢:暴露右小腿,了解伤口及右下肢有无畸形和反常活动等情况(2分)。</p>
<p><b>二、伤口包扎及夹板外固定操作过程(14分)</b></p>
<p>(一)充分暴露伤口,除去伤口周围污物(2分)。</p> <p>(二)伤口处覆盖无菌纱布或棉垫并包扎(2分)。</p> <p>(三)选用2块夹板,其长度超过膝关节及踝关节,置于右小腿外侧和内侧(2分)。</p> <p>(四)固定前用毛巾等软物铺垫在夹板与肢体间(2分)</p> <p>(五)夹板上端固定至大腿,下端固定至踝关节及足底(3分),绷带捆扎,松紧度以绷带上下可移动1cm为宜(3分)。</p>
<p><b>三、职业素质(2分)</b></p>
<p>(一)操作前能以和蔼的态度告知患者包扎固定的目的,取得患者的配合,缓解焦虑紧张情绪。操作时动作轻柔规范,体现爱护患者的意识。操作结束后告知患者相关注意事项(1分)。</p> <p>(二)着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现出良好的职业素质(1分)。</p>



## 第三站 基本操作

试题编号:9 换药

临床情景:张女士,33岁。因甲状腺腺瘤行右侧甲状腺次全切除术。术后第2天。	
要求:请为患者(医学模拟人或模具)切口换药。 考试时间:10分钟	
评分标准(全过程任何步骤违反无菌操作原则,一处扣2分)	总分 20分
<b>一、操作前准备(4分)</b>	
(一)戴帽子、口罩(头发、鼻孔不外露),洗手(口述)	1分
(二)患者取仰卧位,充分暴露手术切口部位	1分
(三)材料准备:两只换药碗(盘)、两把镊子、适量的70%酒精棉球和敷料等	2分
<b>二、换药过程(14分)</b>	
(一)用手移去外层敷料(1分),内层敷料用镊子夹起,将其放置在盛污物的换药碗(盘)内(2分)	3分
(二)一把镊子接触伤口,另一把镊子传递换药碗中的清洁物品(4分);操作过程中,镊子头部应低于手持部以避免污染(3分)	7分
(三)观察伤口的情况(口述)。用70%酒精棉球消毒伤口周围皮肤2遍	2分
(四)无菌敷料覆盖伤口并固定。粘贴胶布的方向应与躯干长轴垂直,长短适宜	2分
<b>三、职业素质(2分)</b>	
(一)操前能以和蔼的态度告知患者操作的目的,取得患者的配合。操作时注意无菌观念,动作轻柔规范,体现爱护患者的意识,操作结束后告知患者相关注意事项	1分
(二)着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现出良好的职业素质	1分

## 第三站 基本操作

试题编号:10 男性导尿

临床情景:周先生,70岁,确诊胃癌3天入院,拟行胃大部切除术,术前需留置导尿	
要求:请用普通导尿管为患者(医用模拟人或模具)留置导尿 考试时间:10分钟	
评分标准	20分
一、操作过程(17分,全过程任何步骤违反无菌操作原则,一处扣2分,扣完为止)	
(一)操作前准备(3分)	
1.戴帽子、口罩(头发、鼻孔不外露)(0.5分);洗手(口述)(0.5分)	1分
2.物品准备:无菌导尿包,普通导尿管,无菌手套,碘伏,20ml注射器,生理盐水,胶布等	0.5分
3.告知患者及家属留置导尿目的并取得患者配合	0.5分
4.嘱患者取屈膝仰卧位,两腿略外展,暴露外阴	1分
(二)留置导尿操作过程(14分)	
1.消毒外阴:打开无菌导尿包外层,将垫巾置于患者臀下,将弯盘置于患者会阴处(0.5分);右手持钳或镊子夹取碘伏棉球,依次消毒阴阜、阴茎、阴囊(1分);左手戴手套用无菌纱布裹住阴茎将包皮向后推,暴露尿道口(0.5分);自尿道口向外后旋转擦拭尿道口、龟头及冠状沟3遍(1分)	3分
2.脱去手套,打开无菌导尿包内层,更换无菌手套,铺洞巾	1分
3.用液体石蜡润滑导尿管前段,置于弯盘中	1分
4.无菌纱布裹住阴茎并提起,用消毒棉球再次擦拭尿道口、龟头及冠状沟,最后再次消毒尿道口,每个棉球仅用1次	3分
5.使阴茎与腹壁呈60°角,右手持锁子将导尿管慢慢插入尿道约20cm~22cm,见尿液流出(可口述)	2分
6.缓慢退出导尿管至无尿液流出(可口述),再插入约2cm	2分
7.用胶布固定导尿管于阴茎及周围皮肤上,导尿管末端接集尿袋	1分
8.操作结束后整理物品,告知患者及家属相关注意事项	1分
二、医学人文素养(3分)	
(一)仪表端庄,举止大方,着装(工作服)整洁	0.5分
(二)操作时动作规范,认真细致(0.5分),有体现关爱操作对象的动作(0.5分),注意保护隐私(0.5分)	1.5分
(三)主动自我介绍(0.5分),语言文明,态度和蔼(0.5分)	1分



## 第三站 基本操作



万能公式

试题编号:10 男性导尿

临床情景:周先生,70岁,确诊胃癌3天入院,拟行胃大部切除术,术前需留置导尿	
要求:请用普通导尿管为患者(医用模拟人或模具)留置导尿 考试时间:10分钟	
评分标准	20分
一、操作过程(17分,全过程任何步骤违反无菌操作原则,一处扣2分,扣完为止)	
(一)操作前准备(3分)	
1.戴帽子、口罩(头发、鼻孔不外露)(0.5分);洗手(口述)(0.5分)	1分
2.物品准备:无菌导尿包,普通导尿管,无菌手套,碘伏,20ml注射器,生理盐水,胶布等	0.5分
3.告知患者及家属留置导尿目的并取得患者配合	0.5分
4.嘱患者取屈膝仰卧位,两腿略外展,暴露外阴	1分
(二)留置导尿操作过程(14分)	
1.消毒外阴:打开无菌导尿包外层,将垫巾置于患者臀下,将弯盘置于患者会阴处(0.5分);右手持钳或镊子夹取碘伏棉球,依次消毒阴阜、阴茎、阴囊(1分);左手戴手套用无菌纱布裹住阴茎将包皮向后推,暴露尿道口(0.5分);自尿道口向外后旋转擦拭尿道口、龟头及冠状沟3遍(1分)	3分
2.脱去手套,打开无菌导尿包内层,更换无菌手套,铺洞巾	1分
3.用液体石蜡润滑导尿管前段,置于弯盘中	1分
4.无菌纱布裹住阴茎并提起,用消毒棉球再次擦拭尿道口、龟头及冠状沟,最后再次消毒尿道口,每个棉球仅用1次	3分
5.使阴茎与腹壁呈60°角,右手持锁子将导尿管慢慢插入尿道约20cm~22cm,见尿液流出(可口述)	2分
6.缓慢退出导尿管至无尿液流出(可口述),再插入约2cm	2分
7.用胶布固定导尿管于阴茎及周围皮肤上,导尿管末端接集尿袋	1分
8.操作结束后整理物品,告知患者及家属相关注意事项	1分
二、医学人文素养(3分)	
(一)仪表端庄,举止大方,着装(工作服)整洁	0.5分
(二)操作时动作规范,认真细致(0.5分),有体现关爱操作对象的动作(0.5分),注意保护隐私(0.5分)	1.5分
(三)主动自我介绍(0.5分),语言文明,态度和蔼(0.5分)	1分





